600037270P

G.121.f.23

E. BIBL. RADCL.

C.

16544 e 151/3

Digitized by Google

Digitized by Google

600037270P

G. 121. I. 23

E. BIBL. RADCL.

C.

16544 e 131/3

Digitized by Google

Digitized by Google

Friedrich Hildebrandt's,
weiland der Arzneikunde und Weltweisheit ordentl. öffentl. Lehrers an der Universität zu Erlangen, königl. preuß. Hofraths, Mitgliedes vieler gelehrter Akademien und Gesellschaften,

Handbuch

der

Anatomie des Menschen.

Vierte

umgearbeitete und sehr vermehrte Ausgabe

besorgt von

Ernst Heinrich Weber,
ordentlichem Professor der Anatomie an der Universität zu Leipzig, der Med. und Philos. Dr., corresp. Mitgliede der königlichen Akademien der Wissenschaften zu Berlin und Turin, so wie auch der naturforschenden und medicinischen Gesellschaften zu Leipzig, Dresden, Halle, Erlangen, Moskau und Stockholm.

Dritter Band.

Das Gefäß- und Nervensystem.

Braunschweig,
Verlag der Schulbuchhandlung.
1831.

Digitized by Google

Digitized by Google

Vorrede

zum dritten Bande.

Bei genauer Vergleichung wird man finden, daß dieser Band mehr Zusätze und eine vollkommnere Umarbeitung bedurfte und erhalten hat, als der zweite Band. Bei den bis Seite 123 reichenden Betrachtungen über den Bau, die Verbreitung und die Wirkungsart der Arterien, Venen und Lymphgefäße konnte das, was in der älteren Ausgabe des Handbuchs enthalten war, nicht mehr als die in andern Büchern vorkommenden Notizen benutzt werden. Bei der Lehre vom Baue des Herzens mußte eine kritische, durch eigne Untersuchungen unterstützte Vergleichung der von Gerdy neuerlich gegebenen Beschreibung mit den mühevollen Untersuchungen Wolffs und anderer Anatomen angestellt, und der ganzen Darstellung eine andere Form gegeben werden. Bei der Beschreibung des Arteriensystems wurden die Werke von Münz, Tiedemann, Langenbeck und von andern benutzt, bei der des Venensystems ist alles das hinzugethan worden, was man Breschet verdankt. Die Abweichungen der Arterien von der Regel sind für den Chirurgen zu wichtig, als daß sie hier übergangen werden durften. Die Zusammenstellung dieser Abweichungen aber, bei welchen vorzüglich Meckel's und Otto's wichtige Werke zum Grunde gelegt, zugleich aber viele einzelne Schriften und Abhandlungen benutzt worden sind, ist Herrn Aßmann zuzuschreiben. Die Einleitung zur Beschreibung des Nervensystems ist, wie alle diese Einleitungen, von mir neu ausgearbeitet worden. Das Gehirn und Rückenmark hat, seitdem die letzte Ausgabe dieses

Digitized by Google

Handbuchs erschienen ist, so viele, zum Theil sehr ausgezeichnete Anatomen beschäftigt, unter andern Wenzel, Gall, Reil, Carus, Döllinger, Meckel, Tiedemann, Burdach, Treviranus, Serres, Rosenthal, Desmoulin, Langenbeck, Laurencet und Rolando, daß diese Lehre eine ganz neue Gestalt erhalten mußte. Dabei konnten nur Rolando's Werke über das Rückenmark und über das verlängerte Mark, nicht aber das kürzlich erschienene Werk desselben über das große Gehirn benutzt werden. Endlich mußte aber auch die Beschreibung der Nerven nach den wichtigen neuen Untersuchungen Bocks über das fünfte Nervenpaar und über die Rückenmarksnerven, ferner nach den Bereicherungen, die diese Lehre durch die Arbeiten von Munniks, Gall, C. Bell, Lobstein, Jacobson, Baur, Tiedemann, Treviranus, Wutzer, Serres, Desmoulin, Rolando, Bellingeri, Göz, Hirzel, Arnold, Langenbeck und J. Müller erhalten hat, berichtigt, und zum Theil umgestaltet werden. Da nun diese Darstellung des Gefäß- und Nervensystems bei so vielen Zusätzen einen größeren Raum einnimmt, als der vorhergehende Band, so ist es nöthig geworden, von dem Plane, die Eingeweidlehre mit dieser Lehre in einem Bande zusammen zu fassen, abzugehen. Die Eingeweidlehre, an welcher fortwährend gedruckt wird, wird vielmehr eben so, wie in der frühern Ausgabe, den vierten Band ausmachen, in welchem außerdem auch die Entwickelungsgeschichte des Menschen abgehandelt werden soll.

Ernst Heinrich Weber.

Digitized by Google

Inhalt des dritten Bandes.

Viertes Buch.

Von dem Gefäßsysteme.

Seite

Literatur ... 3

Schriften über das ganze Gefäßsystem S. 3. — Schriften über diejenige Abtheilung des Gefäßsystems, in welcher der Kreislauf geschieht S. 3. — Schriften über mechanische und physiologische Untersuchungen über den Kreislauf S. 3. — Schriften über den Zusammenhang der Arterien und Venen unter einander durch die Haargefäße, und über den Zusammenhang derselben mit den Höhlen und Oberflächen des Körpers durch die Poren S. 4. — Schriften über den Herzbeutel, das Herz und die Entwickelung desselben S. 5. — Ueber die Arterien S. 10. — Schriften über allgemeinere Verhältnisse der Arterien, ihre Häute und deren Organe S. 10. — Schriften über die Abweichungen im Verlaufe der Arterien S. 11. — Schriften über die Lebenseigenschaften der Arterien S. 11. — Beschreibungen des Arteriensystems S. 12. — Abbildungen des Arteriensystems S. 12. — Einige Schriften über die vergleichende Anatomie der Arterien S. 12. — Schriften über die Venen S. 13. — Schriften über die Abtheilung des Gefäßsystems, in welcher der Kreislauf nicht geschieht, oder über die Lymphgefäße S. 14. — Ueber das Lymphgefäßsystem oder über ganze Abtheilungen desselben S. 14. — Einige besondere Schriften über einzelne, die Lehre von den Lymphgefäßen betreffende Gegenstände S. 19. — Ueber die Muskelfasern und Klappen der Lymphgefäße S. 19. — Schriften über die Communication derselben mit den Venen S. 19. — Schriften über die Lymphdrüsen S. 20. — Schriften über den Ductus thoracicus S. 20. — Schriften über die Lymphgefäße einzelner Organe S. 21. — Ueber die vergleichende Anatomie der Lymphgefäße S. 21.

Ueber das Gefäßsystem im Allgemeinen.

Gefäße des Körpers im weiteren Sinne des Wortes S. 22. — Adern, oder Gefäße im engeren Sinne des Wortes. Blutgefäße, oder Gefäße, in welchen der Kreislauf geschieht, und Lymphgefäße, oder Gefäße, in welchen sich Säfte bewegen, die sich auf dem Wege befinden, um in den Kreislauf zu gelangen S. 23. — Gefäße des Kreislaufs S. 25. — Verschiedenheit der Arterien und der Venen S. 26. — Ueber die im Gefäßsysteme vorkommenden Ventile S. 28. — Definition der Arterien und der Venen S. 29. — Beweise für den Kreislauf des Bluts S. 30.

Haargefäße ... 33

Bedeutung des Worts Haargefäß S. 33. — Ihre Wände S. 35. — Verschiedene Menge derselben in verschiedenen Theilen S. 35. — Nutzen der verschiedenen Einrichtung der Haargefäßnetze S. 37. — Geschwindigkeit des Bluts in den Haargefäßen S. 39. — Hindernisse der Blutbewegung, welche aus der Reibung an den Wänden entstehen S. 41. — Haargefäße in verschiedenen Geweben S. 42. — Messungen des Durchmessers der Haargefäße S. 44. — Gestalt der Blutgefäßnetze, die nicht zu den allerkleinsten gehören. — Verschiedenheit der Haargefäßnetze in den verschiedenen Lebensaltern und in Krankheiten S. 47. — Giebt es Gefäße des Kreislaufs, die nur Blutwasser führen? S. 48. — Ueber die Oeffnungen, durch welche etwas aus den Blutgefäßen heraus, oder in sie eindringen kann S. 50. — Es giebt an den Blutgefäßen keine offnen Enden S. 51. — Die Absonderung scheint durch Poren zu geschehen S. 52. —

Digitized by Google

Seite

Ueber die Kräfte, durch welche etwas aus den Blutgefäßen ausgetrieben der in sie hineingezogen werden kann S. 53. — Durchschwitzung durch die Poren der Häute S. 54.

Arterien und Venen 56

Die zwei größten Arterien S. 56. — Communication der Arterien S. 56. — Zahl der Theilungen in kleinere Zweige S. 57. — Lage der Arterien an Stellen, wo sie vor Druck und Dehnung geschützt sind S. 58. — Größe der Höhle des Arteriensystems in den Stämmen und Zweigen S. 58. — Geschwindigkeit des Blutlaufs in den Stämmen und Zweigen der Arterien S. 59. — Festigkeit der Arterienwände S. 60. — Häute der Arterien S. 62. — Aeußere Haut derselben S. 62. — Mittlere Haut derselben S. 63. — Innerste Haut der Arterien S. 65. — Verschiedenheit der Meinungen über die Zahl der Häute der Arterien S. 67. — Nutzen der drei Häute der Arterien S. 67. — Puls der Arterien S. 67. — Nutzen der Elasticität der Arterien S. 69. — Druck, welchen die Arterien vom Blute auszuhalten haben S. 70. — Gefäße und Nerven der Arterien S. 71. — Fähigkeit der Arterien, schmerzhaft zu werden S. 73. — Fähigkeit der Arterien zu Lebensbewegungen S. 74. — Entstehung, Wachsthum, Krankheiten und Wiederherstellung verletzter Arterien S. 79.

Venen 83

Körpervenen im Allgemeinen 83

Communication der Körpervenen unter einander S. 84. — Klappen der Körpervenen S. 84.

Lungenvenen im Allgemeinen 86

Häute der Venen S. 88. — Verhältnißmäßig geringe Zerreißbarkeit der Venenwände S. 90. — Gefäße und Nerven der Venen. S. 91. — Empfindungsvermögen in den Venen S. 91. — Lebensbewegung der Venen S. 92. — Bildungsvermögen der Venen und Krankheiten derselben S. 93.

Lymphgefäße 94

Einrichtung der Lymphgefäße S. 94. — Klappen der Lymphgefäße und Communication der zahlreichen Stämme, in welche sie an den meisten Stellen des Körpers getheilt bleiben S. 96. — Festigkeit und Ausdehnbarkeit der Wände der Lymphgefäße S. 97. — Zahl und Beschaffenheit der Häute der Lymphgefäße S. 98. — Durchmesser aller Lymphgefäße zusammengenommen S. 99. — Mechanismus und Kräfte, wodurch die Einsaugung geschieht S. 99. — Das lebendige Bewegungsvermögen der Lymphgefäße wirkt nicht auf dieselbe Weise wie das der Muskeln S. 100. — Einige Anatomen halten die Einsaugung für die Wirkung einer todten Haarröhrchenkraft S. 101. — Hypothesen, um sich das Vermögen einzusaugen, als ein lebendiges vorzustellen S. 101. — Anfang der Lymphgefäße an den verschiedenen Stellen des Körpers S. 102. — Giebt es sichtbare Oeffnungen, wodurch die Lymphgefäße, namentlich an den Zotten der Gedärme, einsaugen? S. 103. — Giebt es solche Oeffnungen im Zellgewebe, von wo aus eingeblasene Luft und eingetriebenes Quecksilber leicht in die Lymphgefäße übergeht? S. 104. — Zwischen den Blutgefäßen und Lymphgefäßen findet kein solcher Zusammenhang Statt, daß während des Lebens eine Strömung von Blut oder von blutartiger Flüssigkeit aus jenen in diese geschähe S. 104. — Beweise für die durch die Lymphgefäße geschehende Einsaugung S. 106. — Fortgang der Saugadern S. 106. — Größe der Lymphgefäße bei ihrem Fortgange durch verschiedene Theile S. 107. — Verschiedenheit hinsichtlich ihrer Communicationen unter einander S. 107. — Stellen des Körpers, wo die Saugadern in größter Menge, wo sie in geringerer Menge vorkommen, und endlich wo sie gar nicht gefunden werden S. 107.

Lymphdrüsen 10

Theile des Körpers, an welchen die Lymphdrüsen liegen S. 108. — Zahl und Größe derselben an verschiedenen Stellen des Körpers S. 108. — Hüllen der Lymphdrüsen S. 108. — Befestigung derselben S. 109. — Ihr innerer Bau S. 109. — Verlauf der Lymphgefäße durch die Lymphdrüsen S. 109. — Es giebt in den Lymphdrüsen keine Zellen, welche etwas anders als bloße Erweiterungen der durch sie hindurch gehenden Lymphgefäße, und welche so von den Lymphgefäßen getrennt wären, daß sie mit ihnen in keiner ganz offenen Verbindung ständen S. 111. — Verschiedene Beschaffenheit der Lymphdrüsen bei dem Delphinen und Wallfischen S. 113. — Die Lymphdrüsen sind bei dem Menschen

Digitized by Google

Seite

in größter Menge vorhanden, und überhaupt nur bei den Säugethieren sehr ausgebildet, bei den Vögeln fehlen sie fast ganz, und bei den Amphibien und Fischen sind sie gar nicht vorhanden S. 113. — Lymphgefäßnetze scheinen daselbst ihre Stelle zu vertreten S. 113.

Endigung der Lymphgefäße 113

Ob es kleine Lymphgefäße gebe, die noch nicht zu größeren Stämmen zusammengetreten sind, und welche die von ihnen eingesaugte Flüssigkeit in kleine Venen ergießen, oder, was beinahe dasselbe ist, ob es einsaugende Enden der Venen gebe S. 114. — Es findet keine solche Verbindung von Lymphgefäßen und Venen innerhalb der Lymphdrüsen Statt, daß die Säfte daselbst aus den Lymphgefäßen in die Venen hinüber fließen S. 114. — Bei dem so oft beobachteten Uebergange eingespritzter Flüssigkeiten aus den Lymphgefäßen der Lymphdrüsen in die Venen deuten mehrere Erscheinungen eine Zerreißung an S. 116. — Die von Fohmann angegebenen Gründe widerlegen die Annahme einer Zerreißung nicht S. 118. — Der Uebergang findet vielleicht auch durch erweiterte Poren Statt, die der Lymphe während des Lebens hinreichenden Widerstand leisten, und nur einen Uebergang von Säften aus den Lymphgefäßen in die Venen, und umgekehrt (durch eine Art von Absonderung, nicht durch ein Ueberströmen) gestatten S. 119. — Die Lymphgefäßstämme scheinen sich nicht an andern Stellen als an den hinter den Schlüsselbeinen gelegenen in größere Venen zu öffnen S. 120. Der Ductus thoracicus ist wahrscheinlich deswegen im Verhältnisse zu den großen Durchmessern aller Lymphgefäßstämme zusammengenommen so klein, weil in den Lymphdrüsen assimilirte Säfte durch eine Absonderung in die Blutgefäße übergehen S. 121. — Von den Vögeln, wo nach Fohmann und Lauth eine sichtbare Einmündung großer Lymphgefäße in verschiedene große Venen Statt findet, darf man nicht auf die Säugethiere und auf den Menschen schließen, denn den Vögeln fehlen die Lymphdrüsen fast ganz, und die Einrichtung des Lymphgefäßsystems ist also eine andere S. 121. — Krankheiten der Lymphgefäße S. 121.

Das Herz.

Gestalt und Lage des Herzens S. 124. — Gewicht desselben S. 125. — Der Herzbeutel S. 127. — Nutzen des Herzbeutels S. 127. — Das Herzbeutelwasser S. 128. — Gefäße und Nerven des Herzbeutels S. 129. — Die vier Abtheilungen des Herzens und die Furchen, durch welche dieselben schon von außen unterschieden werden können S. 130. — Zweck der vier Höhlen S. 130. — Zweck der rechten und der linken Herzhälfte S. 131. — Die obere dünnwandige Herzhälfte, oder die zwei Vorkammern, atria, und die untere dickwandige Herzhälfte, oder die zwei Herzkammern, ventriculi S. 132. — Fleischfasern der vier Abtheilungen des Herzens S. 133. — Größe der Höhlen des Herzens 134. — Die Höhlen der rechten Herzhälfte sind während des Lebens eben so weit als die der linken S. 134. — Oeffnungen an den vier Herzhöhlen und Klappen an einigen dieser Oeffnungen S. 135. — Klappen an der Grenze der Kammern und der Vorhöfe S. 136. — Nutzen der warzenförmigen Muskeln derselben S. 137. — Befestigungspunkte der Fleischfasern des Herzens S. 138. — Die drei halbmondförmigen Klappen am Ausgange jeder Herzkammer in die mit ihr zusammenhängende Arterie S. 139. — Ueber die Wirkungsart und den Verlauf der Fleischfasern des Herzens im Allgemeinen S. 139. — Fleischfasern der Vorhöfe S. 141. — Allgemeine Beschreibung der Fleischfasern der Kammern S. 143. — Specielle Beschreibung des Verlaufs der Fleischfasern der Herzkammern S. 144. — Resultate dieser speciellen Beschreibung. Die Beschreibungen verschiedener Anatomen unter einander verglichen S. 150. — Verlauf der Fleischfasern an der Scheidewand der Kammern S. 150. — Verschiedener Anatomen Beschreibung des Zusammenhangs und der Lagen der Fleischfasern der Herzkammern S. 151.

Beschreibung der vier Abtheilungen des Herzens im Einzelnen S. 153. — Rechter Vorhof S. 153. — Rechte Herzkammer S. 155. — Linker Vorhof S. 156. — Linke Herzkammer S. 157. — Gefäßstämme, die in das breite Ende des Herzens treten S. 158.

Entwickelung des Herzens und der großen Blutgefäßstämme, S. 159. — Kreislauf des Blutes beim sehr kleinen Embryo S. 161. — Die Lungenarterie ist anfangs nur Körperarterie für die untere Körperhälfte S. 161. — In dem Maaße, als die zu den Lungen gehenden Aeste ansehnlicher werden, verengert sich ein Stück

Digitized by Google

Seite

des Stammes, und wird zum Ductus arteriosus S. 162. — Entstehung der Valvula foraminis ovalis S. 162. — Die Eustachische Klappe S. 163. — Weil die rechte Herzkammer bei Embryonen das Blut durch den Körper treiben hilft und mit der Aorta communicirt, mußte sie ziemlich eben so fleischig sein als die linke Kammer S. 163. — Verwachsen des Ductus arteriosus und des Foramen ovale nach der Geburt S. 164. — Gefäße des Herzens S. 164. — Beschreibung der Kranzarterien S. 165. — Venen des Herzens S. 166. — Foramina Thebesii S. 167. — Lymphgefäße des Herzens S. 168. — Nerven desselben S. 169.

Beschreibung der Gefäße des kleinen Kreislaufs.

Die Lungenarterie S. 169. — Die vier Lungenvenen S. 170.

Beschreibung der Gefäße des großen Kreislaufs.

Die Schlagader des großen Kreislaufs, die Aorta ... 171

Ursprung, Verlauf und Aeste der Arteria aorta 171. — Varietäten S. 171. — Aeste der Aorta im Einzelnen S. 178.

Arteriae carotides ... 17

A. carotis externa S. 180. — A. thyreoidea superior S. 180. — A. lingualis S. 182. — A. maxillaris externa S. 182. — A. pharyngea S. 184. — A. occipitalis S. 185. — A. auricularis posterior S. 186. — A. temporalis S. 187. — A. maxillaris interna S. 188.

A. carotis interna S. 191. — Ramus communicans S. 193. — A. choroidea S. 193. — A. fossae Sylvii S. 193. — A. corporis callosi S. 193. — A. ophthalmica S. 194.

Arteriae subclaviae ... 19

A. vertebralis S. 199. — A. spinalis anterior S. 201. — A. spinalis posterior S. 201. — A. basilaris S. 201. — A. cerebelli inferior S. 201. A. cerebelli superior S. 202. — A. cerebri profunda S. 202. — A. auditoria interna S. 202. — Circulus Willisii S. 203.

A. mammaria interna S. 203. — Rami thymici S. 204. — A. bronchialis anterior S. 204. — A. pericardiaco-phrenica S. 204. — Rami intercostales S. 204. — Rami sternales S. 204. — Ramus phrenico-pericardiacus S. 205. — Ramus musculo-phrenicus S. 205. — Ramus epigastricus S. 205.

A. thyreoidea inferior S. 207. — A. cervicalis ascendens S. 207. — A. cervicalis superficialis S. 207. — A. transversa colli S. 207. — A. transversa scapulae S. 208. — A. cervicalis profunda S. 208. — A. intercostalis superior S. 208.

A. axillaris S. 209. — A. thoracicae externae S. 210. — A. subscapularis S. 210. — A. circumflexa humeri anterior S. 211. — A. circumflexa humeri posterior S. 211.

A. brachialis S. 211. — A. profunda brachii S. 212. — A. collateralis radialis prima S. 212. — A. collateralis radialis secunda S. 212. — A. collateralis ulnaris prima S. 213. — A. nutritia magna S. 213. — A. collateralis ulnaris secunda S. 213.

A. ulnaris S. 213. — A. recurrens ulnaris S. 214. — Ramus dorsalis S. 214. — Ramus volaris S. 214. — A. interossea S. 215. — A. interossea dorsalis S. 215. — A. interossea volaris S. 216.

A. radialis S. 216. — Ramus volaris S. 218. — Ramus dorsalis S. 218. Allgemeine Bemerkungen über die aus dem Bogen der Aorta entspringenden Arterien S. 219.

Aeste des absteigenden Theils der Brustaorta ... 2

Vordere Aeste der Aorta in der Brusthöhle S. 223. — AA. bronchiales S. 223. — AA. oesophageae S. 225. — AA. pericardiacae S. 226.

Hintere Aeste der Aorta in der Brusthöhle S. 227. — AA. intercostales inferiores S. 227.

Aeste des im Unterleibe liegenden Theiles der Aorta ... 2

Arterien für die Seitenwände der Bauchhöhle S. 228. — AA. lumbales S. 228. —

Digitized by Google

Seite

Arterien für die in der Unterleibshöhle gelegenen Organe S. 229. — AA. phrenicae inferiores S. 229.

A. coeliaca S. 231. — A. coronaria ventriculi sinistra S. 231. — Ihr Aſt, Ramus hepaticus S. 232. — A. splenica oder lienalis S. 232. — Ihre Miljäſte, ferner AA. ventriculi breves S. 232. — und die A. gastro-epiploica sinistra et hepatica S. 232. — A. hepatica S. 233. — Ihre Aeſte, die A. coronaria ventriculi dextra oder pylorica S. 233. — Die A. gastro-duodenalis, welche ſich in die A. pancreatica duodenalis und in die A. gastro-epiploica dextra theilt S. 235. — Endlich die Leberäſte derſelben.

A. mesenterica superior S. 234. — Ihre Dunndarmäſte S. 235. — Ihre Dickdarmäſte die A. colica media, die A. colica dextra und die A. ileo-colica S. 236.

A. mesenterica inferior S. 237. — Ihre Aeſte, die A. colica sinistra S. 237 und die A. haemorrhoidalis interna S. 237.

A. renalis S. 238. — A. spermatica S. 239. — A. suprarenalis S. 240.

Endzweige der Aorta 241

A. sacra media S. 241. — Arteriae iliacae S. 241. — A. iliaca interna oder hypogastrica. S. 241. — A. iliaca externa oder cruralis S. 242.

Aeſte der A. hypogastrica, namentlich die A. iliolumbalis S. 242. — A. sacra lateralis S. 243. — A. obturatoria S. 243. — A. iliaca posterior S. 244. — A. ischiadica S. 245. — A. pudenda interna und ihre Aeſte die A. haemorrhoidalis media, die AA. haemorrhoidales externae, die A. perinaei und die A. penis S. 245 u. 246. — Die Aeſte dieſer Arterien beim weiblichen Geſchlechte S. 247. — Arteria umbilicalis S. 247, ihre Aeſte, die AA. vesicales und die A. uterina.

Aeſte der A. cruralis, namentlich die A. epigastrica S. 249. — A. circumflexa ilei S. 250. — A. pudenda externa S. 251. — A. circumflexa femoris externa S. 252. — A. circumflexa femoris interna S. 252. — A. femoris profunda 252.

A. poplitaea S. 253. — Zwei obere und zwei untere Gelenkarterien S. 254. A. tibialis antica S. 254. — Ihre Aeſte, die A. malleolaris anterior interna und die externa, die A. tarsea interna und die externa S. 255. — A. tibialis postica S. 256. — A. peronaea S. 256. — A. plantaris interna und externa S. 257. — AA. digitales plantares S. 258. — AA. digitales dorsales S. 258.

Von den Venen des großen Kreislaufs.

Die zwei Hohlvenen und ihre Hauptzweige im Allgemeinen 259

Die Vena cava superior begleitet das Bruſtſtück der Aorta an ſeiner rechten Seite, führt das Blut zurück, welches die Aorta in der oberen, über dem Zwerchfelle gelegenen Körperhälfte verbreitet hat, die aus ihr hervorgehenden zwei Venae anonymae oder jugulares communes entſprechen demnach oben aus dem Aortenbogen hervorgehenden großen Arterien, die Vena azygos entſpricht der Aorta descendens, krummt ſich wie ſie über den linken, ſo über den rechten Luftröhrenaſt abwärts, und begleitet die Aorta an ihrer rechten Seite S. 260. — Die Vena cava inferior begleitet das Bauchſtück der Aorta an ihrer rechten Seite, und führt alles das Blut zurück, welches es unterhalb des Zwerchfells in die untere Körperhälfte vertheilt hat S. 260.

Venen an den Wänden des Rumpfs 260

Vena azygos S. 261. — Untere und mittlere Zwiſchenrippenvenen S. 264. — Plexus venosi spinales S. 266. — Venae spinales internae anteriores et posteriores S. 267. — Venae spinales externae anteriores S. 268.

Oberer Theil der oberen Hohlvene S. 268. — Venae anonymae oder jugulares communes S. 269. — Kleine Venen, die zuweilen in die Vena cava oder in die Vena jugularis communis oder in ihre Aeſte gehen S. 270. — V. intercostalis superior S. 270. — VV. bronchiales S. 270. — VV. oesophageae S. 270. — VV. mammariae internae S. 270. — VV. thymicae S. 270. — VV. mediastinae — VV. pericardiacae S. 270. — VV. phrenicae superiores S. 271.

Digitized by Google

Seite

Venen des Halses und Kopfs, namentlich die Vena vertebralis, welche die tiefe Vene des Halses und Kopfs, die Vena jugularis interna, welche die mittlere Vene des Halses und des Kopfs und die Vena jugularis externa, welche die oberflächliche oder die Hautvene des Halses und des Kopfs ist S. 271. Die V. vertebralis ist doppelt eine außerhalb des canalis vertebralis liegende, welche auch V. vertebralis superficialis genannt wird, und eine in den Canalis vertebralis liegende, welche auch V. vertebralis profunda heißt S. 271. — Die größten Aeste der V. jugularis interna sind der aus der Schädelhöhle kommende Ramus cerebralis S. 272, und der vom Gesichte kommende Ramus facialis S. 272. — Dieser Zweig entsteht selbst wieder durch die Vereinigung der V. facialis anterior und der V. facialis posterior S. 272. — Jeder von ihnen hat oberflächliche Aeste und einen tief liegenden Ast S. 273. und 274. — Die Aeste der V. jugularis externa, namentlich vordere Zweige, der mittlere Zweig, und hintere Zweige S. 276.

Venen einiger Theile des Kopfs, welche mit mehreren der beschriebenen Venenstämme in Verbindung stehen S. 277.

Venen in der Schadelhöhle S. 277. — Sinus der harten Hirnhaut, welche eine Richtung von vorn nach hinten haben S. 277. — Sinus longitudinalis superior S. 278. — Sinus longitudinalis inferior S. 278. — Sinus quartus S. 277. — Zwei sinus occipitales posteriores S. 279. — Sinus, welche eine mehr quere Richtung haben S. 279. — Sinus transversus S. 280. — Sinus petrosus superior S. 280. — Sinus petrosus inferior S. 280. — Sinus occipitalis anterior S. 280. — Sinus circularis S. 281. — Sinus cavernosus S. 281. — Sinus alae parvae S. 281. — Emissaria Santorini S. 282. — VV. diploicae S. 283.

Venen der Augenhohle S. 284. — V. ophthalmica cerebralis S. 284. — V. ophthalmica facialis S. 285. — Aeste derselben, namentlich VV. ciliares posticae S. 286. — VV. ciliares anticae S. 286. — V. centralis retinae S. 286.

Venen der unpaaren Organe am Halse S. 286. — V. thyreoidea superior, media und inferior. — V. lingualis S. 286. — VV. pharyngeae S. 287.

Venen des Arms S. 287. — VV. subclaviae S. 287. — V. axillaris S. 288. — Hautnerven des Arms, namentlich V. cephalica, basilica und mediana S. 288. — Tief liegende Venen des Arms S. 290.

Vena cava inferior 291

Die V. cava inferior begleitet das Bauchstück der Aorta an seiner rechten Seite und führt alles das Blut zurück, welches die Aorta unterhalb des Zwerchfells in der unteren Körperhälfte vertheilt hat S. 291. — VV. phrenicae S. 292. — VV. hepaticae S. 293. — VV. renales S. 293. — VV. spermaticae internae S. 294. — VV. suprarenales S. 295. — VV. lumbares S. 295. — VV. iliacae S. 295. — V. iliaca interna oder hypogastrica S. 295. — V. iliaca externa oder cruralis S. 296. — VV. cutaneae pedis S. 297, namentlich V. saphena magna S. 297. — V. saphena parva S. 298. — Tiefe Venen des Fußes S. 298.

Vena portae 299

Vena mesenterica S. 299. — Vena lienalis S. 300.

Vena umbilicalis 301

Ursprung der Vena umbilicalis S. 301. — Aeste derselben in der Leber und Communication mit dem linke Aste der V. portae S. 302. — Ligamentum teres, Ductus venosus S. 303.

Von den Saugadern.

Ductus thoracicus S. 303. — Die andern Hauptstämme S. 304. — Plexus lumbares et iliae S. 304. — Saugadern des Dünndarms S. 305. — Saugadern des Dickdarms S. 306. — Saugadern des Magens S. 307. — Saugadern des Netzes S. 307. — Saugadern der Milz S. 307. — Saugadern des Pankreas S. 307. — Saugadern der Leber und der Gallenblase S. 307. — Saugadern der Nieren und der Nebennieren S. 308. — Saugadern der

Digitized by Google

Seite

Harnblase S. 308. — Saugadern des Mastdarms S. 308. — Saugadern der männlichen Geschlechtstheile S. 309. — Saugadern der weiblichen Geschlechtstheile S. 309. — Saugadern an der Wand des Unterleibs S. 310. — Saugadern der Bauchhaut S. 310. — Saugadern der Bauchglieder S. 310. — Saugadern des Zwerchfells S. 312. — Saugadern der Brust S. 312. — Saugadern der Brusthaut und des Herzbeutels S. 313. — Saugadern des Herzens S. 313. — Saugadern der Lungen S. 313. — Saugadern der Speiseröhre S. 313. — Saugadern der Thymusdrüsen S. 314. — Saugadern der Milchdrüse S. 314. — Saugadern der Brustglieder S. 314. — Saugadern der Augen S. 315. — Saugadern des Gehirns S. 315.

Fünftes Buch.

Von dem Nervensysteme.

Literatur über das Nervensystem 319

Schriften über den Begriff und die Geschichte des Nervensystems S. 319. — Schriften über den Bau der zum Nervensysteme gehörenden Theile S. 319. — Schriften über die Regeneration der zum Nervensysteme gehörenden Theile S. 320. — Beschreibung des Nervensystems S. 321. — Vermischte Abhandlungen über die Nerven S. 322. — Schriften über die Gehirnhäute S. 323. — Schriften über das Gehirn und das Rückenmark S. 324. — Schriften über einzelne Theile des Gehirns S. 329. — Schriften über die Entwickelung des Nervensystems S. 331. — Schriften über einzelne Nervenpaare S. 337.

Ueber das Nervensystem im Allgemeinen 339

Eintheilung des Nervensystems in die Centraltheile und in die Nerven S. 339. — Verschiedenheit der Einhüllung der Nervenfasern in diesen und in jenen S. 339. — Lage der grauen und der weißen Substanz im Nervensysteme S. 341. — Endigung, Richtung und Verflechtung der Fasern der weißen Substanz S. 342. — Doppelt vorhandene und einmal vorhandene Theile des Nervensystems S. 342. — Methoden, die Fasern und ihre Richtung sichtbar zu machen S. 344. — Anhäufung der grauen Substanz, in welcher sich die Bündel der Hirnfasern zertheilen und wieder vereinigen, oder Ganglien des Gehirns, nach Gall S. 345. — Anfang der Nervenfäden S. 345. — Wachsen sie von ihrem innern oder von ihrem äußern Ende aus? S. 346. — Giebt es specifisch verschiedene Nerven? S. 346. — Anastomosen, Geflechte und Ganglien S. 347. — Ueber die Structur der Nervenknoten S. 348. — Ueber den Nutzen der Nervenknoten und des mit vorzüglich vielen Nervenknoten versehenen sympathischen Nerven S. 350.

In den Nervenknoten werden die Nervenfäden von einander getrennt, in anderer Ordnung wieder zusammengefaßt, bequem nach verschiedenen Richtungen vertheilt, und dadurch wird bewirkt, daß die zur Erhaltung des Lebens unentbehrlichen Organe nicht von einem einzelnen Nervenpaare, sondern von vielen zugleich mit Nerven versehen werden, was zur Folge hat, daß wenn einer der Nerven gelähmt wird, nicht die Function eines solchen Organs ganz aufhört S. 350. — Vermuthlich findet auch in den Ganglien, vermöge des Zusammenstoßens der Nerven durch ihr Nervenmark eine Uebertragung von Eindrücken von einem Nerven auf die mit ihm zusammenhängenden Nerven statt S. 350. — Nach der Meinung einiger Anatomen und Physiologen vermehrt sich die Zahl der Nervenfäden in den Nervenknoten, oder mit andern Worten, sind sie Mittelpuncte, von welchen Nervenfäden ihren Anfang nehmen S. 351. — Noch andere glauben, daß die Ganglien und vielleicht auch manche Geflechte den Einfluß des Gehirns auf die Theile, welche von den Ganglien-Nerven erhielten, beschränkten, und daß sie auch verhinderten, daß die Fortpflanzung der Eindrucke von gewissen Stellen des Körpers aus zum Sitze der Empfindungen durch die aus den Ganglien entspringenden Nerven geschehen könnte S. 352. — Kein einziger Muskel, der nur vom sympathischen Nerven Fäden erhält, kann willkührlich bewegt werden S. 354. — Kein einziger Muskel, dessen Bewegung ganz willkührlich ist, erhält sichtbare Nerven vom Nervus sympathicus S. 354. — Einige haben behauptet, daß die Aeste des N. sympathicus, gestochen und auf andere Weise gereizt, keinen Schmerz der-

Digitized by Google

Seite

vorbrächten, eine Behauptung, die jedoch noch nicht erwiesen ist S. 355. — Andere haben auch geglaubt wahrgenommen zu haben, daß, wenn Aeste der Ganglien des N. sympathicus galvanisirt würden, die unwillkührlichen Muskeln, die von daher Fäden erhielten, nicht in Zuckungen geriethen, was doch bei den willkührlichen Muskeln der Fall ist, wenn ihre Nerven galvanisirt werden, eine Behauptung, welche gleichfalls noch nicht bewiesen worden ist S. 356. — Mechanische Reizung des Gehirns und des Rückenmarkes kann, wie es scheint, zwar alle Muskeln in Bewegung setzen, welche vom Gehirne und Rückenmarke Nerven erhalten, nicht aber die unwillkührlich wirkenden Muskeln, die vom N. sympathicus mit Zweigen versehen werden S. 356. — Bei Lähmung und Vernichtung des Gehirns und sogar bei Lähmung und Vernichtung des Rückenmarks dauert die Pulsation des Herzens, das vom N. sympathicus und vom N. vagus seine Nerven erhält bei Säugethieren, Amphibien und Fischen einige Zeit fort S. 357. — Nerven für die Empfindung und Nerven für die Bewegung S. 358.

Ueber das Gehirn und Rückenmark und deren Häute 362

Die harte Hirnhaut S. 362. — Die harte Rückenmarkhaut S. 366. — Die Spinnwebenhaut S. 367. — Die weiche Hirnhaut S. 369. — Die weiche Rückenmarkhaut S. 370. — Das Ligamentum denticulatum des Rückenmarks S. 371.

Das Rückenmark S. 371. — Gestalt S. 371. — Verschiedene Länge desselben bei Embryonen S. 372. — Die zwei Anschwellungen desselben S. 372. — Ende desselben S. 372. — Die zwei Spalten desselben, in welche die weiche Hirnhaut eindringt S. 373. — Weiße, äußere und graue innere Substanz des Rückenmarks S. 273. — Gestalt der grauen Substanz S. 374. — Graue und weiße Commissur der beiden Seitenhälften S. 374. — Die weiße Substanz wird durch die vorspringenden Theile der grauen Substanz in sechs unter einander continuirlich zusammenhängende Abtheilungen getheilt S. 375. — Entstehung des Rückenmarks S. 376. — Innerer Bau der Markwände des Rückenmarks.

Ursprung der Rückenmarknerven S. 378. — Ihre Zahl ist 30 bis 31 S. 378. — Vordere und hintere Rückenmarkwurzeln S. 378. — Spinalknoten an den hinteren Wurzeln S. 378. — Ursprung dieser Wurzeln im Rückenmarke S. 379.

Das Gehirn S. 379. — Eintheilung desselben in das große Gehirn S. 379. — in das kleine Gehirn S. 380. — und in den Verbindungstheil S. 381. — Zusammenhängende Beschreibung des Verbindungstheils S. 382. — Medulla oblongata S. 383. — Pons Varolii S. 383. — Crura cerebri S. 384. — Corpora quadrigemina S. 384. — Tuber cinereum S. 385. — Infundibulum und glandula pituitaria S. 385.

Zusammenhängende Beschreibung des großen Gehirns S. 385. — Die Thalami und die Corpora striata S. 386. — Die dritte Hirnhöhle S. 387. — Die Seitenventrikel S. 387. — Septum pellucidum S. 388. — der Fornix S. 388. — die die Seitenventrikel und den dritten Ventrikel verbindende Monroische Oeffnung S. 389. — Commissura anterior S. 389. — Commissura mollis S. 389. — Commissura posterior S. 389. — Pedunculus glandulae pinealis S. 389. — Acervulus S. 389. — Aquaeductus Sylvii S. 389.

Zusammenhängende Beschreibung des kleinen Gehirns S. 390. — Mittelstück desselben oder Wurm S. 390. — Seitenstücke desselben oder Hemisphären S. 390. — Große horizontale Querfurche S. 390. — Vordere und hintere Hirnklappe S. 391. — Untere Schenkel des kleinen Gehirns zum verlängerten Marke, mittlere Schenkel desselben zur Brücke, obere Schenkel desselben zu den Vierhügeln S. 391. — Einschnitte im kleinen Gehirn und dadurch entstehende Lappen, Läppchen und Blätterchen S. 392. — Lebensbaum 393.

Zergliederung des Gehirns von oben S. 393.

Betrachtungen über den Bau der einzelnen Hirntheile S. 394. — die vorderen Pyramiden des verlängerten Marks S. 394. — die Olivenbündel S. 395. — Corpora restiformia S. 396. — die hinteren Pyramiden S. 396. — Verhalten der grauen Substanz im verlängerten Marke S. 397. — Das verlängerte Mark der Säugethiere S. 398.

Die Brücke S. 398. — Die vierte Hirnhöhle S. 398. — Das kleine Gehirn S. 400. — Entwickelung des kleinen Gehirns beim menschlichen Embryo und bei verschiedenen Thieren S. 401. — Die Hirnschenkel S. 401, — und die Vierhügel

Digitized by Google

Seite

S. 402. — Die Vierhügel bei Säugethieren S. 404. — Vergleichung des grossen Gehirns mit dem kleinen S. 404. — Fasern, welche die Fortsetzung des Hirnschenkels und des Balkens sind S. 405. — Die graue Substanz, welche die Windungen überzieht S. 406. — Die Zirbel S. 407. — Corpora caudicantia, Fornix, Taenia, Pes hyppocampi S. 408. — Septum pellucidum S. 410. — Quere Hirnspalte, grauer Hügel, Trichter und Hirnanhang S. 410. — Die vordere Commissur S. 411. — Die Plexus choroidei S. 411. — Serum der Gehirnventrikel S. 412. — Einiges aus Burdachs Darstellung des Zusammenhangs, in welchem die Theile des Gehirns und des Rückenmarkes unter einander stehen S. 412.

Die Entwickelung des Gehirns S. 415. — Das Gehirn der Säugethiere mit dem des Menschen verglichen S. 423. — Gefäße des Gehirns im Allgemeinen S. 424. — Blutgefäße desselben insbesondere S. 426. — Gefäße des Rückenmarks S. 426.

Die Gehirnnerven 427

Uebersicht der Zahl der Gehirnnerven und über ihre Verschiedenheit im Allgemeinen S. 427. — Drei Classen von Gehirnnerven, Nerven, die nur der Empfindung, andere, die nur der Bewegung, noch andere, die beiden Verrichtungen dienen S. 428. — Gehirnnerven nach der Größe des Querschnitts aufgezählt S. 431. — Uebersicht über den Ort, wo die Gehirnnerven an der Oberfläche des Gehirns zum Vorschein kommen und wo sie zum Schädel hinausgehen S. 431.

Besondere Beschreibung des Ursprungs und Verlaufs der einzelnen Hirnnerven S. 434. — 1) Nervus olfactorius S. 434. — 2) N. opticus S. 436. — Das chiasma S. 437. — 3) N. oculi motorius S. 442. — 4) N. trochlearis oder patheticus S. 443. — 5) N. trigeminus S. 444. — 6) N. abducens S. 463. — 7) N. facialis S. 465. — 8) N. acusticus S. 470. — 9) N. glossopharyngeus S. 472. — 10) N. vagus S. 476. — 11) N. accessorius S. 481. — 12) N. hypoglossus S. 483.

Die Rückenmarknerven 484

Uebersicht der Zahl der Rückenmarknerven S. 484. — Die acht Halsnerven S. 485.

Die vier oberen Halsnerven zusammengenommen betrachtet S. 486. — Die von den vorderen Aesten derselben entspringenden Hautnerven S. 486. — Uebersicht über die Muskeln, welche von den vorderen Aesten der vier obern Halsnerven Zweige bekommen S. 487. — Die von den hinteren Aesten derselben entspringenden Hautnerven S. 488. — Uebersicht über die Muskeln, welche von den hinteren Aesten der vier oberen Halsnerven Zweige bekommen S. 488. — Die vier oberen Halsnerven einzeln beschrieben S. 488. — Die vier unteren Halsnerven zusammengenommen betrachtet S. 491. — Vordere Aeste S. 491. — Hintere Aeste S. 491. — Nervus phrenicus, der Zwerchfellnerv S. 492. — N. dorsalis scapulae S. 493. — N. thoracicus posterior S. 493. — Plexus brachialis S. 494. — Nervi thoracici anteriores S. 494. — N. suprascapularis S. 495. — Nervi subscapulares S. 495. — Nervenstämme des Arms S. 495. — N. cutaneus internus minor S. 496. — N. cutaneus internus major oder cutaneus medius S. 496. — N. musculo-cutaneus S. 496. — N. axillaris S. 497. — N. medianus S. 497. — N. radialis S. 498. — N. ulnaris S. 500. — Uebersicht über die Muskeln, welche von den vier unteren Halsnerven Zweige erhalten S. 502. — Uebersicht über die Schulter- und Armmuskeln, welche von dem plexus brachialis Nerven bekommen S. 502. — Uebersicht über die Muskeln des Oberarms, Unterarms und der Hand, welche von den Stämmen der Armnerven Zweige erhalten S. 502. — Uebersicht über die Hautnerven am Halse S. 502. — Uebersicht über die Hautnerven des Arms S. 503.

Die Brust- oder Rückennerven S. 503. — Vordere Aeste der Brustnerven, oder die Nervi intercostales S. 504. — Uebersicht über die Muskeln, welche von den vorderen Aesten der Brustnerven Zweige erhalten S. 506. — Hintere Aeste der Brustnerven S. 506. — Besondere Beschreibung einzelner Brustnerven S. 507. — Uebersicht der von den Brustnerven entspringenden Hautzweige S. 508. — Uebersicht über die Muskeln, welche von den Brustnerven Zweige erhalten S. 509.

Digitized by Google

Seit

Die 5 Lendennerven S. 509. — Die vorderen Aeste S. 509. — Die hinteren Aeste S. 510. — Einige kleinere Zweige der vorderen Aeste der Lendennerven S. 510. — Vom ersten Lendennerven S. 510. — N. ileo-hypogastricus S. 510. — N. ileo-inguinalis S. 511. — Vom ersten und zweiten Lendennerven: N. spermaticus externus S. 511. — N. cutaneus externus S. 511. — Uebersicht über die Muskeln am Bauche, welche von den vorderen Aesten der Lendennerven Zweige erhalten S. 512.

Die fünf bis sechs Kreuznerven S. 512. — Die vorderen Aeste S. 512. — N. pudendus S. 513. — Die hinteren Aeste S. 514.

Nerven des Schenkels S. 514. — N. cruralis S. 514. — N. obturatorius S. 516. — Kleinere Nerven des plexus ischiadicus S. 516. — N. glutaeus superior S. 516. — Der große hintere Hautnerv S. 517. — N. ischiadicus S. 517. — N. peronaeus S. 518. — Der Schienbeinnerv S. 519. — Uebersicht über die Hautnerven des Schenkels S. 521.

Der sympathische Nerv 5

Vom sympathischen Nerven und seinen Knoten im Allgemeinen S. 523. — Der am Kopfe gelegene Theil des sympathischen Nerven S. 527. — Der am Halse gelegene Theil des sympathischen Nerven S. 531. — Der in der Brusthöhle gelegene Theil des sympathischen Nerven S. 535. — Der an den Lendenwirbeln gelegene Theil des sympathischen Nerven S. 537. — Der am Kreuzbeine gelegene Theil des sympathischen Nerven S. 537. — Geflechte des sympathischen Nerven in der Brust und Unterleibshöhle S. 538.

Digitized by Google

Viertes Buch.

Von dem

Gefäßsyſtem.

Digitized by Google

Digitized by Google

Literatur der Lehre von dem Gefäßsysteme.

Die Schriften, welche die Literatur über das Gefäßsystem ausmachen, sollen nach folgendem Plane aufgeführt werden:

I. Schriften über das ganze Gefäßsystem. S. 3.
II. Schriften über diejenige Abtheilung des Gefäßsystems, in welcher der Kreislauf geschieht, oder über die Blutgefäße. S. 3.
1. Mechanische und physiologische Untersuchungen über den Kreislauf. S. 3.
2. Ueber den Zusammenhang der Arterien und Venen unter einander durch die Haargefäße, und über den Zusammenhang derselben mit den Höhlen und Oberflächen des Körpers durch die Poren. S. 4.
3. Ueber den Herzbeutel, das Herz und die Entwickelung desselben. S. 5.
4. Ueber die Arterien. S. 10.
a. Ueber allgemeinere Verhältnisse d. Arterien, ihre Häute u. deren Organe. S. 10.
b. Ueber die Abweichungen im Verlaufe der Arterien. S. 11.
c. Ueber die Lebenseigenschaften der Arterien. S. 11.
d. Beschreibungen des Arteriensystems. S. 12.
e. Abbildungen des Arteriensystems. S. 12.
f. Einige Schriften über die vergleichende Anatomie der Arterien. S. 12.
5. Ueber die Venen. S. 13.
III. Schriften über die Abtheilung des Gefäßsystems, in welcher der Kreislauf nicht geschieht; oder über die Lymphgefäße. S. 14.
1. Ueber das Lymphgefäßsystem oder über ganze Abtheilungen desselben. S. 14.
2. Einige besondere Schriften über einzelne, die Lehre von den Lymphgefäßen betreffende Gegenstände. S. 19.
a. Ueber die Muskelfasern und Klappen der Lymphgefäße. S. 19.
b. Ueber die Communication derselben mit den Venen. S. 19.
c. Ueber die Lymphdrüsen. S. 20.
d. Ueber den Ductus thoracicus. S. 20.
e. Ueber die Lymphgefäße einzelner Organe. S. 21.
f. Ueber die vergleichende Anatomie der Lymphgefäße. S. 21.

Schriften über alle Classen von Adern.

Hierher gehören diejenigen Abtheilungen der anatomischen Handbücher und Kupferwerke (S. Th. I. S. 14 bis 31.), die die Gefäßlehre zugleich mit allen anderen Theilen der Anatomie abhandeln. Mehrere von ihnen sind auch mit einem besonderen Titel versehen, den aber speciell anzuführen nicht nöthig scheint. Wir heben hier nur die besseren der Handbücher aus; wie: Schaarschmidt (S. No. 269 angiologische Tabellen); Sömmerring (S. No. 296. Th. IV. der deutsch. und Th. V. der lat. Ausg.); *Bichat* (No. 303.); Meckel (No. 317. Th. III.)

Von Kupferwerken gehören hierher: Loder (No. 80.); *Mascagni* (No. 86.); *Antommarchi* (No. 86 (3.); *J. Cloquet* (No. 89 und 90.)

Schriften über die Blutgefäße oder Gefäße des Kreislaufes.

1. Mechanische und physiologische Untersuchungen über den Kreislauf.

1180. • *Guilielm. Harvaei* exercitationes anatomicae de motu cordis et sanguinis circulatione in animalibus. Francof. 1628. 4. Roterodam. 1671. 12. et alibi.

Digitized by Google

1181. °*C. G. Rose*, Diss. de motu sanguinis naturali et praeternatura Helmstad. 1668. 4.

1182. °*Jean Claude Adrien Helvetius*, observation sur l'inégalité de cap cité qui se trouve entre les organes destinés à la circulation du sang dans corps de l'homme; et sur les changements qui arrivent au sang en passant p le poumon. Mém. de Paris 1718. 4. hist. p. 17. Mém. p. 222. éd. in 8. hi p. 21. mém. p. 281.

1183. °*Henr. Alb. Nicolai*, Diss. de directione vasorum pro modificand sanguinis circulo. Argentor. 1725. 4. Recus. in *Halleri* coll. diss. an Vol. II. p. 481.

1184. °*Joh. Alph. Borelli*, de motu animalium (ſiehe Th. II. S. 320. N 984 dieſer Liter.) a la Haye 1743. 4. Part. II. prop. 70 — 73.

1185. °*Jac. Keill*, tentamina medico-physica ad quasdam quaestion quae oeconomiam animalem spectant, accommodata. Quibus acced. medici statica britannica. Lond. 1718. 8.

1186. *Jurin*, De potentia cordis. Philosophical Transactions 1718, n. 358. 1719 n. 362.

1187. *C. F. Maertens*, Diss. de circulatione sanguinis. Helmst. 1739.

1188. °*Jo. Gottl. Krüger*, resp. *Sam. Hambacher*, Diss. de theoriae p sicae tubulorum capillarium ad corpus humanum applicatione. Halae M 1742. 4.

1189. *Passavant* (*Bernoulli*), de vi cordis. Bâles 1748.

1190. °*Steph. Hales*, statical essays etc. Vol. I. II. Lond. 1731 — 33 Ueberſetzt ins Franz. und mit vielen Anmerk. bereichert von *Sauvages*, u dem Titel: Haemastatique ou la statique des animaux, expériences hydrauliq faites sur des animaux vivans, avec un recueil de quelques expériences les pierres que l'on trouve dans les reins et dans la vessie, et des recher sur la nature de ces concrétions irregulières, par *Etienne Hales*. Ouv très-utile aux médecins. Traduit de l'anglois et augmenté de plusieurs re ques et de deux dissertations de médecine sur la théorie de l'inflammatio sur la cause de la fièvre. A Genev. 1744. 4. Deutſch. Halle 1748. 4.

1191. °*Alb. Haller*, de partium corporis humani praecipuarum fabri functionibus. Tom. I. Lib. II.

1192. *A. Braun*, Diss. sist. meletemata quaedam circa doctrinam de t sanguinis. Jenae 1792. 4.

1193. °*G. Prochaska*, controversae physiologicae, quae vires cordis et tum sanguinis per vasa animalium concernunt. In Opp. min. anat. arg. Vienn. 1800. p. 1 sq.

1194. *Araldi*, della forza e dell' influsso del cuore sul circolo del sa In mem. della società italiana in Modena. 1804. Vol. XI. p. 342. Vol. 1810. p. 166.

1195. *Thom. Young*, The croonian lecture on the function of the and arteries. Philos. transact. 1809. Prt. I.

1196. °J. Heinr. Oeſterreicher, Verſuch einer Darſtellung der vom Kreislaufe des Blutes. Nürnb. 1826. 4.

1197. °Gerg. Wedemeyer, Unterſuchungen über den Kreislauf des B und insbeſondere über die Bewegung deſſelben in den Arterien und Capille ßen; mit erklärenden Hindeutungen auf pathologiſche Erſcheinungen. Han 1828. 8.

1198. °*J. L. M. Poiseuille*, recherches sur la force du coeur aor In *Breschet* répert. génér. d'anat. et de physiol. pathol. Tom. VI. à 1828. p. 60 — 87.

2. Ueber den Zuſammenhang der Arterien und Venen u einander durch die Haargefäße, und über den Zuſam hang derſelben mit den Höhlen und Oberflächen des pers durch die Poren.

1199. *Raym. Vieussens*, novum vasorum corporis humani systema 1705. 8.

1200. *J. F. Fasel*, de arteriis non sanguiferis. Jenae 1763. 4.

Digitized by Google

1201. °*Abrah. Kaau*, perspiratio dicta Hippocrati (s. d. Lit. z. Haut, Th. II. S. 511. No. 1069.)

Hieher gehört auch Janke's, unten bei den Venen, unter No. 1392. angeführte Schrift.

1202. °*John Evelyn*, an account of divers schemes of arteries and veins, dissected from adult human bodies and given to the repository of the Roy. Soc. to which are subjoined a description of the extremities of those vessels, and the manner the blood is seen by the microscope, to pass from the arteries to the veins in quadrupeds when living; with some chirurgical observations and figures after the life, by Will. Cowper. Philos. transact. 1702. p. 1177.

1203. *Ferrein*, sur de nouvelles artères et veines lymphatiques, in Mém. de l'acad. des sc. de Paris 1741. 4. p. 371.

1204. °*Jan. Bleuland*, experimentum anatomicum, quo arteriolarum lymphaticarum existentia probabiliter adstruitur et icone illustratur. Lgd. Bat. 1784. 4.

1205. °H. van den Bosch, theoretische und praktische Bemerkungen über das Muskelvermögen der Haargefäßchen. Münster 1786. 4.

1206. °*Jo. Gottl. Hause*, Progr. de fine arteriarum, earumque cum venis anastomosi. Lips. 1792. 4.

1207. °A. F. Hecker, über die Verrichtungen der kleinsten Schlagadern, und einiger aus einem Gewebe der feinsten Gefäße bestehenden Eingeweide, der Schild- und Brustdrüse, der Milz, der Nebennieren und der Nachgeburt. Erfurt 1790. 8.

1208. °*B. N. G. Schreger* de *Cruikshankii* decreto, non esse pervias ullas vivi corporis partes nisi vasorum osculis. In ejusd. fragment. anat. Fasc. I. No. 6.

1209. °Grg. Prochaska, Bemerk. über den Organismus des menschlichen Körpers und die denselben betreffenden arteriösen und venösen Haargefäße, nebst der darauf gegründeten Theorie der Ernährung. Wien 1810. 8.

1210. °*Idem*, de vasis sanguineis capillaribus, illorum copia et proportione ad substantiam solidam non vasculosam etc. In ej. disquis. anat. phys. organism. corp. hum. Vienn. 1812. 4. cap. 9.

1211. °K. Burdach, über die Haargefäße, mit Hinsicht auf die Lieberkühnschen Präparate in St. Petersburg. In der russ. Samml. für Naturw. und Heilk. Herausg. von Chrichton, Rehmann und Burdach. Bd. 2. 1817. 8. St. 3.

1212. °S. Th. Sömmerring, über das feinste Gefäßnetz der Aderhaut im Augapfel. In Denkschriften der Münchner Akad. d. Wiss. 1818—1820. S. 3. ff.

1213. *Broussais*, mémoire sur la circulation capillaire, tendant à faire mieux connoitre les fonctions du foie, de la râte et des glandes lymphatiques. Mém. de la soc. méd d'émul. de Par. Vol. VII. p. 1.

— faits relatifs à la circulation capillaire. In Annal. de la soc. de méd. de Montpell. Vol. XX. p. 195.

1214. *Gardien*, rapport sur un mémoire manuscrit du Dr. *Broussais*, relatif à la circulation capillaire, tendant a déterminer d'une manière plus précise les fonctions du foie, de la râte et des glandes lymphatiques. In *Tartra*, bull. des sc. méd. Vol. IV. 31.

Hierher gehört auch *P. Mascagni* in seinem Prodromo. Siehe No. 86. Th. I. S. 51. und in seinen auf die Lehre von den Lymphgefäßen Bezug habenden Schriften. (Siehe die Literatur der Lymphgefäße.)

3. Ueber den Herzbeutel, das Herz und die Entwickelung desselben.

1215. *Jul. Jasolini*, de aqua pericardii et cordis pinguedine quaestiones anatomicae. Neapol. 1573. 8. Hanau 1654. Fref. 1668. 4.

1216. *Marc. Aurel. Severinus*, de aqua pericardii, cordis adipe, poris choledochis. Hanau 1654. 4.

1217. °*Joh. Maur. Hoffmann*, resp. *Grg. Frid. Francus de Frankenau*, Diss. de pericardio, atque experimentis et observationibus novissimis circa id habitis. Altorfi 1690. 4.

1218. °*Gunth. Christph. Schelhammer*, resp. *Joh. Christph. Wentzel*, Diss. de aqua pericardii. Jenae 1694. 4.

1219. °*Alexis Littre*, observation sur l'eau, qui est dans le péricarde et

Digitized by Google

dans le ventricule du cerveau. Mém. de Paris 1711. 4. hist. p. 29. éd. in 8. hist. p. 37.

1220. ° *Gottwald Schuster*, (vide etiam Acta Acad. Nat. Curiosor. Vol. VI. p. 180.) Hydrocardiologia, sive Diss. med. theolog. legalis de liquore pericardii, qua binae quaestiones, altera: ob die Feuchtigkeit, so zwischen dem Herz und dessen Behältniß befindlich, ein Kennzeichen geschehener Erstickung abgiebt? altera: ob das Wasser, so aus der eröffneten Seiten des Herrn Jesu am Creutze geflossen, aqua pericardii gewesen? Chemnicii 1740. 4.

1221. *Jos. Buteus*, observatio, unde pericardii lympha proveniat? Commentar. Bononienses. Tom. II. P. 1. C. p. 151.

1222. *Andr. Bernh. Heimann*, Diss. de pericardio sano et morboso. Lgd. Bat. 1729. 8. ibid 1753. 4.

1223. *Jos. Lanzoni*, de pericardio. Ferrariae (?) recus. in Bibliotheca anat. Mangeti, et in ej. opp. omn. Lausannae 1738. 4.

1224. ° *Chr. Gottl. Ludwig*, resp. *J. G. Friderici*, an liquor pericardii per auriculas cordis transsudet? Lipsiae 1740. 4.

1225. ° *Henr. Kyper*, Diss. de humore pericardii. Lgd. Bat. 1741. 4.

1226. *G. Eisenmann*, resp. *J. J. Roth*, Diss. de liquore pericardii. Argentor. 1748. 4.

1227. ° *Chrst. de Jonge*, Diss. phys. med. de pericardio et liquore eo contento. Traj. ad Rhen. 1754. 4.

1228. *J. Klefeker*, Diss. de halitu pericardii. Lgd. Bat. 1758. 4.

1229. ° *Hippocrates*, περὶ καρδίης (de corde) Exstat in ed. Lindeniana. Tom. I. p. 289. — in ed. Frobeniana gr. p. 54. — in ed. Mercuriali, sect. IV. p. 48. — in ed. Foesii, sect. III. p. 50. — in ed. Charter. Vol. IV. p. 269. — in ed. Kühnii. Lips. 1825. Vol. I. p. 485. cum commentariis Jacobi Horstii. Frcf. ad Viadr. 1563. 4.

1230. *Avicennae*, liber de corde. Venet. 1495. Fol. 1507. 8. Lgd. 1557. 8. et alibi, et in operibus Avicennae.

1231. *Jac. Milich*, oratio de cordis partibus et motibus. Viteberg 1551. 4.

1232. *Nic. Taurelli* et *Grg. Sytschii*, de cordis natura et viribus theses. Altorf 1585. 4.

1233. *Eustach. Rudii* de naturali et morbosa cordis constitutione. Venet. 1600. 4.

1234. *Jo. Nic. Stupanus*, resp. *E. Vestifio*, de corde et organis ei famulantibus.

1235. *Jac. Cocus*, de corde, arteriis et pulmonibus. Viteberg. 1604. 4.

1236. *Valentin Hartung*, resp. *D. Winkler*, Diss. de corde. Lipsiae 1619. 4.

1237. *Theod. Illing*, resp. *J. H. Grosch*, καρδιολογία h. e. de cordis natura et essentia. Lipsiae 1626. 4.

1238. *Petri Lauremberg*, exercitatio de pericardio, de corde, de pulmonibus, de aspera arteria. Rostoch. 1635. 4. recus. in ejus collegio anatom. Rostoch. 1636. 4. et in ej. anat. corp. hum. Francof. 1665. 12.

1239. *Conr. Vict. Schneider*, de corde disputatio. Viteberg. 1642. 12.

1240. *Petr. Oelhafen*, resp. *B. Blank*, Diss. de corde. Gedani 1643. 4.

1241. ° *Jac. Back*, de corde dissertatio, in qua agitur de nullitate spirituum, de haematosi, de viventium calore. Roterod. (1648. 12. 1659. 12. 1660. 12.) 1671. 12. (Lgd. Bat. 1664. 12.) Englisch. London 1653. 8.

1242. *Thom. Bartholini*, Diss. de corde apud veteres. Hafniae 1648.

1243. ° *Eccard Leichner*, resp. *Jo. Jac. Wittig*, diascepsis anatomico-medica de cordis constitutione et usu. Erfurti 1657. 4.

1244. *Wern. Rolfink*, resp. *J. Rhetio*, de corde ex veterum et recentiorum propriisque observationibus concinnata et ad circulationem sanguinis accommodata dissertatio. Jenae 1654. 4.

1245. *Chr. Loesnitzer*, Diss. de corde humano. Lipsiae 1654. 4.

Hierher gehört auch ° *Nicolaus Stenonis* de musculis et glandulis etc. p. 22. Siehe Th. II. S. 317. No. 914.

1246. *Mich. Sennert*, resp. *G. A. Merclin*, Diss. de corde. Viteberg 1664. 4.

1247. *J. Chr. Hippius*, resp. *C. Engelhaupt*, Diss. de corde. Lipsiae 1667. 4.

Digitized by Google

1248. *Grg. Wosegin*, resp. *Nitzschke*, Diss. de cordis structura ejusdemque usu. Regiom. 1667. 4.

1249. ° *Richardi Lower*, tractatus de corde. Item de motu, colore et transfusione sanguinis: ut et de venae sectione. His accedit Diss. de origine catarrhi; in qua ostenditur, illum non provenire a cerebro. (London 1669. 8. 1680. 8. Amstel. et Lgd. 1708. 8. 1722. 8. 1728. 8.) Editio septima, prioribus correctior et indice auctior, cum figuris aeneis. Lgd. Bat. 1740. 8. 1749. 8. Französisch: Traité du coeur, du mouvement et de la couleur du sang et du passage du chyle dans le sang. à Paris 1679. 8.

1250. *J. Nicol. Pechlin*, resp. *Ad. Conr. Langelott*, Diss. de fabrica et usu cordis. Kiloni 1676. 4. recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 313 — 358.

1251. *Casp. Bartholin* (filius), resp. *G. Serup*, Diss. de cordis structura et usu. Hafniae 1678. 4.

1252. *Petr. Hoffvenii*, (*s. Houſwenii*) resp. *D. Lindenio*, Diss. de corde, ejusque structura et usu. Upsal. 1681. 8. c. fig.

1253. *C. Morton*, Diss. de corde. Lgd. Bat. 1683. 12.

1254. *Jo. Godofr. de Berger*, Progr. de corde. Viteberg. 1688. 4.

1255. *Frid. Schrader*, resp. *R. Hake*, de corde et pulmonibus, ad *Veslingii* syntagma anat. c. 10. Helmstad. 1688. 4.

1256. *Grg. Alb. Hamberger*, Diss. de Deo ex conformatione cordis demonstrato. Jenae 1692. 4. (1708. 4.)

1257. *Raym. Vieussens*, nouvelles découvertes sur le coeur dans une lettre à *M. Budin* à Paris 1706. 12.

1258. ° *Jacq. Benig. Winslow*, observations sur les fibres du coeur et sur les valvules, avec la manière de les préparer pour les démontrer. Mém. de Paris 1711. hist. p. 21. mém. p. 151. ed. in 8. hist. p. 26. mém. p. 196.

1259. ° *Alex. Stuart*, on the muscular structure of the heart. Philos. trans. 1741. p. 675.

1260. ° *Jos. Lieutaud*, observations anatomiques sur le coeur. Mém. de Paris 1758. hist. p. 26. mém. p. 244. 308. éd. in 8. hist. p. 38. mém. p. 362. 1757. Mém. 3., contenant la description particulière des oreillettes, du trou ovale et du canal artériel. Ibid 1754. hist. p. 55. mém. p. 369. éd. in 8. hist. p. 82. mém. p. 560.

1261. *Ejusd.* traité nouveau de la structure et des causes du mouvement du coeur. à Toulouse 1715. 4.

1262. ° *Martin Martinez*, observatio rara de corde. Madrid 1723. 4. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 973.

1263. *Aug. Fr. Walther*, Pr. de structura cordis auricularum. Lipsiae 1734. 4. et in *Halleri* coll. diss. an. II. p. 163.

1264. *Petri Gerike*, Pr. de cordis et vasorum proxime cum eo connexorum situ vero in homine, hujusque rationibus. Helmstad. 1741. 4.

1265. *Grg. Lud. de Monge*, de corde in genere. Basil. 1745. 4.

1266. ° *Grg. Fr. Sigwart*, resp. *Joh. Henr. Sulzer*, antagonismus fibrarum cordis humani musculosarum controversiosus. Tubingae 1755. 4.

1267. *Jo. Fr. Faselii* Pr. de vero adipis ad basin cordis circumfusi usu. Jenae 1763. 4.

1268. ° *Joh. Nicol. Weise*, resp. *Gttl. Joh. Grg. Wilh. Gmelin*, Diss. de dextro cordis ventriculo post mortem ampliore. Altorf. 1767. 4.

1269. ° *M. de Senac*, traité de la structure du coeur, de son action et de ses maladies. à Paris 1749. 4. 2 voll. Seconde édit. avec fig. Tom. I. II. à Paris 1774. 4.

1270. *Jo. Gttl. Petzold*, de corde et ejus motu epistola. Lipsiae 1750. 4.

1271. ° *Chr Loeber*, Diss. de cordis fabrica et functione, atque de sanguinis per cor et vasa sanguinea circulatione. Erford. 1767. 4.

1272. ° *Arnold. Anthon. Stook*, Diss. de fabrica et motu, causisque motricibus cordis. Lgd. Bat. 1775. 4.

1273. ° *Jo. Lud. Fr. Dietz*, Pr. observatio anatomica de corde. in ac. Lauteric. 1781. 4.

1274. *V. Bocalosi*, del cuore e delle azioni, che dipendono de quest organo. Leid. 1789. 8.

1275. ° *Gaspar. Frid. Wolff*, de ordine fibrarum muscularium cordis.

Digitized by Google

Diss. 1. de regionibus et partibus quibusdam in corde, tunica exuto, notabilibus. Acta acad. sc. imp. Petropol. ann. 1780. P. II. p. 197. Diss. 2. de textu cartilagineo cordis; sive de filis cartilagineo-osseis eorumque in basi cordis distributione. Ibid. ann. 1781. P. I. p. 211. Diss. 3. de fibris externis ventriculi dextri. Ibid. 1781. P. 2. p. 221. Diss. 4. de fibris externis ventriculi sinistri. Ibid. 1782. P. 2. p. 214. Diss. 5. de actione fibrarum externarum ventriculi sinistri. Nova acta acad. Petrop. Tom. I. p. 231. Diss. 6. quae repetitas et novas observationes de fibris ventriculorum externis continet. P. 1. ventriculus dexter. Ibid. Vol. II. p. 181. P. 2. ventriculus sinister. Ibid. Vol. III. p. 185. Diss. 7. de stratis fibrarum in universum. Ibid. Vol. III. p. 227. Diss. 8. P. 1. 2. de fibris mediis ventriculi dextri. Ibid. Vol. IV. p. 217 und 242. Diss. 9. de actione fibrarum mediarum ventriculi dextri. Vol. V. p. 223. Diss. 10. de strato secundo fibrarum ventriculi sinistri P. I. Ibid. Vol. VI. p. 217. P. II. Vol. VIII. p. 347. P. III. Vol. IX. p. 271. P. IV. Ibid. Vol. X. 175. ad ann. 1792.

1276. ° *J. Bern. Jac. Behrends*, Diss. qua demonstratur, cor nervis carere. Moguntiae 1792. 4.

1277. ° *Adam. Theoph. Nicol. Zerener*, an cor nervis careat et iis carere possit. Erford. 1794. 4.

1278. ° *Everard Home*, über die Muskelbewegung, aus den Philosophical Transactions of the royal Society of London for the Year 1795. P. I. p. 202. sq. Uebersetzt in Reils Archiv für die Physiologie. B. II. Halle 1797, wo S. 102 bis 106 vom Bau des Herzens gehandelt wird.

1279. *Vaust*, Recherches sur la structure et les mouvemens du coeur. Liège 1821.

1280. ° *P. N. Gerdy*, Recherches, discussions et propositions d'anatomie, de physiologie, de pathologie. 1°. sur la langue, le coeur et l'anatomie des régions etc. avec 13 figures. Thèse soutenu à la faculté de Méd. de Paris. à Paris 1823. 4. p. 24. Siehe auch Journ. compl. du dict. d. sc. méd. Vol. X. p. 97.

Entwickelung des Herzens.

1281. Just. Gottfr. Günz, Bemerkungen an Herz und Leber bei einer achtmonatlichen Frucht. Abhandlung. der schwedischen Akademie der Wissenschaft. 1751. S. 35.

1282. ° Danz, Grundriß der Zergliederungskunde des ungebornen Kindes in den verschiedenen Zeiten der Schwangerschaft. Gießen 1793. Bd. 2. S. 185—188.

1283. ° Joh. Fr. Meckel, Beiträge zur Bildungsgeschichte des Herzens und der Lungen der Säugethiere. In Meckels Archiv., Bd. II. S. 402. übersetzt: Mémoire sur l'histoire du développement du coeur et des poumons dans les mammifères. In Journal compl. du Dict. d. sc. méd. I. 1818. p. 259.

1284. ° *L. Rolando*, sur la formation du coeur et des vaisseaux artériels, veineux et capillaires. In Journal compl. du Dict. des sc. méd. XV. 1823. p. 323. et XVI. p. 34.

1285. ° *Prévost et Dumas*, observations sur le développement du coeur dans le foetus. In Bullet. des sc. de la soc. philomat. Oct. 1824. p. 145. et Nov. p. 161.

1286. H. Fr. Kilian, über den Kreislauf des Blutes im Kinde, welches noch nicht geathmet hat. Mit 10 Steintaf. Karlsruhe 1827. 4.

Wichtig sind für diese Entwickelungsgeschichte besonders auch die Schriften über die Entwickelung des Hühnchens im Ei, des Malpighi, Gasp. Fr. Wolff, Pander, Döllinger und d'Alton, und über die der Vögel und der Säugethiere des von Bär.

Valvula Eustachii, foramen ovale, ductus arteriosus Botalli, ductus venosus.

1287. ° *Petri Gassendi*, de septo cordis pervio libellus. (Lgd. Bat. 1639. 12.) cum *Pinaeo* de virginitatis notis et aliis. (Lgd. Bat. 1641. 12.) Francof. et Lips. 1689. 12. p. 304 sq.

Die beiden hierher gehörigen Schriften von *Caecil. Folius* siehe bei der Lit. der Lymphgefäße unter No. 1401.

1288. De nupero Botallianorum invento, quo viam sanguinis a dextro in

Digitized by Google

sinistrum cordis ventriculum adserunt, *Claudii Galeni* sententia abhinc 1500 annis monumentis literarum publicata. Patav. 1640. 4.

1289. *Galeni et Botalli,* placida de via sanguinis in corde. Venet. 1640. 4.

1290. *Guichard Joseph Duverney,* observation sur la circulation du sang dans le foetus. Mém. de Paris 1699. hist. p. 25. 34. mém. p. 227. éd. in 8. hist. p. 35. 39. mém. p. 283.

1291. *Jean Mery,* de la manière dont la circulation du sang se fait dans le foetus. Mém. de Paris. Vol. II. p. 175. Vol. X. p. 65. ann. 1703. hist. p. 32. éd. in 8. hist. p. 39.

1292. — *Idem.* Réponse à *G. J. Duverney,* critique du nouveau système de la circulation du sang par le trou ovale du coeur de foetus humain. Mém. de Paris 1703. mém. p. 403. éd. in 8. mém. p. 490.

1293. — *Idem.* Observation sur l'usage du trou ovale et du canal de communication dans le foetus. Mém. de Paris. Vol. II. p. 238.

1294. — *Idem.* Observation sur le canal de communication, qui se trouve dans le foie du foetus, entre la veine-porte et la veine-cave. Mém. de Paris. Vol. II. p. 299.

1295. ° *Jean Mery,* Nouveau système de la circulation du sang par le trou ovale dans le fétus humain, avec les réponses aux objections faites contre cette hypothèse. Paris 1700. 12.

1296. *Paul Bussière,* lettre pour servir de réponse à *M. Mery.* Paris 1698. 12.

1297. — Lettre ———— sur le trou ovale dans le foetus. Paris 1703. 12.

1298. *Alexis Littre,* observations sur la circulation du sang dans le foetus, observations qui appuient le système de *J. Mery.* Mém. de Paris 1701. hist. p. 36. éd. in 8. hist. p. 45.

1299. *Pierre Simon Rouhault,* observation sur la force, qui pousse le sang dans le foetus. Mém. de Paris 1718. hist. p. 11. éd. in 8. hist. p. 13.

1300. *Jacques Benigne Winslow,* description d'une valvule singulière de la veine-cave inférieure, à l'occasion de laquelle on a proposé un sentiment nouveau sur la fameuse question du trou ovale, qui semble également appuyé par les preuves favorables aux deux opinions contraires. Mém. de Paris 1717. hist. p. 17. mém. p. 211. éd. in 8. hist. p. 20. mém. p. 272.

1301. — *Idem*: Eclaircissement sur le mémoire a. 1717. qui traite de la circulation du sang dans le foetus; et quelques rémarques sur un système particulier de *Vieussens,* et sur un écrit de *Rouhault* sur cette même matière. Mém. de Paris 1725. mém. p. 23. 260. éd. in 8. mém. p. 34. 371.

1302. *Jo. Henr. Croeser,* Diss. qua sanguinis per foramen ovale trajectus indicatur, et membranae ejus foraminis ante partum nullum esse usum, post nativitatem vero claudere id foramen. Groening. 1735. 4.

1303. ° *Nicolas Lemery,* sur le trou ovale. Mém. de Paris 1739. hist. p. 4. mém. p. 31. 97. éd. in 8. hist. p. 4. mém. p. 39. 128.

1304. *François Jos. Hunauld,* observation anatomique sur la valvule du trou ovale, qui, dans le foetus, laisse passer le sang d'une oreillette du coeur dans l'autre. Mém. de Paris 1735. hist. p. 19. 1740. p. 51. éd. in 8. hist. p. 26. et 71.

1305. ° *Jo. Frid. Crell,* resp. *Chr. Gothofr. Leissnerus,* de valvula venae cavae Eustachiana. Vitemberg. 1737. 4.

1306. ° *Jo. Gothofr. Brendelius,* Pr. de valvula Eustachiana inter venam cavam inferiorem dextramque cordis auriculam consita schediasmation, quo novam illius, reticulo suo, cornuque altero duplici, instructae, tabulam proponit. Vitemberg. 1738. 4. recus. in ejusd. opusc. math. et med. argumenti cura *Wrisberg,* Gotting. 1769. 4. I. p. 71. et in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 171.

1307. *Leander Peaget* et *Julian. Busson,* ergo sanguis in foetu a dextra in sinistram cordis auriculam per foramen ovale transit? non secus. Paris. 1741. 4.

1308. *Pietro Tabarrani,* Lettera, in cui vengono esaminate due figure di quelle lasciateci, delineate dal Cel. *Eustachio,* cioe a dire la III. et la VI. della tavola XVI. nella prima delle quali si crede che l'*Eustachio* in cambio della sua cotanto celebrata valvula abbia rappresentata quella del forame ovale, ragionandosi con tale occasione non solo di esse valvule, ma eziandio del fo-

Digitized by Google

rame ovale medesimo, del suo usu stato cotanto controverso nel feto, e del canale pure arterioso communemente chiamato del Botallo, ed eziandio di quello, che appellano venoso. Atti di Siena. Tom. III. Append. p. 41.

1309. *Laurentius Heister*, venae umbilicalis in foetu vera insertio, et canalis venosi accuratior descriptio, errorumque, quos autores circa haec commiserunt, emendatio. Ephemer. nat. cur. Cent. V. et VI. p. 236.

1310. *Jo. Jac. Huber*, de foramine ovali. Cassel 1745. 4.

1311. *Alb. Haller*, Pr. de valvula Eustachii. Gotting. 1737. 4. Lips. 1738. 4. 1749. 4. in opp. min. I. p. 24. et coll. Diss. anat. II. p. 189.

1312. — *Idem*, de foramine ovali et valvula Eustachii. Gott. 1748. Fol. et in Fasc. IV. icon. anat. et in opp. min. Vol. I. p. 33.

1313. *Exupère Jos. Bertin*, sur le cours du sang dans le foie du foetus humain. Mém. de Paris 1753. 4. hist. p. 117. mém. p. 323. 1765. hist. p. 28. mém. p. 35. 106.

1314. *Jo. Mich. Dioboldt*, Diss. de foramine ovali. Argentor. 1771. 4.

1315. ° *Jo. Fr. Lobstein*, resp. *Mich. Dioboldt*, Diss. de valvula Eustachii. Argentor. 1771. 4.

1316. *Gasp. Frid. Wolff*, de foramine ovali ejusque usu in dirigendo motu sanguinis, observationes novae. Novi commentar. Acad. Petropol. Vol. XX. 1775. hist. p. 49. Mem. p. 357.

1317. ° *Franc. Xaver. de Buglioni*, (Henrici Palmatii Leveling) observationes anatomicae rariores de valvula Eustachii et foramine ovali. Anglipoli 1780. 4. (et in *Levelingii* obss. anat. rar. Anglipoli 1787.)

1318. *Raphael Bienvenu Sabatier*, mémoire sur les organes de la circulation du sang du foetus. Mém. de Paris 1774. hist. p. 7. mém. p. 198. — Mémoire sur les changemens qui arrivent aux organes de la circulation du foetus, lorsqu'il a commencé à respirer. Mém. de l'instit. de Paris. Sc. math. et phys. Tom. 3. p. 337.

1319. ° *Guil. Ed. Biel*, de foraminis ovalis et ductus arteriosi mutationibus. Berolini 1827. 4. Cum II. tabb. aen.

4. Schriften über die Arterien.

a. Ueber allgemeinere Verhältnisse der Arterien, ihre Häute und deren Organe.

1320. ° *Joh. Ern. Hebenstreit*, Progr. de arteriarum corporis humani confiniis. Lips. 1739. 4. recus. in Halleri collect. Diss. Vol. II. p. 35.

1321. ° *Idem*. Progr. de vaginis vasorum. Lipsiae 1740. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 27.

1322. ° *Idem*. Progr. de flexu arteriarum. Lipsiae 1741. 4. recus. in Halleri coll. Diss. Vol. I. p. 555.

1323. *J. C. Hörmann*, de arteriarum flexuoso progressu. Lips. 1763. 4.

1324. ° *Jo. Traug. Adolph*, Diss. arteriologiae recte concinnandae leges; cum specimine carotidis externae. Helmstad. 1764. 4.

1325. ° *J. C. Pohl*, Progr. de arteriis. Lipsiae 1773. 4.

1326. ° Joh. Fr. Meckel, über den Verlauf der Arterien und Venen. In dess. Arch. Bd. 1. S. 285. — Ueber die Verschiedenheit der rechten und linken Körperhälfte in Hinsicht auf die verhältnißmäßige Größe der Arterien und Venen. Archiv., Bd. 1. S. 450.

1327. ° *Charl. Henr. Ehrmann*, structure des artères, leurs propriétés, leurs fonctions et leurs altérations organiques. Strasbourg 1822. 4.

1328. ° *D. Belmas*, derselbe Titel ibid. eod. 4.

1329. *W. Vrolik*, Diss. anat. path. de mutato vasorum sanguiferorum decursu in scoliosi et cyphosi. Amstel. 1823. 4. c. tabb. aen. II.

1330. ° *Chr. Gttl. Ludwig*, resp. *Grg. Chr. Hahn*, Diss. de tunicis arteriarum. Lips. 1739. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. Vol. II. p. 1. sq.

1331. ° Alex. Monro, über die Häute der Arterien und ihre Krankheiten. In s. Werken. Leipzig 1762. 4. p. 95.

1332. ° *De la Sône*, recherches sur la structure des artères. Mém. de l'Ac. roy. des sc. 1756. Paris 1762. 4. p. 107. sq.

1333. *Ger. van Swieten*, de arteriae fabrica et efficacia in corpore humano. Lgd. Bat. 1725. 4.

Digitized by Google

1334. °*B. S. Albin*, de arteriae membranis et vasis. In ej. annot. acad. Lib. IV. cap. 8. p. 30.

1335. °*Alb. Haller*, de arteriarum et venarum fabrica. In oper. min. Vol. I. p. 173.

1336. °*John Hunter*, a treatise on the blood, inflammation and gun-shot-wounds. To which is prefixed a short account of the authors life by his brother-inlaw, *Everard Home*. Lond. 1794. 4. Versuche über das Blut, die Entzündung, die Schußwunden. Nebst einer Nachricht von dem Leben des Verfassers v. Eberh. Home. Aus dem Engl. übers. v. E. B. G. Hebenstreit. 1797. 8. 2 Bde.

1337. °*C. Ed. Letierce*, essai sur quelques points d'anatomie et de physiologie méd. et chirurg. de la membrane interne des artères. Thes. inaug. Paris 1829. Arch. gén. de méd. 1829. Nov. p. 424.

1338. °*Alb. de Haller*, resp. *Math. Lud. Rud. Berkelmann*, Diss. de nervorum in arterias imperio. Gotting. 1744. 4. et in *Halleri* opp. min. Vol. I. p. 513.

1339. °*Henr. Aug. Wrisberg*, observat. anat. phys. de nervis arterias venasque comitantibus. In ej. comment. Vol. I. Gotting. 1800. 8. p. 363. et in *Ludwig* script. nevrol. min. Vol. III. p. 24.

1340. °*S. C. Lucae*, quaedam observationes anatomicae circa nervos arterias adeuntes et comitantes. c. fig. annexae sunt annotationes circa telam cellulosam. Frcf. a. M. 1810. 4. Deutsch: anatomische Beobachtungen über die Nerven, die zu den Arterien gehen und sie begleiten; nebst einem Anhange über das Zellgewebe. Reils Archiv, Bd. IX. S. 551 ff.

1341. °*F. Ribes*, kurze Darstellung einiger anatomischen, physiologischen und patholog. Untersuchungen. Aus den mém. de la soc. méd. d'émulat. Tom. VIII. 1817. p. 604 — 631. in Meckels Arch. Bd. V. p. 442 ff.

b. Ueber die Abweichungen im Verlaufe der Arterien.

Die Schriften über die Varietäten einzelner Arterien werden bei der Beschreibung der einzelnen Gefäße selbst angegeben werden. Außerdem vergleiche man hierbei die meisten angiol. Schriften, besonders Haller, Mayer, Sömmerring, Meckel, so wie die Werke über pathol. Anat. von Voigtel, Meckel und Otto.

1342. °*Franç. Jos. Hunauld*, sur les causes de la structure singulière qu'on rencontre quelquefois dans différentes parties du corps humain. Sur la variété qui se trouve dans la distribution des vaisseaux. Mém. de Paris 1740. mém. p. 382. éd. in 8. p. 525.

1343. °*Cas. Chstph. Schmiedel*, de varietatibus vasorum plerumque magni momenti. Erlang. 1745. 4.

1344. °*C. G. Ludwig*, observationes quaedam angiologicae. Lips. 1764. 4.

1345. *Th. H. Timmermann*, Diss. de notandis circa naturae in humana machina lusus. Rintel. 1765. 4. p. 50. sq.

1346. °*J. C. Loder*, Pr. de nonnullis arteriarum varietatibus. Jenae 1781. 4.

1347. °*Sandifort*, de notabilioribus vasorum aberrationibus. In obs. anat. path. Lib. IV. VIII. L. B. 1774. 4. p. 91.

1348. *Koberwein*, de vasorum decursu abnormi ejusque vi in omnem valetudinem varia. Viteb. 1810. 4.

1349. *Ryan*, de quarundam arteriarum in corpore humano distributione. Edinb. 1810. (1812?) 8.

1350. °Joh. Fr. Meckel, über einige merkwürdige Gefäßabweichungen. Meckels Arch. VI. S. 453.

1351. *Schoen*, Diss. de nonnullarum arteriarum ortu et decursu abnormi. Halae 1823. 8.

c. Ueber die Lebenseigenschaften der Arterien.

1352. *Guil. Verschuir*, de arteriarum et venarum vi irritabili ejusque in vasis excessu et inde oriunda sanguinis directione abnormi. Groning. 1766. 4.

1353. *Chr. Kramp*, de vi vitali arteriarum. Argentor. 1786. 8.

1354. *Caleb Hillier Parry*, an experimental inquiry into the nature, cause and varieties of the pulse, and certain other properties of the larger arteries

Digitized by Google

in animals with warm blood. Illustr. by engrav. Lond. 1816. 8. Deutsch: ° Experimentaluntersuchung über die Natur, Ursache und Verschiedenheit des arteriösen Pulses und noch gewisse andere Eigenschaften der großen Arterien in warmblütigen Thieren. Mit 1 Kpfrt. Aus dem Engl. v. E. v. Embden. Hannover 1817. 8.

1355. *Chr. Henry Parry,* additional experiments on the arteries of warm blooded animals. Lond. 1819. 8.

1356. ° *Mich. Jaeger,* tractatus anatomico-physiologicus de arteriarum pulsu. Virceb. 1820. 8.

1357. *Car. Hastings,* Disp. phys. inaug. de vi contractili vasorum. Edinb. 1818. 8. und in Meckels Arch. Bd. 6. — Abhandl. über die Entzündung der Schleimhaut der Lungen, nebst einer auf Versuche sich gründenden Untersuchung über die Contractilität der Blutgefäße und die Natur der Entzündung. Aus d. Engl. v. G. v. d. Busch. Bremen 1822. 8.

1358. ° *Fr. Guil. Oppenheim,* Diss. sist. experimenta nonnulla circa vitam arteriarum et circulationem sanguinis per vasa collateralia. Manhemii 1822. 4. c. tab. aen.

1359. *Maunoir,* mémoires physiologiques et pratiques sur aneurysme et la ligature. à Genev. 1802. 8. p. 106.

1360. *Jones,* a treatise on the process employed by nature in suppressing the hemorrhage from divided and punctured arteries, and on the use of the ligature. Lond. 1806. ed. 2. 1810. m. 15 Kpft. Deutsch mit Anmerk. v. Spangenberg. Hannover 1813. 8.

1361. ° *A. F. J. C. Mayer,* Progr. disquisitio de arteriarum regeneratione. Bonnae 1823. 4.

1362. ° *Theoph. Ebel,* Diss. de natura medicatrice sicubi arteriae vulneratae et ligatae fuerint. Giessae 1826. 4. m. 6 Kpft.

1363. *v. Schönberg,* memorie sul ristabilimeno della circolazione nella legatura o anche recisione dei tronchi delle arterie, con le conchiusioni immediate, illustrate da experimenti e disegni. Napol. 1826.

1364. ° Anton Zhuber, neue Versuche an Thieren und deren Resultate über die Wiedererzeugung der Arterien, mit beigefügten Bemerkungen darüber. Mit 3 lith. Tafeln. Wien 1827. 8.

d. Beschreibung des Arteriensystems.

1365. J. E. Wreden, arteriologische Tabellen. Hannover 1721. Fol.

1366. *Chirol,* tableau de toutes les artères du corps humain. à Paris 1762. Fol.

1367. ° *Adolph Murray,* descriptio arteriarum corporis humani, in tabulas redacta. Diss. I. resp. *Jo. Theoph. Nathhorst.* Upsal. 1780. Diss. II. resp. *Eric. Odhelius.* Ibid. 1781. Diss. III. resp. *Andr. Hesselius.* Ibid. 1782. Diss. IV. resp. *Jo. Gust. Hallmann.* Ibid. 1783. 4. Zusammen Lipsiae 1794. 8. Upsal. 1798. 4.

1368. ° Joh. Fr. Siegism. Posewitz, Physiologie der Pulsadern des menschlichen Körpers. Nebst einer vorausgeschickten Beschreibung des Herzens und einer tabellarischen Uebersicht der beiden arteriösen Systeme. Erster Theil. Leipzig 1795. 8. (Mehr ist nie erschienen.)

1369. *J. Barclay,* a description of the arteries of the human body. Edinb. 1812. 8.

1370. *Rob. Harrison,* surgical anatomy of the arteries of the human body, designed for the use of students. Dublin 1824. 8. 2 voll.

e. Abbildungen des Arteriensystems.

Wichtig sind besonders die oft citirten: Iconum anat. Fasc. v. *Alb. Haller.* Fasc. II. icon. et descriptio arteriae maxillaris internae, thyreoideae, coeliacae. Fasc. III. arter. capitis, mesenterii, thoracis, renum. Fasc. IV. arter. pelvis. Fasc. V. arter. pedis. Fasc. VI. arter. pectoris et brachii. Fasc. VII. arter. cerebri, medullae spinalis, oculi.

1371. ° *Ant. Scarpa,* sull' aneurisma riflessioni ed osservazioni anatomico-chirurgiche. Pavia 1804. Fol. — Ueber die Pulsadergeschwülste. Aus d. Ital. mit Anm. u. Zus. v. Ch. F. Harleß. Zürich 1808. 4.

1372. ° *Charl. Bell,* (engravings of the arteries of the human body. Lond.

Digitized by Google

1811. 8. fourth edit. 1824. 8.). Darstellung der Arterien, bearbeitet und mit prakt. Anmerk. begleit. v. Heinr. Robbi, mit einer Vorrede v. J. Ch. Rosenmüller (auch lat.) Leipzig 1819. 8. Mit 14 Kpft.

1373. °*Fr. Tiedemann*, tabulae arteriarum corporis humani. Carlsruhe 1822. Fol. Der erklärende Text lat. und deutsch, in 4.

1374. *G. D. Dermott*, illustrations of the arteries, connected with aneurism. and surgical operations. Lond. 1825. Fol.

1375. — *Idem*: a concise description of the locality and distribution of the arteries in the human body. London 1827. 12. w. copp. plat.

1376. °R. Froriep, chirurgische Anatomie der Ligaturstellen am menschlichen Körper. — Auch unter d. Tit. Anatomia chirurgica locorum corporis humani ligandis arteriis peridoneorum. Mit 18 Kpft. Weimar 1830. Fol.

f. Einige Schriften über die vergleichende Anatomie der Arterien.

Außer den Handbüchern über die vergleichende Anatomie und Zootomie von Cuvier, Tiedemann und Carus sind hier zu berücksichtigen:

1377. °*Rapp*, Ueber das Wundernetz, in *Meckels* Archiv, Jahrgang 1827. p. 1.

1378. °*Jo. Car. Leop. Barkow*, Ueber einige Eigenthümlichkeiten im Verlaufe der Schlagadern der Fischotter. *Meckels* Archiv, 1829. p. 30.

1379. °*Idem*: Disquisitiones circa originem et decursum arteriarum mammalium. Acc. tabb. aen. IV. Lipsiae 1829. 4. Ueber die Arterien der Vögel siehe F. Bauer. Th. I. S. 46. No. 636.

1380. °J. F. Meckel, in dem Archive für die Physiol. Jahrgang 1826. S. 19. 1829. S. 221.

1381. °*Chr. L. Nitzsch*, Observationes de avium arteria carotide communi. Halae 1829.

1382. °Hans Barkow, anatomisch-physiologische Untersuchungen, vorzüglich über das Schlagadersystem der Vögel. Siehe Meckels Archiv. Jahrg. 1829. Hft. 4. Mit Kpf.

Ueber Arterien der Amphibien, Bojanus. Siehe Thl. I. S. 46. No. 635. Rusconi, Th. I. S. 46. No. 631 — 633. Ueber die der Fische, Monro. Siehe Th. I. S. 45. No. 606.

1383. °Fr. Schlemm, anatomische Beschreibung des Blutgefäßsystems der Schlangen. In Treviran. Zeitschr. f. die Phys. 2 Bd. 1 Hft. S. 101.

1384. Fr. Tiedemann, Anatomie des Fischherzens. Landshut 1809. 4.

1385. °*Rathke*, über die Herzkammer der Fische, in *Meckels* Archiv für d. Physiol. 1826. 152.

1386. *Cuvier et Valenciennes*, histoire naturelle des poissons. Tom. I. à Paris 1828. 8. (Tafeln in Fol.)

5. Ueber die Venen.

1387. °*Hieron. Fabricii ab Aquapendente*, de venarum ostiolis. Patavii 1603. Fol. et in ej. opp. omn. (Das erste Werk über die Klappen der Venen, die jedoch schon über ein halbes Jahrhundert früher *Cananus* aufgefunden hatte. Siehe *Rudolphi*, Grundriss d. Physiol. B. II. Abth. 2. S. 284.)

1388. °*Henr. Meibom*, resp. *Joh. Gabr. Schmiedt*, Diss. de valvulis seu membranulis vasorum, eorumque structura et usu. Helmst. 1682. 4. Recus. in Halleri coll. Diss. anat. Vol. II. p. 49.

1389. °*Theodul. Kemper*, resp. *Jo. Ern. Richelmann*, Diss. de valvularum in corporibus hominis et brutorum natura, fabrica et usu mechanico. Jenae 1683. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. II. p. 79.

1390. *Petr. Gerike*, de valvulis venarum et earum usu. Helmstad. 1723. 4.

1391. °*Jo. Ern. Hebenstreit*, Progr. de venis communicantibus. Lipsiae 1744. 4. In *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 41.

1392. °*Jo. Godofr. Janke*, de ratione, venas corporis humani angustiores, inprimis cutaneas ostendendi. Lipsiae 1762. 4. Recus. in *Sandiforti* Thesaur. Diss. Vol. II. p. 235.

1393. *J. C. Pohl*, Progr. de venis. Lipsiae 1773. 4.

1394. °*H. Marx*, diatribe anat. phys. de structura et vita venarum. Carlsruh 1819. 8. c. fig. color.

Digitized by Google

1395. ° *E. F. Gurlt*, Diss. de venarum deformitatibus. Vratislaviae 1819. 4.

1396. ° *Car. Frid. Weigel*, praeside *E. H. Weber*, Diss. de strato musculoso tunicae venarum mediae in quibusdam mammalibus majoribus indagato. c. tab. aen. Lipsiae 1823. 4.

1397. ° *M. J. Weber*, über Varietäten der Venen, in *Meckels* Archiv. Jahrg. 1829, S. 1.

Abbildungen und systematische Beschreibungen des Venensystems.

1398. ° Aug. Carl. Bock, Darstellung der Venen des menschlichen Körpers nach ihrer Structur, Vertheilung und Verlauf. Zum Unterricht für Aerzte, Wundärzte und zum Studium für angehende Anatomen. Mit 20 Kpft. Leipzig 1823. 8.

1399. ° *M. G. Breschet*, Recherches anatomiques, physiologiques et pathologiques sur le système veineux, et spécialement sur les canaux veineux des os. Paris. Mit vielen Steindrucktafeln; ohne Jahrzahl. Ist noch nicht vollendet.

Vergleichende Anatomie der Venen.

Außer den oben bei den Arterien angeführten Werken von Monro, Cuvier, Tiedemann, Rusconi, Bojanus, sind hier zu erwähnen: Bojanus, Abhandlung über die Pfortader der Schildkröten, in der Isis, Jahrg. 1818. S. 1428. und Rathke, über die Leber und das Pfortadersystem der Fische, in Meckels Archiv f. d. Physiol. 1826. S. 126.

III. Schriften über die Abtheilung des Gefäßsystems, in welcher der Kreislauf nicht geschieht, oder über die Lymphgefäße.

1. Schriften über das Lymphgefäßsystem, oder über ganze Abtheilungen desselben.

1400 ° *Casp. Asellii* de lactibus seu lacteis venis, quarto vasorum mesaraicorum genere, novo invento, dissertatio, qua sententiae anatomicae multae vel perperam receptae convelluntur, vel parum perceptae illustrantur. Mediolan. 1627. 4. (Basil. 1628. 4. Lgd. Bat. 1640. 4.) Recus. in coll. oper. *Spigelii* ed. *van der Linden*. Amstel. 1645. Fol. et in *Mangeti* theatro anat.

1401. ° *Caecilii Folii*, sanguinis e dextro in sinistrum cordis ventriculum defluentis facile reperta via, cui non vulgaris in lacteas nuper patefactas venas animadversio proponitur. Venet. 1639. 4. Frcf. 1641. 12. Lgd. Bat. 1723. 8.

1402. ° *Jo. Pecqueti* experimenta nova anatomica, quibus incognitum hactenus chyli receptaculum, et ab eo per thoracem in ramos usque subclavios vasa lactea deteguntur; Diss. anat. de circulatione sanguinis et chyli motu. Huic secundae editioni quae emendata est, illustrata, aucta, accessit de thoracicis lacteis Diss., in qua *Jo. Riolani* responsio ad eadem experimenta nova anatomica refutatur, et inventis recentibus canalis Virsungici demonstratur usus; et lacteum ad mammas a receptaculo iter indigitatur. (Paris 1651. 4. Harderovici 1651. 12. Amstel. 1661. 12.) Paris 1654. 4. et in *Mangeti* Bibl. anat.

1403. ° *Joann. Mart. Brendel* (*Maur. Hoffmann*), Theses medicae de venis lacteis oculatioris aevi anatomicis decantatis. Altorf. 1650. 4.

1404. *Thom. Bartholini*, de lacteis thoracicis in homine brutisque nuperrime observatis historia anatomica. Hafniae 1652. 4. Londin. 1652. 8. Paris. 1653. 8. Lgd. Bat. 1654. 12. Genevae 1654. 8. Ultraj. 1654. 12. Amstelod. 1661. 8. Recus. in ejusd. opusc. nov. anatom. de lacteis thoracicis et lymphaticis vasis. Hafniae et Francof. 1670. 8. p. 1. in *Siboldi Hemsterhuys* messis aurea. Heidelberg. 1659. 8. in *Munieri* sylloge. Genuae 1654. 8. et in Bibl. anat. *Mangeti*. Vol. II. p. 657.

1405. — *Ejusd.* vasa lymphatica nuper Hafniae in animantibus inventa et hepatis exsequiae. Hafniae 1653. 4. Paris. 1653. 8. In ej. opusc. nov. anat. de lacteis thoracicis etc. p. 73. in *Hemsterhuys* messis aurea, in *Munieri* sylloge et in *Mangeti* Bibl. anat. Vol. II. p. 692.

1406. — *Ejusd.* dubia anatomica de lacteis thoracicis et an hepatis funus

Digitized by Google

immutet medendi methodum. Hafniae 1653. 4. Paris 1653. 8. In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thorac. etc. p. 113. in *Hemsterhuys* messis aurea et in *Mangeti* Bibl. anat. Vol. II. p. 673.

1407. — *Ejusd.* vasa lymphatica in homine nuper inventa. Hafniae 1654. 4. In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thoracicis etc. p. 149.

1408. — *Ejusd.* defensio vasorum lacteorum et lymphaticorum adversus *Jo. Riolanum*, celeberrimum Lutetiae anatomicum. Hafniae 1655. 4. In ej. opusc. nov. an. de lacteis thorac. p. 185.

1409. — *Ejusd.* examen lacteorum contra *Riolanum* et *Harveium*. Hafniae 1655. 4. Frcf. 1656. 4.

1410. — *Ejusd.* Spicilegium primum ex vasis lymphaticis, ubi cl. V. *Glissonii* et *Pecqueti* sententiae expenduntur. Hafniae 1655. 4. Ibid. 1657 (1658) 4. Rostoch. 1660. 4. Amstel. 1661. 12. in opusc. nov. anat. de lacteis thorac. p. 413.

1411. — *Ejusd.* spicilegium secundum ex vasis lymphaticis, ubi clar. vir. *Backii, Cattierii, Le Noble, Tardii, Whartoni, Charletoni, Bilsii* etc. sententiae examinantur. Hafn. 1660. 4. Amstel. 1661. 12. In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thorac. p. 463.

1412. — *Ejusd.* responsio de experimentis anatomicis Bilsianis et difficili hepatis resurrectione ad *Nicol. Zas.* Hafniae 1661. 8. Belgice vertente *Gerardo Blaes.* Amstelod. 1661. 12. In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thorac. p. 519.

1413. — *Ejusd.* (sub nomine *Nicolai Stephani*) castigatio epistolae maledicae *Bilsii*, ubi Bilsianae artes deteguntur, et professoris dignitas vindicatur. Hafniae 1661. 8. Amstel. 1661. 12. in *Th. Bartholini* orationibus. Hafniae 1668. 8.

1414. — *Ejusd.* Diss. anatomica de hepate defuncto, novis Bilsianorum observationibus opposita. Hafniae 1661. 8. In ej. opusc. nov. anat. de lacteis thor. p. 549.

1415. — *Ejusd.* de hepatis exatorati desperata causa, cum praecipuis eruditae Europae medicis concertatio. Hafniae 1666. 8. In ej. opusc. anat. de lacteis thor. p. 615.

1416. — *Ejusd.* opuscula nova anatomica de lacteis thoracicis et lymphaticis vasis, uno volumine comprehensa, ab auctore aucta et recognita. Hafn. et Frcf. 1670. 8. (eine von Bartholin selbſt veranſtaltete Sammlung aller bisher genannten Schriften deſſelben).

1417. ⚬ *Thom. Bartholin*, insidiae structae *Olai Rudbeckii* ductibus hepaticis aquosis, et vasis glandularum serosis Arosiae editis. Lgd. Bat. 1654. 8.

1418. *Olai Rudbeck*, nova exercitatio anatomica, exhibens ductus hepatis aquosos et vasa glandularum serosa. Arosae 1653. 4. recus. in *Hemsterhuys* messis aurea.

1419. — *Ejusd.* insidiae structae aquosis ductibus *Olai Rudbeck a Thoma Bartholino*. Lgd. Bat. 1654. 8.

1420. — *Ejusd.* epistola ad *Thom. Bartholinum* de vasis serosis. Upsal. 1657. 12.

1421. ⚬ *Ejusd.* de sero ejusque vasis. c. fig. Upsal. 1661. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. VII. P. I. p. 235.

1422. *Jo. Riolani*, opuscula nova anatomica. 1) Indicium novum de venis lacteis, tam mesentericis, quam thoracicis, adversus *Thom. Bartholinum*; 2) Lymphatica vasa *Bartholini* refutata; 3) Animadversiones secundae ad anatomiam reformatam *Bartholini*; 4) Ejusdem dubia anatomica de lacteis thoracicis resoluta; 5) Hepatis funerati et resuscitati vindiciae. Paris 1653. 8.

1423. *Martin Bogdan*, insidiae structae *Bartholini* vasis lymphaticis ab *Olao Rudbeckio* Sueco in suis ductibus hepaticis, et detectae. Hafn. et Frcf. 1654. 4.

1424. — *Ejusd.* apologia pro vasis lymphaticis *Thomae Bartholini* contra insidias secundo scriptas ab *Olao Rudbeckio*. Hafniae 1654. 12.

1425. ⚬ *Sibold. Hemsterhuys*, messis aurea exhibens anatomica novissima et utilissima experimenta. Lgd. Bat. 1654. 12. Huic editioni access. de vasis lymphaticis tabulae *Rudbeckianae*, fig. aen. illustratae. Heidelberg 1659. 8.

1426. *Jo. Alcid. Munier*, de venis tam lacteis thoracicis, quam lymphaticis novissime repertis sylloge anatomica. Genuae 1654. 8.

Digitized by Google

1395. ° *E. F. Gurlt*, Diss. de venarum deformitatibus. Vratislaviae 1819. 4.
1396. ° *Car. Frid. Weigel*, praeside *E. H. Weber*, Diss. de strato musculoso tunicae venarum mediae in quibusdam mammalibus majoribus indagato. c. tab. aen. Lipsiae 1823. 4.
1397. ° *M. J. Weber*, über Varietäten der Venen, in *Meckels* Archiv. Jahrg. 1829, S. 1.

Abbildungen und systematische Beschreibungen des Venensystems.

1398. ° Aug. Carl. Bock, Darstellung der Venen des menschlichen Körpers nach ihrer Structur, Vertheilung und Verlauf. Zum Unterricht für Aerzte, Wundärzte und zum Studium für angehende Anatomen. Mit 20 Kpft. Leipzig 1823. 8.
1399. ° *M. G. Breschet*, Recherches anatomiques, physiologiques et pathologiques sur le système veineux, et spécialement sur les canaux veineux des os. Paris. Mit vielen Steindrucktafeln; ohne Jahrzahl. Ist noch nicht vollendet.

Vergleichende Anatomie der Venen.

Außer den oben bei den Arterien angeführten Werken von Monro, Cuvier, Tiedemann, Rusconi, Bojanus, sind hier zu erwähnen: Bojanus, Abhandlung über die Pfortader der Schildkröten, in der Isis, Jahrg. 1818. S. 1428. und Rathke, über die Leber und das Pfortadersystem der Fische, in Meckels Archiv f. d. Physiol. 1826. S. 126.

III. Schriften über die Abtheilung des Gefäßsystems, in welcher der Kreislauf nicht geschieht, oder über die Lymphgefäße.

1. Schriften über das Lymphgefäßsystem, oder über ganze Abtheilungen desselben.

1400 ° *Casp. Asellii* de lactibus seu lacteis venis, quarto vasorum mesaraicorum genere, novo invento, dissertatio, qua sententiae anatomicae multae vel perperam receptae convelluntur, vel parum perceptae illustrantur. Mediolan. 1627. 4. (Basil. 1628. 4. Lgd. Bat. 1640. 4.) Recus. in coll. oper. *Spigelii* ed. *van der Linden*. Amstel. 1645. Fol. et in *Mangeti* theatro anat.
1401. ° *Caecilii Folii*, sanguinis e dextro in sinistrum cordis ventriculum defluentis facile reperta via, cui non vulgaris in lacteas nuper patefactas venas animadversio proponitur. Venet. 1639. 4. Frcf. 1641. 12. Lgd. Bat. 1723. 8.
1402. ° *Jo. Pecqueti* experimenta nova anatomica, quibus incognitum hactenus chyli receptaculum, et ab eo per thoracem in ramos usque subclavios vasa lactea deteguntur; Diss. anat. de circulatione sanguinis et chyli motu. Huic secundae editioni quae emendata est, illustrata, aucta, accessit de thoracicis lacteis Diss., in qua *Jo. Riolani* responsio ad eadem experimenta nova anatomica refutatur, et inventis recentibus canalis Virsungici demonstratur usus; et lacteum ad mammas a receptaculo iter indigitatur. (Paris 1651. 4. Harderovici 1651. 12. Amstel. 1661. 12.) Paris 1654. 4. et in *Mangeti* Bibl. anat.
1403. ° *Joann. Mart. Brendel* (*Maur. Hoffmann*), Theses medicae de venis lacteis oculatioris aevi anatomicis decantatis. Altorf. 1650. 4.
1404. *Thom. Bartholini*, de lacteis thoracicis in homine brutisque nuperrime observatis historia anatomica. Hafniae 1652. 4. Londin. 1652. 8. Paris. 1653. 8. Lgd. Bat. 1654. 12. Genevae 1654. 8. Ultraj. 1654. 12. Amstelod. 1661. 8. Recus. in ejusd. opusc. nov. anatom. de lacteis thoracicis et lymphaticis vasis. Hafniae et Francof. 1670. 8. p. 1. in *Siboldi Hemsterhuys* messis aurea. Heidelberg. 1659. 8. in *Munieri* sylloge. Genuae 1654. 8. et in Bibl. anat. *Mangeti*. Vol. II. p. 657.
1405. — *Ejusd.* vasa lymphatica nuper Hafniae in animantibus inventa et hepatis exsequiae. Hafniae 1653. 4. Paris. 1653. 8. In ej. opusc. nov. anat. de lacteis thoracicis etc. p. 73. in *Hemsterhuys* messis aurea, in *Munieri* sylloge et in *Mangeti* Bibl. anat. Vol. II. p. 692.
1406. — *Ejusd.* dubia anatomica de lacteis thoracicis et an hepatis functus

Digitized by Google

immutet medendi methodum. Hafniae 1653. 4. Paris 1653. 8. In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thorac. etc. p. 113. in *Hemsterhuys* messis aurea et in *Mangeti* Bibl. anat. Vol. II. p. 673.

1407. — *Ejusd.* vasa lymphatica in homine nuper inventa. Hafniae 1654. 4. In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thoracicis etc. p. 149.

1408. — *Ejusd.* defensio vasorum lacteorum et lymphaticorum adversus *Jo. Riolanum*, celeberrimum Lutetiae anatomicum. Hafniae 1655. 4. In ej. opusc. nov. an. de lacteis thorac. p. 185.

1409. — *Ejusd.* examen lacteorum contra *Riolanum* et *Harveium*. Hafniae 1655. 4. Frcf. 1656. 4.

1410. — *Ejusd.* Spicilegium primum ex vasis lymphaticis, ubi cl. V. *Glissonii* et *Pecqueti* sententiae expenduntur. Hafniae 1655. 4. Ibid. 1657 (1658) 4. Rostoch. 1660. 4. Amstel. 1661. 12. in opusc. nov. anat. de lacteis thorac. p. 413.

1411. — *Ejusd.* spicilegium secundum ex vasis lymphaticis, ubi clar. vir. *Backii, Cattierii, Le Noble, Tardii, Whartoni, Charletoni, Bilsii* etc. sententiae examinantur. Hafn. 1660. 4. Amstel. 1661. 12. In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thorac. p. 463.

1412. — *Ejusd.* responsio de experimentis anatomicis Bilsianis et difficili hepatis resurrectione ad *Nicol. Zas*. Hafniae 1661. 8. Belgice vertente *Gerardo Blaes*. Amstelod. 1661. 12. In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thorac. p. 519.

1413. — *Ejusd.* (sub nomine *Nicolai Stephani*) castigatio epistolae maledicae *Bilsii*, ubi Bilsianae artes deteguntur, et professoris dignitas vindicatur. Hafniae 1661. 8. Amstel. 1661. 12. in *Th. Bartholini* orationibus. Hafniae 1668. 8.

1414. — *Ejusd.* Diss. anatomica de hepate defuncto, novis Bilsianorum observationibus opposita. Hafniae 1661. 8. In ej. opusc. nov. anat. de lacteis thor. p. 549.

1415. — *Ejusd.* de hepatis exatorati desperata causa, cum praecipuis eruditae Europae medicis concertatio. Hafniae 1666. 8. In ej. opusc. anat. de lacteis thor. p. 615.

1416. — *Ejusd.* opuscula nova anatomica de lacteis thoracicis et lymphaticis vasis, uno volumine comprehensa, ab auctore aucta et recognita. Hafn. et Frcf. 1670. 8. (eine von Bartholin selbst veranstaltete Sammlung aller bisher genannten Schriften desselben).

1417. ✪ *Thom. Bartholin*, insidiae structae *Olai Rudbeckii* ductibus hepaticis aquosis, et vasis glandularum serosis Arosiae editis. Lgd. Bat. 1654. 8.

1418. *Olai Rudbeck*, nova exercitatio anatomica, exhibens ductus hepatis aquosos et vasa glandularum serosa. Arosae 1653. 4. recus. in *Hemsterhuys* messis aurea.

1419. — *Ejusd.* insidiae structae aquosis ductibus *Olai Rudbeck a Thoma Bartholino*. Lgd. Bat. 1654. 8.

1420. — *Ejusd.* epistola ad *Thom. Bartholinum* de vasis serosis. Upsal. 1657. 12.

1421. ✪ *Ejusd.* de sero ejusque vasis. c. fig. Upsal. 1661. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. VII. P. I. p. 235.

1422. *Jo. Riolani*, opuscula nova anatomica. 1) Indicium novum de venis lacteis, tam mesentericis, quam thoracicis, adversus *Thom. Bartholinum*; 2) Lymphatica vasa *Bartholini* refutata; 3) Animadversiones secundae ad anatomiam reformatam *Bartholini*; 4) Ejusdem dubia anatomica de lacteis thoracicis resoluta; 5) Hepatis funerati et resuscitati vindiciae. Paris 1653. 8.

1423. *Martin Bogdan*, insidiae structae *Bartholini* vasis lymphaticis ab *Olao Rudbeckio* Sueco in suis ductibus hepaticis, et detectae. Hafn. et Frcf. 1654. 4.

1424. — *Ejusd.* apologia pro vasis lymphaticis *Thomae Bartholini* contra insidias secundo scriptas ab *Olao Rudbeckio*. Hafniae 1654. 12.

1425. ✪ *Sibold. Hemsterhuys*, messis aurea exhibens anatomica novissima et utilissima experimenta. Lgd. Bat. 1654. 12. Huic editioni access. de vasis lymphaticis tabulae *Rudbeckianae*, fig. aen. illustratae. Heidelberg 1659. 8.

1426. *Jo. Alcid. Munier*, de venis tam lacteis thoracicis, quam lymphaticis novissime repertis sylloge anatomica. Genuae 1654. 8.

Digitized by Google

1427. *Franc. Glisson*, anatomia hepatis. Ad calcem operis subjiciuntur nonnulla de lymphae ductibus nuper repertis. London 1654. 8. Amstel. 1665. 12. Hag. 1681. 12.

1428. *Carol. le Noble*, observationes rarae et novae de vasis lacteis mesentericis et thoracicis. Paris 1655. 8. Rothomag. 1655. 8.

1429. *Guil. de Henault*, clypeus, quo tela in *Pecqueti* cor a *C. le Noble* conjecta infringuntur et eluduntur. Rothomag. 1655. 12.

1430. ° *Adrien Auzout* (*Auzotius*), Epistola ad Pecquetum de vasis lacteis et receptaculo chyli. Paris. 1657. 4.

1431. ° *Georg. Segeri*, Diss. anat. de quidditate et materia lymphae Bartholinianae, cui accessere epistolae doctorum virorum de eadem lympha. Hafn. 1658. 4.

1432. ° *Ludov. de Bils*, (waaragtig gebruyk der tot noch too gemeende gylhuys beneffens de verryzenis der lever. Rotterd. 1658. 4.)

1433. Epistolica Dissertatio qua verus hepatis circa chylum, et pariter ductus chyliferi hactenus dicti usus docetur. Roterodami 1659. 4. Ibid. 1661. 4.

1434. — *Ejusd.* Kort berigt van de waarschouwinge van *Jo. van Hoorne* en op de aanmerkingen van *P. Barbette*. Rotterd. 1660. 4.

1435. — *Ejusd.* responsio ad epistolam *Tob. Andreae*, qua ostenditur verus usus vasorum hactenus pro lymphaticis habitorum et historia memorabilis, quae auctori occasione balsamationis potissimum Lovanii evenerunt. Roterod. 1659. 4.

1436. — *Idem*, responsio ad admonitiones *Jo. ab Horne* et ad animadversiones *Pauli Barbette* in anatomica Bilsiana, interprete *G. Buenio*. Roterod. 1661. 4. (Alle zusammen in ej. specimina anatomica. Interprete *G. Buenio*. Roterod. 1661. 4.)

1437. ° *Louys de Bills*, letter, touching the true use of the lymphatick vessels. Philos. transact. 1668. p. 791.

1438. *Paul. Barbette*, aanmerkingen op d'anatomische schriften van *Lud. de Bils*. Amstel. 1660. 8.

1439. ° *Anton Deusing*, de nutrimenti in corpore elaboratione, ubi de chylificatione et chyli motu, sanguinificatione, depuratione alimenti, itemque spiritibus, quibus adjecta appendix de chyli motu et de admiranda anatome *Bilsii*. Groning. 1660. 12. Roterod. 1661. 4.

1440. — ° *Ejusd.* resurrectio hepatis adserta contra Socium larvatum Vincent. *Slegelium*, sub personati *Blottesandaei* cohorte furiosa signiferum. Accedit disquisitio ulterior de chyli motu atq. officio hepatis ad *Thom. Bartholin*. Groning. 1662. 12.

1441. ° *Ejusd.* examen anatomes anatomiae Bilsianae, s. epistola de chyli motu. Groning. 1665. 12.

1442. ° *Gunth. Chrstph. Schelhammer*, de lymphae ortu et lymphaticorum vasorum causis. Helmstad. 1683. 4. In *Mangeti* Bibl. anat. Vol. II p. 717.

1443. ° *Jo. Zeller*, resp. *Joh. Sam. Kniselio*, Diss. de vasorum lymphaticorum administratione observatis et observandis in hac illorum phoenomeni n, et p. n. eorumque causis. Tubingae 1687. 4. In *Halleri* coll. Diss. anat Vol. I. p. 809.

1444. ° *Martin Lister*, letter concerning powder'd blues passing the lacteal veins. Philos. transact. 1701. p. 819.

1445. ° *William Musgrave*, letter, concerning some experiments made for transmitting a blue coloured liquor into the lacteals. Philos. trans. 1701 p. 996.

1446. ° *Richard Hale*, an account of the external maxillar and other salivary glands; also of the insertions of all the lymphaticks (as well above as below the subclavians) into the veins; which glands and insertions have not hitherto been mention'd, or not truly described by any authors. Phil. trans. 1720. p. 5.

1447. *Abrah. Vater*, vasa lactea in cadavere feminae visa. Wittebergae 1722. 4.

1448. ° *Jo. Chrstph. Bohlii* Diss. epistolica ad *Fred. Ruyschium* de usu novarum cavae propaginum in systemate chylopoëo, ut et de corticis cerebri textura. Amstel. 1727. 4. *Ruyschii* responsio. Cum fig. aen. Amstel. 1727.

Digitized by Google

1449. *Joh. Grg. Duvernoy*, descriptio vasorum chyliferorum. Commentar. acad. Petropolitanae. Vol. I. 1728. p. 262.

1450. De vasis lacteis in homine inventis. Commentarii Bononienses. Vol. I. C. p. 123.

1451. *Sam. Theod. Quellmalz*, resp. *Car. Frid. Schwertner*, Diss. de venis absorbentibus. Lipsiae 1732. 4.

1452. *Jo. Gothofr. Brendelius*, Pr. de chyli ad sanguinem publico privatoque potissimum commeatu per venas mesaraicas non improbabili. Gotting. 1738. 4.

1453. *Grg. Chr. Hahn*, de transitu chyli ex ventriculo ad sanguinem. Lipsiae 1740. 4.

1454. *Antoine Ferrein*, observation sur les vaisseaux lymphatiques. Mém. de Paris 1738. hist. p. 46. Ed. in 8. p. 64. — Observation sur les nouvelles artères et veines lymphatiques. Ibid. 1741. 4. hist. p. 47. mém. p. 371. éd. in 8. hist. p. 64. mém. p. 495.

1455. *Joh. Chrstph. Pohl*, resp. *Jo. Chr. Laubmeyer*, viae lacteae corporis humani per extispicia animalium olim detectae historia naturalis, cum notis criticis necessariisque commentariis in placita *Ruyschiana* et *Boerhaeana*. Regiom. 1741. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. I. p. 605.

1456. *Herm. Pauli Juchii*, resp. *Chr. Ern. Lossius*, Diss. de viis et motu chyli. Erford. 1744. 4.

1457. *Car. Frid. Kaltschmied*, resp. *Leber. Chr. Dan. Mittelhäuser*, Diss. sist. viam chyli ab intestinis ad sanguinem. Jenae 1752. 4.

1458. *Mark Akenside*, observations on the origin and use of the lymphatic vessels, being an extract from Gulstonian lectures, read in the theatre of the coll. of physic. of London in June 1755. In Philosoph. transact. Vol. 50. P. 1757. p. 322.

1459. *Joh. Jac. van Es*, Diss. de vasis chyliferis. Lgd. Bat. 1762. 4.

1460. *Jo. Sographi* libellus, in quo theoria lymphaeductuum *Monroi* et *Hunteri* exponitur et ad praxin chirurgicam adaptatur. Patavii 1766. 8.

1461. *Car. a Linné*, resp. *Car. Petr. Thunberg*, Diss. de venis resorbentibus. Upsaliae 1767. 4.

1462. *Alex. Monro*, de venis lymphaticis valvulosis et de earum imprimis origine. Berol. 1757. 8. Edit. 2. Edinburgi 1770. 8.

1463. — Observations anatomical and physiological, wherein *D. Hunters* claim to some discoveries is examined. Edinburgh 1758. 8.

1464. Opuscula anatomica de vasis lymphaticis. I. de venis lymphaticis valvulosis et de earum imprimis origine, auctore *Alex. Monro*. — II. Diss. epist. de vasis lymphaticis glandulisque conglobatis ad *Alb. de Haller a Jo. Fr. Meckel*. Praemittitur brevis de novo horum vasorum invento historia. Lipsiae 1760. 8. (Jo. Fr. Meckels 2te Schrift über die Lymphgefäße. Siehe unten No. 1499.)

1465. *William Hewson*, account of the use of the spleen, thymus, lymphatic glands and lymphatic vessels. In med. and philos. comment. by a Soc. in Edinburgh. Vol. I. p. 99.

1466. *Will. Hewson*, experimental inquiries into the properties of the blood. Lond. 1771. 8. (Deutsch: Nürnberg 1780. 8.) Part. II. containing a description of the lymphatic system. Lond. 1774. 8. (Lat. vert. *van de Wynperssе*. Ultraj. 1783. 8. Part. III. posthum. ed. *Falconer*. London 1777. 8.)

1467. *Paul Chr. Fr. Werner* et *Chr. Gttl. Feller*, vasorum lacteorum atque lymphaticorum anatomico-physiologica descriptio. Fascic. I. Lipsiae 1784. 4. c. tabb. aen. IV.

1468. *Jo. Sheldon*, the history of the absorbent system. Part I. containing the chylography or description of the human lacteal vessels. London 1784. fol. min.

1469. *Lambertus Lucas van Meurs*, collectanea medica inauguralia sive systematis vasorum absorbentium succincta descriptio. Hardervici 1786. 4.

1470. *Pietro Assalini*, (saggio medico sui vasi linfatici. Torin. 1787. 8.) — essai médical sur les vaisseaux lymphatiques. Avec les moyens de prévenir les effets des substances vénimeuses comme la salive du chien enragé, le venin de la vipère, le virus vénérien etc. Turin, 1787. 8. übersetzt in der Samml. auserles. Abhdl. für pr. Aerzte. Bd. 15. S. 93. und Dresden 1793. 8.

Digitized by Google

1471. *Blizard*, physiological observations on the absorbent system of the vessels. London 1787. 8.

1472. ° *Gttl. Emanuel Lindner*, specim. inaug. de lymphaticorum systemate. Halae 1787. 8.

1473. ° *Floriano Caldani*, riflessioni sopra alcuni punti di un nuovo sistema de' vasi assorbenti ed esperienze sulla elettricità animale. In Padova 1792. 8.

1474. ° *Car. Guil. de Mueller*, Praesid. *Ern. Platner*, Physiologia systematis vasorum absorbentium. Lipsiae 1793. 4.

1475. ° *Eduard Holme*, Diss. de structura et usu vasorum absorbentium. Lgd. Bat. 1793. 8.

1476. ° *Jo. Conr. Frey*, Diss. de illustrationibus, quas cognitio absorptionis in corpore humano, atque inventio systematis vasorum absorbentium universae medicinae atque chirurgiae praebent. Erford. 1795. 4.

1477. ° Gisb. Jac. Wolff, (Geneeskundige verhandeling over het nut der watervaten. Harlem 1794. 8.) Arzneikundige Abhandlung über den Nutzen der Wasser- oder Lymphgefäße, nebst einem Brief von S. Th. Sömmerring. Aus dem Holl. übersetzt v. L. L. Finke. Lingen 1795. 8.

1478. ° Bernh. Nath. Gttl. Schreger, theoretische und praktische Beiträge zur Kultur der Saugaderlehre. Erster Bd. Leipzig 1793. 8. Mit 2 Kpft.

1479. ° *William Cruikshank*, the anatomy of the absorbing vessels of the human body. London 1786. gr. 4. ed. nova 1791. 4. Ejusd. versio gallica auct. *Phil. Petit-Radel.* Paris 1787. 8.

1480. ° William Cr., Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße oder Saugadern des menschlichen Körpers. Aus d. Engl. Mit einigen Anmerk. und Kpft. vermehrt, herausgegeben von Chr. Fr. Ludwig. Leipzig 1789. 4.

1481. ° William Cruikshank's und anderer neuere Beiträge zur Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße oder Saugadern des menschlichen Körpers. Mit Kpf. Mit einigen Anmerk. und einer Uebersicht der Literatur der Saugaderlehre vermehrt, herausgegeben von Chr. Fr. Ludwig. Leipzig 1794. 4.

1482. *René Nicol. Dufriche Desgenettes*, analyse du système absorbant ou lymphatique. Montpellier 1791. 8.

1483. ° *Gregor. Basilevitsch*, systematis resorbentis physiologico-medici descriptio. Argentorati 1792. 4.

1484. ° *Paul. Mascagni*, Prodromo d'un' opera sul sistemo de vasi linfatici. Siena 1784. 4. Prodrome d'un ouvrage sur le système des vaisseaux lymphatiques, contenant 24 planches in Folio. à Sienne 1784. 4.

1485. ° *Ejusd.* vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia. Senis 1787. Fol. max.

1486. ° Paul Mascagni's Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße oder Saugadern des menschlichen Körpers. Aus d. Lat. mit Kpfrn. Mit einigen Anmerk. und Zusätzen vermehrt, herausg. von Chr. Fr. Ludwig. Leipzig 1789. 4.

1487. ° Vasorum lymphaticorum historia seu totius operis pars I. a *Paul. Mascagni* denuo edita. Adjectis ex parte secunda seu ichnographia annotationibus, praeparationum catalogis et tribus tabulis. Accedit diatribe de vasorum sanguineorum finibus et structura, qua auctoris sententia novis experimentis asseritur et a nonnullorum difficultatibus vindicatur. Tom. I. Sen. 1795. 8.

1488. ° Paul Mascagni's neue Theorie der Absonderungen durch unorganische Poren, und dessen Geschichte der Lymphgefäße. Aufs neue herausgegeben und mit einem zweiten Theile, worin das Daseyn der Gefäße der zweiten Art behauptet, und die Absonderung durch unorganische Poren widerlegt wird, vermehrt von Peter Lupi. Aus d. Lat. übers. 2 Thle. Leipzig 1799. 8.

1489. ° Fragmens de la traduction de l'ouvrage de *Mascagni* sur les vaisseaux lymphatiques, par *P. F. Bretonneau* et *Saclier*. In Mém. de la soc. méd. d'émulat. Vol. I. 1798. p. 311 — 381.

1490. ° *Henr. Car. Becker*, doctrinae de vasis chyliferis et lymphaticis primordia. Halae 1797. 8.

Digitized by Google

1491. *Giuseppe Jacopi*, esame della dottrina di *Darwin* sul moto retrogrado dei liquidi nei vasi linfatici. Pavia 1804. 8.

1492. Heinr. Ludw. Attenhoffer Lymphatologia, oder Abhandlung über das lymphatische System und dessen Leiden. Wien 1808. 8.

1493. *C. A. Delavenay*, quelques idées sur les vaisseaux lymphatiques et les hydropisies en général. Présentées et soutenues à l'école de médecine de Montpellier, le 10. Août 1808. à Montpellier 1808. 8.

1494. *Ern. Alex. Lauth*, essai sur les vaisseaux lymphatiques. Diss. Strasbourg 1824. 4.

1495. Aug. Erl. Bock, Darstellung der Saugadern des menschlichen Körpers nach ihrer Structur, Vertheilung und Verlauf u. s. w. Mit 15 Kpft. 4. Leipzig 1828. 8.

2. Einige besondere Schriften über einzelne, die Lymphgefäße betreffende Gegenstände.

a. Ueber die Muskelfasern und die Klappen der Lymphgefäße.

1496. *Bernh. Gtll. Schreger*, de irritabilitate vasorum lymphaticorum. Lipsiae 1789. 8.

1497. *Frid. Ruysch*, dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis et lacteis. (Hagae 1665. 12). c. fig. aen. access. quaedam observationes rariores. Lgd. Bat. 1687. 12. in *Mangeti* Bibl. anat. Vol. II. p. 712. sq. et in *Ruyschii* operibus.

1498. *Jo. Jac. Doebel*, valvularum vasorum lacteorum, lymphaticorum et sanguiferorum dilucidatio. Rostochii 1694. 4.

b. Ueber die Communication der Lymphgefäße mit den Venen.

1499. *Jo. Frid. Meckel*, nova experimenta et observationes de finibus venarum ac vasorum lymphaticorum in ductus visceraque excretoria corporis humani, ejusdemque structurae utilitate. Berolini 1772. 8. (Für die Communication der Lymphgefäße und Venen in den Lymphdrüsen).

1500. *Nic. Oudeman*, de venarum praecipue meseraicarum fabrica et actione (ohne Namen des Orts). 1794. 8. (gegen das Einsaugungsvermögen der Venen und gegen die Communication der Venen mit den Lymphgefäßen an andern, als an den bekannten Stellen hinter dem Schlüsselbeine).

1501. Brolyk's Abhandlung (Ueber die Communication der Lymphgefäße mit den Venen an andern als an den gewöhnlichen Stellen) im Journal für die neue holländische Literatur, St. 1. Siehe auch allgemeine med. Annalen, 1803.

1502. *Vincenz Fohmann*, anatomische Untersuchungen über die Verbindung der Saugadern mit den Venen. Mit einer Vorrede v. Fr. Tiedemann. Heidelberg 1821. 8. (Für die Communication der kleinen Venen und Lymphgefäße in den Lymphdrüsen.)

1503. *Regolo Lippi*, illustrazioni fisiologiche e patologiche del sistema linfatico-chilifero, mediante la scoperta di un gran numero di communicazioni di esso col venoso. Firenze 1825. 4. Mit 9 Kpft. in queer Folio. (Für die Communication der Lymphgefäße mit den großen Venen im Unterleibe und an andern Stellen.)

1504. *Giovanni Rossi* hat einen Aufsatz gegen *Lippi* in Annali universali bekannt gemacht. Siehe *Froriep*, Notizen. Mai 1826. p. 17.

1505. *Antommarchi*, Mém. sur la non-communication des veines avec les vaisseaux lymphatiques des glandes conglobées, in Férussac Bullet. des sc. méd. Tome XVIII. 1829. p. 8. et p. 161. (Gegen Lippi und Fohmann.)

1506. *Portal*, Note sur la communication des vaisseaux lymphatiques et des veines, in Férussac Bullet. des sciences med. Sept. 1829. p. 327. (Für die vielfältige Communication der Lymphgefäße und der Venen. Siehe auch daselbst eine ältere, aus den Mém. des Savans étrangers, Vol. III. p. 155. citirte Abhandlung Mertrud's, in welcher derselbe die Communication der Lymphgefäße mit den Venen zu beweisen suchte, angeführt.)

1507. *D. Dubbled*, Lettre sur la communication des veines et des vaisseaux lymphatiques, in Férussac, Bullet. des sc. méd. 1829. p. 329. (Für die Communication der Venen und Lymphgefäße in den Lymphdrüsen.)

Digitized by Google

c. Ueber die Saugaderdrüsen.

1508. *Jo. Bapt. Fels*, de glandulis conglobatis. Argentor. 1774. 4.

1509. ° *Joh. Gtl. Haase*, resp. *Car. Gtl. Krause*, Diss. de motu chyli et lymphae glandulisque conglobatis. Lipsiae 1778. 4.

1510. *Chr. Fr. Nürnberger*, de glandulis conglobatis. Viteberg. 1780. 4.

1511. ° *Anton. Pacchioni*, Diss. de glandulis conglobatis durae meningis humanae, indeque ortis lymphaticis ad piam meningem productis. Ephemer. acad. nat. cur. Cent. 1 et 2. append. p. 139.

1512. ° B. N. G. Schreger, von den Nerven der Saugaderdrüsen. In s. Beitr. z. Kult. d. Saugaderlehre, p. 248.

1513. *John Charles Ogilvie*, observations on the interior structure and oeconomy of the conglobate glands. In London medical and phys. Journal. Febr. 1827.

d. Ueber den Ductus thoracicus.

1514. ° *Jo. van Horne*, novus ductus chyliferus, nunc primum delineatus, descriptus et eruditorum examini expositus. Lgd. Bat. 1652. 4. (ibid. 1660. 4. recus. in ejusd. opusc. ed. *Pauli*. Lipsiae 1707. 8. p. 273.)

1515. ° An extract of a letter of *M. Pecquet* to *M. Carcavi*, concerning a new discovery of the communication of the ductus thoracicus with the emulgent vein. Phil. transact. Vol. II. 1667. p. 461.

1516. ° *Jean Pecquet*, lettre touchant une nouvelle découverte de la communication du canal thoracique avec la veine émulgente. Mém. de Paris. Tom. I. p. 37. Tom. X. p. 462. avec la veine cave inférieure. Ibid. p. 501.

1517. ° *Joh. Grg. Grubelius*, resp. *Jo. Hadr. Slevogt*, Diss. de ductu chylifero Pecquetiano. Jenae 1674. 4.

1518. ° *Walter Needham*, some annotations upon a discovery pretended to have been made by *Pecquet*, of a communication between the ductus thoracicus and inferior vena cava. Philos. transact. 1672. p. 5007.

1519. ° *Joh. Dan. Dorstenius*, resp. *Casp. Chr. Schetla*, galaxiae exhibitio s. Diss. anat. de ductu thoracico chylifero. Marburgi Cattorum. 1678. 4.

1520. ° *Joh. Henr. Schulze*, de ductu thoracico, nova facilique encheiresi inveniendo. Acta acad. nat. curios. Vol. I. p. 500.

1521. ° *Johannes Sigismund. Henninger*, de vasis lacteis et modus novum inveniendi ductum thoracicum in corpore humano. Ephemer. acad. nat. curiosor. Centur. 3. 4. append. p. 120.

1522. ° *Jo. Saltzmann*, resp. *Jerem. Adam Leitersperger*, Diss. exhibens encheireisin novam, qua ductus thoracicus una cum receptaculo chyli in quovis subjecto humano demonstrari potest. Argentor. 1711. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. I. p. 685.

1523. ° *Jo. Adolph Wedel*, Diss. de valvula venae subclaviae ductui thoracico imposita. Jenae 1714. 4. Recus. in *Halleri* coll. diss. anat. Vol. I. p. 80

1524. ° *Arent Cant*, Diss. de receptaculo et ductu chyli. Lgd. Bat. 172 4. c. tab. aen. et in ejus impetus primi anatomici.

1525. ° *Louis Gayant*, *Claude Perrault* et *Jean Pecquet*, observatio sur la communication de la veine emulgente avec le canal thorachique. Mé de Paris. Vol. I. 1733 p. 37.

1526. ° *Aug. Fr. Walther*, observationes anatomicae selectae tres ductu thoracico bipartito, vena bronchiali sinistra, et inferiore arteria hepati superioris mesaraicae sobole. Lipsiae 1731. 4. In *Halleri* coll. Diss. an Vol. I. p. 757.

1527. ° *B. S. Albinus*, de insertione ductus chyliferi in vena azygos. ejus annot. acad. Lib. IV. cap. 9.

1528. ° A. P. Queitsch, Nachrichten von der großen Speiseſaftröhre der Bruſt, oder der Bruſtmilchader. Frkf. a. d. Oder 1740. 4. Mit Kpf.

1529. ° *Alb. de Haller*, resp. *Conr. Maur. Chr. Bussmann*, observationes de ductu thoracico. Gotting. 1741. 4. In ej. coll. Diss. anat. Vol. I. 793. et in oper. min. Vol. I. p. 586.

1530. ° *Franc. Jac. Narcissus*, Diss. de generatione et receptaculis ch Lgd. Bat. 1742. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. I. p. 769.

1531. ° *Bern. Siegfr. Albini* tabula vasis chyliferi cum vena azyga, teriis intercostalibus, aliisque vicinis partibus. Lgd. Bat. 1757. Fol. max.

Digitized by Google

1532. *Alex. Monro, Beschreibung des menschlichen Milchsaftbehälters und der Milchsaftröhre. In dessen Knochenlehre v. Krause übersetzt. Leipz. 1781. 8. S. 645.

1533. *Antoine Portal, remarques sur la structure du canal thorachique et celle du reservoir du chyle. Mém. de Paris 1770. hist. p. 37. mém. p. 393.

1534. *Janus Bang, de variationibus in ductu thoracico visis. Soc. med. Hafniensis collectanea. Vol. I. 1774. p. 82. sq.

1535. *Raphael Bienvenu Sabatier, remarques sur le canal thorachique de l'homme. Mém. de Paris 1780. hist. p. 15. mém. p. 603.

1536. *Sam. Thom. Soemmerring, de trunco vertebrali vasorum absorbentium corporis humani commentatio, juncta icone. In comment. soc. reg. scient. Gotting. Vol. XIII. 1795 — 98. p. 111.

1537. *Astley Cooper, drei Fälle von Verstopfung des ductus thoracicus, nebst einigen Versuchen über die Wirkungen der Unterbindung dieses Gefäßes. In Isenflamm und Rosenmüllers Beiträgen, 1r Bd. 1s Hft. S. 47. in Reils Arch. Bd. 5.

Lymphgefäße in einzelnen Organen.

1538. *Rudolph Jac. Camerer, de nova vasorum seminiferorum et lymphaticorum in testibus communicatione. Miscell. acad. nat. curios. Dec. 2. ann. 7. 1688. p. 432.

1539. *Güntherus Christph. Schelhammer, de vase chylifero lymphatico coli nunc demum reperto. Miscell. acad. nat. curiosor. Dec. 3. ann. 3. 1695. et 1696. p. 176.

1540. Paolo Geron. Biumi, esamine di alcuni canaletti chiliferi, che del fondo del ventricolo per le toniche del omento sembrano penetrare net fegato. Mediolan. 1728. 8.

1541. *François Joseph Hunauld, observation sur des vaisseaux lymphatiques dans le poumon de l'homme qu'on n'avoit encore vus que dans les animaux. Mém. de Paris. 1734. 4. hist. p. 44. ed. in 8. hist. p. 61.

1542. *Henry Watson, a description of the lymphatics of the urethra and neck of the bladder. Philos. transact. 1769. p. 392.

1543. Casim. Christph. Schmiedel, de habitu naturali venarum lymphaticarum in hepate. Erlang. 1747. 4. c. fig.

1544. *Jo. Gottl. Haase, de vasis cutis et intestinorum absorbentibus, plerisque lymphaticis pelvis humanae annotationes anatomicae. Cum iconibus. Lipsiae 1786. Fol.

1545. *Ch. N. Schreger, von den Saugadern der Conjunctiva des Auges. In s. Beitr. z. Kult. der Saugaderl. 1r Bd. S. 244.

1546. Gaetano Ultini, dei vasi linfatici della placenta. Mem. dell' istituto nazionale italiano. Fisica e matem. Vol. I. P. 2. p. 309.

Vergleichende Anatomie.

1547. Franç. Magendie, mém. sur les organes de l'absorption chez les mammifères. à Paris 1809. 8.

Ueber die Lymphgefäßdrüsen der Wallfische haben *Abernethy*, Phil. Transact. 1796. und *Knox* in Edinb. Med. and surg. Journ. Jul. 1824. p. 23. übers. in Froriep's Notizen, 1824. Aug. p. 51. sq. Untersuchungen gemacht.

1548. A. Monro, State of facts concerning the paracenthesis of the thorax an account of air effused, and lymphatic vessels in oviparous animals. Edinb. 1770.

Ueber die Lymphgefäße der Vögel haben auch *Hunter* et *Hewson*, Phil. Tr. 1768. T. 58. 217. 1769. T. 59. p. 204. Beobachtungen gemacht.

1549. Lauth, Mém. sur les vaisseaux lymphatiques des oiseaux, in Annales des sc. naturelles. Paris 1825.

Ueber die der Amphibien, namentlich über die der Schildkröten, findet man bei Hewson, Cruikshank und neuerlich bei Bojanus (siehe Th. I. S. 46. No. 635.) Beobachtungen. Hinsichtlich d. Fische ist das vorzüglichste Werk:

1550. *Vincenz Fohmann, das Saugadersystem der Wirbelthiere. Erstes Heft: das Saugadersystem der Fische. Mit XIII. Steindrucktafeln. Heidelberg u. Leipz. 1827. Fol. Außerdem haben auch Hunter, Hewson und Monro Untersuchungen über die Saugadern der Fische angestellt.

Digitized by Google

Ueber das Gefäßsystem im Allgemeinen.

Gefäße des Körpers im weiteren Sinne des Wortes.

Gefäße, vasa, des menschlichen Körpers im weiteren Sinne des Wortes, nennt man häutige Röhren, in welchen sich Flüssigkeiten, oder mit einem andern Worte, Säfte, humores, des menschlichen Körpers bewegen. In diesem Sinne des Wortes unterscheidet man die Gefäße, welche Säfte zusammenleiten und sie dann aus dem Körper herausführen, vasa secernentia, oder auch vasa excernentia, ductus excretorii, Ausführungsgänge, von den Gefäßen, bei welchen dieses nicht der Fall ist, und welche Blut oder eine dem Blute ähnliche Flüssigkeit im Körper führen. Die Ausführungsgänge, ductus excretorii, machen einen Theil der offnen Höhlen aus (S. Th. I. S. 53), sie führen eine von dem Blute verschiedene, aus dem Blute abgesonderte Flüssigkeit, und ergießen dieselbe entweder in andere weitere Stellen der offnen Höhlen, in die Nasenhöhlen, in die Luftwege, in den Speisecanal, in die Harnwege und in die Höhle der Geschlechtstheile, oder sie führen sie an die äußere Oberfläche des Körpers, und lassen sie durch Oeffnungen, die sich an der Haut befinden, ausfließen. Die Werkzeuge, welche besonders dazu eingerichtet sind, daß diese Säfte aus dem Blute bereitet und abgesondert werden, und aus den Blutgefäßen in die Ausführungsgänge übergehen, und in welchen daher die Ausführungsgänge in einem kleinen Raume mit unzähligen blutführenden Röhrchen in Berührung kommen, gehören zu den Organen, die man Drüsen, glandulae, oder drüsenartige Theile (S. Th. I S. 432) nennt. Die Ausführungsgänge leiten also die Säfte, die in den Drüsen aus den blutführenden Röhren in sie hinübergetreten sind zu weiteren, nach außen geöffneten, Behältern oder Canälen, oder zu der Oberfläche des Körpers selbst. So führen die Ausführungsgänge der Thränendrüsen, ductus lacrimales, die Thränen an die Oberfläche der Augen, die Ausführungsgänge der Speicheldrüsen, ductus salivales, den Speichel in die Höhle des Mundes, die Ausführungsgänge der Schleimdrüsen, ductus excretorii glandularum mucosarum, den Schleim in sehr viele, mit Schleimhäuten überzogene Höhlen, der Ausführungsgang der Leber, ductus hepaticus oder bilifer, die Galle aus der Leber in das Mittelstück des Zwölffingerdarms, der Ausführungsgang des Pankreas, ductus pancreaticus, den pankreatischen Saft aus dem Pankreas zu dem nämlichen Theile des Darmkanals, die Ausführungsgänge der Nieren, ductus uriniferi, den Harn in die Harnblase, die Ausführungsgänge der Hoden, ductus seminales, den Samen und die der andern, zu den Geschlechtstheilen gehörenden Drüsen, ihre Säfte in die Höhle der Geschlechtstheile, die Ausführungsgänge der Milchdrüsen, ductus lactife-

Digitized by Google

die Milch bei den Frauen an die Oberfläche des Körpers, wohin auch alle Ausführungsgänge der Hautdrüsen, folliculi sebacei, die Hautsalbe bringen

Allein weil sich die Wände der blutführenden Canäle nicht auf eine sichtbare Weise in die der Ausführungsgänge fortsetzen, und mit ihnen also in keinem noch erkennbaren, ununterbrochenen Zusammenhange stehen, weil ferner die Häute, aus denen sie bestehen, sehr verschieden von denen der Ausführungsgänge sind, weil endlich im Gegentheile die Wände des Speisecanals, die der Canäle in den Geschlechtstheilen und die Haut selbst, in einem ununterbrochenen Zusammenhange mit den Wänden der Ausführungsgänge stehen, die sich an ihnen öffnen, und auch in vieler Rücksicht aus ähnlichen Häuten gebildet sind, so rechnet man, wenn man das Wort Gefäß im engeren Sinne gebraucht, die Ausführungsgänge nicht zu dem Gefäßsysteme, sondern man sieht diese baumförmig verzweigten, mit verschlossenen Enden anfangenden, in den Luftwegen, im Speisecanale, in den Geschlechtstheilen und auf der Haut sich öffnenden Canäle als Fortsetzungen und Anhänge der Luftwege des Speisecanals, und der Canäle in den Geschlechtstheilen und der Haut an.

Adern oder Gefäße im engeren Sinne des Wortes.

Dagegen stehen die Wände aller Canäle, welche Blut oder blutähnliche Flüssigkeiten führen, und welche man mit einem Worte Adern nennt, in einem ununterbrochenen Zusammenhange untereinander, haben eine und dieselbe innere Haut, und bilden also ein einziges Ganzes, das man das Gefäßsystem, systema vasorum, nennt. Alle zu dem Gefäßsysteme zu rechnenden Canäle bilden zusammengenommen die Classe der mittleren Höhlen des Körpers (S. Th. I. S. 54).

Blutgefäße und Lymphgefäße.

Das Gefäßsystem besteht aus 2 Classen von häutigen Röhren.

In der einen bewegen sich Säfte im Kreise herum, indem sie aus einem Netze sehr enger Röhrchen, von denen fast alle Theile des Körpers durchzogen sind, in größere und immer größere und weniger zahlreiche zusammengeleitet, und durch die 2 Höhlen in der rechten Hälfte des Herzens hindurch zu den Lungen geführt, daselbst in kleinere und immer kleinere Röhren vertheilt, und zu einem Netze sehr enger Röhrchen, das alle Abtheilungen der Lungen durchdringt, gebracht werden, von da aber wieder in größere und immer größere und weniger zahlreiche Röhren zusammengeleitet, dann durch die in der linken Hälfte des Herzens befindlichen 2 Höhlen hindurch geführt, von da in kleinere und immer kleinere Röhren zu fast allen Theilen des Körpers vertheilt und in das Netz der kleinsten Röhrchen, das fast alle Theile des Körpers durchdringt,

Digitized by Google

zurückgebracht werden. Die Säfte vollenden in diesem Röhrensysteme eine Bewegung, durch welche sie immer wieder an die nämlichen Stellen zurückgebracht werden, in denen sie schon mehrmals flossen, und die man daher den Kreislauf des Bluts nennt. Die erste Classe von Adern ist also die, in welchen der Kreislauf des Bluts geschieht.

In der 2ten Classe der Adern, d. h. der häutigen, zu dem Gefäßsysteme zu rechnenden Röhren, in den Lymphgefäßen, vasa lymphatica, bewegen sich Säfte, die sich auf dem Wege befinden, um in den Kreislauf zu gelangen, und welche also den Gefäßen des Kreislaufs zugeführt werden. Diese Röhren haben auf der einen Seite unzählige enge, nicht mit sichtbaren Oeffnungen versehene Enden, mittels deren sie Flüssigkeiten einsaugen, d. h. Flüssigkeiten aus der Umgebung in ihre Höhle hereinziehen, sich damit füllen, auch dieselbe fortbewegen, sie endlich in wenigere Röhren sammeln und in gewisse Gefäße des Kreislaufs ergießen. Diese Gefäße stehen daher nur mittels ihrer dickeren Enden, nicht aber mittels ihrer dünneren Anfänge mit den Gefäßen des Kreislaufs in Verbindung. Die dünneren Anfänge derselben liegen vielmehr theils an der Oberfläche der Haut und der offenen Höhlen an, und nehmen daselbst durch ihre unsichtbaren Poren Substanzen auf und führen sie in die Gefäße des Kreislaufs, und also mehr in das Innere des Körpers hinein, theils fangen sie an den geschlossenen Höhlen, die die innersten Höhlen des Körpers sind, an, nehmen also aus dem Innern des Körpers Substanzen auf und führen sie in die Gefäße des Kreislaufs, und also mehr nach außen.

Die Lymphgefäße bilden also einen Anhang an den Gefäßen des Kreislaufs, und die Säfte werden, so lange sie in ihnen befindlich sind, nicht in einem Kreislaufe herumgeführt. Weil diese Gefäße die Eigenschaft besitzen, auch wenn sie leer sind, Säfte von den benachbarten Stellen des Körpers in ihre Höhle hereinzuziehen und sich damit zu füllen, so nennt man sie auch Saugadern, vasa resorbentia. Denn die Gefäße des Kreislaufs können, wenn sie leer sind, sich nicht durch Einsaugung mit Flüssigkeit füllen, obwohl ihre Wände so durchdringlich sind, daß manche Substanzen, von dem in ihnen befindlichen Säften angezogen, in sie eindringen können.

Gefäße des Kreislaufs im Allgemeinen.

Nimmt man auf die Beschaffenheit des Bluts Rücksicht, so kann man, wie bereits erklärt worden, im menschlichen Körper 2 Gefäßnetze unterscheiden. Beide bestehen aus sehr engen, durchsichtigen Röhrchen. In

Digitized by Google

dem einen Netze wird das hellroth ankommende Blut in dunkelrothes, in dem anderen das dunkelroth ankommende Blut in hellrothes verwandelt. Das erste Gefäß macht einen Bestandtheil fast aller Theile des Körpers aus, denn fast alle Theile des Körpers sind davon durchzogen. Das Blut ändert in ihm seine Farbe und wird dunkelroth, während es zur Ernährung aller dieser Theile beiträgt, das andere liegt in den Lungen, welche davon ganz durchzogen sind. Das Blut ändert in ihm seine Farbe, weil es daselbst beim Athmen der Luft ausgesetzt wird, und wird heller roth. Diese beiden sehr dichten Röhrennetze, die aus so engen Röhrchen bestehen, daß dieselben 5 mal und an manchen Stellen sogar 10 mal dünner als Kopfhaare von mittlerer Dicke sind, stehen mit einander durch 2 aus größeren Röhren bestehende Röhrenleitungen in Verbindung. Jede von ihnen fängt, wie schon gesagt worden, in dem einen feinsten Netze mit wurzelförmig zertheilten Enden an, und hört, nachdem sich alle diese Röhren in eine große Röhre vereinigt haben, und diese hierauf von neuem in kleinere und immer kleinere Röhren zertheilt worden ist, in dem andern Netze mit baumförmig zertheilten Enden auf. Beide Röhrenleitungen stehen daher bei dem Erwachsenen nur mittels jener 2 feinsten Gefäßnetze an ihren Enden mit einander in Verbindung. Man hat die Röhrchen jener feinsten Netze, weil sie so eng sind, Haargefäße, vasa capillaria, genannt, nicht als ob sie eine besondere Classe von Gefäßen ausmachten, die einen eigenthümlichen Bau hätten, denn sie sind vielmehr die ununterbrochene Fortsetzung der größeren Röhren jener 2 Röhrenleitungen, deren baumförmig in Zweige getheilte Anfänge und Enden ohne eine bestimmte Grenzlinie in einander übergehen.

Von den erwähnten, aus größeren Röhren bestehenden 2 Röhrenleitungen führt die eine dunkelrothes Blut aus dem Haargefäßnetze aller Theile des Körpers in das Haargefäßnetz der Lungen, die andere hellrothes Blut aus dem Haargefäßnetze der Lungen in das Haargefäßnetz des Körpers. Diese 2 Röhrenleitungen liegen in einer großen Strecke des Körpers neben einander, ohne jedoch bei Erwachsenen wechselseitig in einer andern Gemeinschaft als durch jene sehr engen Haargefäße zu stehen, und beide haben an der nämlichen Stelle, und zwar da, wo die Wurzeln jeder von diesen 2 Röhrenleitungen in eine einzige Hauptröhre zusammentreten, eine erweiterte, von Fleischfasern umgebene Stelle. Diese beiden neben einander liegenden erweiterten Stellen, von denen jede schon für sich von Fleischfasern umgeben ist, sind auch noch dadurch untereinander verbunden, daß sie auch von Fleischfasern, die ihnen gemeinschaftlich angehören, und die von einer Erweiterung auf die andere übergehen, umgeben werden, und daß sie in einem ihnen gemeinschaft-

Digitized by Google

lichen Sacke eingeschlagen liegen. Diese erweiterte, von Fleischfasern umgebene, von einem häutigen Sack eingehüllte Stelle der 2 Röhrenleitungen nennt man das Herz, cor [1]). Durch das Herz gehen daher 2 Röhren hindurch, durch die rechte Hälfte desselben die eine, die das dunkelrothe Blut aus allen Theilen des Körpers zu den Lungen führt, durch die linke Hälfte desselben die andere, die das hellroth gewordene Blut aus den Lungen zu allen Theilen des Körpers führt. Das Herz leistet, weil es durch seine Fleischfasern mit großer Kraft zusammengedrückt werden kann, die Dienste eines Pumpwerks, durch welches das in den 2 Hauptröhren befindliche Blut fortgetrieben wird.

Nimmt man nicht sowohl auf die Farbe des Bluts, das in den Gefäßen, die zum Kreislaufe dienen, enthalten ist, als auf die Beschaffenheit der Wände derselben und darauf, ob sie das Blut dem Herzen zuführen, oder ob sie dasselbe vom Herzen wegführen, und also, ob sie dem Drucke einer vom Herzen fortgestoßenen Flüssigkeit ausgesetzt sind oder nicht, Rücksicht; so theilt man die Blutgefäße in Arterien, arteriae, und Venen, venae, ein.

Jede von den beiden früher beschriebenen Röhrenleitungen besteht zum Theil aus Arterien, zum Theil aus Venen. Da wo die zu einer Röhrenleitung gehörenden Arterien und Venen sich vereinigen, liegt das Herz. Es giebt daher zweierlei Arterien und zweierlei Venen, die, welche hellrothes, und die, welche dunkelrothes Blut führen. Die Venen, weil sie das Blut nach dem Herzen hinführen, haben nicht den Druck, den dieses fleischige Pumpwerk durch das Fortstoßen von Blut hervorbringt, auszuhalten, denn nur die Röhren, in welche das Blut aus dem Pumpwerke eingetrieben wird, nicht aber die, welche dem Pumpwerke das Blut zufließen lassen und also vor ihm liegen, sind einem solchen Drucke ausgesetzt. Das Blut bewegt sich daher in den Venen mit keiner großen Gewalt vorwärts, und sie leisten ihm daher, ob sie gleich nur dünne Wände haben, doch den nöthigen Widerstand. Anders verhält sichs mit den Arterien. Sie führen das Blut aus dem Herzen fort. In diese schon vom Blute vollen elastischen Röhren treibt das Herz während des Lebens wie ein Pumpwerk immer von neuem durch seine mit großer Kraft geschehende Verengerung Blut ein, und bringt dadurch einen großen Druck in dem sie erfüllenden Blute, das nicht schnell genug einen Ausweg findet, hervor. Dieses stark gedrückte Blut strebt, wie jede gedrückte Flüssigkeit, nach allen Richtungen auszuweichen

[1]) Die Fleischfasern, welche jeder Abtheilung des Herzens allein angehören, und die welche von der einen Herzhälfte auf die andere fortgehen und beiden Herzhälften gemeinschaftlich sind, bilden nicht 2 getrennte Lagen, sondern sind unter einander untrennlich verflochten.

Digitized by Google

und drückt daher auch heftig auf die Wände der Arterien und strebt sie auszudehnen. Diese aber sind dick und sehr elastisch, und geben zwar etwas nach, indem sie sich ein wenig, jedoch in kaum sichtbarem Grade der Quere nach, sehr beträchtlich aber der Länge nach, ausdehnen und dadurch dem vorwärts gedrückten Blute Platz verschaffen. Sie widerstehen aber der übermäßigen Ausdehnung durch ihre dicken und steifen Wände hinreichend. In dieser Dicke der Wände, durch welche sich die Arterien, ganz vorzüglich die größern, vor den Venen und Lymphgefäßen auszeichnen, liegt auch der Grund zu einer andern Verschiedenheit dieser 2 Classen von Gefäßen. Die Arterien nämlich, wenigstens die größeren, stehen wegen ihrer dicken steifen Wände immer offen, und werden, wenn sie von außen gedrückt werden, nicht so leicht völlig zusammengedrückt. Dagegen fallen die Venen, wenn sie leer sind, und wenn sie nicht durch die benachbarten Theile, an welchen sie angeheftet sind, auseinander gehalten werden, zusammen, d. h. ihre dünnen Wände legen sich an einander, auch werden sie durch eine äußere Kraft leicht zusammengedrückt und dadurch für das Blut ungangbar gemacht. Einer Störung des Blutlaufs durch einen äußern Druck auf die Venen ist indessen an denjenigen Stellen, wo sie einer Zusammendrückung ausgesetzt sind, dadurch vorgebeugt, daß in ihnen an vielen Stellen Klappen, die man auch Taschenventile nennen könnte, angebracht sind (eine Vorrichtung, die sich an den Arterien nur an einer Stelle, da wo sie vom Herzen das Blut empfangen, findet), daß ferner dasselbe Blut, welches zu einem Theile des Körpers durch eine Arterie hinfließt, von da durch mehrere zusammengenommen weitere und unter einander verbundene Venen zurückfließt, wodurch bewirkt wird, daß dem Blute, wenn ihm der Weg aus jenen Theilen in einer Vene versperrt wird, immer noch ein Weg durch eine andere Vene offen bleibt. Eine Folge davon, daß mehrere zusammengenommen weitere Venen das Blut zurückführen, welches eine einzige engere Arterie in einen Theil hingeführt hatte, und daß die Venen nicht offen stehen, sondern zusammenfallen, ist, daß sie während des Lebens nicht alle in dem Grade angefüllt sind, als es ihr Durchmesser erlaubt, und daß die in ihnen vorhandene Blutsäule durch leere oder wenig erfüllte Stellen unterbrochen ist, während die Arterien im Leben immer voll, und daher von einer continuirlichen Blutsäule erfüllt sind. Dieser Umstand aber, daß die Venen nicht ohne Unterbrechung mit Blut angefüllt sind, macht selbst wieder die Gegenwart der Klappen nöthig. Denn in den Arterien, welche mit einer continuirlichen Blutsäule angefüllt sind, drängt das nachfolgende Blut das vorhergehende fort und hindert es zurückzuweichen. In den Venen ist dieses nicht der Fall. Hier müssen also Klappen dieses Zurückweichen

Digitized by Google

an den Orten hindern, wo sie vollkommen mit Blute erfüllt sind. Ein Ventil oder eine Klappe nennt man bekanntlich eine solche in Röhren angebrachte Vorrichtung, vermöge welcher eine in ihnen bewegte Flüssigkeit nicht gehindert wird, sich in der einen Richtung fort zu bewegen, durch welche sie aber, wenn sie in der entgegengesetzten Richtung zurück zu fließen anfängt, sich selbst den Weg versperrt. Dergleichen Ventile bringt man z. B. an den Pumpen der Brunnen und in den Luftpumpen an. In diesen Instrumenten sind Klappenventile und Kegelventile im Gebrauche. Im Körper des Menschen und vieler Thiere befindet sich nun zu dem nämlichen Zwecke eine neue Vorrichtung dieser Art, auf die man in der Mechanik bisher nicht gefallen war, die der Taschenventile. In den Arterien liegen sie, wie gesagt, nur an einer einzigen Stelle, an der Oeffnung nämlich, durch welche das Blut aus dem Herzen in die Arterien eingetrieben wird, und sind daselbst so gestellt, daß sie das Blut hindern, in das Herz zurückzufließen; in den Venen kommen sie an vielen Stellen vor, und sind so gestellt, daß sie das Blut nicht hindern, nach dem Herzen hin zu fließen, sondern im Gegentheile ihm den Weg verschließen, wenn es sich nach den Theilen des Körpers, aus dem es herkommt, zurückzubewegen anfängt.

Diese Taschenventile am Anfange der Arterien und in den Röhren der Venen bestehen aus Falten der innersten Haut dieser Gefäße, welche in der Höhle derselben einen halbmondförmigen Vorsprung bilden. Jeder solche halbmondförmige Vorsprung stellt eine Tasche dar, welche mit den Taschen einigermaßen verglichen werden kann, die man in Kutschen seitwärts anzubringen pflegt. Jede solche halbmondförmige Falte hat nämlich einen converen parabolischen Rand, welcher inwendig an der Wand der Gefäße angeheftet ist, wodurch daselbst ein kleiner Wulst, agger, entsteht, und einen concaven halbmondförmigen Rand, der an der Wand der Röhre nicht angeheftet ist, sondern davon absteht und also frei ist. An den beiden Spitzen, cornua, der halbmondförmigen Falte kommen diese 2 Ränder zusammen. Man sieht hieraus leicht von selbst, daß zwischen der halbmondförmigen Falte und der Wand der Röhre ein Zwischenraum befindlich ist, welcher nach der einen Seite am angehefteten Rande verschlossen, nach der andern Seite am freien Rande offen ist. Diese offne Seite ist in allen Röhren dahin gerichtet, wohin das Blut fließen soll, in den Venen nämlich ist sie nach dem Herzen zu, in den Arterien vom Herzen abgekehrt. Weil nun die offene Seite jeder solchen Tasche dahin, wohin das Blut fließen soll, die verschlossene Seite derselben aber dahin, wo es herkommen soll, gerichtet ist, so wird diese Bewegung des Bluts in der von der Natur bezweckten Richtung

Digitized by Google

durch die Klappen nicht gehindert. Denn das Blut drückt, wenn es in die Arterien aus dem Herzen einströmt, und in den Venen, wenn es nach dem Herzen hinströmt, diese Taschen an die Wand an, die daher vom Blute unerfüllt bleiben, und erhält sich dadurch den Weg offen; dagegen versperrt es sich selbst den Weg, wenn es aus den Arterien ins Herz, oder wenn es in den Venen nach den kleinen Zweigen zurückzuströmen anfängt, weil es dann in die Höhlen jener Taschen eindringt, sie anfüllt und aufblähet, wo dann die Falten aneinandergedrückt werden und die Höhle der Röhre verschließen. Das Blut wird folglich durch diese Vorrichtuug gehindert, in einer andern Richtung als in der von der Natur bestimmten zu fließen. Die Arterien bedurften nur an einer Stelle, nicht an vielen Stellen der Klappen. Denn da sie immer von einer ununterbrochenen Blutsäule ganz und gar ausgefüllt sind, so kann das Blut in keinem ihrer Zweige rückwärts fließen, sobald es an ihrem Anfange, wo sie mit Klappen versehen sind, nicht zurückfließen kann. Die Venen dagegen sind an vielen Stellen, nicht vollkommen erfüllt, oder ganz unerfüllt; nach diesen Stellen zu würde daher das Blut leicht durch seine eigene Schwere zurücksinken, oder wenn ein Druck auf die Venen stattfindet, zurückweichen, würde dieses nicht durch die Klappen verhindert. Diese bewirken daher nicht nur, daß ein äußerer, auf die Venen wirkender Druck keine Störung im Laufe des Venenbluts hervorbringt, sondern sogar, daß ein solcher Druck die Vorwärtsbewegung des Bluts befördert. Faßt man nun also den Unterschied, der zwischen den Arterien und Venen stattfindet, kurz zusammen, und bezeichnet ihn zugleich möglichst genau, so ergiebt sich folgendes:

Die Arterien, Schlagadern oder Pulsadern, arteriae, sind runde, häutige, mit einer äußerst glatten innern Oberfläche versehene, elastische Röhren, welche dickere Wände als die andern Gefäße besitzen, sich namentlich durch eine mittlere, in gelbliche Cirkelfasern theilbare elastische Haut auszeichnen, vermöge deren sie auch dann, wenn sie leer sind, nicht zusammenfallen, sondern offen stehen, der Zusammendrückung von außen her, so wie auch der Ausdehnung, die sie von innen her durch das in ihnen enthaltene Blut erleiden könnten, mehr als andere Gefäße widerstehen, und dabei eher zerreißen, als sehr ausgedehnt werden. In sie wird das Blut von den fleischigsten Abtheilungen des Herzens eingetrieben, und in Gestalt einer ununterbrochenen Blutsäule aus wenigeren größeren Röhren in immer zahlreichere und kleinere bewegt.

Venen, Blutadern, venae, sind runde, häutige, mit einer äußerst glatten innern Oberfläche versehene Röhren, welche dünnere Wände als die Arterien, aber dickere Wände als die Lymphgefäße besitzen, einer deutlich darstellbaren, mittleren, faserigen Haut entbehren, und niemals

Digitized by Google

deutliche Cirkelfasern, sondern, wenn überhaupt Fasern, die eine bestimmte Richtung haben, an ihnen unterscheidbar sind, Längenfasern besitzen, wegen ihrer dünneren Wände, wenn sie leer sind, zusammenfallen, wenn sie voll sind, ihr Blut durchschimmern lassen, wenn sie mit Gewalt gefüllt werden, sich leichter übermäßig ausdehnen, als zerreißen, durch Druck von außen her leicht zusammengedrückt werden, und an solchen Stellen, wo sie einem solchen äußern Drucke unterworfen sind, im Innern Klappen besitzen, welche die rückgängige Bewegung des Bluts hindern. Uebrigens sind die meisten vielfach untereinander verbunden, so daß dem Blute, wenn ihm ein Weg versperrt wird, noch mehrere andere Wege offen stehen. In ihnen wird endlich das mit geringerer Gewalt bewegte Blut den von dünnen Wänden umgebenen Abtheilungen des Herzens so zugeführt, daß es sich dabei aus vielen kleineren Röhren in weniger größere bewegt, und keineswegs eine ununterbrochene Blutsäule bildet, sondern oft unerfüllte Stellen, oder solche, die an vielen Stellen, nicht so, wie es ihr Durchmesser erlaubt, angefüllt sind, zwischen sich hat,.

Beweise für den Kreislauf des Bluts.

Daß ein großer Theil des Bluts, der durch die Arterien vom Herzen aus in einen Theil des menschlichen Körpers geführt wird, durch die Venen nach dem Herzen zurückkehre, und daß es folglich keineswegs durch die nämlichen Blutgefäße zu ihm zurückkehre, durch welche es vom Herzen aus zu den Theilen hingebracht worden war, beweisen bekanntlich die schon vorhin erwähnten Ventile in den Venen, am Anfange der Arterien und im Herzen, welche dem Blute in einem jeden Gefäße nur nach einer Richtung sich zu bewegen gestatten, in den Arterien vom Herzen aus nach den Theilen des Körpers hin, in den Venen von den Theilen des Körpers aus, nach dem Herzen hin; ferner Beobachtungen am lebenden Menschen: denn wenn ein Glied durch ein umgelegtes Band stark genug zusammengeschnürt wird, so häuft sich das Blut, welches durch das Band zu dem Herzen zurückzufließen gehindert wird, in den Venen an, und es schwellen daher die Venen in demjenigen Theile des Gliedes an, welcher entfernter vom Herzen liegt, als das Band, während die Venen in dem andern Theile des Gliedes zusammenfallen, welcher dem Herzen näher ist als das Band, und wohin es von dem entfernteren Theile des Gliedes aus zu fließen durch das Band gehindert ist; endlich Beobachtungen an lebendig geöffneten Thieren: denn verhindert man das Blut, indem man den Stamm der Körperarterie im Unterleibe eines lebendigen Thiers durch ein Band zusammenschnürt, vom Herzen aus in die Hinterfüße zu gelangen, ohne dem im Gliede befindlichen Blute den Rückweg nach

Digitized by Google

dem Herzen zu verſperren, ſo wird das Glied ſchnell vom Blute entleert; verhindert man dagegen das Blut, indem man den Stamm der Körpervene im Unterleibe durch ein Band zuſammenſchnürt, von den Hinterfüßen aus nach dem Herzen zurückzufließen, ohne daß dem in dieſe Glieder vom Herzen aus einſtrömenden Blute der Weg verſperrt wird, ſo häuft ſich das Blut in den Hinterfüßen an, ſie ſchwellen davon auf, und es entſteht die zuerſt von Lower beobachtete Anſammlung von Blutwaſſer im Zellgewebe und in der Unterleibshöhle, welche der ähnlich iſt, die man bei Waſſerſüchtigen findet.

Daß nun aber der größere Theil des durch die Arterien in ein Organ des Körpers geführten Blutes in einem ununterbrochenen Strome in die Venen gelange, und durch dieſelben zum Herzen zurückkehre, und daß alſo nur ein geringerer Theil der in den Blutgefäßen enthaltenen Flüſſigkeit aus ihnen austrete und Behufs der Ernährung in die Subſtanz der Theile gelange, beweiſen folgende Umſtände. Bei lebenden Menſchen kann in äußerſt kurzer Zeit ein großer Theil alles Bluts durch eine einzige geöffnete Vene ausfließen. In durchſichtigen Theilen lebender Thiere ſieht man mit dem Vergrößerungsglaſe die Blutkügelchen ſich in den Höhlen der durchſichtigen kleinſten Adern fortbewegen, die Ströme der Blut zuführenden Arterien bringen das Blut in ein Netz von kleinen Canälen, in welchem es, ohne eine ſichtbare Unterbrechung der Strömung zu erleiden, bis zu den Venen hinläuft, die es wieder nach dem Herzen hinführen. Malpighi [1]) hat dieſe Bewegung des Bluts zuerſt an der Urinblaſe, am Gekröſe und an den Lungen eines Froſches, Leeuwenhoek [2]) am Schwanze der Froſchlarven und der Fiſche geſehen, worauf ſie von Spallanzani [3]), Haller [4]) und von einer großen Menge neuerer Naturforſcher genau unterſucht und auch von W. Cowper an durchſichtigen Theilen warmblütiger Thiere, namentlich am Gekröſe eines Hundes und im Omentum einer Katze geſehen worden iſt. Ungeachtet dieſe Beobachtung des Durchgangs des Bluts durch die Haargefäße bei warmblütigen Thieren große Schwierigkeiten hat, weil der Blutlauf bei ihnen nach beträchtlichen Verletzungen ſchnell ſtillſteht, und das Blut ſchnell gerinnt, haben doch Reichel, Harleß und Oeſterreicher [5]) denſelben gleichfalls wiederholt geſehen, und viele von denjenigen, welche ſich neuerlich mit der Beobachtung des Hühnchens im bebrüteten Ei beſchäftigten, haben ſich von dieſem Uebergange bei dem Vogelembryo überzeugt.

---

[1]) *Malpighi*, ſiehe *Haller*, Elementa physiol. Lib. III. Sect. 3. §. 20.

[2]) *Lecuwenhoek*, Epist. 59. p. 15, und bei *Haller* a. a. O.

[3]) *Spallanzani*, Dell' azione del cuore ne vasi sanguini, in Modena 1768. 8. überſ. in den mathematiſch phyſ. Abhandlungen. Leipzig 1769, und Derſelbe de fenomeni della circolazione osservata nell giro universale de' vasi etc. Modena 1773. überſ. ins Franz. v. *Tourdes*. Siehe *Oesterreicher*, Versuch einer Darſtellung der Lehre vom Kreislaufe des Bluts. Nürnberg 1826. 4. p. 13.

[4]) *Haller*, Opera minora. Tom. I. p. 1.

[5]) Oeſterreicher, a. a. O. S. 13, hat den Durchgang des Bluts durch die Haargefäße an mehreren und verſchiedenen Säugethieren mit eben der Deutlichkeit, als an kaltblütigen Thieren geſehen. Man findet in ſeiner Schrift auch die Beobachtungen

Da man nun, wie ich selbst bezeugen kann, den Durchgang des Bluts durch die Haargefäße bei kaltblütigen Thieren schon mit gut eingerichteten Lupen zu beobachten im Stande ist, die (von ihrem Mittelpunkte aus gerechnet) 2 bis 3 Linien Brennweite haben, und folglich nur 32 bis 48 mal im Durchmesser vergrößern, so ist bei diesen Beobachtungen keine Gefahr der mikroskopischen Täuschung vorhanden.

Aber auch durch andere Versuche an lebenden und todten Thieren, so wie am Leichname des Menschen, läßt sich ein ununterbrochener Uebergang von Flüssigkeiten aus den Arterien durch die Haargefäßnetze hindurch in die Venen sichtbar machen.

Denn man kann Wasser, Quecksilber und gefärbte Flüssigkeiten, welche einen aufgelöst'ten Färbestoff enthalten, bei lebenden Thieren und bei todten Menschen aus den Arterien durch die Haargefäße in die Venen hinüberdrücken, ohne einen stärkeren Druck anzuwenden, als derjenige ist, welchem das Blut während des Lebens in den Arterien ausgesetzt ist.

Hales[1]) brachte eine 4½ Fuß lange, senkrechte Glasröhre mit ihrem einen gekrümmten kupfernen Ende in die Halsschlagader eines lebenden Hundes in der Richtung nach den Aesten derselben, und band sie fest, durch das andere trichterförmige Ende derselben füllte er die Röhre voll Wasser, welches die Temperatur des Bluts hatte, und erhielt sie durch Nachgießen desselben voll. Das Blut, welches er gleichzeitig aus der geöffneten Jugularvene ausfließen ließ, wurde nun desto mehr mit warmen Wasser verdünnt, je länger er diesen Versuch fortsetzte. Von der Zeit an, da das Thier starb, floß aus der Vene weniger Blut und Wasser aus, als zuvor; indessen reichte es schon hin, um die Menge der aus dieser Vene ausfließenden Flüssigkeit wieder zu vermehren, daß Hales eine längere Röhre (von 9½ Fuß) in die Arterie einbrachte und füllte. Da nun das Blut in einer leeren Röhre, die in die carotis eines ähnlichen Hundes in der Richtung nach dem Herzen zu eingebracht wird, nach den Versuchen von Hales fast eben so hoch, und bei manchen Hunden noch höher emporsteigt als 4½ Fuß, und also eine 4½ Fuß hohe Blutsäule dem in den Arterien vorwärts gedrückten Blute das Gleichgewicht hält, so sieht man aus dem von Hales angestellten Versuche ein, daß ein mäßiger Druck, der dem gleichkommt, unter welchem das Blut in den Arterien lebender Thiere steht, schon hinreicht, um bei lebenden Thieren Wasser aus den Arterien in die Venen überzutreiben.

Magendie[2]) schnürte nahe am Unterleibe den Schenkel eines Hundes durch ein Band zusammen, ohne jedoch die Schenkelarterie und die Schenkelvene mit einzubegreifen. Wenn er nun die Schenkelvene am Hüftgelenke durch ein besonderes Band zuband, so schwoll sie von dem Blute, welches aus dem Schenkel zurück und weiter nach dem Herzen fortzufließen gehindert war, auf, und ließ ihr Blut, wenn eine kleine Oeffnung in dieselbe gemacht wurde, mit einem ziemlich hohen Strahle herausspringen. Während dieses geschah, drückte nun Magendie die Schenkelarterie zwischen den Fingern zusammen, und verhinderte

---

Anderer aufgeführt, z. B. die von *Reichel*, de sanguine ejusque motu. Lips. 1767. Exp. 5. 14. 15. und Harless Untersuchungen über den Blutlauf in warmblütigen Thieren. Rheinische Jahrbücher, B. VII. St. 2. 1823.

1) *Hales*, Haemastatique ou la statique des animaux, expériences hydrauliques faites sur des animaux vivans, traduit par Mr. de *Sauvages*, à Geneve 1764. 4. p. 95.

2) *Magendie*, Grundriss der Physiologie, übersetzt von *C. F. Heusinger*. Eisenach 1820. 8. B. II. S. 314.

Digitized by Google

dadurch das Blut vom Herzen aus zu dem Schenkel zu gelangen. Der Strahl des aus der Schenkelvene ausströmenden Blutes dauerte nun zwar noch einige Augenblicke fort, so lange nämlich, bis sich die Schenkelarterie ihres Bluts entleert und sich zusammengezogen hatte. Wenn er nun aber aufhörte, die Schenkelarterie mit den Fingern zusammenzudrücken, so daß also das vom Herzen kommende Blut wieder in die Schenkelarterie eintreten konnte, so fing das Blut, so bald es wieder in die kleinsten Zweige gelangt war, von neuem an aus der Schenkelvene auszufließen, und der Blutstrahl stellte sich wieder her. Aenderte er nun den Versuch so ab, daß er, anstatt das vom Herzen kommende Blut in die Schenkelarterie eintreten zu lassen, lauwarmes Wasser in die Schenkelarterie einspritzte, so drang Wasser aus der Schenkelvene hervor, und mit je größerer Kraft er diese Einspritzung machte, um so schneller strömte es aus der Vene heraus. Aehnliche Versuche mit demselben Erfolge haben Croß [1]) an der Arteria carotis und Vena jugularis eines lebenden Hundes, und Wedemeyer [2]) und Günther an der Arteria und Vena brachialis lebender Pferde angestellt. Das Wasser drang bei Wedemeyer's Versuchen, nachdem sich die Vene damit gefüllt hatte, so oft mit einem Sprunge aus der Vene, als der Stempel niedergedrückt wurde, und das Ausfließen ließ nach, so wie nicht mehr eingespritzt wurde. Essig ging anfangs fast mit derselben Leichtigkeit als Wasser aus den Arterien in die Venen über. Wenn aber mehrere Spritzen voll eingespritzt worden waren, ging er schwerer über, und rieselte nur in einem schwachen Strome aus den Venen. Brantwein ging sogleich anfangs schwerer in die Venen über, als Wasser, und floß nur in einem Strome, aber nicht sprungweise aus.

Hales [3]) trieb bei einem Hunde 100 Minuten lang Wasser durch den Druck einer 9½ Fuß hohen Wassersäule aus den Arterien in die Venen, und reinigte dadurch die Blutkanäle vom Blute. Hierauf spritzte er eine Flüssigkeit, welche aus geschmolzenem Fette, Harze, Terpentinöl und Zinnober bereitet worden, in die Arterien, durch eine 4½ Fuß hohe erwärmte Röhre vermöge des Drucks ein, den die die Röhre anfüllende Flüssigkeit hervorbrachte. Die Flüssigkeit ging mit einer beträchtlichen Menge Zinnober gefärbt in die Venen der Gallenblase über, und noch viel mehr Zinnober wurde in den Arterien zurückbehalten. Auf ähnliche Weise trieb er eine solche Flüssigkeit aus den Arterien in die Venen des Magens, der Gedärme und der Harnblase hinüber. Janke [4]) endlich füllte die Venen der Haut des Menschen durch flüssig gemachtes Wachs, das er in die Arterien eintrieb, sehr vollkommen an.

Alle diese Erfahrungen lassen keinen Zweifel übrig, daß das Blut in einem Strome aus den Arterien in die Venen übergehe.

Haargefäße.

Bedeutung des Wortes Haargefäß.

Die Haargefäße [5]) sind die engsten, fast alle Teile des Körpers durchdringenden Röhren, welche den Uebergang des Bluts aus den

---

[1]) *J. C. Cross*, An essay on the circulation of the blood; in the medical recorder. Philadelphia 1827. April p. 298.

[2]) *Wedemeyer*, Untersuchungen über den Kreislauf des Bluts und insbesondere über die Bewegung desselben in den Arterien und Capillargefäßen, mit erklärenden Hindeutungen auf pathologische Erscheinungen. Hannover 1828. 8. S. 180.

[3]) *Hales*, Haemastatique, traduit par *Sauvages*. Geneve 1764. 4. p. 132.

[4]) *J. G. Janke*, de ratione venas c. h. angustiores imprimis cutaneas ostendendi. 1762. 4.

[5]) Ein Werk, welches eine genaue Abbildung der Haargefäßnetze des menschlichen Körpers an allen Stellen liefert, an welchen es eine verschiedene Form hat, giebt es nicht,

Digitized by Google

Arterien in die Venen vermitteln, und auch hinsichtlich des Baues und der Dicke ihrer Wände, der Richtung ihrer Zweige und der Farbe des Bluts, das sie führen, zwischen den Arterien und Venen in der Mitte liegen, so daß man oft nicht bestimmt angeben kann, von wo an sie Venen oder Arterien genannt zu werden verdienen. Ihre Wände sind äußerst dünn und durchsichtig, so daß man nicht mehrere Häute und keine Faserlagen, die eine bestimmte Richtung hätten, an ihnen unterscheiden kann. Ihre Zertheilung in Zweige geschieht an vielen Stellen auf eine solche Weise, daß jede von den vielen Röhren, die aus einer Röhre abgehen, oder die in eine Röhre zusammentreten, dieser an Größe ganz oder ziemlich gleich sind, und

und selbst gute naturgetreue Abbildungen desselben an einzelnen Stellen sind selten. Die beste ist die von Sömmerring gegebene, welche Theil I. Tafel 2. Fig. 33 copirt ist. Sie stellt das feinste Blutgefäßnetz an der Aderhaut des Menschen dar.

S. Th. Soemmerring, Ueber das feinste Gefäßnetz der Aderhaut im Augapfel, vorgelesen den 9ten Mai 1818. Denkschriften der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München für das Jahr 1818.

Außerdem findet man Abbildungen von Haargefäßen in folgenden, zum Theil von Sömmerring a. a. O. schon angeführten Schriften: *Ruysch*, Opera omnia. Amstelodami 1710 — 1722. Tomi III. 4. enthalten viele, aber nicht verzügliche Abbildungen der Haargefäße.

Möller, Diss. exhibens observationes circa tunicam retinam et nervum opticum. Magdeb. 1749. recuss. in Halleri select diss. anat. Vol. VII. — *Lieberkühn*, de fabrica et actione villorum intestinorum tenuium hominis. Lugd. Batav. 1745 (mit Kupfertafeln, die Lyonet gearbeitet). — *Zinn*, descriptio anatomica oculi humani. Goettingen 1755. ed. altera edita ab *H. A. Wrisberg*. 1780. — *Wrisberg*, Novi Commentarii soc. reg. Gotting. 1772. Tab. I. — *Jo. Gottl. Walter*, De venis oculi summatim. Berolini 1778. — *Fr. Aug. Walter*, Annotationes academicae. Berolini 1786, de hepate tabula II. — *Bleuland*, Obs. de sana et morbosa oesophagi structura. Lugd. Bat. 1785. 4. Ejusd. Experimentum anatomicum de arteriolarum lymphaticarum existentia. Lugd. Bat. 1784. Ejusd. Vasculorum in intestinorum tenuium tunicis subtilioribus anatomes opera detegendorum descriptio iconibus ad naturae fidem pictis illustrata. Lugd. Batav. 1797. — Ejusd. icones anatomico-physiologicae partium corporis humani et animalium, quae in descriptione musei rheno-trajectani inveniuntur. Fascic. I. c. tabb. VI. Trajecti ad Rhenum 1826. 4. — *Mascagni*, Vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia. Senis 1787. fol. Tab. III. fig. 22. Ejusd. Prodromo della grande anatomia. Firenze 1819. fol. (auf den Figuren, welche injicirte Blutgefäße darstellen). — *S. Th. Soemmerring*, Icones oculi humani. Francofurti 1804. Tab. VI. Ejusd. Icones organi auditus. Francofurti 1806. c. Tab. IV. Ejusd. Icones organorum gustus et vocis. Francofurti 1808. Tab. I. Ejusd. Icones organi olfactus. Francofurti 1810. c. Tab. II. und in den Denkschriften d. Königl. Acad. d. Wiss. in München. B. I. (Gefäße des Gehirns.) — *Reisseisen*, Ueber den Bau der Lungen. Berlin 1822. Fol. Tab. III. *B. W. Seiler*, Naturlehre des Menschen, mit Bemerkungen aus der vergleichenden Anatomie für Künstler und Kunstfreunde, 1. Heft mit 4 Kupfert. Tab. I. — *Döllinger*, de vasis sanguiferis, quae villis intestinorum hominis brutorumque insunt. Monachii 1828. 4. — *B. Eble*, Ueber den Bau und die Krankheiten der Bindehaut des Auges, mit besonderem Bezuge auf die contagiöse Augenentzündung, nebst einem Anhange über den Verlauf und die Eigenthümlichkeiten der letzteren unter der Garnison von Wien. Mit 3 illum. Kupf. Wien 1828. 8. — *C. E. v. Baer*, Untersuchungen über die Gefäßverbindung zwischen Mutter und Frucht in den Säugethieren. Ein Glückwunsch zur Jubelfeier *Sam. Thom. v. Soemmerring's*, mit einer buntgedruckten und illum. Tafel. Leipzig 1828. Fol.

Digitized by Google

daß sie sich so häufig unter einander vereinigen, daß man diese Zertheilung der Röhren mehr mit der Zertheilung und Vereinigung der Fäden eines Netzes, als mit der der Zweige eines Baums vergleichen kann. Das Blut, das die Arterien in die Haargefäße des Körpers bringen, verwandelt nur sehr allmählig seine hellrothe Farbe in eine dunkelrothe, und eben so verwandelt das in den Haargefäßen der Lungen bewegte Blut nur sehr allmählig seine dunkelrothe Farbe in eine hellrothe, und es giebt daher kleine Röhrchen, in welchen es weder hellroth noch dunkelroth ist, und welche man daher auch nicht wegen ihrer hellen oder dunkeln rothen Farbe für Arterien oder Venen erklären kann. Außerdem wird es noch dadurch schwerer, sehr kleine Arterien an der hellrothen Farbe ihres Blutes von sehr kleinen Venen zu unterscheiden, weil das Blut in den kleinsten Blutgefäßen wegen der starken Vergrößerung, die man anwenden muß, um diese kleinen Gefäße zu sehen, nur eine sehr blasse, kaum erkennbare rothe Farbe hat.

Die Wand der Haargefäße.

Die Wände der kleinsten Haargefäße, z. B. die an den durchsichtigen Theilen lebender Thiere, sind so durchsichtig, daß man sie selbst mittels des Mikroskops nicht, sondern nur die Körnchen in der Flüssigkeit, die sie enthalten, sehen kann, die man aber oft bei lebenden Thieren in den Haargefäßen so deutlich sieht, daß man sehr genau ihre Gestalt erkennt. Nicht selten wird man zu beiden Seiten der Blutströmchen eine helle oder eine dunkle Grenzlinie gewahr, welche die im Blutstrome vorbeitreibenden Blutkörnchen nicht überschreiten. Man muß daher eine Begrenzung der Höhle dieser kleinen Blutgefäße annehmen, ob man sie gleich wegen ihrer Durchsichtigkeit nicht immer sehen kann. Hätten die Haargefäße keine häutige Begrenzung, wären sie nur ausgehöhlte Wege, welche sich das Blut in dem weichen Thierstoffe selbst gebahnt hätte, so würde jeder geringfügige Druck diese Canäle ihrer Form, Zahl und Lage nach verändern, indem er bewirken würde, daß der weiche Thierstoff an den Stellen, an denen er gedrückt wurde, zusammenklebte, wodurch das Blut genöthigt werden müßte, sich in ihm, anstatt der verschlossenen, neue Wege zu bahnen.

Menge der Haargefäße in verschiedenen Theilen.

Die Haargefäße sind der Sammelplatz und das Ziel des Blutes. Denn in ihnen ist die größte Menge desselben enthalten, in ihnen fließt es am langsamsten, in ihnen kommt das in die kleinsten Strömchen vertheilte Blut in eine sehr innige Berührung mit den Wänden der Blutgefäße, und ist daselbst unstreitig dem Einflusse der Nerven aus-

Digitized by Google

gesetzt, in ihnen erleidet daher auch das Blut die sichtbarsten Verän derungen seiner Farbe und chemischen Beschaffenheit, und leistet den Körper die wesentlichen Dienste, zu denen es bestimmt ist. Die größeren Blutgefäße dagegen sind nur die Wege, durch welche das Blut aus den Haargefäßen des Körpers in die Haargefäße der Lungen und um gekehrt gelangt.

Nach Hales [1]), welcher die Haargefäße der Gedärme durch gefärbte, er starrende Flüssigkeiten anfüllte, hat der Theil des Haargefäßnetzes, welcher mit den Venen in der nächsten Verbindung steht, engere rundlichere Zwischenräume (Maschen), als der, welcher mit den Arterien näher zusammenhängt, der sich durch eckige und oft rechtwinkliche Zwischenräume auszeichnet. Die Röhren, aus denen sie bestehen, scheinen auch beträchtlich dicker zu sein.

Nicht in allen Theilen des Körpers aber sind die Haargefäße gleich groß und ihre Netze gleich dicht, d. h. nicht in allen Theilen gehen die baumförmig getheilten Arterien in die wurzelförmig zusammentretenden Venen so über, daß ein Netz von gleichförmig dicken Haargefäßen dazwischen liegt, und nicht in allen Theilen endlich machen die Haargefäße einen gleich großen Theil der Substanz der Organe aus; sondern in manchen Theilen liegt in den großen Zwischenräumen des Haargefäßnetze viel Substanz, welche nicht aus blutführenden Röhrchen besteht, in andern liegt zwischen den engeren Netzen derselben weniger solche Substanz. Von diesem Verhältnisse der Zahl der Blutgefäße in den Organen zu der Menge der Substanz in denselben, die weiter kein blutführenden Röhrchen enthält, hängen, wie Th. I. S. 175 gezeigt worden ist, viele sehr wichtige physikalische Eigenschaften und Lebenseigenschaften der Theile ab. Man kann dieses Verhältniß in durchsichtigen Theilen lebender Thiere durch die Beobachtung des Blutlaufs mittels des Mikroskops erkennen, in undurchsichtigen Theilen aber durch eine sehr vollkommene Anfüllung der Haargefäßnetze mittels einer festwerdenden, undurchsichtigen, nicht zusammentrocknenden Materie sichtbar machen; denn indem man diese Theile trocknet, wird ihre Substanz, wenn sie nicht zu dick ist, durchsichtig, vorzüglich wenn man sie, bevor man sie betrachtet, in Terpentinöl einweicht und dann mit einem durchsichtigen Lacke überzieht, wo man dann die angefüllten Gefäßnetze an ihnen erkennen kann. Auch sieht man es den Theilen schon während des Lebens an, ob sie sehr dichte Blutgefäßnetze einschließen oder nicht. Denn da das rothe Blut oder eine rothgefärbte eingespritzte Flüssigkeit durch die durchsichtigen Röhrchen durchschimmert, so sehen Organe, welche sehr dichte Blutgefäßnetze besitzen, roth oder röthlich, diejenigen aber, welche keine, oder Blutgefäßnetze mit weiten Zwischenräumen einschließen, nicht roth, sondern weiß oder gelblich aus, oder sind durchsichtig, selbst wenn sie dick sind. Daß nun diese gleichförmige röthliche Farbe, wie wir sie an den Lippen, an der ihrer Oberhaut beraubten Lederhaut am Fleische und an vielen Theilen bemerken, wirklich von dem durch die durchsichtigen blutführenden Röhrchen schimmernden Blute herrühre, kann man dadurch beweisen, daß solche im Tode blaß gewordene Theile dadurch, daß man die Haargefäße mit einer rothen Materie sehr vollkommen anfüllt, wieder roth werden und daß man dennoch, wenn man sie hierauf mit Hülfe des Mikroskops im trockneten Zustande betrachtet, nur die Netze der Haargefäße, nicht aber die Zwischenräume der Substanz der Theile mit der eingespritzten Materie erfüllt sind.

[1]) *Hales*, Haemastatique, traduit par *Sauvages*. Geneve 1744. 4. p. 132.

Digitized by Google

Dagegen verändern die Theile, welche keine sehr dichten Blutgefäßnetze enthalten, ihre Farbe auch nach dem Tode nicht, wenn ihre Blutgefäße mit einer getrübten Flüssigkeit angefüllt werden. Von dem durchschimmernden Blute rührt es auch her, daß z. B. die Fingerspitze röther aussieht, wenn man das Blut, indem man einen Finger umfaßt und drückt, nöthigt, sich daselbst anzuhäufen, daß aber die Röthe desselben sogleich verschwindet, wenn der Druck nachläßt, und umgekehrt, daß eine sehr rothe Stelle der Haut, auf die man mit der Fingerspitze einen Druck ausübt, unter der Fingerspitze und im nächsten Umkreise derselben blaß wird, augenblicklich aber ihre rothe Farbe wieder annimmt, wenn der Druck aufhört.

Auf dem Mangel aller Blutgefäße in gewissen Theilen beruhet zum Theil die Bd. I. S. 170 vorgetragene Unterscheidung der einfachen und zusammengesetzten Gewebe, auf der geringeren Zahl der Haargefäße der zusammengesetzten Gewebe die zwei in Bd. I. S. 173 und 175 betrachteten Unterabtheilungen.

Unter den von einem sehr dichten Haargefäßnetze durchdrungenen Theilen des Körpers zeichnen sich wieder diejenigen aus, welche Blut in größerer Menge aufnehmen, weil es nicht bloß zu ihrer Ernährung, sondern auch zur Bereitung und Absonderung gewisser Säfte dient. Dieses ist nämlich an der inneren Oberfläche der von einer Schleimhaut überzogenen Canäle, der Luftwege, des Darmcanals, der Harn- und Geschlechtswege, der Ausführungsgänge der Drüsen und an der äußeren Oberfläche der Lederhaut der Fall. An allen diesen Stellen haben die durch das Mikroskop erkennbaren Haargefäßnetze eine andere Gestalt, als in den Theilen, in welchen das Blut nur zur Ernährung der Substanz der Organe dient, und sowie alle diese Theile einen ähnlichen Zweck, den der Bereitung und Ausscheidung von Säften auf eine Oberfläche haben, so haben auch die Haargefäßnetze in denselben eine gewisse Aehnlichkeit. Ganz an der Oberfläche dieser Säfte-absondernden Häute nämlich liegt das engste Netz, welches diese Organe enthalten, so ausgebreitet, daß die untereinander zusammenhängenden Röhrchen längs der Oberfläche hinlaufen und in einer möglichst großen Berührung mit der Oberfläche sind.

Die Röhrchen, aus denen die Haargefäßnetze bestehen, sind ziemlich von einem und demselben Durchmesser, und daher sehen sie sehr gleichförmig und gitterartig aus, so daß Stämme und Zweige nicht unterschieden werden können. Dabei sind die Zwischenräume der Netze im Verhältnisse zu dem Durchmesser der Röhrchen, aus welchen sie zusammengesetzt sind, sehr eng. Die Röhrchen selbst aber sind nicht so eng, als die feinsten Blutgefäße, welche sich im Gehirn, in den Nerven und in den Muskeln zum Zwecke der Ernährung dieser Theile befinden.

Nutzen der verschiedenen Einrichtung der Haargefäßnetze.

Die so eben beschriebene Einrichtung dieser Netze hat den Nutzen, daß in jeder Blutstropfen recht lange dicht an derjenigen Oberfläche eingeführt werde, auf welche die aus ihm abzusondernden Säfte austre-

Digitized by Google

ten sollen. Hätten die Röhrchen, welche dieses Netz bilden, eine solche Lage gehabt, daß sie nicht längs der Oberfläche dieser Häute verliefen, sondern mehr senkrecht in dieselben eindrängen, so würde jeder in diese Theile eingeführte Bluttropfen nur sehr kurze Zeit an der Oberfläche haben verweilen können, und es würden sehr viele Blut zuführende Gefäßstämme nöthig gewesen sein, um so große Häute in allen Punkten mit Blut zu versehen. Wären hier ferner die Blutgefäße so eingerichtet gewesen, daß die baumförmig sich theilenden kleinen Arterien unmittelbar in wurzelförmig sich vereinigende Venen übergegangen wären, ohne daß zwischen diesen beiden Gefäßarten ein großes, sehr gleichförmiges Netz in der Mitte gelegen hätte; so würde das Blut, so bald es in die kleinen Arterien eingedrungen gewesen, alsbald durch die Venen zurückgeführt worden sein, und es würde daher nicht lange in den kleinsten Gefäßen an den Oberflächen der absondernden Häute verweilt haben. Dieser schnelle Durchgang des Bluts durch die Substanz eines Organs scheint bei dem Gehirne Statt zu finden. Denn in die Gehirnsubstanz treten sehr weit und sehr zahlreiche Blutgefäßstämme ein und aus, und dennoch enthält sie, wie schon ihre Farbe beweist, nicht viel Blut. Hier scheint aber auch die entgegengesetzte Einrichtung erforderlich zu sein, denn unstreitig enthält das Blut nicht viel von dem Principe, welches zur Ernährung der Gehirnsubstanz brauchbar ist, und jeder Tropfen Blut kann nicht lange im Gehirne umher geleitet werden, um ernährende Theile abzusetzen, sondern wird schnell derselben beraubt und zur Ernährung des Gehirns unbrauchbar. Wenn daher die Blutgefäße im Gehirn schnell in die kleinsten Zweige zertheilt werden, und diese selbst nicht sehr lang und sehr vielfach hin und her gewunden und in ein sehr dichtes und sehr ausgedehntes Netz verflochten sind, so erklärt sich hieraus, wie das Gehirn so große zu- und wegführende Gefäße haben und so arm an Blute sein könne. Unstreitig ist die Proportion der Zahl und Dicke der Blut zu- und wegführenden Gefäße zu den Haargefäßnetzen in jedem Theile von anderer Beschaffenheit. Eine andere also in dem Gehirne, als in den Muskeln und als in den Knochen und Knorpeln. So wie Teiche, die durch große und zahlreiche Bäche Zufluß und Abfluß haben, ihr Wasser schnell wechseln, eben so bestimmt die Zahl und Weite der Blut zu- und wegführenden Gefäße im Verhältniß der größeren und kleineren Gefäßnetze die Schnelligkeit, mit welcher das zugeführte Blut einen Theil wieder verläßt und die Menge des Bluts, welches in einer gegebenen Zeit durch das Organ durchfließt, nicht aber die Menge, die in jedem Zeitmomente in ihm vorhanden ist.

In den sich baumförmig zertheilenden Arterien und Venen läuft das Blut, wie später gezeigt werden wird, verschieden geschwind; in den Stämmen nämlich geschwinder, in den Zweigen dagegen desto langsamer, je öfter sich ein Arterienstamm in kleinere Zweige getheilt hat, und je weniger schon kleine Venen zu größeren zusammengetreten sind. In diesen sehr gleichförmigen Haargefäßnetzen dagegen kann das Blut an den verschiedenen Punkten desselben Netzes und also auch an den verschiedenen Stellen der Oberfläche derselben Haut mit ziemlich gleicher Geschwindigkeit fließen. Denn weil sich der von den Blutgefäßen eingeschlossene Raum nicht erweitert, wenn sich die Zahl der Gefäße durch eine Theilung in Zweige vermehrt, zugleich aber durch eine Vereinigung von Zweigen um eben so viel vermindert, so kann jeder Bluttropfen

Digitized by Google

während er durch ein so gleichförmiges Netz hindurchgeht, mit ungeänderter Geschwindigkeit fortfließen, was unstreitig für die Verrichtung der Absonderung wichtig ist.

Geschwindigkeit des Bluts in den Haargefäßen.

Die Geschwindigkeit, mit der sich das Blut in den Haargefäßen bewegt, ist sehr gering. Man muß sich schon die Geschwindigkeit, mit welcher sich das Blut in den größeren Gefäßen während des Lebens bewegt, viel geringer denken, als die ist, mit welcher das Blut aus größeren verletzten Gefäßen ausfließt. Denn aus einem verletzten Gefäße fließt das Blut ganz mit der Geschwindigkeit aus, welche der Druck hervorbringen kann, unter welchem sich das Blut im Gefäße befindet, denn hier fällt das Hinderniß weg, welches das weiter vorn befindliche Blut dem nachfolgenden entgegensetzt, und das zur Oeffnung hinströmende Blut wird daher auf seinem Wege nach der Oeffnung hin allmählig beschleunigt. Dessen ungeachtet weiß Jeder, wie langsam das Blut aus kleinen Schnittwunden selbst in sehr gefäßreichen Theilen, in welchen unzählige kleine Gefäße durch einen Schnitt durchschnitten werden, ausfließt. Hales hat hierüber an den Gedärmen eines Hundes Messingen gemacht. Er hatte durch eine Reihe von Versuchen den Druck kennen gelernt, welchen das in den Arterien befindliche Blut während des Lebens bei gesunden Thieren, namentlich bei Hunden und Pferden, erleidet, indem er eine leere senkrechte Glasröhre in verschiedene große Arterien mit ihrem gekrümmten Ende einbrachte und festband, so daß das in den Arterien vorwärts bewegte Blut in dieser Röhre in die Höhe steigen mußte. Die Höhe, bis zu welcher es stieg, gab das Maaß ab für den Druck, unter welchem das Blut in den Adern sich befand; denn das Blut stieg, wenn es die Gerinnung desselben nicht verhinderte, so lange in der Röhre in die Höhe, bis der Druck der in der Röhre befindlichen Blutsäule dem Drucke, den das Blut in den Arterien erfuhr, gleich war. Da er auf diese Weise die Kraft kennen gelernt hatte, mit welcher das Blut in den Arterien vorwärts gedrückt wird, so konnte er auch Flüssigkeit in die Arterien mit der nämlichen Kraft eintreiben. Zu diesem Zwecke band er eine an ihrem einen Ende gekrümmte 4 bis 5 Fuß hohe Röhre in den Anfang der Körperarterie bei ihrem Uebergange in den Bauch dicht über dem Ursprunge der Arteria mesenterica superior ein, erhielt sie in senkrechter Lage und mit lauwarmen Wasser gefüllt, und schnitt die Gedärme der Stelle gegenüber, wo sie am Gekröse befestigt sind, ihrer ganzen Länge nach auf. Ungeachtet das Wasser auf diese Weise durch den nämlichen Druck vorwärts getrieben wurde, welchen das Blut während des Lebens in den Arterien dieser Thiere erleidet, und auch unzählige Gefäße, die etwa doppelt so dick als ein Haar waren, durchschnitten worden waren, so floß doch das Wasser nicht in einem Strome aus, sondern schwitzte nur hervor, so daß nur 342 Kubikzoll Wasser in 400 Secunden ausliefen, was, da eine große Zahl von Blutgefäßen durchschnitten war, auf eine sehr langsame Fortbewegung des Wassers schließen läßt. Noch mehr habe ich mich von der Langsamkeit des Blutlaufs in den Haargefäßen durch das Mikroskop an durchsichtigen Theilen kaltblütiger Thiere überzeugt. Jeder, welcher das Mikroskop öfter zur Hand genommen hat, weiß, mit welcher überraschenden Geschwindigkeit kleine im Wasser sichtbare Theilchen durch das Sehfeld zu fliegen scheinen, wenn der Objectträger, auf welchem sich ein wenig Flüssigkeit befindet, nur sehr wenig geneigt wird, und während daher die wahre Bewegung der Flüssigkeit nur äußerst gering ist. Dieses kommt daher, weil die Geschwindigkeit eines betrachteten Theilchens auch 100 mal vergrößert erscheint, wenn der Durchmesser desselben 100 mal größer gesehen

Digitized by Google

wird. Da man nun dessen ungeachtet die Blutkörnchen in den kleinsten Gefäßen kaltblütiger Thiere nicht so schnell fortrücken sieht, daß man dadurch gehindert wäre, die Blutkörnchen einzeln zu unterscheiden und sogar ihre Gestalt zu beurtheilen, so muß die Bewegung derselben äußerst langsam sein. Hiermit stimmen auch die Messungen und Berechnungen, welche Keill und Hales gemacht haben, gut überein. Nach Hales durchlief das Blut in den Haargefäßen des geraden Bauchmuskels eines Frosches in 1 Secunde ungefähr $^1/_8$ Linie, in den der Lungen aber, wo es geschwinder als in irgend einem andern Haargefäßnetze fortgetrieben wird, ungefähr in 1 Secunde $^1/_2$ Zoll = 6 Linien. Die Bewegung des Bluts war in den Haargefäßen der Lungen ungefähr 40 mal, oder wenn ich auf die hier weggelassenen Bruchtheile Rücksicht nehme, 43 mal geschwinder als in den Haargefäßen der Muskeln [1]). Unstreitig fließt es in dem Haargefäßnetze jeder andern Classe von Organen mit einer andern Geschwindigkeit, und diese bestimmte Geschwindigkeit hat gewiß auf die Verrichtung der Theile einen wesentlichen Einfluß.

Die Geschwindigkeit, die das Blut in den Haargefäßen hat, hängt, wenn die Kräfte, die es vorwärts treiben, gleich groß sind, sehr von der minderen Engigkeit der Haargefäße, die den Uebergang aus den Arterien in die Venen vermitteln, ab. Denn je enger die Haargefäße sind, desto mehr hängt sich das klebrige Blut an den Wänden derselben an, und desto größer ist die Reibung. Keill [2]) hat den Widerstand, den das Blut in den kleinen Adern bei seinem Uebergange in die Venen erfährt, auf eine sinnreiche Weise gemessen. Keill ließ nämlich aus der quer durchschnittenen Schenkelvene, und nachher auch aus der quer durchschnittenen Schenkelarterie eines lebenden Hundes Blut ausfließen, und verglich die Mengen Blut, die in einer gleich großen Zeit aufgefangen werden. Während aus der Schenkelvene 3 Theile Blut ausflossen, strömten aus der Schenkelarterie 7 $^1/_2$ Theile aus. Obgleich die kleinen Arterien durch ihre eigne lebendige Kraft etwas zur Ueberwindung der Reibung des Bluts an den Wänden der Haargefäße beitragen, so verhielt sich hier dennoch der Verlust der Geschwindigkeit, den das Blut durch seine Reibung in den kleinen Gefäßen erlitt, wie $^9/_{15}$. Denn wenn die Gefäße unverletzt sind, fließt durch die Schenkelvene alles das Blut zurück, welches durch die Schenkelarterie in den Schenkel einströmt, und folglich hätte, wenn es die Reibung des Bluts in den Gefäßen nicht verhindert hätte, in derselben Zeit eben so viel Blut durch die quer durchschnittene Vene, als durch die quer durchschnittene Arterie ausfließen müssen. Der oben erwähnte, von Hales [3]) an todten Hunden angestellte Versuch, wo er die Dünndärme und Dickdärme eines Hundes ihrer ganzen Länge nach, an der Stelle, welche der Befestigung des Mesenterium gegenüberliegt, aufschnitt (weil er auf dieser Stelle die Därme aufschneiden konnte, ohne andere als sehr kleine Blutgefäße zu durchschneiden) und hierauf eine 4 $^1/_2$ Fuß lange senkrechte Röhre mit ihrem gekrümmten Ende in die Aorta an der Stelle, wo die Arteria mesenterica entspringt, einband und mit Wasser gefüllt erhielt, giebt auch eine ungefähre Vorstellung von dem Hinderniſſe, den das Wasser auf seinem

[1]) Thomson, in seiner Schrift über die Entzündung, hält es für unmöglich, daß man die Geschwindigkeit der Blutkügelchen in den durchsichtigen Haargefäßen kaltblütiger Thiere messen könne, und in der That hat er Recht, rücksichtlich der Mikroskope, die sehr stark vergrößern und ein kleines Sehfeld haben. Wenn man aber ein Mikroskop anwendet, welches nur so stark vergrößert, um die Blutkörnchen noch eben sehen zu können, dagegen aber ein sehr großes Sehfeld besitzt, so kann man die Geschwindigkeit der Blutkörnchen allerdings messen. Indessen ist die von Hales gemachte Messung noch sehr unvollkommen und daher nur ungefähr gültig, denn er hat sich keiner Tertienuhr, sondern einer gewöhnlichen Taschenuhr dabei bedient.

[2]) *Keill*, Tentamina medico-physica. London 1718. Tent. 3. p. 50.

[3]) *Hales*, Haemastatique, traduit par Sauvages. S. 39. sq.

Digitized by Google

Wege aus der Aorta bis zu den durchschnittenen Gefäßen erfuhr, die etwa noch einmal so dick als ein Haar waren. Denn das Wasser trat bei diesem Versuche aus der Durchschnittsfläche der Gedärme so langsam aus, daß durch die kleinen durchschnittenen Gefäße in 400 Secunden nur 340 Kubikzoll Wasser ausflossen. Dagegen floß, wenn er das Experiment so abänderte, daß er die Stämme, aus welchen alle diese kleinen Gefäße entspringen, kurz vor ihrem Uebergange zu den Gedärmen durchschnitt, dieselbe Menge Wasser in 140 Secunden, d. h. in ⅓ der Zeit aus, die es vorher zum Ausfließen brauchte. Nimmt man also an, daß bei diesem Versuche kein Wasser durch die Haargefäße der aufgeschnittenen Därme in die Venen übergegangen, sondern daß alles Wasser zur Schnittfläche der aufgeschnittenen Därme ausgeflossen sei; so kann man folgern, daß bei dem ersteren Versuche ⅔ der Kraft durch die Reibung des Wassers in den kleinen Gefäßen verloren gegangen sei. Man sieht aus allen diesen Versuchen, daß zwar das Hinderniß, welches das circulirende Blut in den Haargefäßen erleidet, sehr beträchtlich ist. Allein es ist keineswegs so groß, als Bichat es sich gedacht hat, welcher glaubte, der Druck, welchen das Herz auf das Blut hervorbringe, erstrecke seine Wirkungen nur bis in die Haargefäße, aber nicht bis in die Venen. Die oben angeführten Versuche beweisen das Gegentheil.

Bichat hat sich aber unstreitig das Hinderniß, welches der Fortbewegung des Bluts in den Haargefäßen entgegensteht, zu groß gedacht, indem er annahm, daß die Kraft des Herzens das Blut nicht durch sie hindurchtreiben könne. Denn da Hales mit Blut vermischtes Wasser durch den Druck einer 9½ Fuß hohen Wassersäule bei todten Thieren aus den Arterien in die Venen übergetrieben hat (siehe S. 32 und 33), so darf man wohl nicht daran zweifeln, daß während des Lebens auch das Herz dieses vermöge. Außer der Engigkeit der Haargefäße aber, welche in verschiedenen Classen von Organen verschieden zu sein scheint, giebt es noch zwei andere Umstände, die auf die Geschwindigkeit des Blutlaufs in den einzelnen Abtheilungen des Gefäßsystems einen Einfluß haben. Diese sind theils die Länge der Canäle, vorzüglich der engen, durch welche das Blut vorwärts gedrängt werden muß, (denn je länger die kleinen Canäle sind, in denen die Reibung sehr groß ist, desto größer wird das Hinderniß, das dem Blute entgegensteht), theils das Gewicht der Blutmasse, die durch das nachkommende Blut vorwärts gedrängt werden muß. Indessen scheint dieser letztere Umstand nicht sehr in Betracht zu kommen.

Ehemals glaubten viele Physiologen, daß auch die stumpferen oder spitzigeren Winkel, unter welchen die Aeste aus den Röhren abgehen, einen Einfluß auf die Geschwindigkeit des Bluts hätten. Durch den Ursprung der Aeste unter einem spitzigeren Winkel nämlich würde der Fortgang des Bluts weniger gehemmt, als durch den Ursprung der Aeste unter einem minder spitzigen. Allein dieser Umstand hat nur dann einen Einfluß auf die Geschwindigkeit einer Flüssigkeit, wenn sie bei ihrer Fortbewegung so wenig Widerstand erleidet, daß ihr Lauf durch

Digitized by Google

Summirung der Stöße, die sie empfängt, nach einer bestimmten Richtung hin beschleunigt wird. Wenn dagegen der Widerstand, den die Flüssigkeit bei ihrer Bewegung erfährt, so groß ist, daß die Stöße in jedem Momente dadurch aufgehoben werden und sich also nicht summiren können, so daß vielmehr diese Flüssigkeit, im Falle die Druckkräfte plötzlich zu wirken aufhörten, auch sogleich stillstehen würde; so haben die spitzigeren oder weniger spitzigen Winkel keinen merklichen Einfluß auf die Geschwindigkeit. Die Flüssigkeit in den Röhren befindet sich unter diesen Umständen überall unter dem nämlichen Drucke und strebt mit gleicher Kraft nach allen Richtungen hin auszuweichen, und sie tritt daher, die Winkel mögen spitzer oder weniger spitz sein, in alle abgehenden Röhren mit gleicher Gewalt ein.

Haargefäße in verschiedenen Geweben.

Da, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, von der verschiedenen Einrichtung der Haargefäßnetze in verschiedenen Theilen so viel abhängt, so macht die Untersuchung derselben einen vorzüglich wichtigen Theil der Anatomie aus. Indessen bewirkt die große Schwierigkeit, die mit einer solchen Untersuchung verknüpft ist, daß man bis jetzt nur noch eine sehr unvollkommene Kenntniß der Haargefäße in verschiedenen Theilen besitzt.

Die Theile, welche mit sehr dichten Blutgefäßen durchzogen sind, nehmen, wie schon gesagt worden, eine röthliche Farbe an, wenn ihre Blutgefäße sehr vollkommen mit einer rothgefärbten Materie angefüllt werden. Im frischen Zustande ist indessen die rothe Farbe nicht so lebhaft, als im getrockneten, theils, weil die Theile oft von undurchsichtigen oder unvollkommen durchsichtigen, weniger gefäßreichen Substanzen bedeckt sind, welche, wenn man sie austrocknet, an Umfang sehr abnehmen und zugleich durchsichtig werden, theils, weil die Röhrchen, sobald sie mit gefärbten, durch Trocknen an Umfang nicht abnehmenden Materien gefüllt sind, selbst durch Trocknen an Umfang nicht abnehmen, während doch die zwischen ihnen befindliche thierische Materie zusammentrocknet, die die Röhrchen zuvor auseinander hielt. Man darf sich daher auch die Blutgefäßnetze nicht als so dicht vorstellen, als sie an getrockneten Theilen des menschlichen Körpers zu sein scheinen. Ob man nun gleich aus der Ansicht, welche die sehr vollkommen angefüllten Blutgefäße im getrockneten Zustande darbieten, keine ganz richtige Vorstellung davon, wie sie im ungetrockneten Zustande beschaffen sind, erhält; so kann man doch die Verschiedenheit der Theile unter einander hinsichtlich der Kleinheit und Zahl ihrer kleinen Blutgefäße dadurch erkennen. Burdach [1], Oesterreicher [2] und ich selbst haben daher gesehen, daß die Einrichtung des Haargefäßnetzes an den nämlichen Theilen des Körpers dieselbe war, wenn auch die Theile von verschiedenen Menschen genommen, oder von verschiedenen Anatomen sehr vollkommen angefüllt waren. Prochaska [3], welcher nächst Lieber

[1] Burdach, Ueber die Haargefäße, mit Hinsicht auf die Lieberkühnschen Präparate in Petersburg, in d. russischen Sammlung herausgegeben von D. Ehrichton, Reimann und Burdach. 1817. B. II. Heft 3.

[2] Oesterreicher, Versuch einer Darstellung der Lehre vom Kreislaufe des Blutes. Nürnberg 1826. S. 13.

[3] Disquisitio anatomico-physiologica organismi humani ejusque processus vitalis, auct. *Georgio Prochaska*. c. Tab. aen. Viennae 1812. 4. 96. sq.

Digitized by Google

kühn durch die Kunst, die feinsten Haargefäße sehr vollkommen mit gefärbten erstarrenden Flüssigkeiten anzufüllen, vorzüglich berühmt ist, eine Kunst, welche er von Barth in Wien gelernt hatte, und mit welcher sich auch Sömmerring, Fleuland und Döllinger in München, Seiler in Dresden und Pockels in Braunschweig mit vorzüglichem Erfolge beschäftigt haben, hat über diesen Gegenstand ausführlich gehandelt, und ist durch seine Betrachtungen der künstlich gefüllten Haargefäße der frischen und getrockneten Theile zu folgenden, von mir ins Kurze zusammengezogenen Resultaten geführt worden:

In die Nägel, Haare und in die Oberhaut dringt niemals die eingespritzte Flüssigkeit ein, und sie werden daher niemals roth. Die zweifache Substanz der Zähne erhält keine Gefäße, die Zähne haben nämlich nur an der Oberfläche ihrer Höhle Gefäße. In dem Glaskörper werden, nach Prochaska, niemals Blutgefäße sichtbar, zur Linse gehören nur wenige, und diese scheinen vielmehr der Kapsel der Linse anzugehören.

Die die Knochenenden überziehenden Knorpel behalten, wenn gefärbte Flüssigkeiten in die feinsten Blutgefäße eingespritzt werden, ihre Farbe ungeändert, die Sehnen und Bänder der Knochen werden dabei gar nicht roth, sondern behalten auch die ihnen eigenthümliche Farbe, denn sie haben, wenn man die wenigen Gefäße abrechnet, welche das sie einhüllende Zellgewebe durchziehen, gar keine Gefäße. Die vielen Gefäße, welche den Muskelfasern zukommen, treten daher an der Stelle, wo die Muskelfasern in die Sehnenfasern übergehen, nicht zu den Sehnenfasern über, sondern endigen sich meistens blind, oder sie beugen sich zuweilen um und laufen zu den Muskeln zurück. Die Knochenhaut sieht unter diesen Umständen frisch und mäßig roth aus, getrocknet röther, weil sie nicht wenig Blutgefäße enthält, die größtentheils nicht ihr angehören, sondern in die Knochen übergehen. In den Knochen machen die Blutgefäße nur einen sehr kleinen Theil aus, indessen enthalten sie bei Kindern weit mehr Blutgefäße, als bei Erwachsenen. Die harte Hirnhaut verhält sich wie die Knochenhaut. Die Spinnwebenhaut des Gehirns wird niemals roth; die weiße Gehirnsubstanz wird niemals, auch bei der vollkommensten Anfüllung der Blutgefäße, sehr roth, eben so die Nerven, und namentlich zeigt auch die Netzhaut wenig Blutgefäße. Die graue Gehirnsubstanz ist viel reicher an Blutgefäßen und röthet sich daher bei der Einspritzung weit mehr. Der nicht mit den Gelenkknorpeln verwachsene Theil der Synovialhäute, der Gelenksäcke und vorzüglich auch die mit Fett erfüllten Falten derselben röthen sich an ihrer innern Oberfläche sehr, keineswegs aber der Theil derselben, der die Gelenkknorpel überzieht, vielmehr beugen sich die Gefäßröhrchen an der Grenze, wo die Gelenkhaut auf die Gelenkknorpel übergeht, plötzlich um und kehren zum nicht angewachsenen Theile dieser Haut zurück. Die Wände der Fettzellchen an der innern Oberfläche der Haut sind von einem Netze sehr dünner, unstreitig zur Absonderung des Fetts bestimmter, Blutgefäße umgeben. Die von ihren zelligen Scheiden enthüllten Muskeln werden stark roth, weil der Färbestoff die sehr zahlreichen engen, der Länge der Fleischfasern nach verlaufenden, unter einander vielfach communicirenden, Haargefäße erfüllt. Im Ganzen sieht die innere Oberfläche der Haut, so lange sie nicht getrocknet, in Folge der Einspritzung wenig roth aus, denn sie besteht aus Lamellen, welche nicht nur selbst sehr wenig Blutgefäße besitzen, sondern auch die zahlreicheren Blutgefäße der oberflächlichen Lage der Haut verdecken. Daher kommt es denn, daß die Haut im getrockneten Zustande auch an ihrer inneren Oberfläche sehr roth wird, denn beim Trocknen nehmen diese Lamellen der inneren Oberfläche der Haut sehr am Umfange ab, und lassen vermöge ihrer Durchsichtigkeit die Gefäße der sehr gefäßreichen oberflächlichen Lage der Haut durchschimmern.

Die äußere Lage der Haut sieht, wenn gefärbte Flüssigkeit eingespritzt und die Oberhaut entfernt worden ist, sehr stark roth aus, ganz vorzüglich in der Hohlhand und im Hohlfuße. Durch das Mikroskop sieht man ein Netz sehr enger und nicht bei ihrer Zertheilung in ihrem Durchmesser noch ferner abnehmender Röhrchen, in deren äußerst kleinen Zwischenräumen sich eine nicht aus Röhrchen bestehende Substanz befindet, die ungefähr der Menge nach nur eben so viel zu betragen scheint, als die aus Gefäßen bestehende Substanz. Aus diesem Netze steigen die allerfeinsten Gefäße zu den Hautwärzchen empor, von denen sich manche blind zu endigen scheinen, die meisten jedoch wieder in das Gefäßnetz der Haut zurückgehen. Die Hautdrüsen des Ohrs stellen sich als kleine Höhlen dar, die

von einem Netze von derselben Beschaffenheit, wie das an der Oberfläche der Lederhaut befindliche, überzogen sind. Die ganze innere Oberfläche des Mundes, die der Haupthöhlen der Nase (jedoch nicht die der Nebenhöhlen) und der an denselben befindlichen Höhlen der einfachen Schleimdrüsen, die des Magens und der in dessen Wänden befindlichen kleinen dicht neben einander stehenden Zellen, die der dünnen Gedärme und ihrer Zellen, die der dicken Gedärme und ihrer kleinen, sehr zahlreichen Zellen, sind gleichfalls von einem so dichten Netze von derselben Beschaffenheit bedeckt, und dasselbe gilt von der innern Oberfläche der Harnleiter, der Harnblase, der Harnröhre, der Muttertrompeten, des Uterus und der Scheide. Von einem auf dieselbe Weise gebildeten, an der Oberfläche ausgebreiteten Netze sind die Zellen und Luftröhrenäste der Lungen und die Ausführungsgänge der Drüsen, namentlich die der Speicheldrüsen und der Leber überzogen, und auch die Aderhaut des Auges ist mit einem sehr dichten Netze an ihrer inneren, die schwarze Farbe absondernden, Oberfläche bedeckt [1]).

Messungen an Haargefäßen, die an Lieberkühnschen Präparaten sichtbar sind.

Auf diese Beobachtungen von Prochaska lasse ich nun einige von mir gemachte Untersuchungen über den Durchmesser der Röhrchen, aus welchen die Haargefäßnetze in verschiedenen Theilen des Körpers bestehen, folgen. Ich wählte zu diesem Zwecke auf der reichen anatomischen Sammlung in Berlin getrocknete, mit durchsichtigem Lack überzogene und dadurch auf Glas befestigte Stücke menschlicher Theile aus, in welchen die Blutgefäße von dem berühmten Lieberkühn so vollkommen mit gefärbter Materie angefüllt worden waren, als es irgend möglich ist. Ohne daß der mindeste Erguß solcher Materie ins Zellgewebe Statt gefunden hatte, waren die Röhrchen strotzend erfüllt und bildeten sehr gleichförmige Netze, an welchen nur selten Gefäßenden, welche nicht mit andern Gefäßen verbunden gewesen wären, sichtbar waren. Die engsten Röhrchen kamen in der Gehirn- und in der Nervensubstanz vor, und auch in den Muskeln waren sie sehr eng; aber die Zwischenräume zwischen ihnen waren weiter und unregelmäßiger als an den an der Oberfläche der Haut und der Schleimhäute gelegenen Ge-

[1]) Diese von Prochaska gemachten Untersuchungen, welche die einzigen sind, wo die Haargefäßnetze, welche so fein mit erstarrenden Flüssigkeiten angefüllt worden waren, in nicht getrockneten und in getrockneten Theilen des menschlichen Körpers verglichen wurden, enthalten zum Theil Beweise für die allgemeinen Betrachtungen, welche ich oben über die Haargefäße angestellt habe. Ich bedauere, daß ich, als ich im Jahre 1821 in Wien eine schöne Reihe Prochaska'scher Präparate betrachtete, welche Hr. von Lenhossek besaß, und mir zu zeigen die Güte hatte, noch nicht darauf eingerichtet war, die Durchmesser der Gefäße undurchsichtiger Theile durch das Mikrometer zu messen. Dieses würde mich in den Stand gesetzt haben, die Prochaska'schen Präparate genauer mit den Lieberkühn'schen zu vergleichen.

Digitized by Google

fäßnetzen, welche zur Absonderung eines Saftes und nicht allein zur Ernährung dienten. An einem mit No. 36 bezeichneten Stücke der Rindensubstanz des Gehirns, ferner an einem mit 64 bezeichneten Stücke der Medullarsubstanz des Gehirns, und endlich an einem mit No. 74 bezeichneten quer durchschnittenen Nerven, hatten die Röhrchen des kleinsten Gefäßnetzes im Mittel einen Durchmesser von wenigstens 0,003 Par. Lin., oder ungefähr von ein wenig mehr als $^1/_{333}$ P. Lin. $= ^1/_{3996}$ P. Zoll; es gab aber viel Röhren, welche viel enger waren, und einzelne Röhrchen und einzelne Stellen an den Röhrchen, welche sogar enger als $^1/_{5000}$ Zoll waren. Die sehr unregelmäßigen Zwischenräume in diesem Gefäßnetze in der Medullarsubstanz waren etwa $^1/_{77}$ P. L. oder $^1/_{814}$ P. Zoll breit und $^1/_{40}$ Linien $= ^1/_{480}$ Zoll lang, manche derselben waren auch noch kleiner. Die Zwischenräume waren demnach etwa ihrer Länge nach 8 bis 10 mal, und ihrer Breite nach 4 bis 6 mal größer als der Durchmesser der Röhrchen. Eben so verhielten sich die kleinen Gefäßnetze und ihre Zwischenräume an dem Querschnitte des Nerven. Dagegen waren die Röhren, welche das feinste Gefäßnetz an der Oberfläche der Schleimhäute, namentlich an der Schleimhaut der Nase, der Lippen, an der innern Haut der Augenlieder, an der innern Haut des Magens, des Dünndarms, des Dickdarms und an der der Lederhaut ausmachten, viel dicker, denn Röhren, welche im Mittel $^1/_{333}$ Par. Lin. $= ^1/_{3996}$ Pariser Zoll im Durchmesser hatten, gehörten zu den feineren, und häufig war der Durchmesser der Gefäße, welche den Haupttheil des sehr gleichförmigen Haargefäßnetzes dieser Oberflächen ausmachten, nicht viel von $^1/_{3000}$ Zoll entfernt. Auch waren die Zwischenräume zwischen den Röhrchen enger, oft nur von einem 3 bis 4 mal so großen Durchmesser, oder gar so schmal, daß ihr Durchmesser nicht größer oder kaum so groß als der der Röhrchen war. Zugleich hatte das Netz eine regelmäßigere Form, und lag so an der Oberfläche ausgespannt, daß die Blutgefäße in einer möglichst großen Berührung mit derselben waren. An den das Fett absondernden Bläschen des Zellgewebes bildeten noch dickere Röhrchen ein sehr gleichförmiges Netz; aber außer ihnen gab es engere Röhrchen, welche den an der Oberfläche der Schleimhäute und der Lederhaut gleichkamen. Aber der Durchmesser der Zwischenräume zwischen ihnen war 8 bis 12 mal größer, als der der engeren Gefäße an den Schleimhäuten. Auch an der Knochenhaut, wo die Röhrchen des feinsten Gefäßnetzes gleichfalls ungefähr den Durchmesser hatten als an den der Oberflächen der Schleimhäute und der Lederhaut, waren die Zwischenräume zwischen ihnen viel größer und unregelmäßiger, als die an den Netzen jener Häute.

Um auch den Durchmesser der kleinsten Blutgefäße zu bestimmen, wenn sie vom Blute, nicht aber von künstlich eingespritzten Flüssigkeiten ausgedehnt wären, maß ich sie an einem sehr stark mit Blut angefüllten Hodensacke eines neugebornen Kindes, an welchem sich die Oberhaut leicht abziehen ließ. Ich fand den Durchmesser der engsten Haargefäße, die ich sah, $^1/_{525}$ Par. Zoll. In den röhrenartigen Zwischenräumen, die sich in dem in der Verknöcherung begriffenen Theile des Knorpels der Kniescheibe dieses Kindes gebildet hatten, befanden sich Netze rother Blutgefäße, deren Durchmesser $^1/_{144}$ Pariser Zoll groß war.

Gestalt der Blutgefäßnetze, die nicht zu den allerkleinsten gehören.

Wenn man nicht bloß die kleinsten, sondern auch andere kleine nur durch das Mikroskop erkennbare, jedoch baumförmig in Zweige getheilte Arterien in verschiedenen Theilen unter einander vergleicht; so findet man, daß sehr viele Theile des Körpers durch die verschiedene Menge und

Digitized by Google

Dicke der von einem Arterienstämmchen nach einander abgehenden Aeste, durch die Verschiedenheit der Winkel, unter welchen sie abgehen, und durch die Verschiedenheit der Krümmungen, der Vereinigungen und Zusammenmündungen dieser Zweige in den verschiedenen Theilen ein verschiedenes, sich gleich bleibendes Ansehn besitzen, so daß man im Stande ist, ein Stückchen getrocknete Leber, Niere und Schilddrüse an den durch das Mikroskop betrachteten angefüllten kleinen Gefäßen zu unterscheiden. Sömmerring [1]), von welchem diese Bemerkung gemacht worden, sagt, daß die Verzweigung der Arterien in den dünnen Därmen einem unbelaubten Bäumchen, im Mutterkuchen einem Quästchen, in der Milz einem Sprengwedel, in den Muskeln einem Reiserbündel, in der Zunge einem Pinsel, in der Leber einem Sterne, an den Hoden und im Adergeflechte des Hirns einer Haarlocke, in der Blendung vorn einem Kranze, hinten ringsum die Blendung einem Fältchen; in der Linse einem Federbusche, in der Gefäßhaut des Gehirns einer Franze, in der Riechhaut einem Gitter ähnlich sei. Döllinger [2]) hat die Vertheilungsart der sehr kleinen Arterien in den Bewegung hervorbringenden Theilen des thierischen Körpers verglichen. Er findet, daß sie in den Muskeln, seien es nun Muskeln eines Menschen, oder eines Vogelmagens, oder eines Fisches, ganz eigenthümlich und sich gleichbleibend ist, daß man an allen diesen Stellen Muskeln, deren Blutgefäße vollkommen mit einer gefärbten Materie erfüllt worden, schon durch die Vertheilung der kleinen Blutgefäße als Muskeln erkennen und von der Substanz des Uterus, der Arterien der Regenbogenhaut des Auges unterscheiden könne. Vieles hängt unstreitig hierbei von der Gestalt der kleinen Theile, aus welchen ein Organ besteht und welches die kleinen Gefäße umschlingen, und von der größern oder geringern Zahl der kleinen Blutgefäße, welche in einem kleinen Raume Platz finden müssen, ab. Daher ist die Vertheilungsart der kleinen Blutgefäße eine ganz andere in der Medullarsubstanz der Nieren, welche aus convergirenden, dicht nebeneinander liegenden Fasern besteht, als in der Rindensubstanz derselben, die größtentheils aus kleinen Körnchen zusammengesetzt ist. An den meisten Theilen bilden schon Arterien, die noch ziemlich groß sind, durch ihre Vereinigung Netze, in den Zwischenräumen dieser Netze zertheilen sich die Aeste dieser Arterien, und so entsteht daselbst ein aus noch engeren Röhrchen bestehendes Netz, in dessen Zwischenräumen sich abermals noch dünnere Zweige verbreiten. End-

---

[1]) S. Th. Sömmerring, Vom Baue des menschlichen Körpers. Th. IV. Frankfurt a. M. 1801. S. 93. 94.

[2]) *Döllinger*, Bemerkungen über die Vertheilung der feinsten Blutgefässe in den beweglichsten Theilen des thierischen Körpers. *Meckels* Archiv, VI. 186. 1820.

Digitized by Google

lich gehen, wie Hales [1]) beobachtete, diese kleinen Arterien in die Venen über, deren kleinste Netze dadurch von den kleinsten Arteriennetzen unterschieden waren, daß ihre Zwischenräume nicht so eckig als die der Arteriennetze, und nicht so groß, sondern runder und kleiner waren.

Verschiedenheit der Haargefäßnetze in verschiedenen Lebensaltern und in Krankheiten.

Die Zahl der Haargefäße in einem Theile, und also auch die Dichtigkeit der Netze derselben ist während der verschiedenen Lebensperioden eines Thieres oder eines Menschen wahrscheinlich sehr verschieden. Bei sehr jungen Froschlarven ist, wie ich mich durch eigne Beobachtungen überzeugt habe, die Zahl der Blutströmchen im durchsichtigen Schwanze kleiner als bei größeren, die Netze derselben werden, während die Froschlarve wächst, eine Zeit lang dichter, und die Gefäßbogen, durch welche Arterien und Venen zusammenhängen, vermehren sich. Nach Döllinger [2]) vermehren sich die Haargefäßbogen am Schwanze und am Körper sehr kleiner, noch durchsichtiger, im Wachsthume begriffener Fische. Man kann, nach ihm, ein solches Thierchen nicht 5 Minuten lang betrachten, ohne die Entstehung neuer Strömchen und die Bildung neuer Zwischenbogen wahrzunehmen. Die knorplichen Grundlagen der Knochen des Menschen sind zur Zeit der Bildung der Knochen an den Stellen, wo sie im Begriffe sind zu verknöchern, weit gefäßreicher als nachdem sie verknöchert sind, und der Gefäßreichthum der Knochen und anderer Theile nimmt mit den Jahren auch bei dem Menschen sehr ab. Aber nicht nur in den verschiedenen Lebensaltern vermehrt und vermindert sich die Zahl der kleinen Blut führenden Röhrchen, sondern dasselbe scheint oft und in viel kürzerer Zeit in Krankheiten zu geschehen. An Orten, wo zuvor keine Blutgefäße vorhanden waren, z. B. in der von manchen entzündeten Theilen abgesonderten geronnenen Lymphe, bilden sich Blutgefäße, namentlich in der von der Brusthaut und von der Bauchhaut unter solchen Umständen ausgeschwitzten Lymphe, werden, wie ich mich durch Injectionen selbst überzeugt habe, häufig durch die Anfüllung der Blutgefäße mit gefärbten Materien, nach dem Tode Blutgefäße sichtbar [3]). Es ist daher theils an sich nicht unwahrscheinlich, daß sich auch in Theilen, welche schon Blutgefäße enthalten, während sie entzündet sind, die Zahl der kleinen Blutgefäße vermehren könne, theils

---

[1]) *Hales*, Haemastatique, p. 132.

[2]) *Döllinger* in *Meckels* Archiv für die Physiologie. B. VI. Halle 1820. p. 198.

[3]) Ueber diese neuerzeugten Gefäße hat auch kürzlich *J. L. C. Schröder van der Kolk* Observationes anatomico-pathologici et practici argumenti. c. 3 tabb. lith. Amstelodami 1826. p. 41. Beobachtungen mitgetheilt.

Digitized by Google

lehren dieses die mikroskopischen Beobachtungen Gruithuisens [1]), Hastings [2]) und Kaltenbrunners [3]) an durchsichtigen entzündeten Theilen lebender Thiere geradezu. Alle diese Schriftsteller sahen sowohl, daß, während ein Theil entzündet ist, viele Wege, in denen zuvor Blut floß, ungangbar werden, als auch daß neue Wege entstehen, um sich mit den schon vorhandenen Blutgefäßen in Verbindung zu setzen. Ich besitze ein Stückchen eines sehr glücklich von Dr. Pockels in Braunschweig injicirten kranken Knochens, in welchem die knorpligen und häutigen Theile, in welchen der Proceß der Heilung und Wiedererzeugung vor sich ging, von einem so dichten Netze sehr enger Blutgefäße erfüllt ist, daß diese anderwärts nicht so gefäßreichen Theile in dem krankhaften Zustande mit zu den gefäßreicheren Theilen des Körpers gezählt werden müssen.

Giebt es Gefäße des Kreislaufs, die nur Blutwasser führen?

Ehemals nahmen Boerhaave [4]), Vieussens [5]), Ferrein [6]), Haller [7]), Sömmerring [8]), Bleuland [9]), Bichat und andere Anatomen, Gefäße an, welche den Uebergang der Säfte aus den Arterien in die Venen vermitteln hülfen, sich aber dadurch von den zu denselben Zwecke dienenden Blutgefäßen unterschieden, daß sie zu eng wären, um rothes Blut aufnehmen zu können, und daher nur Serum führten, und seröse Gefäße, vasa serosa, hießen. Leeuwenhoek glaubte sogar dergleichen Gefäße, die viel enger als die wären, welche die Blutkörnchen nur in einer einfachen Reihe durchlassen, häufig genug gesehen zu haben, was aber, wie Theil I. S. 132, 133 gezeigt worden ist, auf einer mikroskopischen Täuschung beruhete. Vieussens nannte diese hypothetisch angenommenen Gefäße Ductus lymphatico-nerveos. Daß es seröse Gefäße gebe, schlossen einige von jenen Anatomen auch

---

[1]) Gruithuisen in der Medicinisch-chirurgischen Zeitung, B. II. Salzburg 1811. 8. 1822. S. 312. Desselben Organozoonomie. München 1811. Vorrede, VI. und endlich dessen Beiträge zur Physognosie und Eautognosie. München 1812. S. 87.

[2]) *Hastings*, A treatise on inflammation of the mucous membranes of the lungs. London 1820. *Horns* Archiv 1821. Sept. 467 sq.

[3]) *Kaltenbrunner*, experimenta circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione, cum IX Tabb. Monachii 1826. 4. S. 23 sq.

[4]) *Boerhaave*, Oratio de usu ratiocinii mechanici in medicina habita, 1702 L. B. 1703. Ed. nova 1730. p. 11.

[5]) *Vieussens*, Novum vasorum corporis humani systema. Amstelodami 1705. 12

[6]) *Ferrein*, in Mém. de Paris 1741. in 8. S. 506. 1749 in 8. S. 721 in 4 S. 497.

[7]) *Alberti Halleri* de partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus Lib. II. §. 31.

[8]) S. Th. Sömmerring, vom Baue des menschlichen Körpers. Th. 4. §. 72.

[9]) *J. Bleuland*, Experimentum anatomicum, quo arteriarum lymphaticarum existentia probabiliter adstruitur institutum, descriptum et icone illustratum Lugd. Batav. 1784. 4.

Digitized by Google

daraus, daß manche Theile des menschlichen Körpers, die im gesunden Zustande weiß oder durchsichtig wären, und kein oder wenige rothes Blut führende Gefäße hätten, in Krankheiten, und namentlich im entzündeten Zustande, sehr roth würden, und dann eine zahllose Menge von rothen Blutgefäßen zeigten, die dadurch sichtbar würden, daß die zuvor unsichtbaren, durchsichtiges Blutwasser führenden, **seröse**n Gefäße vom rothen Blute oder von eingespritzten gefärbten Flüssigkeiten ausgedehnt würden. Dieses ist z. B. an dem an den Augapfel angehefteten Theile der Bindehaut des Auges und an der Kapsel der Krystalllinse der Fall. Indessen beweisen diese Thatsachen keineswegs, daß es seröse Gefäße gebe. Denn Blutgefäße, welche so eng sind, daß sie nur eine einfache Reihe von Blutkörnchen (welche bekanntlich selbst durchsichtig sind) durchlassen, sehen auch durchsichtig aus, und geben den Theilen, in denen sie sich befinden, wenn sie nicht sehr dicht liegen, kein rothes Ansehn. Wenn diese kleinen Gefäße nun vom Blute oder von gefärbten Flüssigkeiten sehr ausgedehnt werden, so erscheinen die Theile so roth, wie das bei entzündeten Theilen der Fall ist. Mascagni[1] spritzte in die Blutgefäße entzündeter Theile Leimauflösung, die mit Zinnober gefärbt war, und fand die kleinen Blutgefäße um das Doppelte, Dreifache und sogar um das Vierfache weiter, als sie in denselben Theilen zu sein pflegen, wenn sie nicht entzündet sind. Uebrigens scheint sich auch, wie oben gesagt worden, die Menge der kleinen Blutgefäße, wenn sich Theile heftig entzünden, dadurch vermehren zu können, daß zum Theil neue Gefäße dieser Art entstehen.

An durchsichtigen Theilen lebender Thiere sieht man wohl zahlreiche Blutgefäße, die so eng sind, daß sie nur eine einfache Reihe von Blutkörnchen durchgehen lassen, aber keine solche Gefäßnetze, welche zu eng wären, als daß sie Blutkörnchen aufnehmen könnten. Man sieht nur, daß zuweilen in den kleinsten Gefäßen, zumal wenn der Blutlauf im Begriff ist ins Stocken zu kommen, einzelne Blutkügelchen in großen Zwischenräumen geschwommen kommen, und hat daher Ursache zu vermuthen, daß diese Gefäße dann fast nichts als Serum führen. Schon B. S. **Albin** meinte keinen hinreichenden Grund zur Annahme seröser Gefäße zu haben. **Mascagni**[2] und **Prochaska**[3] läugnen aber geradezu, daß es seröse Gefäße gebe, und **Sömmerring**[4] hat in seiner letzten Schrift über diesen Gegenstand dieselbe Ansicht angenommen.

[1] *Mascagni*, Vasorum lymphaticorum hist. Senis 1787. fol. S. 8.
[2] *Mascagni*, Vasorum lymph. hist. et ichnogr. S. 7—8.
[3] *Prochaska*, Disquisitio anat. physiol. organismi c. h. ejusque processus vitalis. S. 110.
[4] *Sömmerring*, über das feinste Gefäßnetz der Aderhaut im Augapfel. Denkschriften d. Königl. Akad. d. Wiss. zu München für d. J. 1818. letzte Seite der Abhandlung.

Digitized by Google

Bleuland[1]) suchte zwar die Existenz der serösen Gefäße durch die Einspritzung gefärbter Flüssigkeiten in dieselben zu beweisen. Er erfüllte nämlich zuerst die Venen eines Theils des Darmkanals mit einer groben blaugefärbten Masse, und spritzte dann in die Arterien desselben 2 untereinander gemengte Flüssigkeiten, eine rothe, in welcher der rothe Färbestoff nur fein zertheilt war, und eine weiße Flüssigkeit, in welcher der weiße Färbestoff aufgelöst war, ein. Er zog nun ein Stückchen von der Bauchhaut des Darms ab, und sah, daß die Haargefäße, welche Blut zu führen bestimmt sind, alle mit der rothen Materie erfüllt waren, welche sie, weil sie nur fein zertheilt, nicht aber aufgelöst war, nicht durchgelassen, sondern zurückgehalten hatten, daß aber die weiße Flüssigkeit in noch feinere, an der Oberfläche der Bauchhaut gelegene Gefäße gedrungen war, die aus den rothen Haargefäßen hervorgingen und von den rothen ganz verschieden waren. Da sich indessen auch die sehr kleinen Gefäße, welche rothes Blut führen, wiederholt in noch kleinere theilen, so konnte Bleuland nur dann durch seinen Versuch gewiß werden, daß er Gefäße angefüllt habe, welche zu eng wären, um rothes Blut aufzunehmen, wenn er den Durchmesser der von ihm mit rother und weißer Farbe erfüllten Gefäße mittels des Mikrometers gemessen hätte.

Es bleibt daher immer noch zweifelhaft, ob es seröse Gefäße gebe oder nicht, und noch viel weniger läßt sich darthun, ob diese serösen Gefäße sich wie Arterien in Zweige und Reiser theilen, und ob es also auch seröse Venen gebe, oder ob die serösen Gefäße nur Bogen und Netze bilden, die auf der einen Seite mit rothes Blut führenden Arterien, auf der andern mit rothes Blut führenden Venen zusammenhängen.

Ueber die Oeffnungen, durch welche etwas aus den Blutgefäßen heraus oder in sie eindringen kann.

Durch die dünnen durchsichtigen Haargefäße dringen während des Lebens und nach dem Tode, wenn die Adern gefüllt werden, dünne Flüssigkeiten wie ein Thau an den Oberflächen der Häute, an denen sie sich befinden, und in die Zellen des Zellgewebes hervor, und umgekehrt dringen auch während des Lebens an manchen Stellen in die Haargefäße, in welchen das Blut fließt, Substanzen von außen ein, z. B. in die Haargefäße der Lungen, Sauerstoffgas. Die Anatomen haben sich aber bis jetzt vergebens Mühe gegeben, die Wege, durch welche etwas in diese kleinen Blutgefäße eindringen, oder aus ihnen austreten kann, sichtbar zu machen. Es ist daher zweifelhaft, ob die kleinen Gefäßnetze sehr enge Seitenzweige besitzen, die mit offnen Enden aufhören, und die man aushauchende Gefäße, vasa exhalantia, nennen kann, oder ob alle kleinen Röhrchen ununterbrochen in die der Venen übergehen, und also nur in den Wänden jener kleinen Röhrchen Zwischenräume oder Oeffnungen befindlich sind, durch welche etwas in sie eindringen oder aus ihnen austreten kann. Hewson, Haller, Cruikshank, Bichat und andere Anatomen haben eine Endigung der kleinen Arterien in aushauchende Gefäße angenommen, ohne sie je-

[1]) *Bleuland*, a. a. O.

Digitized by Google

doch gesehen zu haben, denn sie schlossen nur auf das Vorhandensein offner Gefäßenden, weil während des Lebens und nach dem Tode Feuchtigkeiten, die sich in den Blutgefäßen befinden und vorwärts getrieben werden, aus den Gefäßen hervordringen. Dieser Schluß ist aber nicht richtig. Auch darf man daraus, daß man an getrockneten Theilen, deren Blutgefäße sehr vollkommen mit erstarrenden Flüssigkeiten angefüllt worden sind, hier und da Gefäßenden sieht, nicht schließen, daß diese während des Lebens vorhanden gewesen wären und die Dienste aushauchender Gefäße verrichtet hätten. Denn solche Gefäßnetze finden sich auch dann, wenn die Anfüllung der Blutgefäße an manchen Stellen unvollkommen von Statten gegangen ist. Die nicht erfüllten Stellen der Gefäße trocknen dann nämlich zusammen und werden unsichtbar. Daher findet man an den Stücken menschlicher Theile, an welchen die Anfüllung der kleinen Blutgefäße Lieberkühnen am vollkommensten gelungen war, fast gar keine Gefäßenden, sondern Gefäßschlingen, und zwar an Häuten, wo sehr viel Säfte abgesondert werden, und wo es unzählige Gefäßenden geben müßte, wenn die Absonderung durch solche offne Gefäßenden geschähe. Aus diesen und ähnlichen Gründen haben auch W. Hunter, Prochaska[1]), Mascagni[2]) und Sömmerring[3]), nach ihren eignen hierüber angestellten Beobachtungen, die Existenz aushauchender Gefäßenden geläugnet, und nur Poren in den Wänden der Blutgefäße angenommen. Ist man aber schon darüber nicht völlig gewiß, ob die Absonderung nur durch solche Poren geschehe, so ist man noch viel weniger zu entscheiden im Stande, ob diese kleinen Oeffnungen in den Wänden der Gefäße mit einer besondern Vorrichtung versehen sind, vermöge deren sie sich erweitern und verengern, und dadurch einen lebendigen Einfluß auf die Art haben können, wie und welche Substanzen durch sie hindurchgelassen werden. In jedem Falle müssen die Oeffnungen, durch welche etwas aus den Blutgefäßen austritt, sehr eng sein, weil während des Lebens im gesunden Zustande mit den abgesonderten Flüssigkeiten keine Blutkörnchen aus den Blutgefäßen austreten, und weil nach Mascagni's[4]) Erfahrungen eine in die Arterien eines Todten eingespritzte, mit Zinnoberpulver gefärbte Leimauflösung ungefärbt und wie ein Thau auf der Oberfläche der Häute, namentlich auf der innern Oberfläche der Schleimhäute und der von ihnen

[1]) *Prochaska*, Disquisitio anatomico-physiologica organismi corporis humani ejusque processus vitalis, c. Tabb. aenn. Viennae 1812. 4. S. 106, 107.
[2]) *Mascagni*, a. a. O. Tab. III. Fig. 22. S. 14. 15.
[3]) *Sömmerring*, Denkschriften der Königl. Acad. d. Wissenschaften zu München für das Jahr 1818. 4. Ueber das feinste Gefäßnetz der Aderhaut im Augapfel, vorgelesen den 9. Mai. Besonderer Abdruck. S. 15. 16.
[4]) *Mascagni*, Vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia. Senis 1787. Fol. S. 7, 8.

Digitized by Google

überzogenen Ausführungsgänge der Drüsen, auf der der Blutgefäße, auf der der serösen Häute und endlich auf der der Fettzellchen und der andern Zellen des Zellgewebes hervorkommt, ohne daß die Theilchen des Zinnobers (welche unter dem Mikroskope untersucht, ein Wenig größer als Blutkörnchen erschienen) mit hindurchgelassen wurden. Die Oberflächen aller dieser Theile waren nach dem Erkalten der Leimauflösung mit einem geronnenen, gallertartigen ungefärbten Leimüberzuge bedeckt. Sogar wenn lauwarmes Wasser mit noch feiner zertheilten Färbestoffen, z. B. mit Tinte oder Indigo versetzt, in verschiedene Arterien oder Venen lebender Thiere oder auch todter Thiere und Menschen eingespritzt wurde, kam es nur schwach gefärbt auf der Oberfläche der Theile, zu welchen die Gefäße gingen, zum Vorschein. Aehnliche Beobachtungen hat schon vor Mascagni, Hales gemacht, und aus ihnen scheint hervorzugehen, daß diese Poren nicht überall gleich weit sind. Denn in das Zellgewebe, in die Fettbläschen und in die Lymphgefäße ging der Zinnober mit der von ihm in die Arterien eingespritzten Flüssigkeit nicht zugleich über, wohl aber, ohne daß eine Zerreißung stattfand, immer in die Zellen der Lungen und in die Höhle der Gedärme. Hales[1]) trieb die Flüssigkeit nur mit der Kraft, mit welcher das Blut in den Arterien der lebenden Thiere vorwärts gedrückt wird, ein, und konnte den in die Höhle der Gedärme übergangenen Zinnober mit Hülfe des Mikroskops erkennen, und sah, daß er sich daselbst in Gestalt sehr dünner Fäden verfand. Vielleicht war das von ihm angewendete Zinnoberpulver etwas feiner als das von Mascagni gebrauchte. Die Poren, die aus den Netzen der Lungenarterien in die Höhlen der Lungenzellen führen, scheinen selbst wieder noch weiter zu sein als die, welche auf der innern Oberfläche der Gedärme ausgehen. Denn nach Kaau und Hales Erfahrungen geht bei Säugethieren Wasser, welches man in die Lungenarterien oder in die Lungenvenen fließen läßt, sogar leichter aus den Haargefäßen in die Höhlen der Lungenzellen und in die Luftröhrenäste, als von den Arterien in die Venen, oder von den Venen in die Arterien über, und zwar, nach Hales, bei einem Drucke, der viel zu gering ist, als daß er eine Zerreißung der Gefäße hervorbringen könnte, nämlich selbst bei einem Drucke, der durch eine weniger als 1 Fuß hohe Wassersäule verursacht wurde, dahingegen bei Thieren von derselben Art Blut, welches durch eine beigemischte Salpeterauflösung flüssig erhalten wurde, aus der Lungenarterie weder in die Lungenzellen drang, noch in die Venen überging, selbst wenn es durch eine 2 Fuß hohe Flüssigkeitssäule vorwärts gedrückt wurde; woraus man sieht, daß die Blutgefäße in jenem ersteren Falle, wo der Druck viel geringer war, durch den angewendeten Druck nicht zerrissen sein können. In den Haargefäßnetzen der Lungen sind die Poren sogar so weit, daß Wasser, welches Hales[2]) in die Luftröhre eines Schweins fließen ließ, auf diesen bei einem Drucke einer 5 Fuß hohen Wassersäule in die Lungenarterie überging und aus ihr ausfloß (wiewohl ungefähr 5 mal langsamer, als wenn es umgekehrt durch den nämlichen Druck aus der Lungenarterie in die Blutröhre getrieben worden wäre). In andern Theilen geschah dieser Uebergang in die Blutgefäße nicht, z. B. wenn der Magen und die Gedärme damit angefüllt wurde. Wegen dieser größeren Poren scheint auch während des Lebens Luft in die Haargefäßnetze der Lungen aus den Lungenzellen dringen zu können.

An welcher Stelle der Gefäße die Häute derselben am leichtesten von den abzusondernden oder aufzusaugenden Säften durchdrungen werden, d. h., ob die Absonderung in den größeren oder kleineren Arterien oder in den Venen am lebhaftesten vor sich geht, läßt sich durch Beobachtungen nicht zeigen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß die engsten, dünnsten und durchsichtigsten Röhrchen, d. h. die, welche das Haargefäßnetz ausmachen und weder für Arterien noch für Venen gehalten

[1]) *Hales*, Haemastatique, traduit par *Sauvage*, p. 133.

[2]) *Hales*, a. a. O., p. 64.

werden dürfen, hierzu am geschicktesten sind. Man darf daher nicht behaupten, daß die Arterien die absondernden Gefäße wären, die Venen aber nicht. Vielmehr ist es wahrscheinlich, daß die Haargefäße, welche den Uebergang von den Arterien zu den Venen bilden, das meiste hierzu beitragen. Wenn Wasser bei einem todten oder auch bei einem lebenden Thiere in die Haargefäße eines Theils getrieben wird, so tritt etwas davon durch die Poren aus, es mag nun durch die Arterien oder durch die Venen hereingebracht werden sein, denn durch beide gelangt es in die Haargefäße.

Hales[1]) band das gekrümmte Ende einer 9½ Fuß hohen Röhre in die vena portae eines Hundes so ein, daß das Wasser, womit er sie gefüllt erhielt, nach den Gedärmen hinfließen mußte. Auf der innern Oberfläche eines Stücks des Darms, den er geöffnet hatte, konnte er nun sehen, wie die Flüssigkeit eben so durchschwitzte und in die Höhle des Darms überging, als das bei einem andern Versuche der Fall gewesen war, als er Wasser in die Arterien der Därme durch den nämlichen Druck eingetrieben hatte. *Bichat* hat an den Gedärmen, *Reisseisen*[2]) an den Lungen ähnliche Beobachtungen gemacht.

Ueber die Kräfte, durch welche etwas aus den Blutgefäßen ausgetrieben oder in sie hineingezogen werden kann.

Daß die Häute der Blutgefäße und andere thierische Häute mit unorganischen Poren versehen sind, und daß durch diese Poren sowohl während des Lebens als nach dem Tode eine Durchdringung und Durchseihung von gewissen Flüssigkeiten, und dadurch auch eine Trennung gemengter Flüssigkeiten geschehen könne, ist nicht zu bezweifeln[3]). Auch können getrocknete und wieder aufgeweichte Häute, durch welche 2 Flüssigkeiten, die sich gegenseitig anziehen, getrennt werden, eine dieser Flüssigkeiten zur andern herüberleiten, indem die eine der beiden Flüssigkeiten die andere durch chemische Kraft an sich zieht, oder indem vielleicht auch electrische Strömungen eine Hinüberführung bewirken. Auf diese Weise läßt eine mit dunkelrothem Blute erfüllte Blase das Sauerstoffgas der atmosphärischen Luft, das vom Blute angezogen wird, hindurchtreten, wodurch das mit der Oberfläche der Blase in Berührung stehende Blut heller roth wird[4]). In der That kann die Kraft, mit welcher eine Flüssigkeit eine andere Flüssigkeit durch eine feuchte Blase hindurch an sich, und in ein

---

[1]) *Hales*, a. a. O. S. 97. No. 16. und S. 96. No. 12.

[2]) *Francisci Danielis Reisseisen* de fabrica pulmonum commentatio, a regia academia scientiarum Berolinensi praemio ornata cum Tabb. Berolini 1822. Fol. p. 16.

[3]) Man erwäge hierbei *Magendie's*, *Fodera's* und *Lebkuchners*, unter *Emmerts* Leitung angestellte Versuche in *Magendie* Journal de Physiologie exp. T. I. St. 3. *Fodera* Recherches expérimentales sur l'exhalation et l'absorbtion. Paris 1823. *Lebkuchner* Diss., qua experimentis eruitur, utrum per viventium adhuc animalium membranas atque vasorum parietes materiae ponderabiles illis applicatae permeare queant, nec ne. Tubingae 1819. 8.

[4]) *Girtanner*, Antiphlogistische Chemie 1795. S. 214.

Digitized by Google

Gefäß hereinzieht, oder aus demselben herauszieht, bedeutend groß sein. Nach Parrots[1]) Entdeckung wird von einer mit lauwarmen Urin gefüllten verschlossenen Blase, die man in lauwarmes Wasser bringt, so viel Wasser aufgenommen, daß sich das Gewicht der in ihr enthaltenen Flüssigkeit in 24 Stunden um 0,142 vermehrt, dagegen wird aus einer solchen mit Wasser gefüllten Blase, wenn sie in Urin gebracht wird, so viel herausgezogen, daß sich die Flüssigkeit an Gewichte in derselben Zeit um 0,09 vermindert. Aber eine mit Wasser gefüllte und in Wasser gebrachte Blase nimmt weder Flüssigkeit auf, noch verliert sie davon. Ein mit Weingeist gefülltes, mit Blase völlig verschlossenes Gefäß in Wasser gesetzt, zog so viel Wasser herein, daß die Blase nach 3 Stunden zu einer Halbkugel ausgespannt emporragte, war dagegen in dem verschlossenen Gefäße Wasser, und wurde nun dasselbe in Weingeist gesetzt, so verminderte sich die Menge des Wassers im Gefäße so sehr, daß die Blase in das Gefäß hereingedrückt und äußerlich concav wurde. Als im ersteren Falle in die nach außen gedrängte Blase hineingestochen wurde, sprang der Weingeist in einem Strahle mehrere Fuß weit heraus. Porret[2]), welcher ähnliche Versuche angestellt hat, war der Meinung, daß eine Erregung elektrischer Strömungen die Ursache dieser Ueberführung von Flüssigkeit sei, was aber durch seine Versuche nicht bewiesen wird. Andere von Sömmerring, E. H. Müller, Fischer, Dütrochet, Magnus und Wach angestellte, gleichfalls hierher gehörige Versuche kann man in Wach's[3]) Abhandlung nachsehen. Dütrochet[4]) beobachtete, daß, wenn man bei einem Huhne die Blinddärme wegschnitte, sie an ihrem offnen Ende zubände und sie dann in Wasser legte, sie sich damit füllten, oder wenn sie offen gelassen würden sie sich nicht nur füllten, sondern auch überflössen. Dieses dauerte so lange, bis die Fäulniß eintrat, dann aber erfolgte das Entgegengesetzte, das in den Blinddärmen enthaltene Wasser drang nach außen heraus. Wurden die Blinddärme mit einer Auflösung von Gummi in Wasser angefüllt, so brachte diese Flüssigkeit eine ähnliche Wirkung hervor. Die Blinddärme füllten sich mit Wasser, und die Flüssigkeit stieg in die Höhe. Dütrochet benennt diese Erscheinung mit dem nicht eben brauchbaren Namen Endosmosis und Exosmosis. Sie unterscheidet sich von der gewöhnlicher Haarröhrchenanziehung, und von dem Einsaugungsvermögen der Schwämme und des Fließpapiers dadurch, daß bei der Haarröhrchenanziehung Flüssigkeiten von festen Körpern angezogen werden, die ein größeres Anziehungsvermögen zu einer Flüssigkeit, als die Flüssigkeitstheilchen unter einander haben. Bei jenen Erscheinungen dagegen ziehen sich zwei verschiedene Flüssigkeiten einander gegenseitig an, und die Blase läßt nur die eine leichter als die andere hindurchtreten. Eine so beträchtliche Anziehung üben auf einander durch eine feuchte Blase hindurch nicht nur tropfbare, sondern auch luftförmige Flüssigkeiten aus. Denn nach Grahams[5]) Entdeckung saugt ein feuchte, zusammengefallene, nur ein Wenig atmosphärische Luft enthaltende zugebundene Blase, wenn man sie in eine mit kohlensaurem Gas gefüllte Glocke bringt, so viel kohlensaures Gas ein, daß sie sich strotzend damit füllt. Die in der Blase befindliche atmosphärische Luft und das kohlensaure Gas üben hierbei un

---

[1]) **Parrot**, in seiner Inauguraldisputation: Ueber den Einfluss der Physik und Chemie in der Arzneikunde. Siehe *Prochaska* Disquisitio anat. physiol. organismi corporis humani ejusque processus vitalis. Viennae 1812. 4. p. 8 und in *Schweiggers* Journ. d. Chemie u. Physik LVIII. 1830. S. 20 sq.

[2]) *Porret*, in Thomson's Ann. of philosophy, B. VIII. p. 74, und in *Schweigger* Journ. d. Ch. LVIII. 1830.

[3]) *Wach*, in *Schweiggers* Journal, LVIII. 1830. S. 20 sq.

[4]) *Dutrochet*, L'agent immédiate du mouvement vital dévoilé dans sa nature dans son mode d'action chez les végétaux et les animaux. Paris 1826, und dessen Nouvelles recherches sur l'endosmose, suivies de l'application expérimentale de ces actions physiques à la solution du problème de l'irritabilité végétale etc. Paris 1828. Siehe auch *Poggendorf*, Annalen d. Physik X. 138. *Poisson*, ebendaselbst p. 134. Fischer, ebendaselbst 126. *Magnus*, ebendaselbst X. 153.

[5]) *Schweigger*, Jahrbuch der Chemie u. Physik. 1829. III. 227.

Digitized by Google

streitig eine Anziehung auf einander aus, und weil die Blase die Kohlensäure leichter als die atmosphärische Luft durch sich hindurchläßt, so dringt mehr Kohlensäure herein, als atmosphärische Luft hinaus.

Indessen ist durch alle diese Versuche keineswegs bewiesen, daß, wie W. Hunter, Mascagni, Prochaska, Sömmerring und Dütrochet behaupten, auch während des Lebens eine ähnliche Durchgänglichkeit der Häute, wie nach dem Tode, Statt finde, und daß die erwähnte Kraft die Absonderungen bewirke.

Bekanntlich dringt der Färbestoff der Galle nach dem Tode durch die Häute der Gallenblase und färbt die benachbarten Gedärme. Dieses findet, sagt Cruikshank [1]) im lebenden Körper nicht Statt. Oeffnet man bei einem lebenden Thiere den Unterleib, so wird man diese benachbarten Theile ungefärbt finden. Die Erfahrungen dagegen, daß die Absonderung der Milch, der Galle, des Speichels und anderer Säfte durch Gemüthsbewegungen der Menge und Beschaffenheit nach schnell verändert werden können, lassen uns bei dem Absonderungsgeschäfte eine Einrichtung vermuthen, vermöge welcher das Nervensystem einen beträchtlichen und schnellen Einfluß auf dasselbe haben kann. Außerdem hat Hewson [2]) gegen die Erklärung des Absonderungsgeschäfts durch ein Durchschwitzen durch unorganische Poren den Einwurf gemacht, daß, wenn die Wände der absondernden Blutgefäße ringsum mit solchen Poren versehen wären, die sich nicht durch eine lebendige Bewegung verengen könnten, die abgesonderten Säfte nicht nur an der einer Höhle (z. B. dem Magen) zugewendeten Oberfläche eines Gefäßes, sondern auch da hervortreten würden, wo das absondernde Gefäß an das benachbarte Zellgewebe stößt. Hierdurch würde z. B. der Darmsaft eine Art innerer Wassersucht des Zellgewebes der Gedärme hervorbringen müssen, was doch keineswegs der Fall ist, und woraus also erhelle, daß die Absonderung nicht durch unorganische Poren geschehe.

Arterien und Venen.

Es giebt 2 große Arterien im menschlichen Körper, von welchen die eine das von der rechten, die andere das von der linken Kammer des Herzens fortgestoßene Blut empfängt.

---

[1]) W. Cruikshank, Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße, übers. von Ludwig. Leipzig 1798. 4. S. 10.

[2]) W. Hunter's Gründe für, und Hewson's Gründe gegen die Erklärung der Absonderung durch Poren, findet man einander kurz gegenübergestellt, in *Mascagni* Vasorum lymphaticorum hist. et ichnogr. S. 14. Auch mag man das nachsehen, was Cruikshank Gesch. d. eins. Gef. S. 10, und *B. N. G. Schreger* de Cruikshankii decreto non esse pervias ullas corporis humani partes, nisi vasorum oculis, in dessen Fragment. anat. et physiol. Fasc. I. Lips. 1791. 4. gesagt haben.

Digitized by Google

Die eine, die Körperarterie, arteria aorta, leitet das von der linken Kammer des Herzens fortgestoßene Blut zu den Haargefäßen, die in allen Theilen des Körpers befindlich sind. Manche von den Theilen, zu welchen diese große Arterie Blut hinleitet, liegen ganz nahe am Ursprunge derselben, z. B. die Fleischfasern des Herzens. Zu ihnen gehen daher auch nur sehr kurze Röhren. Die meisten aber liegen sehr weit davon entfernt, z. B. die Hände und die Füße; zu ihnen fließt daher das Blut in sehr langen Röhren.

Die zweite, die Lungenarterie, arteria pulmonalis, führt das von der rechten Kammer des Herzens fortgestoßene Blut zu den Lungen und vertheilt es in dem Haargefäßnetze, welches die in den unzähligen Läppchen der Lungen befindlichen Zellen überzieht. Da die Lungen nicht weit von dem Herzen entfernt und die Läppchen derselben alle nahe bei einander liegen, so sind auch alle Röhren, der Lungenarterie kurz.

Ungeachtet nun die Aorta das Blut zu allen, und also auch zu sehr entfernten Theilen des Körpers hinführt, die Lungenarterie dagegen es nur zu den Lungen leitet, so ist doch die Lungenarterie an ihrem Anfange fast eben so weit (von einem fast eben so großen Durchmesser), als die Aorta; denn die Aorta hat nach den Messungen der Anatomen an ihrem Anfange meistens über einen Zoll, die Arteria pulmonalis etwas weniger als einen Zoll im Durchmesser, so daß der der letzteren ungefähr nur um $1/7$ bis $1/12$ oder nicht einmal so viel kleiner ist, als der der Aorta [1]). Der Durchmesser dieser zwei großen Arterien steht demnach in keinem gleichen Verhältnisse zur Länge derselben.

Von der großen Röhre der Aorta gehen zu den verschiedenen Abtheilungen des Körpers kleinere Röhren ab, in welchen das Blut dahinfließt, und von ihnen gehen noch kleinere Röhren ab, durch welche es zu den einzelnen Theilen dieser Abtheilungen hingeleitet wird, wo es durch noch kleinere Röhrchen zu den Abschnitten jedes Theils verbreitet wird, u. s. w. Daher haben alle diese unter einander zusammenhängenden Röhren das Ansehn eines Baums, von welchem die aus der linken Kammer des Herzens hervortretende Aorta der Stamm ist, die kleineren Röhren aber die Aeste, Zweige, Reiser des Baums darstellen.

Communication der Arterien.

Von der Form der Bäume weicht indessen die Form der Arterien dadurch ab, daß sich nicht selten 2 Aeste unter einander verbinden, ent

[1]) Siehe verschiedene Messungen dieser 2 Arterien angeführt in *Hallers* Elementa physiologiae. Lib. VIII. Sect. 2. §. 19.

Digitized by Google

weder durch eine quer aus dem einen in den andern hinübergehende Verbindungsröhre, oder indem 2 benachbarte Aeste in einem Bogen zusammenstoßen, oder endlich dadurch, daß 2 Röhren sich in eine größere Röhre unter einem spitzen Winkel vereinigen. Eine solche Verbindung der Zweige kommt bei den Bäumen niemals vor. Diese Anastogose oder Einmündung, Communication, Anastomosis oder Communicatio, hat bei den Arterien den großen Nutzen, daß das Blut durch einen Druck auf einen Arterienast, oder durch andere Hindernisse nicht gänzlich gehindert wird, in die Zweige dieses Astes zu gelangen, sondern vielmehr auf Seitenwegen durch solche untereinander verbundene Canäle zu denselben hinfließen kann. Die Anastomosen kommen in den kleineren Zweigen der Arterien häufiger vor als in den größeren, in dem feinsten Haargefäßnetze sind sie so häufig, daß es ganz aus anastomosirenden Gefäßen besteht. An Stellen, wo bei der Bewegung der Theile des Körpers ein Hinderniß für den Blutlauf in den Arterien entstehen kann, findet man aber, daß auch ziemlich große Röhren anastomosiren, was jedoch bei den Venen viel häufiger der Fall ist, als bei den Arterien. Nirgends sind so viele und so große anastomosirende Arterien vorhanden, als am Gehirne, im Gekröse der Gedärme, am Magen, in der Hohlhand und im Hohlfuße. Kleiner sind schon die zahlreichen anastomosirenden Gefäße, welche sich am Rückenmarke, ferner in der Nähe aller Gelenke an den Finger- und Zehenspitzen, an vielen Stellen des Gesichts und an der behaarten Haut des Kopfs, hinter dem Brustbeine, hinter den Rippen, in der Schilddrüse und im Uterus befinden. Zu jedem Punkte des Gehirns und Rückenmarkes, deren Thätigkeit nie unterbrochen werden darf, und die zu ihrer für das Leben so wichtigen Verrichtung eines immer fortgesetzten Blutzuflusses bedürfen, tritt daher Blut genug hinzu, wenn auch eine oder 2 von den Blut zuführenden Arterien gedrückt, oder, wie das bei Verletzungen zuweilen geschieht, zugebunden werden. Bei dem Rückenmarke lebender Säugethiere kann man, wenn man sich auch große Mühe giebt, nicht dahin gelangen, durch das Zubinden von Arterien den Blutzufluß zu irgend einer Abtheilung desselben zu vermindern. Im Magen und in den verschiedenen Abschnitten der Gedärme, welche bald viel, bald wenig Blut zugeführt bekommen (viel Blut, während die Verdauung in einem Abschnitte vor sich geht, weniger, wenn die Nahrungsmittel in die darauf folgende Abtheilung übergegangen sind), scheinen diese Verbindungen dazu zu dienen, das Blut zu derjenigen Stelle, wo die Verdauung gerade geschieht, hin, und von den benachbarten Theilen, wo sie schon geschehen ist, abzuleiten, und außerdem das Hinderniß zu beseitigen, welches die Last der in den Gedärmen befindlichen Nahrungsmittel dem Blute hier und da in den Weg legen könnte. In der Hohlhand und im Hohlfuße, so wie auch an vielen Gelenken sind auch die Arterien leicht einem Drucke, welcher einen störenden Einfluß haben könnte, ausgesetzt.

Zahl der Theilungen in kleinere Zweige.

Wie viel mal kleinere Gefäße aus größeren, nämlich ein Ast aus dem Stamme, ein kleinerer Ast oder Zweig aus dem Aste, ein noch kleinerer Zweig oder ein Reis aus dem Zweige, ein noch kleineres Reis aus dem größeren Reise u. s. w. hervorgehen, bis endlich in dem Haargefäßnetze Aeste und Zweige wegen ihrer netzförmigen Verbindung nicht mehr unterschieden werden können, läßt sich nicht bestimmen. Haller behauptete auf dem Wege, auf welchem das Blut aus der Aorta bis in die dem

Digitized by Google

Auge verschwindenden kleinen Arterien der Gedärme fließt, nie über 20 Theilungen gezählt zu haben. Keill nahm nach der Zählung der Theilungen der Arterien an menschlichen Körpern, die Cowper künstlich angefüllt hatte, 40 bis 50 Theilungen an.

Lage der Arterien.

Die größeren Stämme und Zweige der Körperarterien liegen unter Muskeln, Knochen und unter andern Theilen geschützt, was bei vielen Venenstämmen nicht der Fall ist. Diese Einrichtung verhütet die Lebensgefahr, die aus der Steifheit der Arterien, vermöge deren sie immer offen stehen und ihre Wunden klaffen, entspringen würde. Denn aus einer verletzten großen Arterie fährt das Blut so lange fort auszufließen, bis der Tod eingetreten ist; dagegen schließen sich selbst sehr große Venenstämme durch einen geringen Druck, etwas kleinere auch von selbst, und der Ausfluß des Bluts läßt meistens aus den Venen nach, wenn Ohnmacht eintritt. Während es demnach von keinem Nachtheile ist, daß viele große Venenstämme dicht unter der Haut liegen, würde diese Lage, wenn sie bei den Arterien Statt fände, sehr gefahrvoll gewesen sein. An den Gelenken, die sich nur nach einer Seite zu stark beugen, liegen die Arterien an der Beugeseite, an den, welche sich nach 2 entgegengesetzten Seiten beträchtlich beugen, laufen die Arterien neben den Beugeseiten hin und sind dadurch vor einer nachtheiligen Dehnung geschützt.

An Theilen, welche sich zuweilen vergrößern, oder ihre Lage so verändern, daß ihre Arterien, wenn sie gerade wären, gedehnt werden müßten, sind die Arterien schlangenförmig gekrümmt. Z. B. die Arterien des Nabelstrangs, des Uterus, die in der Nähe des Kopfgelenks in den Schädel eintretenden Arterien, die der Lippen, der Zunge, der Iris u. s. w. Man darf aber diese schlangenförmigen Krümmungen nicht mit denjenigen verwechseln, welche überall entstehen können, wenn die Arterien durch eine mit großer Gewalt eingespritzte Flüssigkeit ihrer Länge nach übermäßig ausgedehnt werden.

Größe der Höhle des Arteriensystems in den Stämmen und Zweigen.

So lange eine Arterie keinen Ast abgiebt, bleibt ihre Höhle gleich weit, oder, mit andern Worten, bleibt der Querdurchschnitt ihrer Höhle gleich groß. Rechnet man dagegen an jeder Stelle, wo eine Arterie einen Ast abgiebt, die Höhle des abgegebenen Astes und die Höhle der Fortsetzung des Stammes zusammen, und vergleicht den Querdurchschnitt der Fortsetzung des Stammes und des Astes zusammengenommen mit dem Querdurchschnitte des Stammes oberhalb der Theilung; so findet man, daß der erstere immer größer als der letztere ist. Denkt man sich also die Röhren aller Aeste, die aus der Aorta ihren Ursprung nehmen, in eine einzige Röhre vereinigt, und vergleicht den Querschnitt dieser Röhre mit dem Querschnitte des Anfangs der Aorta, so findet man jenen

Digitized by Google

Querschnitt viel größer, als diesen. Denkt man nun ferner auf eine ähnliche Weise sich alle Röhren der 2ten Ordnung, welche aus jedem Aste der Aorta entspringen, an ihrer Ursprungsstelle in eine Röhre vereinigt, und vergleicht den Querschnitt dieser Röhre mit dem Querschnitte jedes Astes der Aorta, so findet man, daß die Summe der Querschnitte aller Röhren der 2ten Ordnung, den einer Röhre der 2ten Ordnung, aus der sie hervorgegangen sind, noch mehr an Größe übertrifft, als die Summe der Querschnitte aller Röhren der 2ten Ordnung den Querschnitt der Aorta. Nimmt man nun an, daß dasselbe auch bei allen den kleinen Ordnungen von Gefäßen, welche Keill und Haller noch unterschieden haben, auf gleiche Weise der Fall sei, so sieht man ein, daß der Raum, welcher in allen den vereinigt gedachten Röhren, die zu jeder Ordnung von Arterien gehören, enthalten ist, in der Nähe des Herzens in den großen Stämmen enger, in den kleinen Zweigen, entfernter vom Herzen, weiter sein müsse, und daß folglich dieser Raum einen Kegel, dessen Spitze am Herzen, dessen Basis in den Haargefäßen liegt, darstelle. Eben so verhält sich's bei den Venen, die das Blut zum Herzen zurückführen. Auch diese schließen in ihren kleineren Zweigen, wenn diese zusammengerechnet werden, eine größere Höhle ein, als in ihren größeren Zweigen und in den Stämmen, und der Raum, der im Venensystem eingeschlossen ist, stellt also einen Kegel dar, dessen Spitze gleichfalls am Herzen und dessen Basis in den kleinsten Zweigen liegt.

Die Messungen, durch welche man die Zunahme der Höhle des Arteriensystems bei jeder neuen Ordnung von Zweigen zu bestimmen gesucht hat, sind bei verschiedenen Anatomen sehr verschieden ausgefallen. Es bedarf dieser wichtige Gegenstand noch einer neuen, sehr sorgfältig wiederholten Untersuchung. Indessen scheint es, als ob die Zunahme nicht bei allen Arterientheilungen gleich sei, und als ob im Allgemeinen die Zunahme bei der 2ten Ordnung von Röhren geringer als bei der 3ten sei. Es versteht sich von selbst, daß, wenn sich die Aeste einer sich theilenden Arterie mit benachbarten Aesten vereinigen, an diesen Theilungen keine Erweiterung der Höhle des Arteriensystems Statt zu finden brauche, weil die Erweiterung, die bei der Theilung geschieht, durch die Verengerung des Raums, die bei der Vereinigung von Aesten entsteht, aufgehoben werden kann. Aus diesem Grunde erweitert sich das Gefäßsystem in den Haargefäßnetzen nicht in dem Grade, als es außerdem der Fall sein würde.

Geschwindigkeit des Blutlaufs in den Stämmen und Zweigen der Arterien.

Die Einrichtung, daß das Arteriensystem sich in seiner Höhle nach den Aesten zu erweitert, hat die wichtige Folge, daß das Blut in der 2ten Ordnung von Röhren langsamer als in der 1sten, in der 3ten Ordnung von Röhren wieder langsamer als in der 2ten fließen muß,

Digitized by Google

u. s. w. Man sieht dieses offenbar an den Adern durchsichtiger Theile lebender Thiere mit dem Mikroskope, man begreift es aber auch schon durch Ueberlegung. Denn denkt man sich z. B., daß eine gleichseitig viereckige Röhre, die im Durchmesser 1 Zoll mißt, und deren Querschnitt daher 1 Quadratzoll beträgt, vollkommen mit Flüssigkeit erfüllt sei, und plötzlich in eine Röhre übergehe, die 2 Zoll im Durchmesser hat und deren Querschnitt folglich 4 Quadratzolle beträgt, so wird man einsehen, daß die Flüssigkeit, wenn sie fortbewegt wird, in dieser 2ten Röhre 4 mal langsamer fließen müsse, als in jener kleinen Röhre, aus Gründen, die im organischen Körper durch keine organische Kraft beseitigt werden können. Denn die nämliche Menge Flüssigkeit, welche in der engeren Röhre ein 4 Zoll langes Stück der Röhre erfüllte, reicht, wenn sie in die weitere Röhre gelangt ist, nur hin, um ein 1 Zoll langes Stück derselben zu erfüllen.

Wie oben S. 40 schon erwähnt worden, so fließt das Blut in den Adern verschiedener Theile mit verschiedener Geschwindigkeit, z. B. in den Lungen mit größerer Geschwindigkeit, als in anderen Theilen. Vielleicht fließt es sogar in jedem absondernden Organe und in jedem zu ernährenden Theile mit einer andern Geschwindigkeit. Zwei einfache Mittel nun, welche die zwei Ursachen, welche bewirken, daß das Blut, ob es gleich von dem nämlichen Pumpwerke, dem Herzen, fortgetrieben wird, doch in verschiedenen Organen mit verschiedener Geschwindigkeit laufe, liegen in dieser Zunahme der gemeinschaftlichen Höhle der Röhren, in welchen es fließt, und in der größeren oder geringeren Engigkeit der feinsten Haargefäße, durch welche es hindurch muß, ehe es in die Venen gelangt, und in denen es wegen der Adhäsion des Bluts an den Wänden ein desto größeres Hinderniß erleidet, je enger sie sind.

Die Methode, die Röhren hinsichtlich ihres Rauminhalts unter einander zu vergleichen, besteht darin, daß man, wie Keill und Haller, den Durchmesser der Höhle der Arterien, nachdem sie mit einer festen Masse sehr gleichförmig ausgefüllt worden sind, an sehr vielen Stellen genau mißt, auf den, diese Durchmesser darstellenden Linien ein gleichseitiges Quadrat errichtet, und diese Quadrate der Durchmesser der Aeste in Gedanken zusammensetzt, um sie mit dem Quadrate des Durchmessers des Stammes zu vergleichen. Da indessen nicht alle Arterien durch Flüssigkeit, die man in sie einspritzt, in gleichem Grade ausgedehnt werden, und da sie beim Trocknen an manchen Stellen mehr, an andern weniger davon durchschwitzen lassen; so ist dabei einige Vorsicht anzuwenden, und in gewisser Rücksicht eine 2te Methode, um eine Bestätigung zu erhalten, zu empfehlen, nach welcher man große frische Arterien der Länge nach aufschneidet, den Abstand der Ränder derselben, nachdem sie, jedoch ohne Dehnung, ausgebreitet worden, mißt, und daraus den Durchmesser der Gefäße und deren Quadrate berechnet. Endlich kommt man auch allenfalls zu seinem Zwecke, wenn man, wie John Hunter, gleich lange Stücken aller Aeste, die ein Stamm abgiebt, nachdem sie mit einer gleichförmigen erstarrenden Flüssigkeit angefüllt worden, wägt, und ihr gemeinschaftliches Gewicht mit dem Gewichte eines gleich großen Stückes des Stammes vergleicht. Hunter that dieses z. B. mit den beiden Endästen der Aorta, von denen er in der Nähe ihres Ursprungs ein gleich langes Stück abschnitt, und diese 2 Stücken durch Wägung mit einem gleich langen Stück der Aorta, das kurz oberhalb ihrer Theilung in diese Aeste abgeschnitten worden, verglich, wobei man indessen ähnlichen Irrungen unterworfen ist, als bei der ersten Methode.

Festigkeit der Arterien.

Die Stämme der Arterien sind im Allgemeinen fester, und schwerer zerreißbar, als ihre Aeste, was daher rührt, daß ihre Wände absolut

Digitized by Google

dicker sind. Die Anatomen finden daher, daß, wenn man, wie Wintringham, in die Arterien so lange mittels einer Compressionsmaschine Luft, oder wie Viele gethan haben, mittels einer Spritze tropfbare Flüssigkeit eintreibt, bis sie zerplatzen, die Aorta weniger leicht als ihre Zweige zerreißt. Ein anderer Erfolg kann freilich eintreten, wenn sich die Anatomen zum Einspritzen, wie sie meistens thun, schnell gerinnender Flüssigkeiten bedienen, die in den Blutgefäßen von mittlerer Größe länger als in den sehr kleinen flüssig bleiben, und daher zu den kleinen Gefäßen den von der Spritze hervorgebrachten Druck nicht mehr fortpflanzen, wenn die mittleren demselben immer noch ausgesetzt sind. Die Aorta eines jungen Mannes riß bei Wintringham's Versuchen in der Nähe des Herzens durch einen Druck der Luft, der 119 Pfunden und 5 Unzen, ein Stück tiefer von einem Drucke, der 131 Pfunden 10 Unzen gleich kam. Die Milzarterie eines Mannes ertrug einen Druck der Luft, der 41 Pfunden gleich kam. Eine ganz andere Frage ist die, ob die großen Arterien verhältnißmäßig zur Dicke ihrer häutigen Wand an der Aorta fester als an den kleineren Arterien seien. Hier hat Wintringham nach seinen Versuchen das Gegentheil gefunden, so daß z. B. jene Milzarterie, ob sie gleich absolut leichter zerriß als die Aorta, doch verhältnißmäßig aus einer festeren Substanz als die Aorta bestehen mußte, weil sie außerdem, da ihre Wand sehr viel dünner als die der Aorta war, noch viel leichter hätte zerreißen müssen.

Die Dicke der Wände und also auch die Festigkeit der Arterien entspricht dem Drucke, den sie von Seiten des vom Herzen in sie eingetriebenen Bluts auszuhalten haben. Da nun ein dickes, sehr muskulöses Herz das Blut mit größerer Gewalt vorwärts treibt als ein dünnes, weniger muskulöses, so entspricht auch die Dicke der Wände der Arterien und ihre Festigkeit, der Muskelstärke eines jeden von diesen beiden Ventrikeln des Herzens. Diesen Satz bestätigt die Erfahrung sowohl bei dem Menschen, als bei den Säugethieren und Vögeln. Die linke Herzkammer hat viel dickere, fleischigere Wände, und folglich viel mehr Muskelkraft als die rechte. Daher hat auch die Aorta, in welche das Blut von ihr eingetrieben wird, viel dickere Wände als die Arteria pulmonalis. Unstreitig war auch ein größerer Kraftaufwand nöthig, um das Blut durch das zum Theil engere und viel ausgedehntere und längere Haargefäßnetz des Körpers, welches zur Ernährung und zur Absonderung von Säften dient, zu treiben, als dasselbe durch das weit kürzere und kleinere Haargefäßnetz der überdies sehr nahe liegenden Lungen hindurch zu bewegen. Denn in dem Haargefäßnetz des Körpers muß wegen seiner größeren Länge und zum Theil wegen seiner Engigkeit das Blut durch Reibung und Klebrigkeit weit mehr Hindernisse in seiner Bewegung finden, als in dem Haargefäßnetz der Lungen. Nach den von Wintringham an verschiedenen Stellen des Hauptstammes der Körperarterien gemachten Messungen, scheint indessen die Dicke der Wand nicht in dem nämlichen Verhältnisse in kleineren Arterien abzunehmen, als der Querschnitt der Höhle, so daß die Wände der kleineren Arterien in Vergleich zu dem kleineren Querschnitt ihrer Höhle ein wenig dicker sind, als die Wände der Aorta im Vergleich zu dem größeren Querschnitt ihrer Höhle. Indessen erstrecken sich Wintringhams Versuche nur auf einige Stellen der Aorta, nicht auf kleinere Arterien, und reichen deswegen noch nicht hin, einen solchen Satz zu beweisen.

---

[1]) *Wintringham*, Experimental inquiry on some parts of the animal structure. Siehe *Haller*, de partium corporis humani praecipuarum fabrica et functionibus. Tom. I. Lib. II. S. I. §. 14.

Digitized by Google

Häute der Arterien.

So weit die Kleinheit der Arterien eine Unterſuchung ihrer Wände geſtattet, findet man, daß ſie aus folgenden 3 concentriſch in einander eingeſchloſſenen Häuten, die untereinander feſt zuſammenhängen, beſtehen. Zwei derſelben, die innerſte und die äußerſte Haut, kommen mit gewiſſen Abänderungen auch den Venen zu, die mittlere iſt dagegen eine den Arterien eigenthümliche Haut, welche mit ihrer Beſtimmung Pulsadern zu ſein, d. h. den Druck des vom Herzen vorwärtsgetriebenen Blutes auszuhalten, zuſammenhängt.

1) Die erſte derſelben, die äußere Haut, tunica externa, iſt eine weiße, verhältnißmäßig für ihre Dicke ſchwer zerreißbare, zugleich aber leicht ausdehnbare Haut, welche aus einem Gewirr ſich nach allen Richtungen durchkreuzender kleiner feiner Fäden und außerordentlich vieler kleinen Blutgefäße beſteht, welche äußerlich locker, inwendig dicht übereinander liegen und enger untereinander verbunden ſind. Man nennt ſie die Zellgewebhaut, tunica cellulosa, ohne jedoch nachgewieſen zu haben, daß die feinen Faſern, aus denen ſie beſteht, und zwiſchen welchen kein Fett eingeſchloſſen iſt, von derſelben Natur als das gewöhnlich mit dieſem Namen benannte Zellgewebe ſei. Vielmehr unterſcheidet ſich die Subſtanz der äußeren Haut der Arterien unter andern dadurch ſehr weſentlich vom Zellgewebe, daß ſie viel mehr Blutgefäße beſitzt. Durch Einweichen in Waſſer lockert ſich auch der innerſte dichte Theil dieſer Haut auf. Aeußerlich ſteht ſie mit einem lockern, weichen, in Blätter und Zellen ausdehnbaren Zellgewebe in Verbindung, mittels deſſen die Arterien in den zwiſchen den Organen des Körpers befindlichen Zwiſchenräumen locker aufgehangen ſind, ſo daß ſie ſich verſchieben und ausdehnen können. Nach innen zu hängt dieſe äußere Haut mit der mittleren Haut ſo innig zuſammen, daß man beide nicht leicht von einander trennen kann, ohne entweder eine dünne Lage der Zellgewebhaut an der mittlern Haut zurückzulaſſen, oder Faſern der letzteren mit loszureißen.

2) Die mittlere Haut iſt gelb, in der Richtung der Durchmeſſer der Arterien wenig ausdehnbar, aber ſehr elaſtiſch, und verhältnißmäßig zu ihrer beträchtlichen Dicke leicht zerreißbar. Sie läßt ſich ſehr leicht in beliebig viele concentriſche Lagen zertheilen, von denen jede ſich in der Richtung des Querſchnitts der Arterien viel leichter, als in der Richtung ihrer Länge zerreißen und in Cirkelfaſern zertheilen läßt, ſo daß man von der mittleren Haut der Arterien mit leichter Mühe eine Menge platter, bandartiger, concentriſch liegender Bündel abziehen kann. Weder dieſe concentriſch übereinander liegenden Lagen, noch die Faſern

Digitized by Google

in die sich jede Lage zerreißen läßt, sind durch Zellgewebe von einander abgesondert, wie das bei den Muskelfasern und Sehnenfasern der Fall ist. Vielmehr haften sie unmittelbar an einander, und lassen sich auf den mit einem sehr scharfen Messer gemachten Durchschnittsflächen weder mit dem Gesicht allein, noch mit Hülfe des Mikroskops durch wahrnehmbare Grenzlinien unterscheiden. Zerreißt man die Haut, so sieht man zwar zwischen den sich von einander trennenden Blättchen und Fasern feine Fädchen und Blättchen befindlich, welche indessen nicht für Zellgewebe, sondern für kleine Theilchen der mittleren Haut selbst, welche bis zum Zerreißen ausgedehnt werden, zu halten sind, und daher weder durch Einweichen in Wasser, noch durch andere künstliche Hülfsmittel das Ansehn des Zellgewebes erhalten. Der Umstand, daß die Lagen und Fasern, in die sich diese Haut zerreißen läßt, nicht wie die Muskelfasern durch Zellgewebe von einander abgesondert werden, ist für ihre Bestimmung sehr wesentlich. Denn so wie das zwischen den Muskel- und Sehnenfasern liegende nachgiebige Zellgewebe das Mittel ist, durch welches sich jede Faser und jedes Bündel in einem gewissen Grade einzeln bewegen und sich an den benachbarten Fasern etwas verschieben kann, so bewirkt der Mangel eines solchen Zellgewebes in der mittleren Arterienhaut, daß ihre Lagen und Fasern nur einer gemeinschaftlichen Bewegung fähig sind. Weil die Fasern nicht getheilt und einzeln beweglich neben einander liegen, so war es auch nicht erforderlich, daß jede Faser von einem besonderen Netze von Blutgefäßen umgeben werde, was bei den Fleischfasern der Fall ist [1]).

Die Fasern, die man von dieser Haut abziehen kann, liegen übrigens nicht immer parallel, sondern zuweilen etwas seitwärts gebogen. Wo ein Ast aus einem Stamme abgeht, hat dieser seine eigenthümlichen Cirkelfasern, über welche sich die Fasern des Stamms hinwegkrümmen. An der gewölbten Seite des Bogens der Aorta ist die Faserlage dicker als an der concaven. An den Arterien im Innern des Gehirns und der Milz ist sie sehr dünn, fehlt aber doch nicht ganz. Die Substanz, aus welcher diese mittlere Arterienhaut besteht, und von der schon Theil I. S. 365 gehandelt worden, ist eine eigenthümliche, und weder der Substanz des Fleisches, noch der der Sehnen ähnlich. Man hat diese Haut daher ehemals nur mit Unrecht tunica muscu-

[1]) *Doellinger*, Bemerkungen über die Vertheilung der feinsten Blutgefäße in den beweglichen Theilen des thierischen Körpers in *Meckels* Archive für die Physiologie, B. VI. 1820. S. 191, 192, wo er sagt, daß die Fleischfasern sich dadurch auszeichnen, daß sie von sehr vielen kleinen Haargefäßen begleitet werden, die ihnen parallel laufen und unter einander im Fortgehen anastomosiren; daß sich dagegen die kleinsten Gefäße in der mittlern Haut der Arterien ganz anders vertheilen, indem sie sich baumförmig theilen und nie neben den Fasern parallel laufen.

Digitized by Google

laris genannt [1]). Auch muß man, wenn man sie neuerlich Tunica fibrosa nennt, dabei nur an ihre Eigenschaft, sich leicht in Cirkelfasern zerreißen zu lassen, nicht aber an die Gegenwart von Sehnenfasern in ihr denken. Sie ist härter, trockner und weniger blutreich, als Fleisch, fault schwer, und riecht dabei nicht so übel, giebt, wie Bichat und Berzelius angegeben haben, durch Kochen im Wasser keinen Leim und kein Osmazom her, durch langes Faulen im Wasser verwandelt sie sich zwar in einen Brei, aber nicht in Zellgewebe, und besitzt übrigens auch nicht das Vermögen, durch eine ihr beiwohnende lebendige Kraft schnelle sichtbare Bewegungen zu machen.

Essigsäure, welche bekanntlich den Faserstoff erweicht, durchsichtig macht und auflöst, verändert die Farbe der Arterien nach den von Belmas [2]) hierüber angestellten Versuchen wenig, und macht sie vielmehr dichter. Berzelius [3]) sagt dasselbe. Nach ihm wird diese Haut, wenn sie mit concentrirter Essigsäure übergossen wird, weder erweicht, noch aufgelöset, und sogar in kochender verdünnter Essigsäure ist sie unauflöslich; dagegen ist sie in Schwefelsäure, oder Salpetersäure, Salzsäure, die man mit so viel Wasser verdünnt hat, daß sie dieselbe nicht zersetzen, sehr leicht, zumal in Digestionswärme, auflöslich. Die dadurch erhaltene Flüssigkeit wird weder von Alkali, noch von Cyaneisenkalium gefällt, was nach Berzelius geschehen müßte, wenn sie aus Faserstoff bestände. Von kaustischem Kali wird sie zu einer ungefärbten, aber etwas unklaren, durch Säuren nicht fällbaren Flüssigkeit aufgelöst.

Durch mehrere der erwähnten Eigenschaften, namentlich auch dadurch, daß sie gekocht keinen Leim hergiebt, ferner durch ihre gelbe, nicht schillernde Farbe, so wie durch ihre viel größere Ausdehnbarkeit und geringere Festigkeit unterscheidet sich die Substanz der mittlern Arterienhaut auch hinlänglich von der der Sehnen.

Nach John Hunters [4]) Versuchen waren die Arterien eines an Verblutung gestorbenen Pferdes so ausdehnbar, daß die aufgeschnittene Wand der Aorta, der Quere nach ausgedehnt, fast noch einmal so breit gezogen wurde, als sie zuvor war. Ließ man mit der Ausdehnung nach, so zog sie sich durch ihre Elasticität wieder zusammen, jedoch nicht völlig auf ihre vorige Größe, denn sie hatte um $1/11$ bis um $1/17$ ihrer vorigen Breite zugenommen. Kleinere Arterien besaßen dieses Vermögen, sich durch ihre Elasticität wieder zusammen zu ziehen, in einem minderen Grade als größere.

---

[1]) *De la Sône*, Recherches sur la structure des artères. Mém. de l'Ac. roy. des sc. 1756. Paris 1762. 4. S. 119. betrachtete die Fasern der mittleren Haut der Arterien als Muskelfasern von eigenthümlicher Art.

[2]) *Belmas*, Structure des artères, leurs propriétés, leurs fonctions et leurs altérations organiques. Strasbourg 1821. 4. p. 26.

[3]) *Berzelius*, Lehrbuch der Thierchemie, a. d. Schw. übers. von *F. Wöhler*. Dresden 1831. 8. p. 80.

[4]) John Hunter, Versuch über das Blut, die Entzündung und die Schußwunden, a. d. E. Leipzig 1800. 8. Bd. 1.

Nach den Versuchen von Belmas [1]) ließen sich einzelne Fasern, die er von der mittlern Haut der Aorta des Menschen abzog, nur um 1/7 ihrer Länge ausdehnen, ehe sie zerrissen. Waren daher die abgezogenen Fasern lang, so war natürlich auch dieses Stück größer, als wenn sie kurz waren.

3) Die innerste, äußerst dünne, glatte, sehr dichte und durchsichtige Haut, tunica intima [2]), welche nicht faserig ist, kommt allen Theilen des Gefäßsystems zu, denn sie dringt in die Höhlen des Herzens ein, und erstreckt sich von da aus ohne Unterbrechung in die Venen. Beim Embryo setzt sie sich sogar aus den hellrothes Blut enthaltenden Blutbehältern in die dunkelrothes Blut führenden fort. Am Anfange der Arterien bildet sie die Falten, aus welchen die halbmondförmigen Klappen bestehen. Uebrigens zeichnet sie sich in den Arterien dadurch aus, daß sie sich daselbst leichter als in den Venen zerreißen und durch einen zusammengezogenen Faden durchschneiden läßt, auch im Alter öfter durch eine Ablagerung von erdiger Substanz an ihrer äußeren Oberfläche verknöchert. Sie hängt der mittlern Haut sehr fest an, läßt sich jedoch an Arterien, die in immer erneuertem Wasser zu faulen anfangen, stückweise ablösen. B. S. Albin [3]) und Bichat [4]) konnten dabei keine Lage Zellgewebe zwischen ihr und der mittlern Haut der Arterien entdecken, obgleich Alexander Monro der ältere [5]) eine dünne Lage desselben beschrieben, und vermuthet hat, daß in diesem Zellgewebe der Sitz der Verknöcherung sei, dem die Arterien so sehr unterworfen sind [6]). Albin und Bichat konnten auch die Längenfasern nicht

---

[1]) *Belmas* a. a. O. p. 28.

[2]) Ueber die innerste Haut der Gefäße, namentlich über die Frage, ob sie als eine Art Oberhaut derselben, welche keine Gefäße und Nerven besitzt, zu betrachten sei, über die Röthung dieser Haut durch zersetztes Blut, das von ihr nach dem Tode eingesogen wird, ist Theil I. S. 245 — 253 nachzusehen.

[3]) *Albini* Academicarum annotationum Lib. IV. c. 8. p. 36.

[4]) *Bichat* a. a. O. S. 57.

[5]) Alexander Monro, die medicinischen Versuche und Bemerkungen, welche von einer Gesellschaft in Edinburgh durchgesehen und herausgegeben worden, a. d. E. übersetzt. Altenburg 1750. B. II. S. 351, 352.

[6]) Die 4 neuesten Schriftsteller über die Häute der Arterien sind *Michaelis Jäger* Tractatus anatomico-physiologicus de arteriarum pulsu. Wirceburgi 1820. 8. p. 8. *C. Mondini* in Opuso. scientif. di Bologna. T. I. 1817. *Charles Henri Ehrmann*, Structure des artères, leurs propriétés, leurs fonctions et leurs altérations organiques etc. Strasbourg 1822. 4., und Belmas unter demselben Titel und in demselben Jahre zu Strasburg erschienene Schrift in 4. *Christian Gottlieb Ludwig*, De arteriarum tunicis. Lipsiae 1739. 4. und in Hallers Disp. anat. select. Vol. II. p. 1. sq. und Jäger a. a. O. haben die Meinungen verschiedener Schriftsteller über die Zahl der Häute der Arterien gesammelt. *Douglas* (Descriptio peritonaei et membranae cellularis etc. ex anglo latine versa ab *El. Fried. Heistero*. Helmstadii 1733. p. 54, 55) nimmt nur 1 Haut an, glaubt aber, daß sie aus Zirkel- und Längenfasern besteht. Galenus nimmt 2 Häute an (De anatomicis administrationibus VII. §. 5.) Al. Monro, Sömmerring, Bichat, Meckel und viele andere Anatomen zählen 3 Häute. *Willis* (Pharmacia rationalis sect. V. cap. 3.) *Vieussens* (Novum vasorum c. h. systema. Amst. 1705. p. 88), *Verheyen* (Anat. c. h. Lib. I. Tract. 1 c. 4), *Lancisi* (De motu cordis et anevrismatibus. Romae 1728. fol. p. 95) nehmen 4 Häute der Arterien an. Endlich zählen *Laurentius Heister* (Compendium anatomicum, Altorf. 1727 p. 302, Nota.) *De Gorter* (Compendium

Digitized by Google

finden, welche Alexander Monro an ihr wahrgenommen zu haben meint, wiewohl neuerlich auch Gerlach [1]) solche Fasern gesehen zu haben behauptet. Man sehe übrigens über diese innerste Haut das nach, was Th. I. S. 245 gesagt worden ist.

Der Streit über die Zahl der Häute der Arterien ist mehr ein Streit welcher die gebrauchten Worte, als die Wahrnehmungen betrifft [2]). Betrachtet man nämlich die benachbarten Häute, an welche die Arterien an manchen Stellen von einer oder von mehreren Seiten angrenzen, z. B. die Brusthaut, die Bauchhäute und den Herzbeutel, als Häute der Arterien, nennt man das lockere Zellgewebe, durch welches die Arterien äußerlich an benachbarte Theile befestigt sind, mit Haller Tunica cellulosa adscitia, oder die nicht sichtbare Lage Zellgewebe zwischen der mittlern und inneren Haut, Tunica cellulosa interior, so hat man 5 Häute, ohne von andern Anatomen, die nur 3 annehmen, in seiner Behauptung im Wesentlichen abzuweichen; nennt man dagegen die dichte äußere Zellhaut ein Zellgewebe, das man nicht für eine Haut anerkennt, oder trägt man Bedenken, die innerste Haut der Arterien als eine besondere Haut zu betrachten, weil man sie nur mit Mühe und in kleinen Stücken ablösen kann, so kann man nur 2 oder sogar nur 1 Arterienhaut zählen, ohne jedoch eine wesentlich verschiedene Meinung vorzutragen. Von anderer Art ist freilich die Annahme einer Drüsenhaut unter der Zellgewebhaut der Arterien. Allein dieser Punkt ist nicht mehr streitig. Genaue Untersuchungen haben gelehrt, daß die von Willis, Vieussens Verheyen und De Gorter angenommenen, von Bidloo sogar abgebildeten Drüsen in der Wand der Arterien nicht vorhanden sind.

Bemerkenswerth ist es, daß mehrere Anatomen an der mittleren Haut 2 verschiedene Lagen unterschieden haben. John Hunter [3]) glaubte z. B. an der mittleren Haut der Arterien, wenn er Arterien von mäßiger Größe untersuchte, eine innere, dunklere und etwas durchsichtigere Lage, die nach seiner Vermuthung muskulös ist, und eine äußere mehr elastische zu unterscheiden. Er beobachtete den Unterschied der Farbe dieser 2 Lagen auf der Durchschnittsfläche der mit einem scharfen Messer quer durchgeschnittenen Arterien, und meinte, daß in der mittleren Haut sehr großer Arterien die äußere elastische Lage, an der der sehr kleinen Arterien die innere Lage das Uebergewicht habe. Hierbei kann sich Hunter freilich getäuscht haben. Denn da die Haut der Arterien nach dem Tode nicht selten Blutfarbe einsaugt und sich von innen her röthet, so kann hierin der Unterschied der Farbe jener 2 Lagen gelegen haben. Indessen führt er noch einen 2ten Unterschied dieser 2 Lagen an, der diesem Einwurfe nicht ausgesetzt ist; er behauptet nämlich, daß, wenn man eine aufgeschnittene Arterie der Quere nach ausdehne, so ziehe sich nachher die äußere elastische Lage der mittleren Haut stärker zusammen, als die innere dunklere, und diese letztere rage daher auf der Durchschnittsfläche hervor, und benge sogar die Wand nach der entgegengesetzten Seite, so daß die convere Oberfläche zur concaven werde. Die Richtung der Fasern konnte er an dieser Lage nicht unterscheiden.

Auch Mascagni [4]) unterscheidet auf jener Haut, die wir die mittlere genannt haben, 2 Lagen, die äußere Lage, die er elastica, und die innere, die er nervea nennt. Die 2te ist nach ihm viel dünner, aus viel feineren Filamenten zusammengesetzt, aber dennoch fester und compacter als die erstere. Nach ihm ist die elastische Lage, ob sie gleich aus Zirkelfasern zu bestehen scheint, bei genauerer Untersuchung mit dem Mikroskope, dem Gewebe einer Strohmatte ähnlich.

An den größten Arterienstämmen ist die mittlere Arterienhaut die

---

medicinae Tract. XIX. §. 40.) und *Haller* (De partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus. Lib. II. Sect. 1. §. 5 — 9.) 5 Häute der Arterien.

[1]) *Gerlach*, anatomisch-physiologische Inauguralabhandlung über das System der Gefäße. Würzburg 1816. p. 20.

[2]) Albin sagt daher mit Recht »ut omittam numerum tunicarum, quibus de rebus non libenter disputo«.

[3]) Hunter, über das Blut, die Entzündung und die Schußwunden, a. d. E. Leipzig 1800. B. 1. 8.

[4]) *Mascagni*, Prodromo della grande anatomia; opera postuma etc. Firenze 1819. S. 61.

Digitized by Google

die dickste unter allen. Je kleiner der Durchmesser der Arterien wird, desto mehr verliert sich diese hervorstechende Dicke der mittleren Haut. Da nun die sehr kleinen Arterien durchsichtig sind, wenn sie gekocht werden, nicht hart und unverdaulich bleiben, wie die großen Stämme, so muß man wohl schließen, daß die elastische Substanz in ihnen sehr dünn ist, oder fast ganz fehlt.

Nutzen der drei Häute der Arterien.

Die äußere Haut hält die Arterien noch zusammen, wenn auch die innere und mittlere an einer Stelle durchbrochen oder durchschnitten worden. Dieses geschieht z. B. durch einen Faden, womit die Arterien eines lebenden Menschen zugebunden worden, oder wenn das Blut die krankhaft veränderte innere und mittlere Haut durchbricht. In dem letzteren Falle wird oft die äußere nachgiebige Haut durch den Druck des Bluts sackförmig ausgedehnt und verdickt, sie bildet dann eine Geschwulst, die man aneurisma, Pulsadergeschwulst, nennt.

Die innerste Haut hat den Nutzen, durch ihre große Glätte die Reibung des Bluts an den Wänden der Arterien, und das hieraus entspringende Hinderniß für die Bewegung des Bluts möglichst zu vermindern, zugleich aber durch ihre große Dichtigkeit zu verhüten, daß das Blut nicht zwecklos in die schwammige Substanz der Arterienwände ein- und durch sie hindurchdringe. Unstreitig ist es auch diese Haut, welche in den kleinen Arterien vermöge besonderer, noch nicht gehörig bekannter, Einrichtungen einen wesentlichen Nutzen bei der Absonderung der Säfte hat.

Die mittlere, den Arterien eigenthümliche Haut endlich verhindert, daß die Arterien auf der einen Seite nicht so leicht von außen her zusammengedrückt werden, sondern immer offen stehen, und daher mit einer ununterbrochenen Blutsäule gefüllt sind, auf der andern, daß sie von innen her durch das Blut nicht übermäßig, aber doch in einigem Grade ausgedehnt werden, und sich wieder, mit fast eben so großer Kraft zu verengern und zu verkürzen streben, und dadurch das Blut vorwärts treiben.

Puls der Arterien.

Die größeren Arterien und die von mittlerer Größe zeichnen sich während des Lebens durch den an ihnen fühlbaren Puls aus, der zu dem Namen Pulsadern, Schlagadern, womit man die Arterien bezeichnet, Veranlassung gegeben hat. Dieser Puls entsteht dadurch, daß die Herzkammern in die mit ihnen zusammenhängenden großen, vom Blute vollen Arterien wiederholt eine gewisse Menge Blut eintreiben. Das Blut, womit die Arterien angefüllt sind, erleidet, da es durch die engen Haar-

Digitized by Google

gefäße nicht schnell genug vorwärts geschoben werden kann, einen Druck, vermöge dessen es wie jede gedrückte Flüssigkeit nach allen Richtungen auszuweichen strebt. Eine ausdehnbare, elastische, volle Röhre, in welche durch eine weite Oeffnung Flüssigkeit mit Gewalt eingetrieben wird, die durch das andere Ende der Röhre aus irgend einem Grunde nicht schnell genug herausfließen kann (z. B. weil die Flüssigkeit an der Röhre daselbst durch ihre Klebrigkeit haftet, oder weil jenes Ende sehr eng ist), wird durch den Druck der Flüssigkeit sowohl in der Richtung ihrer Durchmesser, als in der ihrer Länge ausgedehnt und durch beide Arten der Ausdehnung in ihrer Höhle erweitert. Ist eine solche Röhre überall verschiebbar, so werden sich die Enden der verlängerten Röhre von einander entfernen. Sind dagegen die Enden oder mehrere andere Stellen der Röhre befestigt, so muß sich die Röhre dabei schlängeln. Dasselbe geschieht nun bei den Arterien. Sie verschieben und schlängeln sich, während sie durch das vom Herzen in sie eingedrückte Blut verlängert werden, und dehnen sich zugleich dabei in ihren Durchmessern etwas aus [1]). Die Ausdehnung der Arterien kann aber in der Richtung der Durchmesser aus 2 Ursachen nicht so merklich sein als in der Richtung ihrer Länge, erstens, weil eine in gleichem Grade ausdehnbare Materie von einer und derselben Kraft um ein desto größeres Stück ausgedehnt wird, je länger die Materie ist. Ist z. B. ein aus dieser Materie bestehender Faden noch einmal so lang als ein zweiter Faden, so wird er auch durch die nämliche Kraft um ein noch einmal so großes Stück ausgedehnt werden, als dieser. Nun sind aber die elastischen Fasern, welche die Peripherie der Arterienhöhle umgeben, sehr kurz, und zwar desto kürzer, je enger die Arterien sind; dagegen bildet die elastische Materie der Arterienwände ihrer Länge nach eine sehr lange Strecke. Folglich muß die Ausdehnung, welche die Arterien durch den Druck des Bluts in der Richtung ihrer Durchmesser erleiden, um so weniger merklich sein, je enger die Arterien sind, und jeder Zeit sehr gering gefunden werden, verglichen mit der Ausdehnung, die sie ihrer Länge nach erfahren. Hierzu kommt noch ein zweiter Umstand, welcher bewirkt, daß die Ausdehnung, die die Arterien in der Richtung ihrer Durchmesser erleiden, noch geringer erscheint, als sie wirklich ist, der nämlich, daß man, indem man diese Erweiterung beobachtet, nur auf einen Durchmesser der Arterie Rücksicht nimmt. Da sich nun die Länge eines Durchmessers einer Röhre zur Länge der Peripherie derselben nahe wie 1 zu 3 verhält, so nimmt man, wenn sich z. B. die Peripherie um 1 Linie ausdehnt, an dem Durchmesser nur eine Verlängerung von $\frac{1}{3}$ Linie wahr. Man darf sich daher nicht wundern, daß die Ausdehnung der Arterien in ihren Durchmessern während des Pulses so gering ist, daß man sie an den meisten Stellen an entblößten Arterien gar nicht durch das Gesicht wahrzunehmen im Stande ist, und es würde ganz irrig sein, mit Parry daraus zu schließen, daß beim Pulse keine Erweiterung der Arterien in ihren Durchmessern Statt finde. Die Größe der gesammten Ausdehnung einer Arterie beim Pulse (d. h. sowohl der aus der Verlängerung der Arterie, als der aus ihrer Erweiterung entspringenden Ausdehnung) kann man mittelst einer von Poiseuille [2]) ausgedachten Vorrichtung bei einem Pferde messen. Er machte nämlich die Arteria carotis communis am Halse eines lebenden Pferdes in einer Strecke von 3 Decimetern ringsherum frei, so daß sie in die Höhe gehoben und in eine untergeschobene Rinne gelegt werden konnte. Diese Rinne war aus einer eisernen Röhre gebildet, aus deren Wand der ganzen Länge nach ein schmales Stück herausgenommen worden war. Dieses Stück setzte er, nachdem die Arterie in die

[1]) *Bichat*. Allgemeine Anatomie, übers. v. *Pfaff*, B. I. Abth. 2. S. 63 befand sich in dem Irrthume, zu glauben, daß die Ortsbewegung, welche die Arterien im Augenblick des Pulses erleiden, davon herrührten, daß die zuvor geschlängelten Arterien durch den Druck des Bluts gestreckt und gerade gemacht würden. Allein es verhält sich umgekehrt, die Arterien werden im Augenblicke des Pulses ausgedehnt und daher länger und geschlängelt. Dasselbe findet nach dem Tode statt, wenn die Anatomen in die Arterien Flüssigkeiten einspritzen. Sie schlängeln sich dann desto mehr, je mehr Kraft man bei der Einspritzung anwendet.

[2]) *Poiseuille*, recherches sur l'action des artères dans la circulation artérielle, siehe Répertoire générale d'anatomie par *Breschet*. 1829. Tome VII. p. 149.

Digitized by Google

Rinne gebracht worden war, wieder ein, verwandelte dadurch die Rinne wieder in eine Röhre, durch welche die Arterie (in welcher der Blutlauf fortdauerte) hindurchging, verschloß die beiden Enden der Röhre mit Wachs und Fett, und füllte den Raum, den die Arterie in der Röhre übrig ließ, mit mäßig warmen Wasser an, das er durch eine enge Glasröhre, die in die Röhre von außen hinein ging, einfüllte. Bei jedem Pulsschlage stieg das Wasser in der 3 Millimeter dicken Glasröhre, durch die er das Wasser eingefüllt hatte, um 70 Millimeter, weil sich die in der eisernen Röhre gelegene, vom Wasser rings umgebene Arterie verlängerte und erweiterte, und das Wasser in die Glasröhre hinausdrängte. In dem Zwischenraume zwischen 2 Pulsschlägen dagegen sank allemal das Wasser in der Glasröhre um eben so viel. Da er nun wußte, daß das eingeschlossene Stück der Arterie 235 Millimeter lang war, und 2106 Quadrat-Millimeter Raum einnahm, und daß es bei jedem Pulsschlage um 210 Quadrat-Millimeter an Umfang zunahm, so folgt, daß es ungefähr um $^1/_{11}$ seines Raums ausgedehnt wurde.

Nutzen der Elasticität der Arterien.

Wären die Arterien wie Glasröhren sehr unausdehnbar, so würde das vom Herzen in sie auszutreibende Blut nicht eher Platz in ihnen finden, als bis das sämmtliche Blut in allen Arterien gleichzeitig vorwärts geschoben würde und Platz machte. Um aber das Blut in allen Stämmen, Zweigen und Haargefäßen gleichzeitig vorwärts zu schieben, würde von dem Herzen eine viel größere Kraft aufgewendet werden müssen, als erforderlich ist, wenn die Arterien ausdehnbar und elastisch sind. Denn unter jenen Umständen müßten alle die Hindernisse, die von der Reibung, Adhäsion des Bluts an den Wänden der Gefäße und von seinem Gewichte herrühren, gleichzeitig an allen Stellen des Gefäßsystems überwunden werden. Weil aber die Arterien ausdehnbar und elastisch sind, so findet das vom Herzen in sie auszustoßende Blut zum Theil schon dadurch Platz, daß die dem Herzen näher gelegenen Arterien sich verlängern und erweitern, dadurch mehr Blut zu fassen im Stande sind und auf diese Weise das vom Herzen ausgetriebene Blut aufnehmen. Indem diese Arterien sich nun hierauf durch ihre Elasticität wieder verkürzen und verengern, und das Blut, das wegen der am Herzen befindlichen Taschenventile nicht wieder ins Herz zurückweichen kann, vorwärts drängen, bewirken sie, daß nun auch nach und nach die vom Herzen entfernteren Arterien vom vorwärts gedrängten Blute ausgedehnt werden, so, daß das Blut successiv in den nähern und entferntern Abtheilungen des Gefäßsystems schneller fortgeschoben wird. Weil dieses sehr schnell geschieht, so ist zwar der Puls an allen Arterien beinahe gleichzeitig, indessen ist er doch nicht so völlig gleichzeitig, daß man nicht zu fühlen im Stande wäre, daß jeder Pulsschlag an der dem Herzen näheren Kopfschlagader ein wenig früher eintrete und nachlasse, als an der vom Herzen entfernteren Schlagader des Fußrückens [1]).

[1]) *Josias Weitbrecht*, in den Commentar. Acad. imp. sc. Petropolitan. ad annum 1734 et 1735. Petropoli 1740. p. 317. — *Th. Young*, The Croonian

Man spricht daher mit Recht von einer Blutwelle, welche vom Anfange der Arterien bis an die Enden derselben fortgehe, und an jeder Stelle der Röhren in dem Zeitmomente, wo sie vorübergeht, den Puls verursache. Diese Welle besteht in einer fortschreitenden Ausdehnung der Wände der Arterien, die von Ort zu Ort längs der angefüllten Arterien fortgeht, und allemal an der Stelle, wo sie sich befindet, mit einer etwas verstärkten Vorwärtsbewegung des Bluts verbunden ist. Auf ähnliche Weise verursacht ein in die Mitte eines Teichs gefallener Stein eine Welle, welche endlich bis ans Ufer gelangt. Hierdurch wird nicht das vom Stein getroffene Wasser bis ans Ufer bewegt, sondern nur um den Stein herum auszuweichen genöthigt. Indem aber dieses Wasser wieder das benachbarte Wasser auszuweichen nöthigt, dessen Platz es einnimmt, so bewegt sich ein Wasserberg nach dem Ufer hin, der aber, während er fortrückt, immer von anderm und anderm Wasser gebildet wird. Um das ganze Wasser eines Teichs gleichzeitig ein klein wenig fortzuschieben, würde eine außerordentliche Kraft nöthig sein, dagegen nur successiv alle Wassertheilchen ein Stückchen fortzuschieben schon die Kraft hinreicht, die ein in das Wasser fallender Stein besitzt. Die Welle ist eine fortschreitende Form, keineswegs eine fortbewegte Materie. Während die Welle sich durch das Wasser hindurch bewegt, setzt sie an jeder Stelle, an welcher sie vorübergeht, das daselbst befindliche Wasser in eine kleine und nur eine kurze Zeit dauernde Bewegung. Die Wellenbewegung, die den Puls verursacht, ist eben so von der Fortbewegung des Bluts unterschieden, wie diese 2 Bewegungen im Flusse.

In dem Zeitraume von einem Herzschlage zum andern rückt das Blut in der Aorta nur um so viel weiter, als das vom Herzen ausgestoßene Blut Raum in dem an das Herz grenzenden Stücke der Aorta einnimmt, d. h. 6 bis 8 Zoll, die Blutwelle dagegen geht mit kaum meßbarer Geschwindigkeit bis ans Ende des Arteriensystems.

Hierzu kommt noch der Nutzen, den die elastische Haut der Arterien hat, indem sie bewirkt, daß das Blut nicht absatzweise fortgestoßen, sondern ununterbrochen vorwärts gedrückt wird. In der That fließt das Blut aus einer geöffneten Arterie eines lebenden Thiers in einem ununterbrochenen Strome aus, und dieser Blutstrom wird in größeren Arterien während jeden Pulsschlages nur augenblicklich verstärkt. Die Verstärkung ist aber desto weniger merklich, je kleiner die Arterien sind, die man öffnet. Das Herz hat hierin einige Aehnlichkeit mit den Spritzen, z. B. mit den Feuerspritzen, daß die Flüssigkeit aus ihm in Zwischenräumen durch periodisch wiederholte Stöße ausgetrieben wird. Der Zweck beider Instrumente erfordert es aber, daß die Flüssigkeit in einem ununterbrochenen Strome fließe. Dieses ist in beiden dadurch bewirkt, daß bei jedem Drucke dieser Pumpwerke nicht nur die Flüssigkeit vorwärts getrieben, sondern auch ein elastischer Körper gespannt wird, welcher auf die Flüssigkeit zu drücken und sie auszutreiben fortfährt, während das Pumpwerk selbst nicht drückt. Dieser elastische Körper ist bei den Arterien die elastische Wand derselben, bei den Feuerspritzen die in ihrem Windkessel über dem Wasser befindliche Luft.

Druck, den die Arterien vom Blute auszuhalten haben.

Wie groß der Druck sei, welchen die Wände der Arterien im Momente des Pulses und in den Zwischenräumen zwischen den Pulsschlägen vom Blute auszuhalten haben, kann man, wie schon oben erwähnt

---

lecture on the functions of the heart and arteries. Philos. Transact. for the year 1809. Part. I. p. 11 sq. — *Ernestus Henricus Weber*, Observationes anatomicae et physiologicae prolus. I. pulsum arteriarum non in omnibus arteriis simul, sed in arteriis a corde remotis paulo serius, quam in corde et in arteriis cordi vicinis fieri.

Digitized by Google

worden ist, bei einem lebenden Thiere dadurch finden, daß man wie Hales eine Arterie öffnet, in dieselbe eine senkrecht gestellte Glasröhre einfügt, anbindet, und beobachtet, wie hoch das Blut in der Röhre in die Höhe steigt. Auf diese Weise fand Hales[1]), daß das Blut in der Arteria carotis bei Pferden ungefähr 8—9 Fuß, beim Schafe 6½, bei verschiedenen Hunden im Mittel 4 Fuß hoch stieg, während es in Röhren, die in den entsprechenden Venen eingebunden worden waren, bei Pferden nur 12½ Zoll, beim Schafe 5½ Zoll, bei Hunden im Mittel 4 Zoll in der Röhre in die Höhe stieg. Er sah das Blut in der in eine Arterie gebrachten Röhre bei jedem Pulsschlage um 1 oder einige Zoll bei heftiger Anstrengung der Muskeln um viel mehr steigen, beim tiefen Einathmen aber fallen. Weil aber Poiseuille[2]) glaubt, daß die schnelle Gerinnung des Bluts die Versuche des Hales unsicher gemacht habe, so hat er eine an ihrem Anfange gebogene, mit einem Hahne versehene und mit Quecksilber gefüllte Röhre genommen, in ihren Anfang etwas kohlensaures Natron gethan, welches das Gerinnen des Bluts hindert, und, nachdem er die Röhre in eine Arterie eingebunden und den Hahn geöffnet hatte, beobachtet, einer wie hohen Quecksilbersäule das in der Arterie befindliche Blut das Gleichgewicht zu halten im Stande sei. Nach Poiseuille's Versuchen steigt das Blut bei Hunden höher als nach Hales Versuchen, was er daher leitet, daß das Blut sich bei diesen den Weg durch seine schnelle Gerinnung versperrt habe. Nach Poiseuille hält das Blut der Arterie bei Hunden im Mittel einer Quecksilbersäule von 151 Millimetern, oder einer Wassersäule von 6½ Par. Fuß, bei Rindern einer Quecksilbersäule von 161 Millimetern, oder eine Wassersäule von 6 Fuß 9 Zoll, bei Pferden einer Quecksilbersäule von 159 Millimetern, oder einer Wassersäule von 6 Fuß 8 Zoll, und also bei diesen Säugethieren im Mittel 156 Millimetern, d. h. einer Wassersäule von 6 Fuß 7 Zoll das Gleichgewicht. Er sah auch, daß der Druck, den die Wände der größeren Arterien auszuhalten haben, gleich sei, sie mögen nun dem Herzen näher oder von demselben entfernter liegen, sie mögen ein wenig größer oder kleiner sein. Auch bei verschiedenen Thieren ist nach seinen Versuchen der Druck, den das Blut vom Herzen erleidet, nicht sehr verschieden, und keineswegs der Größe und dem Gewichte des Herzens proportional, ein Satz, der mit der aus der mechanischen Betrachtung des Herzens sich ergebenden Theorie übereinstimmt; denn nach dieser wird der Druck, den ein großes und ein kleines Herz unter übrigens gleichen Umständen auf die enthaltene Flüssigkeit hervorbringt, dann gleich sein, wenn sich die Herzen selbst ähnlich bleiben, d. h., wenn die Fleischmasse des Herzens nicht nur wie die Oberfläche, sondern auch in allen Durchmessern wie die Durchmesser selbst an Dicke zunimmt. So kann es denn wohl sein, daß der Druck, den das Blut in den Arterien eines Hundes erleidet, dessen Herz immer 8 Loth wiegt, eben so groß ist als der Druck, den das Blut eines Rindes erfährt, dessen Herz über 7 Pfund wiegt.

Gefäße und Nerven der Arterien.

In der äußeren zelligen Haut der größeren Arterien verlaufen die ernährenden Arterien dieser Gefäße. Sie entspringen nicht unmittelbar aus der Höhle der Arterie, der sie angehören, sondern aus Zweigen, die dieselbe abgiebt, und bilden ein ziemlich dichtes Netz. Sie sind bei jüngeren Menschen zahlreicher als bei ältern, und lassen sich noch bei sehr kleinen Arterien, z. B. nach Sömmerring, bei de-

[1]) *Hales*, Haemastatics, übersetzt ins Französische unter dem Titel: Haemastatique de *Hales*, traduit par *Sauvages*. Geneve 1744. 4. p. 1. sq.

[2]) *Poiseuille*, sur la force du coeur aortique, in Répert. gén. d'anatomie et de physiologie pathol. etc. red. par *Breschet*. Paris, Tome VI. cah. 3. 1828. p. 69.

nen, die etwas mehr als ½ Linie im Durchmesser haben, erkennen. Von diesem Netze dringen nur sehr wenig Gefäße in die mittlere gelbe Haut ein, und Bichat [1]) gesteht sogar, daß er weder durch Einspritzung von Flüssigkeiten in die Arterien, noch durch Oeffnung der Arterien an einem lebenden Thiere, die kleinen ernährenden Arterien habe bis zu der innern Membran dringen sehen. C. Ed. Letierce [2]) spritzte gefärbtes Leinöl oder Serum in die Arterien, und trieb die Flüssigkeit in die feineren Gefäße noch mit dem Finger vorwärts. Auf diese Weise glaubt er bei Embryonen die eingespritzte Flüssigkeit bis zur innern Haut oder wenigstens bis in die Nähe der innern Haut dringen gesehen zu haben, durch welche die kleinen Gefäße durchschimmerten. Nach Döllinger breiten sich die kleinen Arterien nicht in Zwischenräumen zwischen den verschiedenen Lagen aus, in die man die mittlere Arterienhaut zerlegen kann, und eben so wenig bilden sie Netze, welche die einzelnen gelben Zirkelfasern umgeben, sondern zertheilen sich baumförmig, und deuten also durch ihre Verbreitungsart nicht an, daß die mittlere Arterienhaut aus concentrischen Blättern, und jedes von diesen aus von einander abgesonderten Zirkelfasern bestände. Auf ähnliche Weise verhalten sich auch die in den Arterienwänden befindlichen Venen. Auch sie bilden zahlreiche Netze in der zelligen Haut, in die nicht selten bei Einspritzungen die Injectionsmassen dringen. Sömmerring sah die größern Stämme der Arterien, z. B. des Unterschenkels, von deutlichen Saugadern dicht umzogen. Die größeren Stämme der Arterien besitzen, wie Sömmerring [3]) bemerkt, verhältnißmäßig feinere und wenigere Nerven, als die Stämme von mittlerer Größe. Je feiner die Arterien werden, desto dichter werden die Netze der sie umgebenden Nerven. Die Arterien am Kopfe, am Halse, in der Brust- und Bauchhöhle erhalten ihre Nerven vom sympathischen Nerven, der ihnen fast ausschließlich angehört. Es ist indessen schwer zu bestimmen, welche von den sie umgebenden Fäden in die Wände der Arterien selbst eindringen, und welche nur an ihnen hinlaufen. »Sehr schön und ohne mühsame Vorarbeit sieht man«, sagt Sömmerring [4]), »die Nervennetze, welche die Wirbelarterie in der Schädelhöhle umziehen.« Diese Nerven haben aber Lucä und Bock nicht finden können, dagegen hat Bock [5]) Netze des sympathischen Nerven, welche die Aeste der Carotis interna nach dem Gehirn zu begleiten, beschrieben. Ribes [6]) will Nervenfäden an den Arterien des Gehirns bis in die Substanz des Gehirns verfolgt haben, und Wrisberg [7]) fand Zweige,

---

[1]) *Bichat*, Allgemeine Anatomie, übers. v. *Pfaff*, B. I. Abth. 2. S. 54.

[2]) *C. Ed. Letierce*, Essai sur quelques points d'anatomie etc. Paris 1829. Siehe Archives gén. d. Méd. Nov. 1829. S. 424.

[3]) S. Th. Sömmerring, Vom Baue des menschlichen Körpers, Th. IV. Frankfurt 1801. S. 71.

[4]) Sömmerring a. a. O. S. 72.

[5]) *A. C. Bock*, Beschreibung des fünften Nervenpaars.

[6]) *Ribes*, Mém. de la soc. méd. d'émulation VIII. 1817. p. 604 sq. *Meckels* Archiv B. V. p. 442.

[7]) H. *A. Wrisberg*, sylloge commentationum anatomicarum: de nervis arterias venasque comitantibus p. 27.

Digitized by Google

die im Gesichte vom Nervus facialis und trigeminus zu den Arterien traten und sie begleiteten. An den Extremitäten gehen von Zeit zu Zeit von den größeren, neben den Arterien verlaufenden Nervenstämmen Aeste zu den Arterien und treten in ihre Häute hinein. Lucä hat sogar Zweige derselben, die in die mittlere Haut hineindringen, beschrieben [1]). Diejenigen Nervenfäden indessen, welche er so hat abbilden lassen, als verwandelten sie sich in eine große dreieckige Lamelle, die sich mit dem Zellgewebe der Arterie vereinigte, hätten mehr vom Zellgewebe geändert werden sollen; ein solcher Uebergang der Nerven in die Zellgewebhaut der Arterien hat sich nicht bestätigt [2]). Ribes [3]) behauptet, bis zum unteren Theile der Armpulsadern und zu den meisten Aesten derselben auch Ganglienneren, und längs der Arteria cruralis bis zur Kniekehlenpulsader vom linken Dickdarmgeflechte und vom Lendentheile des sympathischen Nerven, Fäden verfolgt zu haben. Diese Untersuchungen sind indessen so schwierig, und so leicht mit einer Täuschung verbunden, daß sie noch einer mehrfachen Bestätigung bedürfen. Sehr wichtig würde es allerdings für die Physiologie sein, wenn sich darthun ließe, daß sich Aeste der sympathischen Nerven zu allen Stellen des Gefäßsystems erstreckten.

Sehr auffallend ist es, daß ein fast ganz aus Gefäßen bestehendes Organ, der Mutterkuchen, in welchem so wichtige Processe der Absonderung, der Aufsaugung und der Blutbereitung vor sich gehen, so kleine Nerven enthält, daß selbst ihre Existenz bis auf die neueste Zeit zweifelhaft geblieben. Indessen hat man jetzt Ursache genug, hier wenigstens kleine Nerven anzunehmen. Bauer und Home [4]) glauben beim Delphin und beim Tapir ein Geflecht von Nerven am Nabelstrange und am Mutterkuchen, und endlich auch beim Menschen, und zwar bei diesem, jeder von beiden unabhängig von dem andern, einen Nervenfaden zwischen den 3 großen Gefäßen des Nabelstrangs aufgefunden zu haben. Ribes [5]) hat gemeinschaftlich mit Chaussier 2 bis 3 Nervenzweige an der Vena umbilicalis des Embryo gesehen. Endlich hat Otto in Breslau mündlich gegen mich geäußert, daß er sich von der Existenz von Nerven, welche an den Blutgefäßen zum Nabelstrang gehen, überzeugt habe.

Fähigkeit verletzter Arterien, schmerzhaft zu werden.

Die Verletzung der Arterien scheint keinen merklichen Schmerz zu erregen. Haller [6]) sah niemals, daß ein Thier durch Geschrei oder auf andere Weise Zeichen von Schmerz zu erkennen gab, wenn er eine Arterie desselben an einer Stelle, wo kein Nerv lag, mit einem Faden oder Bande zusammenschnürte. Er beruft sich zugleich auf ähnliche Erfahrungen Bromfields und Pouteau's. Wenn dagegen Bichat, sobald er reizende Flüssigkeiten, wie Dinte oder verdünnte Säuren und Wein, in die Arterien lebender Thiere spritzte, heftigen Schmerz entstehen sah, so muß man wohl berücksichtigen, daß solche Flüssigkeiten durch die Poren der Gefäßwandungen zum Theil ausschwitzen und mit den in der Nachbarschaft gelegenen Theilen, z. B. mit den Nerven in Berührung kommen können, und daß folglich der dadurch erregte Schmerz die Fähigkeit der Arterien, im verletzten Zustande Schmerz zu erregen, nicht beweiset.

---

[1]) *Sam. Ch. Lucae*, Quaedam observationes anatomicae circa nervos arterias adeuntes. Francofurti ad Moenum 1810. 4. und *Reils* Archiv B. IX. 1809. Tab. XI. b.

[2]) *Rudolphi*, Grundriss der Physiologie. Berlin 1821. 8. B. 1. S. 9.

[3]) *Ribes* a. a. O.

[4]) *Ev. Home*, in Phil. Transact. 1825. P. I. p. 78 sq.

[5]) *Ribes*, in Mém. de la soc. médic. d'émulation. Tome VIII. 1817, übersetzt in *Meckels* Archiv T. V. 1819. S. 445.

[6]) *Haller*, De partium corporis humani praecipuarum fabrica et functionibus Lib. II. Sect. 1. §. 12. Desselben: Second Mémoire sur les parties sensibles, p. 217.

Digitized by Google

Fähigkeit der Arterien zu Lebensbewegungen [1]).

Alle sorgfältig angestellten Beobachtungen stimmen darin überein, daß die Arterien nicht die Eigenschaft besitzen, auf die Weise, wie die Muskeln, schnelle Bewegungen durch eine ihnen beiwohnende lebendige Kraft auszuführen. Sie haben keineswegs das Vermögen, durch eine solche Kraft sich plötzlich zu verengern oder zu erweitern, zu verlängern oder zu verkürzen, so daß man die Bewegung zu sehen im Stande wäre, und noch viel weniger können sie eine aus diesen Bewegungen zusammengesetzte unterscheidbare, wurmförmige Bewegung ausführen. Daß die Verlängerung und Verschiebung der Arterien und die Veränderung des Durchmessers, welche sie beim Pulse erleiden, eine mechanische Wirkung des Drucks sei, welchen die elastischen Wände der Arterien von Seiten des in ihnen eingeschlossenen Blutes erfahren, sobald dasselbe einem Drucke von dem in die schon vollen Arterien vom Herzen mit Gewalt vorwärts getriebenen Blute ausgesetzt wird, ist von Bichat und mehreren anderen Beobachtern so gründlich bewiesen worden, daß hierüber kein Zweifel übrig ist. Denn auch die Arterien eines todten Thiers pulsiren auf dieselbe Weise, und machen dieselben Bewegungen, wenn man durch eine Röhre das Blut aus einer Arterie eines lebenden Thiers in sie herüber fließen läßt, oder wenn man in sie mittels einer Spritze stoßweise Wasser eintreibt. Alle Versuche durch eine Reizung der lebenden Arterien, indem man sie sticht, kneipt, oder indem man sie electrisirt und galvanisirt, eine plötzliche sichtbare Bewegung derselben, ein sichtbares Zusammenziehen, eine zuckende Verkürzung, oder endlich ein Zittern ihrer Fasern, wie bei den Fleischfasern, zu veranlassen, sind vergebens gewesen. Manche Körper, welche eine chemische Veränderung in der Substanz der Arterien hervorbringen, bewirken zwar, daß sich die Arterien, die sie berühren,

[1]) *Alb. de Haller*, Opera minora, Tom. I. Lausannae 1763. 4. — *J. H. Zimmermann*, Diss. physiologica de irritabilitate. Gottingae 1751. 4. — *Gualtherus Verschuir*, diss. med. inaug. de arterium et venarum vi irritabili etc. Groningae 1766. 4. — *R. Berkelmann* (praes. *Hallero*), De nervorum in arterias imperio, recus. in Disp. anat. select. coll. ed. *Haller*. Vol. IV. — *Bikker*, Diss. de Natura humana. Lugd. Bat. 1757. p. 45. — *H. van der Bosch*, Theoretische und praktische Bemerkungen über das Muskelvermögen der Haargefäßchen. Münster und Osnabrück 1786. 8. — *P. A. Fabre*, essais sur différents points de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. Paris 1770. 8. übers. v. *Platner*, unter dem Titel: Untersuchungen über verschiedene Gegenstände der theoretischen und practischen Arzneiwissenschaft. Leipzig 1788. 8. — *Christ. Ludw. Hoffmann*, von der Empfindlichkeit und Reizbarkeit der Theile. Mainz 1792. 8. — *Parry*, Experimentaluntersuchung über die Natur, Ursache und Verschiedenheit des arteriösen Pulses, übers. v. *Embden*. Hannover 1817. — *Car. Hastings* Disp. physiol. de vi contractili vasorum. Edinb. 1818. *Meckels* Archiv. VI. 224. *Oppenheim*, Diss. sist. experimenta circa vitam arteriarum. Mannh. 1822. — *J. H. Oesterreicher*, Versuch einer Darstellung der Lehre vom Kreislaufe des Blutes. Nürnberg 1826. 4. — *G. Wedemeyer*, Untersuchungen über den Kreislauf des Bluts und insbesondere über die Bewegung desselben in den Capillargefäßen, mit erklärenden Hindeutungen auf pathologische Erscheinungen. Hannover 1828.

Digitized by Google

krümmen und plötzliche Bewegungen machen, z. B. starke Säuren, reizende Alkalien, Körper, welche, wie der wasserfreie salzsaure Kalk mit großer Kraft an sich ziehen. Allein diese Körper bringen auch dieselbe Wirkung lange nach dem Tode hervor, wenn nicht etwa die Arterien schon solche Veränderungen durch die Fäulniß erlitten haben, welche diese Wirkung verhindern; und dies beruht unter andern darauf, daß der Substanz der Arterienhaut ein Theil des Wassers entzogen wird, welches sie enthält, wodurch sie zusammenschrumpft und hart wird.

Allein eben so gewiß ist es, daß den Arterien an vielen, vielleicht an allen Stellen die Eigenschaft zukommt, sich durch ihre lebendige Kraft allmählig zu verengern, so daß man zwar die Bewegung, die sie machen, selbst nicht sehen, wohl aber die Veränderung der Gestalt der Canäle und der Menge von Blut, das sie enthalten, bemerken kann, welche die Bewegung derselben allmählig hervorbringt, wenn sie einige Zeit fortgedauert hat.

Wenn bei chirurgischen Operationen ganze Glieder weggenommen, dabei aber sehr viele kleine Arterien durchschnitten werden, so verengern sie sich, indem sie mit der Luft in Berührung kommen, in dem Grade, daß sie sogar zu bluten aufhören. Dauerte die Ergießung von Blut aus den kleinen Arterien so fort, wie sie im Augenblicke der Verletzung Statt findet, so würden die meisten chirurgischen Operationen unausführbar sein und den Tod durch Verblutung nach sich ziehen. Diese Verengerung findet selbst bei Arterien, die nicht zu den sehr kleinen gehören, Statt. Man kann diese Zusammenziehung auch bei sehr großen Arterien dadurch hervorrufen, daß man die Arterien zerrt, um sich selbst drehet und windet. Neuerlich haben Alexander Thierry [1]) und Amussat die hierauf beruhende, fast vergessene Methode, Blutungen zu stillen, den Chirurgen wieder ins Gedächtniß zurückgerufen. Thierry hat seine Versuche bei Pferden, und dann auch bei einem Menschen an der bei der Amputation durchschnittenen Arteria cruralis gemacht. Er faßt das Ende der Arterie mit der Pincette, und dreht es, wenn die Arterie groß ist, 8 bis 10 mal, wenn sie eine mittlere Größe hat, 6 mal, und wenn sie klein ist, 4 mal herum, wodurch die Blutung nach seiner Behauptung sicher gestillt wird, und giebt ein Verfahren an, um auch nicht durchschnittene Arterien zu winden und zu drehen. Mit diesen Versuchen stimmt die längst gemachte Erfahrung sehr wohl überein, daß ein neugebornes Kind, dessen Nabelstrang getheilt, aber nicht unterbunden wird, sich nicht leicht durch die Nabelarterien verblutet, wenn der Nabelstrang zerrissen oder zerbissen, leicht aber wenn er durchschnitten wird.

Daß die Arterien durch eine ihnen beiwohnende, von ihrer Elasticität verschiedene, lebendige, bewegende Kraft ihren Durchmesser verändern können, muß man schon daraus schließen, daß durch Schaam und andere Gemüthsbewegungen die Anhäufung einer größern Menge Bluts in den kleinen Blutgefäßen der Wangen, bei Erregung des Geschlechtstriebs durch Vorstellungen oder durch einen örtlichen Reiz eine Anhäufung des Bluts in den Blutgefäßen mancher Stellen der Geschlechtsorgane, durch Verletzungen aller Art ein Zudrang von Blut zu der verletzten Stelle veranlaßt wird, vermöge dessen oft selbst ziemlich große Arterien mehr vom Blute ausgedehnt werden, und weil sie nun eine größere Blutsäule einschließen, stärker pulsiren. Denn ob man gleich sehr gut einsieht, daß das Herz, wenn es sich kraftvoller und

[1]) *Alex. Thierry*, De la torsion des artères. Paris 1829. 8. Siehe Archives générales de Méd. 1829. Oct. p. 321.

ſchneller zuſammenzieht, die Blutbewegung im ganzen Körper zu beſchleunigen im Stande ſein müſſe, ſo läßt ſich doch die Beſchleunigung oder Verlangſamung des Blutlaufs, ſowie die Vermehrung und Verminderung der Blutmenge an einer einzelnen Stelle des Körpers, wenn ſie nicht von einem Drucke auf dieſe Stelle, oder von einer andern mechaniſchen Urſache, ſondern von einer Einwirkung des Nervenſyſtems herrührt, nur erklären, wenn man annimmt, daß die Blutgefäße mit dem lebendigen Vermögen, ihren Durchmeſſer zu verändern, verſehen ſeien. Ob dieſe Veränderung nur in einer Verengerung derſelben, oder in der Erweiterung an gewiſſen Stellen, oder in dieſen beiden Arten der Veränderung ihres Durchmeſſers zugleich liege, läßt ſich durch Beobachtung ſchwer entſcheiden.

Man ſieht aber ſo viel ein, daß, wenn die Arterien nicht bloß durch ihre Elaſticität, ſondern auch zugleich vermöge einer langſam wirkenden, ſie verengernden Kraft dem Drucke des Bluts Widerſtand leiſten, ſie an jeder Stelle erweitert werden können, ohne ein Vermögen, ſich durch eine Lebenskraft auszudehnen, zu beſitzen. Denn ſobald die Kraft, durch welche ſie ſich im gewöhnlichen Zuſtande zu verengern ſtreben, irgendwo gradweiſe nachließe, ſo würden ſie auch ſogleich daſelbſt durch den Druck des Bluts in demſelben Grade erweitert werden. Als eine Wirkung durch Elaſticität allein kann aber eine ſolche Veränderung des Durchmeſſers der Arterien an einzelnen Stellen deswegen nicht angeſehen werden, weil die Elaſticität einer Arterie an einer einzelnen Stelle nur dann ſich verändern kann, wenn ſich die Subſtanz der Arterie verändert, nicht aber durch den ſchnell erfolgenden Einfluß der Nerven.

Hierzu kommen die mikroſkopiſchen Beobachtungen von Gruithuiſen [1]), Thomſon [2]), Wilſon Philip [3]), Haſtings [4]), Kaltenbrunner [5]) und Wedemeyer [6]) an durchſichtigen Theilen leben-

---

[1]) Gruithuiſen, Mikroſkopiſche Unterſuchungen über den Kreislauf in den Capillargefäßen während der Entzündung; in der mediciniſch-chirurg. Zeitung. Salzburg 1811. B. II. S. 298.

[2]) *J. Thomson*, Lectures on inflammation exhibiting a view of the general doctrines pathological and practical of medical surgery. Edinb. 1813. S. 75, überſetzt von *Krukenberg*, unter dem Titel: Ueber Entzündung etc. Halle 1820. S. 127. 8. Auszug in *Meckels* Archiv für die Phyſiologie. B. I. S. 437.

[3]) *W. Philip*, An experimental inquiry into the laws of the vital functions.

[4]) *Carolus Hastings*, Disputatio phyſiologica inauguralis de vi contractili vasorum. Edinburgi 1818. 8. Ein Auszug daraus in *Meckels* Archiv für die Phyſiologie 1820. B. VI. S. 224. *Derſelbe*, A treatise on inflammation of the mucous membranes of the lungs. London 1820, übers. in *Horns* Archiv 1821. Sept. 467.

[5]) *G. Kaltenbrunner*, Experimenta circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione, C. IX. Tab. Monachii 1626. 4.

[6]) *Georg Wedemeyer*, Unterſuchungen über den Kreislauf des Bluts und insbeſondere über die Bewegung deſſelben in den Arterien und Capillargefäßen etc. Hannover 1828. 8. S. 239 sq.

Digitized by Google

der kaltblütiger Thiere. Wenn sie diese Theile mit reizenden Flüssigkeiten bestrichen, oder in ihnen durch andere Reize die regelmäßige Blutbewegung störten, so bemerkten sie, daß die kleinen Blutgefäße, welche im regelmäßigen Zustande beim Blutlaufe keine merkliche Veränderung ihres Durchmessers zu erleiden pflegen, sich nicht selten an einzelnen Stellen allmählig erweiterten oder verengerten.

Nach Thomson und Hastings hatte z. B. Kochsalzauflösung, auf die Schwimmhaut der Frösche gebracht, die Wirkung, daß sich viele kleine Gefäße erweiterten, mehr Blut aufnahmen und dadurch der mit Salzwasser berührten Stelle ein rothes Ansehn gaben. Das flüchtige Laugensalz brachte nach Hastings dieselbe, nach Thomsons Versuchen dagegen die entgegengesetzte Wirkung, Verengerung vieler Haargefäße und Blässe hervor. Nach Wedemeyer wirkten Stückchen Kochsalz, die er 3 bis 4 Minuten lang auf eine Stelle des Mesenterium lebender Frösche legte, früher auf die kleinen Arterien und kleinen Venen, als auf die kleinsten Haargefäße. Zuerst verengerten sich die Arterien etwa um $^1/_3$ ihres Durchmessers, dann aber entstand an ihnen eine dem Aneurysma ähnliche Erweiterung. Die Venen erweiterten sich ohne vorhergehende Verengerung, und auch in den Haargefäßen entstand sehr bald nach der Anwendung des Kochsalzes eine deutliche Erweiterung und vermehrte Aufnahme von rothem Blute, so daß diejenigen Gefäße, welche zuvor durchsichtig gewesen waren, nun roth aussahen. Flüchtiges Laugensalz brachte, nach Wedemeyer, fast immer eine allmählige Erweiterung der kleinen arteriellen und venösen Gefäße hervor, und bei der Erweiterung trat häufig Stockung des Blutlaufs ein. Auch ein durch 14 bis 24 Plattenpaare erregter galvanischer Strom brachte, wenn er 10 bis 30 Secunden hindurch gewirkt hatte, zuweilen erst nach einigen Minuten eine sichtbare Verengerung der kleinen Arterien bis auf $^3/_4$, $^1/_2$ oder sogar bis auf $^1/_4$ ihres Durchmessers hervor, wobei das Blut in den verengerten Stellen schneller, oberhalb aber an den Stellen, an welchen sich die Arterien erweiterten, langsamer floß. Auch die Haargefäße erweiterten sich schnell, gewöhnlich schon in dem Zeitraume einer Minute, und nahmen wegen der in ihnen enthaltenen großen Menge Bluts, das oft sogar zum Stillstehen kam, eine hellrothe Farbe an.

Aber auch größere Arterien verengern sich, wenn sie, wie das bei den Versuchen Parry's [1]) der Fall war, entblößt und längere Zeit der Berührung der Luft ausgesetzt werden. Die Peripherie der Carotis eines Schaafs z. B. zog sich, während sie entblößt $^1/_2$ Stunde mit der Luft in Berührung war, von dem Umfange von $^{225}/_{400}$ Zoll bis auf den Umfang von $^{162}/_{400}$ Zoll zusammen. Auch Hastings sah, daß die Arteria cruralis, oder die Aorta, wenn sie 10 Minuten lang mit dem Scalpell, ohne einen Druck anzuwenden, geschabt worden waren (wobei natürlich auch die Berührung der Luft mitwirkte), sich an dieser Stelle zusammenzog und $^1/_4$ Stunde bis $^1/_2$ Stunde zusammengezogen blieb. In einigen selteneren Beobachtungen Parry's und Hasting's geschah diese Zusammenziehung an einer ganz schmalen Stelle, und gab der Arterie das Ansehn, als wäre sie von einem schmalen Bande zusammengeschnürt gewesen. Auch Verschuirs [2]) frühere Versuche machen ein lebendiges Bewegungsvermögen der Arterien wahrscheinlich. Oft ist es schwer zu bestimmen, in welchem Grade die Veränderung des Durchmessers der Arterien mehr von der Elasticität, oder mehr von einer in ihnen wirksamen lebendigen Kraft abhänge. Hierher ist die

[1]) Hil. Parry, Experimentaluntersuchung über die Natur-Ursache und Verschiedenheit des arteriösen Pulses, übersetzt von Embden. Hannover 1817. 8. Exper. 24. 26. 15.

[2]) Verschuir, De arteriarum et venarum vi irritabili. Groningae 1766. 4.

Digitized by Google

Erscheinung zu rechnen, daß die Arterien immer auch nach starkem Blutverluste voll sind, und daß sie sich also in dem Maaße verengern, als sich die Menge des in ihnen eingeschlossenen Blutes vermindert. Diese Verengerung geht, während sich Thiere verbluten, sehr weit, z. B. nach Parry [1]), so weit, daß sich die Peripherie der bloßgelegten Carotis von $^{222}/_{400}$ Zoll bis auf $^{127}/_{400}$ Zoll verkleinerte. Denn da diese während der Verblutung eingetretene und zuweilen während des Todes selbst vermehrte Zusammenziehung einer Arterie nach dem Tode wieder zum Theil nachließ, so daß die Carotis eines Schaafs, deren Peripherie vor der Verblutung $^{320}/_{400}$ Zoll betrug, und sogleich nach dem Tode durch Verblutung bis auf $^{160}/_{400}$ vermindert war, sich 15 Minuten nach dem Tode, und längere Zeit nachher, nur bis auf $^{234}/_{400}$ oder $^{232}/_{400}$ Zoll wieder erweiterte, so scheint nur ein Theil der Zusammenziehung, welche die Arterie während der Verblutung durch die geöffnete Vena jugularis erlitt, auf die Rechnung der Elasticität der Arterien gebracht werden zu dürfen, ein größerer Theil derselben aber als die Wirkung einer lebendigen Kraft angesehen werden zu müssen.

Auch bei Todesarten, bei welchen keine Verblutung Statt gefunden, glaubte Parry [2]) wahrgenommen zu haben, daß sich die Arterien während des Sterbens verengern und sich dadurch entleeren, nach dem Tode aber sich wieder erweitern.

In manchen Fällen ist auch schwer zu bestimmen, in welchem Grade die Vergrößerung des Durchmessers, die die Arterien erleiden, mehr von einer verminderten lebendigen Zusammenziehung derselben und einer deswegen entstehenden Ausdehnung durch den Druck des Bluts, oder von einem Wachsthume der Wände der Arterien herrührt, z. B., wenn sich die Arterien des Uterus nach der Befruchtung so außerordentlich erweitern, oder wenn, nachdem eine Arterie, z. B. die Carotis der einen Seite, unterbunden worden ist, und nun die der andern Seite an Umfang zunimmt, oder wenn bei einer Arterienegeschwulst, aneurysma, eines Hauptstamms sich die kleinen Seitenzweige erweitern, welche das oberhalb der Geschwulst liegende Stück des Stamms mit dem unter der Geschwulst liegenden Stücke desselben in Verbindung bringen. Parry [3]) sah die Erweiterung der Carotis der andern Seite nach der Unterbindung derselben auf der andern Seite so schnell erfolgen, daß auch hierbei ein Nachlaß in der lebendigen Zusammenziehung Statt gefunden zu haben schien.

Die Verkürzung der Stücken einer durchschnittenen Arterie, durch welche eine Zusammenziehung derselben entsteht, hängt, da sie auch nach dem Tode Statt findet, unstreitig größtentheils oder ganz von der Wirkung der Elasticität der Arterien ab, die sich vorher in einem gespannten Zustande befanden.

In welchem Theile der Substanzen, aus welchen die Arterienwand zusammengesetzt ist, die Lebensbewegung der Arterien ihren Sitz habe, läßt sich durch Versuche schwer ausmachen. In dem elastischen Gewebe der mittlern Arterienhaut scheint er nicht gesucht werden zu dürfen, denn in den größten Arterien, wo diese Haut am dicksten ist, ist die Lebensbewegung der Arterien am wenigsten wahrnehmbar. Im Gegentheile

---

[1]) *Parry* a. a. O. S. 40.

[2]) *Daselbst* a. a. O. S. 52.

[3]) *Daselbst* a. a. O. Exp. 23. 24.

Digitized by Google

hindert die Steifheit dieſer elaſtiſchen Subſtanz die Verkleinerung des Umfangs einigermaßen.

Entſtehung, Wachsthum, Krankheiten und Wiederherſtellung verletzter Arterien.

Die kleinſten Gefäße ſcheinen, nach C. F. Wolfs [1]) Beobachtungen am bebrüteten Eie, welche durch die ſpäteren Beobachtungen von Pander [2]), Rolando [3]), ſo wie durch die von Prevoſt, Dumas [4]) und Bär [5]) beſtätigt worden ſind, früher, oder wenigſtens gleichzeitig, ſichtbar zu werden, als das Herz und die großen Gefäßſtämme. Sie entſtehen vielleicht durch eine Art chemiſcher Veränderung in der Materie des Eiſtoffs, vermöge deren ſich das Flüſſige vom Feſten an gewiſſen Stellen ſcheidet, und das Feſte zu Gefäßwänden und zu Blutkörnchen ſich verdichtet. Viele Arterien, welche ſich ſpäter vor den benachbarten Arterien durch ihre Größe ſehr auszeichnen, machen anfangs einen Theil eines Gefäßnetzes aus, in welchem ſie durch Größe nicht hervorragen. Mancherlei kleine ſtörende Umſtände ſcheinen daher bewirken zu können, daß die Gänge dieſes Netzes, welche ſich der Regel nach erweitern, ſehr wachſen und ſich in größere Arterien verwandeln ſollten, nicht gehörig erweitert werden, und daß dann das Blut durch andere Gänge deſſelben Netzes zu dem Orte, zu welchem es gelangen ſoll, hinfließt. Indem ſich dann dieſe letzteren Gänge zu großen Stämmen erweitern, entſtehen Abweichungen in der Ordnung, in welcher die kleinen Arterien aus den größeren hervorgehen, und in dem Wege, die ſie zu den Theilen nehmen, denen ſie Blut zuführen. Bei den Venen von mittlerer Größe ſind dieſe Abweichungen noch weit häufiger, als bei den Arterien. Sehr intereſſant iſt es, daß das Wachsthum der kleinen und großen Zweige der Arterien in einer ſolchen Uebereinſtimmung geſchieht, und daß das Wachsthum

---

[1]) *C. F. Wolff*, Theoria generationis. Hal. 1759. Fig. 7. 8. 10. und zwo Abhandlungen über die Nutritionskraft, welche von der Kaiſerl. Acad. d. Wiſſ. in St. Petersburg den Preis getheilt erhalten haben, die erſte von Hrn. Hofrath Blumenbach, die zweite vom Hrn. Prof. Born, nebſt einer ferneren Erläuterung eben derſelben Materie von C. F. Wolff. St. Petersburg 1789. 4. Wolfs Erläuterungen. S. 13.

[2]) *Chr. Pander*, Diss. sistens historiam metamorphoseos, quam ovum incubatum prioribus quinque diebus subit. Wirceburgi 1817. 8. Derſelbe gemeinſchaftlich mit Döllinger und d'Alton. Beiträge zur Entwickelungsgeſchichte des Hühnchens im Eie. Würzburg 1718. Fol. m. K.

[3]) *Rolando*. Dizionario periodico di medicina estoso dai DD. *L. Rolando*, e *L. Martini Fascioli* 10. Torrino 1822. c. 1823. Siehe auch Pierers Allg. med. Annalen, Supplementb. 1821 — 1825. Jan. 707.

[4]) *Prévost* et *Dumas*, Sur le développement du poulet dans l'oeuf, in Annales des sc. naturelles. Tome XII. 1827. Déc. p. 415.

[5]) *D. Carl Ernst v. Baer*, Ueber Entwickelungsgeſchichte der Thiere, Beobachtung und Reflexion. Th. I. Königsberg 1828. 4. mit 3 Kt. S. 31 sq.

Digitized by Google

der Organe dem derjenigen Arterien proportional ist, welche zu ihnen das Blut hinführen. Die Hoden bleiben so lange klein, als die langen Stämme der Samenarterien. Zur Zeit, wo die Geschlechtsreife eintritt, wachsen beide entsprechend. Dieselbe Bewandniß hat es mit den Arterien jedes Muskels, der sich durch Uebung in gewissen Bewegungen vergrößert, und auch an den Arterien der Eierstöcke und des Uterus findet dasselbe Statt, während sich diese Theile nach der Befruchtung ziemlich schnell und nur für einige Zeit vergrößern.

Die Arterien heilen, weil sie gespannte elastische Canäle sind, deren Wunden durch die Elasticität der Wände auseinander gezogen werden, nur dann, wenn die Wunden klein sind, und leichter, wenn sie der Länge, als wenn sie der Quere nach gehen. Denn Arterien, welche der Quere nach in beträchtlichem Grade verletzt werden, reißen, weil sie in dieser Richtung theilbarer sind, leicht durch. Ist die Verwundung gering, so schließt sich auch zuweilen der Canal der Arterie an der verwundeten Stelle. Es fehlt indessen nicht an, bei lebenden Thieren, angestellten Experimenten, bei welchen gestochene, oder durch einen kleinen Einschnitt verletzte Arterien, durch eine aus gerinnbarer Lymphe bestehende Substanz vernarbten [1]), und an der verletzten Stelle mit den benachbarten Theilen zusammenklebten und verwuchsen. Vereinigt man die Wundränder einer Arterie durch eine Naht, so verschließt sich ihr Canal an dieser Stelle durch gerinnbare Lymphe [2]). Ist eine Arterie ganz durchgeschnitten, so ziehen sich ihre Enden zurück und heilen nicht zusammen, sondern verschließen sich, ohne daß sich der Canal jemals wieder herstellt. Hierdurch unterscheiden sich die Arterien sehr von den Ausführungsgängen, welche sowohl, wenn sie unterbunden, als wenn sie durchschnitten werden, leicht so heilen, daß sich in der geronnenen Lymphe, die sie vereinigt, wieder einen Canal bildet. Die zurückgezogenen durchschnittenen Arterien verengern sich an dem durchschnittenen Ende und verschließen sich durch gerinnbare Lymphe, die in Folge der Entzündung des Gefäßes abgesondert wird, und der Canal oft bis zu dem nächst höheren Aste ausfüllt, auch die Arteri

---

1) *Fried. Pauli*, Commentatio physiologico-chirurgica de vulneribus sanandis Gottingae 1825. 4. hat die Namen derer, die Beobachtungen hierüber angestellt haben, gesammelt. — *J. L. Petit*, Mém. de l'Ac. roy. des sc. à 1735. III. Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent. Ed. 2. Paris 1774. 8. T. III. p. 229. 244. Mém. sur les hémorrhagies, p. 435. — *Scarpa*, sull aneurisma riflessioni ed osservazioni anatomico-chir. Pavia 1804. fol. max. p. 83. cap. 2. §. 8. §. 9. — *S. Treuling*, Diss. de sistendis haemorrhagiis. Groningae 1804. 8. und in *Siebolds* Chiron. B. II. St. 2. 1805. p. 468. — *J. F. D. Jones*, a treatise on the process, employed by nature from divided and punctured arteries and on the use of ligatures. London 1805. 8. übers. von *Spangenberg*. Hannover 1813. 8. — *P. A. Beclard*, Recherches et expériences sur les blessures des artères in Mém. de la soc. méd. d'émulation. 8me année. Part. II. Paris 1817. p. 569—603.

2) *C. Asman*, Diss. de aneurysmate. Groningae 1773. 4. angeführt in *Th. Lauth* scriptores, p. 619.

Digitized by Google

äußerlich mit den benachbarten Theilen zusammenkleben und verwachsen macht. Die Arterien sehen an der Stelle, welche von der entstandenen Lage der geronnenen Lymphe bedeckt wird, roth aus. In der Lymphe selbst entstehen neue kleine Blutgefäße, durch die dieselbe zu einer organisirten Materie wird.

Unterbindet man eine Arterie, die nicht durchschnitten worden, so füllt sich die Arterie an der Stelle, wo die Unterbindung geschah, und auch ein Stück oberhalb und unterhalb dieser Stelle mit Lymphe aus, und verwächst. Zuweilen treten aber später die 2 Theile der unterbundenen Arterie durch mehrere Arterien, die aus dem obern Ende abgehen und sich in das untere einmünden, mit einander in Verbindung. Diese Arterien entstehen dadurch, daß sich kleine Arterien, die entweder schon ursprünglich als Collateraläste vorhanden waren, oder die in der geronnenen Lymphe neu entstanden sind, erweitern und vergrößern. Dergleichen Beobachtungen hat an der rechten Carotis eines Fuchses Maunoir [1]) gemacht. Die beiden Stücken der geheilten Arterie endigten sich mit einem abgerundeten Ende, und vom obern zum untern Stücke der Arterie ging ein dünnes Gefäß, das ungefähr 1 Millimeter im Durchmesser hatte. Parry [2]) ließ die Arteria carotis zweier Widder unterbinden, und fand nach ihrer Heilung gleichfalls ein Stück der Arterie verwachsen, aber mehrere ziemlich dicke gewundene offene Arterien aus dem obern Stücke in das untere gehen. Mayer [3]) in Bonn machte denselben Versuch mit demselben Erfolge an einem Kaninchen, das er 1 Jahr, nachdem die Ligatur gemacht worden war, tödtete. v. Schönberg [4]) hat sich gleichfalls mit solchen Beobachtungen beschäftigt. Scarpa [5]), welcher die Arterien eines Menschen, bei dem er 27 Jahre zuvor ein Aneurysma der Arteria poplitea nach der Hunterschen Methode operirt hatte, untersuchte, nachdem in sie Wachsmaterie eingespritzt worden war, fand die Arteria cruralis von der Stelle an, wo die profunda entspringt, bis zu der Stelle, wo die Arteria tibialis ihren Anfang nimmt, verschlossen und so verändert, daß sie einer dicken Violinsaite glich. Die Verbindung des obern und untern Stücks geschah durch die erweiterten Aeste der Arteria femoris profunda und der Arteriae articulares. In der Mitte des verschlossenen Stücks der Arteria poplitea war eine Höhle, die mit der Arteria articularis inferior in Verbindung stand. Man sah hier zugleich die große Thätigkeit der Aufsaugung, durch welche die Arteriengeschwulst sammt dem Blute, das sie enthielt, verschwunden war.

Eine Arterie eines Hundes, die Sasse entblößt und mit Cantharidentinctur

[1]) *Maunoir*, Mém. sur l'aneurysme et la ligature des artères. Genève, an X. 1802. 8. p. 106 Fig. 1.

[2]) *C. H. Parry*, An experimental inquiry into the nature, cause and varieties of the arterial pulse, and into certain other properties of the large arteries in animals with warm blood, illustrated by engravings, übers. v. *Emden*. Hannover 1817. 8. S. 144 bis zu Ende. Fig. 1 bis 3.

[3]) *Mayer*, Disq. de arteriarum regeneratione. Bonnae 1823. 4. p. 10.

[4]) *A. v. Schönberg*, Memorie sul ristablimento della circolazione nella legatione o anche recisione dei tronchi delle arterie. Napoli 1826.

Siehe auch Anton Zhuber, Neue Versuche an Thieren und deren Resultate, über die Wiedererzeugung der Arterien, mit beigefügten Bemerkungen darüber. Mit 3 lithogr. Taf. Wien 1827. 8.

[5]) *Scarpa*, Esame comparativo del systema arterioso diambe due gliarti inferiori nel cadavere di un uomo, il quale 27 anni fa era stato operato d'aneurisma popliteo etc. 8. abgedruckt in Omodei Annali universali di medicina compilata. 1828. Auszug in der Salzburger Medicinisch-chirurgischen Zeitung. 1829. B. IV. S. 28.

Digitized by Google

berührt hatte, verſchloß ſich an dieſer Stelle, nachdem die Wunde zugeheftet worden war. Die Arterie wurde äußerlich und inwendig roth, und bedeckte und füllte ſich mit geronnener Lymphe aus. Jones fand, daß die Arterien ſo geneigt ſind, ſich durch abgeſonderte Lymphe zu verſchließen, daß ſchon manche mechaniſche Verletzungen derſelben dieſe Veränderung veranlaſſen, z. B. wenn man eine Arterie mittels eines um ſie gelegten Fadens zuſammenſchnürt, dadurch die mittlere und innere Haut durchbricht, und dann den Faden ſogleich wieder wegnimmt. Obgleich das Blut nach dieſem Verſuche anfangs durch das unterbundene geweſene Stück hindurch zu ſtrömen fortfuhr, ſo füllte ſich doch dieſes Stück der entzündeten Arterie mit geronnener Lymphe aus und verſchloß ſich. Bei einer entzündeten Arterie verliert die innere Haut ihren Glanz und ihre Glätte, läßt die ſehr mit Blut ausgedehnten kleinen Blutgefäße durchſchimmern, bedeckt ſich inwendig mit gerinnender Lymphe und läßt ſich leichter von der mittleren Haut lostrennen. In Folge der Entzündung lockert ſich nach Hodgſon das Gewebe der Arterien zuweilen auf und nimmt ein fleiſchiges Anſehen an, zuweilen ſammelt ſich zwiſchen der inneren und mittleren Haut eine eiterige, käſige Subſtanz an, und bildet auf der inneren Oberfläche Erhöhungen von der Größe der Blattern. In einem brandigen Zuſtande ſah Hodgſon die Wände der Arterien niemals. Häufig kommen an der innern Haut weiße, undurchſichtige Flecke zum Vorſchein, an welchen die Arterie ſpäter verknöchert. An den Klappen der Arterien bilden ſich zuweilen von ſelbſt ſchwammige Auswüchſe, die durch einen Stiel anſitzen. Daß nicht ſelten die innere Haut vieler Arterien nach dem Tode ſehr gleichmäßig roth erſcheint, weil ſie aus dem Blute, das ſich in einem gewiſſen Zuſtande der Zerſetzung befindet, Färbeſtoff einſaugt, und daß dieſe Röthung nicht für ein Zeichen vorhandener Entzündung angeſehen werden dürfe, iſt ſchon Theil I. S. 252 erwähnt *).

*) Die Literatur über die krankhaften Veränderungen an den Arterien findet man ſehr vollſtändig in *A. W. Otto*, Lehrbuch der pathologiſchen Anatomie des Menſchen und der Thiere. Berlin 1830. S. 300 — 343.

Ueber die Entzündung der Arterien hat Morgagni in ſeiner Schrift De sedibus et causis morborum. Cap. XXVI. 35. XLIV. 3. einige Bemerkungen niedergelegt. — *J. P. Frank*, Epitome de curandis hominum morbis l. §. 118. 205. hat bewieſen, daß ſie häufiger vorkomme, als man glaubte. — Deſſen Schüler *Schmuck*, Diss. de vasorum sanguiferorum inflammatione. Heidelbergae 1793. erregte die Entzündung der Arterien an lebenden Thieren, und machte alſo Verſuche darüber. Daſſelbe thaten *Jo. Georg Sasse* mit *Ph. Fr. Meckels* Hülfe, De vasorum sanguiferorum inflammatione. Halae 1797 — und *Jones* a. a. O. Umſtändliche Werke über die Entzündung der Arterien ſind das von Hodgſon von den Krankheiten der Arterien und Venen, mit Rückſicht auf die Entwickelung und Behandlung der Aneurysmen, a. d. E. überſ. von Koberwein, 1817. ins Franz. überſ. v. Breſchet unter dem Titel: *Hodgson*, Traité des maladies des artères et des veines. Paris 1819. 8. 2 Vol., und das von *Gendrin*, Histoire anatomique des inflammations. Paris et Montpellier 1826. 8. überſ. von Radius, unter dem Titel: Anatomiſche Beſchreibung der Entzündung und ihrer Folgen in den verſchiedenen Geweben des menſchlichen Körpers. Leipzig 1828. Eine gut geſchriebene Abhandlung von *J. E. Dezeimeris*, in welcher über die Entzündung der Arterien hiſtoriſche Bemerkungen aus den angeführten Schriften gegeben werden, ſteht im Arch. gén. de Méd. Déc. 1829. p. 481 sq.

Digitized by Google

Venen, Venae.

So wie es 2 verschiedene Arterien giebt, von welchen die Körperarterie das hellrothe, aus den Lungen zum Herzen gekommene Blut vom Herzen aus zu allen Theilen des Körpers führt, die Lungenarterie aber das dunkelrothe, aus allen Theilen des Körpers zum Herzen gekommene Blut von da aus zu den Lungen leitet, so giebt es auch 2 Klassen von Venen. Denn 2 große Körpervenen und eine Herzvene führen das bei der Ernährung der Theile des Körpers dunkel gewordene Blut der rechten Vorkammer, und 4 Lungenvenen führen das beim Athemholen in den Lungen hellroth gewordene Blut der linken Vorkammer des Herzens zu.

Die Venen fangen in den Haargefäßnetzen des Körpers und der Lungen an, wo sich die Röhren dieser Netze zu minder zahlreichen und größeren, und diese wiederholt zu noch wenigeren und zu noch größeren Röhren vereinigen. So oft 2 oder mehrere Zweige sich in einen größeren Zweig vereinigen, ist jedesmal der Querschnitt des größeren Zweiges etwas kleiner, als die zusammengerechneten Querschnitte jener kleinen Zweige. Daher ist die Höhle, welche entsteht, wenn man alle zu einer und derselben Ordnung gehörenden Röhren zusammenrechnet, nicht gleich weit, sondern in den Aesten größer, in den Stämmen kleiner. Aus diesem Grunde fließt auch das Blut, wie man sich durch die mikroskopische Beobachtung an durchsichtigen Theilen lebender Thiere überzeugen kann, in den kleineren Venen langsamer, in den größeren desto geschwinder, je mehr Reiser, Zweige und Aeste sich schon unter einander vereinigt haben.

Körpervenen im Allgemeinen.

Die Körpervenen, welche das dunkelrothe Blut aus einem Theile des Körpers zurückführen, sind weiter, und meistens auch zahlreicher als die Arterien, die das Blut in diesen Theil hineingeführt hatten. Aus diesem Grunde fließt das Blut der Körpervenen nothwendig langsamer, als das Blut der Arterien, denn es fließt dem Herzen durch die weiteren und zahlreicheren Körpervenen in einer Minute eben so viel Blut zu, als von ihm durch die einzige und engere Körperarterie wegfließt. Haller rechnet mit Sauvages, daß der Querschnitt der Höhle der Körpervenen sich zu dem der Körperarterie nahe wie 9 zu 4 verhalte, und also mehr als noch einmal so groß sei, und eben so viel mal muß nothwendig auch das Blut in jenen Körpervenen langsamer als in der Körperarterie bewegt werden; wobei indessen nicht zu übersehen ist, daß wir kein Mittel haben, den Durchmesser der Körperarterien und der Körpervenen während des Lebens genau zu messen, und daß die Messungen, die man nach dem Tode anstellt, deswegen ungenau sind, weil die Arterien nach dem Tode leer und verengt, die Venen mit Blut gefüllt und erweitert gefunden werden. Die Messungen nach dem Tode erlauben daher nur eine ungefähre Schätzung der Größe jener Höhlen.

Digitized by Google

Communication der Körpervenen unter einander.

Die mittleren und größeren Röhren der Körpervenen sind aber nicht nur zahlreicher und weiter, sondern sie stehen auch meistens unter einander weit häufiger in Verbindung (in Communication) als die Arterien. Daß in einem Theile mehrere unter einander communicirende Venenstämme vorhanden sind, um das Blut von den Theilen wegzuführen, welches eine einzige Arterie zu ihnen hingeführt hatte, hat den Nutzen, daß, wenn die mit dünnen Wänden versehenen Venen an der einen Stelle von außen zusammengedrückt werden, dem Blute dennoch durch benachbarte communicirende Venen ein Ausweg offen bleibt, oder wenn das Blut bei der Bewegung der Theile wegen seiner Schwere in der einen Richtung auf ein Hinderniß stößt, es in einer andern einen Ausweg habe. Die Venen sind an denjenigen Stellen viel zahlreicher, als die ihnen entsprechenden Arterien, und zugleich unter einander vielfacher durch communicirende Zweige verbunden, wo die Bewegung des Blutes, wegen des auf die Venen häufig geschehenden äußeren Druckes, leicht gehindert wird, z. B. in der Haut, zwischen den Muskeln, welche die Venen, während sie sich zusammenziehen und dabei dick und hart werden, drücken, ganz vorzüglich an den Gliedmaßen, wo der Druck durch äußere Dinge und durch die Muskeln rings herum Statt finden kann. Zwischen den Muskeln der Gliedmaßen begleiten daher meistens 2 Venen 1 Arterie, so daß zu beiden Seiten der Arterie 1 Vene liegt, und diese tief liegenden Venen stehen mit den oberflächlichen, unter der Haut verlaufenden Venen in Verbindung, so daß das Blut, wenn die Gliedmaßen von außen gedrückt werden, aus der Haut in die tief liegenden Venen und von da weiter fließen, wenn aber die tief liegenden Venen von ihren Muskeln gedrückt werden, Blut aus diesen in die der Haut entweichen kann.

Indessen giebt es noch andere Zwecke, warum die Körpervenen an manchen Stellen vervielfacht und unter einander in häufige Verbindung gebracht sind, z. B. um manche Theile, indem sie sich mit Blut füllen, auszudehnen und zu erwärmen, z. B. das männliche Glied, den Uterus, die Muttertrompeten, welche vielfache Netze großer Venen einschließen.

Klappen der Körpervenen [1]).

An denjenigen Stellen, wo die Schwere der Blutsäule, oder ein Druck von Seiten der Muskeln, oder ein äußerer Druck ein Hinderniß

---

[1]) *H. Fabricii ab Aquapendente* de venarum ostiolis Opera omnia (Ausgabe von *Albinus*). Lugd. Batav. 1738. Fol. p. 155. (Ausgabe von *Bohnius*, Lipsiae 1687. Fol. p. 150.) *J. Gabr. Schmidt* praeside, *J. H. Meibomius* de valvulis s. membranulis vasorum earumque structura et usu. Helmst. 1682. rec. in Disp. anat. select. coll. *A. Haller*, Vol. II. p. 49. — *Richelmann* (*Theodul Kemper*) Diss. de valvularum in corporibus hominis et brutorum natura, fabrica et usu mechanico; rec. ibid. p. 79. — *J. Doebelii* valvu-

für die Bewegung des Bluts in den Venen herbeiführen können, befinden sich in den Venen die schon S. 28 erwähnten Klappen, die daher nicht allen Aesten der Körpervenen zukommen, sondern an mehreren, welche in weichen drüsigen Theilen, oder in der Bauch-, Brust- und Schädelhöhle vor Druck sehr geschützt liegen, fehlen. In der unteren Hohlvene und ihren beiden Hauptästen, den Venis iliacis, in den Venen des Gehirns und Rückenmarks, in der Wirbelvene, in den Zwischenrippenvenen, in denen der Gedärme, des Magens, der Milz und des Pankreas, und an allen andern Aesten der Pfortader, in denen der Milz, der Leber, der Eierstöcke, des Uterus und in der Nabelvene, so wie auch in den Aesten der Herzvenen (nicht aber an der Einmündung ihres Stammes in das rechte Atrium) und endlich in den Venen der Knochen [1]) fehlen die Klappen der Regel nach entweder ganz, oder es finden sich wenigstens nur in manchen dieser Venen einfache und kleine klappenartige Vorsprünge, welche nicht verhindern können, daß eingespritzte Flüssigkeiten in den mit einiger Gewalt ausgedehnten Venen aus den Stämmen in die Zweige dringen. Auch in allen sehr kleinen Venen fehlen sie gänzlich, und schon bei Venen, die weniger als eine Linie im Durchmesser haben, kommen sie nach Haller nur sehr selten vor [2]). Dagegen sind in den Venenstämmen und in den Venen von mittlerer Größe, da wo sie im Bereich sind aus der Brust und Beckenhöhle hervorzutreten, ferner an den Gliedmaßen, am Gesichte, an der Zunge und Mandel, an den Bauchdecken, an der Ruthe, in den Venis spermaticis internis des Mannes, die aus der Bauchhöhle in den Hodensack treten, nicht aber in den Venis spermaticis internis des weiblichen Geschlechts, welche nur in der Bauchhöhle liegen [3]), Klappen vorhanden. In der Vena azygos kommen oft Klappen vor [4]). Uebrigens befinden sich bei dem Menschen an Venen oft keine Klappen, wo bei den Säugethieren welche gefunden werden. So habe ich selbst und mehrere Anatomen vor mir in den Aesten der Vena portae des Pferdes Klappen gefunden. Der aufrechte Gang des Menschen und eine andere Lage und Befestigung der Eingeweide bei ihm macht es auch schon an sich wahrscheinlich, daß bei ihm in der Einrichtung der Klappen Verschiedenheiten Statt finden. Bei den Vögeln, bei welchen die Venen, wie ich wenigstens beim Schwane, wo ich sie untersucht habe, bemerke, die Arterien an Zahl und Umfange bei weitem nicht so sehr übertreffen, als bei dem Menschen und bei den Säugethieren, stehen die Klappen viel seltener, als bei diesen, und bei den kaltblütigen Thieren fehlen sie, nach Swammer-

---

larum vasorum lacteorum lymphaticorum, sanguiferorum dilucidatio. Rostochii 1694. 4. — *Petr. Gericke*, de valvulis venarum et earum usu. Helmst. 1723. — *Perrault*, Essais de Physique. Tom. III. Part. III. c. 5. Pl. 16, 17. S. 252, und *Sömmerring*, Gefäßlehre, p. 413. — *Haller*, De partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus. Tom. I. Lib. II. sect. 2. §. 15 — 22, wo auch eine ausführliche Geschichte der Entdeckungen und der zerstreueten Beobachtungen Anderer zu finden ist.

[1]) *Breschet*, in Nova acta physico-medica academiae caesareae Leopoldinae. Tom. XIII. Bonnae. 4. p. 359. und dess. Recherches anatomiques sur le système veineux etc. p. 24, fand in den Venen der Knochen des Schädels kleine einfache, häutige Vorsprünge, in denen der Wirbel aber konnte er keine bemerken. *Haller* a. a. O. §. 19.

[2]) *Monro*, de semine et testibus, p. 14, fand allemal in der Saamenvene des Mannes, aber nicht in der Saamenvene des Weibes Klappen. Siehe *Haller*, de partium corporis humani praecipuarum fabrica et functionibus. Lib. II. Sect. 2. §. 19. und Sömmerrings Gefäßlehre. 1801. S. 414.

[3]) *Kemper* in *Halleri* Disp. anat. select. Vol. II. p. 112. *Haller*, De partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus. T. I. Lib. II. sect. 2. §. 21.

Digitized by Google

dam, de Heide und Haller, ganz [1]). Die Klappen der Venen sind dünner als die am Anfange der Arterien, indessen bemerkt man doch in ihnen zuweilen glänzende Fäserchen.

Die Klappen der kleinen Venen bestehen nicht selten nur aus einer Tasche. Dieses ist auch zuweilen an solchen Stellen großer Venen, deren Venenäste in die Venenstämme einmünden, der Fall. In größeren Venen, und zwar vorzüglich an solchen Stellen, an welchen keine Venenäste in die Stämme eintreten, bilden je 2 einander gegenüber liegende, meistens gleich große Taschen eine Klappe. Nur selten kommen in den großen Venen Klappen vor, die aus 3 neben einander liegenden Taschen bestehen, z. B. zuweilen in der Jugularvene nach Kerkring und Morgagni, oder in der Schenkelvene nach Haller. Der seltene Fall, wo 4 oder 5 Taschen eine Klappe gebildet haben sollen, ist wohl als regelwidrig anzusehen. Die paarweise gestellten Taschen in kleinen Venen sind sehr länglich und schmal. Unter den aus einer einzigen Tasche gebildeten Klappen giebt es sehr flache. Manche sind sogar nur einem kleinen häutigen Vorsprunge ähnlich, der als eine Verlängerung des einen Winkels erscheint, unter welchem ein kleiner Ast in einen großen Stamm eintritt [2]). Solche Klappen hindern oft, wie schon oben bemerkt worden ist, das Rückwärtsfließen einer mit Gewalt in den Venen rückwärts bewegten Flüssigkeit, durch welche die Venen sehr ausgedehnt werden, nicht. Nicht selten findet man bei Erwachsenen Venenklappen zerstört, z. B. die Hautfalte derselben von Löcherchen durchbrochen oder in ein Netz verwandelt, oder nur den freien Rand der Klappe, der immer ein wenig dicker als der übrige Theil der häutigen Falte zu sein pflegt, vorhanden, der dann in Gestalt eines Fadens oder einer Brücke von der einen Seite zur andern herüber geht [3]). In der Regel wird bei Erwachsenen die große einfache Klappe, die an der Einmündung der untern Hohlvene in die rechte Vorkammer des Herzens befindlich ist (valvula Eustachii), zerstört. Nicht selten findet man auch die Klappe an der Einmündung der großen Herzvene in dieselbe verletzt, aber auch an andern Venen beobachtet man dasselbe, wenn man die Klappen oft genug untersucht.

Lungenvenen im Allgemeinen.

Die 4 Lungenvenen, welche das in den Lungen beim Athmen hellroth gewordene Blut in die linke Vorkammer des Herzens führen, unterscheiden sich dadurch von den Körpervenen, daß der Querschnitt ihrer Höhle nicht größer ist, als der der Lungenarterie; denn in den Lungen selbst wird jeder Ast der Lungenarterie nur von einem ungefähr gleich dicken Aste einer Lungenvene begleitet, und der Querschnitt der Höhle

---

[1]) *Haller* a. a. O.

[2]) *Kemper*, in Disp. anat. select. coll. *Haller*, Vol. II. p. 111.

[3]) *Haller*, De Partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus. Tom. I. Lib. II. sect. 2. §. 17.

Digitized by Google

der 4 Lungenvenen zusammengenommen ist, nach genauen, z. B. von Santorini [1]) gemachten Ausmessungen, nicht größer als der der Lungenarterien, und scheint sogar zuweilen ein wenig kleiner zu sein. Es finden sich auch in den Lungen keineswegs 2 Ordnungen von Venen, oberflächliche und tiefliegende. Weil nun aber die Höhle in den Lungenvenen nicht größer ist, als die der Lungenarterien, so müssen sie während des Lebens mit einer ununterbrochenen Blutsäule angefüllt sein, woraus selbst wieder folgt, daß ein Druck auf die Lungen den Blutlauf in diese Venen nicht so leicht stören kann, da das Blut nur nach der einen Richtung gut ausweichen kann, und von dem nachdringenden Blute unaufhörlich fortgedrängt wird. Da nun überdies der Druck, den die Lungen beim Athmen erleiden, sehr gelind und regelmäßig ist, so scheint derselbe den Blutlauf nicht zu stören, und es scheint daher kein Schaden daraus zu erwachsen, daß die größeren und mittleren Aeste der Lungenvenen nicht einmal unter einander durch Anastomosen zusammenhängen, und daß in ihnen keine ausgebildeten halbmondförmigen Klappen vorhanden sind [2]), die den aus den Stämmen in die Aeste

---

[1]) *Santorini*, Observationes anatomicae. Venetiis 1724. 4. p. 145. sq. *Haller*, Elem physiol. Lib. VIII. sect. 2. §. 23.

[2]) *Kemper* in *Richelmann* Diss. de valvularum in c. h. et brutorum natura etc., in *Haller* Disp. anat. select. Vol. II. p. 112 sagt: Venae pulmonalis totum ductum, exceptis mitralibus, ubi cordi affigitur valvulis destitui asserit *Willis* (Pharmaceut. ration. part. 2. sect. 1. c. 1. p. 12.). Colligit hoc inde, quod liquor trunco ejus injectus, pariter ac in arteria, omnes illico ramos et surculos sine obice quovis pervaderit. At experimentum tum fallax est, sive liquore, sive aëre tentes. Valvulae enim facile rumpuntur, vel removentur vi accedente, uti in quavis vena iis maxime munita experiri licet. Aër vero subtilior se subtus insinuat persaepe. Autopsia igitur consulto in cane et vitulo, hanc Willisio partim assentiri partim refragari apparuit. Semilunares enim non habet, *attamen oblongas illas planas, ad surculorum in ejus ramos majores insertionem manifesto exhibet*, et cum pluriumae harum adsint, regressum ad innumeros surculos satis inhiberi, prioresque non requiri videntur.

Hales, Haemastatique ou la statique des animaux, traduit par Mr. de *Sauvages*, à Genève 1744. 4. p. 63 erzählt, er habe in einer Vena pulmonalis eines Schweins eine 3 Fuß lange senkrechte Röhre eingebunden und dieselbe mit lauem Wasser gefüllt, das Wasser sei aber weder in die Lungenarterien, noch in die Luftröhrenäste gedrungen. Er vermuthet daher, daß sie wohl Klappen haben müßten. Sauvages bestätigt in einer hierzu gemachten Anmerkung diese Vermuthung beim Schöpse. Man braucht, sagt er, nur Quecksilber in diese Venen einzuspritzen, um sich von der Gegenwart dieser Klappen zu überzeugen.

C. Mayer, Ueber die Klappen in den Lungenvenen, in der Zeitschrift für Physiologie, herausgeg. von *Tiedemann* und *Treviranus*, B. III. Darmstadt 1829. 4. S. 156 sagt: es findet sich immer eine Klappe an der Stelle, wo ein Nebenast unter einem spitzen Winkel in den gröfseren Stamm der Lungenvene einmündet. Je spitziger der Winkel ist, um so deutlicher ist auch die Klappe entwickelt. Es finden sich keine Klappen an denjenigen Stellen, wo die Nebenäste unter einem rechten Winkel in den Hauptstamm sich einsenken (was sehr häufig nach *Mayer* der Fall ist). Bei der menschlichen Lunge sind diese Klappen gröfser und zahlreicher, als beim Schweine. Reich (Beiträge zur pathol. Anat. Berlin 1813. S. 31, fand einmal vor der Mün-

Digitized by Google

eingespritzten Flüssigkeiten den Weg gänzlich versperrten, denn man findet nur an Stellen, wo die Zweige in die Stämme unter spitzen Winkeln einmünden, kleine häutige Vorsprünge, die aber nach Mayer überall fehlen, wo diese Einmündung unter einem rechten Winkel geschieht.

Häute der Venen.

Die dünnere und sehr ausdehnbare Wand der Venen hat nur 2 Häute, eine äußere Haut, tunica externa, welche aus kleinen Gefäßen und aus sehr dünnen, in mannichfaltigen Richtungen laufenden, sich vielfach durchkreuzenden Fäserchen besteht, die nach innen zu dichter auf einander liegen, und durch Einweichen im Wasser sich auflockern. An manchen Venen liegen in dieser Haut zarte, röthliche, weiche Längenfasern, die aber nicht zahlreich genug sind und dicht genug liegen, um eine Lage für sich allein zu bilden, auch zu klein sind, um genauer untersucht werden zu können. Diese Haut fehlt den Venen an den Orten, wo sie in Zwischenräumen liegen, die von steifen, unnachgiebigen Wänden begrenzt sind, ganz und gar, z. B. in den Knochen in den von sehnigen Häuten gebildeten Zellen der schwammigen Körper des Gliedes und in den Sinibus der harten Hirnhaut.

Die innere Haut, tunica interna, hat die nämlichen Eigenschaften als die der Arterien, mit dem Unterschiede, daß sie etwas ausdehnbarer ist, von einem umgelegten Faden nicht so leicht durchschnitten wird, nicht so leicht im Alter verknöchert, und in vielen Venen halbmondförmige Falten bildet, welche den Nutzen der Ventile haben. Sie haftet sehr fest an der äußern Haut, ist aber auch da vorhanden, wo diese fehlt, und kleidet dann die Zwischenräume aus, in denen das Venenblut läuft.

Ueber die Zahl der Häute der Venen und über die Richtung der in ihrer Wand verlaufenden Fasern sind die Anatomen zum Theil verschiedener Meinung. Manche Anatomen, wie Haller, Bichat[1], J. F. Meckel[2], Beclard[3] und Marx[4] nehmen eine faserige, sehr dünne mittlere Haut an.

---

dung der einen rechten Lungenblutader eine Klappe. Dieses ist bei den Menschen eine Ausnahme. Nach Cuvier, Vorlesungen über die vergleichende Anatomie, B. IV. S. 133, kommen aber bei mehreren Amphibien Klappen an dieser Stelle als regelmäßige Bildung vor. Siehe J. F. Meckel, Handbuch der Anat. B. III. S. 368.

[1]) *Bichat*, Allgemeine Anatomie, übers. v. *Pfaff*. Leipzig 1802. Th. I. Abth. 2. p. 153.

[2]) *J. F. Meckel*, Handbuch der menschlichen Anatomie. Halle 1815. B. I. p. 10.

[3]) *P. A. Beclard*, Elémens d'anatomie générale. Paris 1823. p. 396.

[4]) *Henricus Marx*, Diatribe anatomico-physiologica de structura atque vita venarum. Carlsruhae 1819. 8. p. 26.

Digitized by Google

Jene drei Anatomen geben indessen zugleich zu, daß sie so dünn sei und die Fasern so wenig unter einander verbunden wären, daß man zweifeln kann, ob man sie eine Haut nennen dürfe. Meckel bemerkt auch, daß diese Längenfasern nur bei manchen Menschen und an manchen Venen deutlich gesehen werden. Sömmerring [1]), Prochaska [2]), Hildebrandt [3]), Cuvier [4]), Rosenmüller und Andere, denen auch ich beitrete, tragen Bedenken, jene Fasern, die keine continuirliche Lage bilden, eine fibröse Haut zu nennen. Cuvier hat sich nicht einmal von der Gegenwart von Längenfasern in den Venen überzeugt, Rudolphi [5]) fand nur dünne und einzeln gelegene Längenfasern, welche zu zart waren, als daß er ihre Natur genau erkennen konnte. Wenn aber Senac [6]) und Portal [7]) eine dickere, aus muskulösen Längenfasern bestehende Haut der Venen beschreiben, so muß man erwägen, daß Senac sich bei seiner Behauptung zum Theil mit auf den Bau der Vena cava der Rinder berufen hat, und daß vermuthlich auch Portal diesen Bau im Auge gehabt, und von diesem auf die Venen der Menschen geschlossen habe. Bei dem Rinde und bei dem Pferde ist nämlich der Stamm der Vena cava inferior ihrer ganzen Länge nach von einer so dicken mittleren Haut umgeben, daß dieselbe an manchen Stellen dicker, als die der Aorta ist; diese dicke fleischige Haut hört plötzlich in den Venis hypogastricis und cruralibus auf, und ist auch an dem Stücke des Stammes derselben, welches zwischen dem Zwerchfelle und dem Herzen liegt, und an der Vena cava inferior sehr dünn. Sie besteht bei Rindern und Pferden aus röthlichen, dem Fleische sehr ähnlichen, unter einander verflochtenen, und mit einander abwechselnd verschmelzenden und sich wieder trennenden Bündeln von Längenfasern, von denen jedes Bündel eine häutige Scheide hat, deren Oberfläche unter dem Vergrößerungsglase helle, schillernde, quere, im Zickzack liegende Streifen zeigt, welche durch Anspannen der Bündel und durch die Einwirkung von Wasser und Weingeist vergehen. Diese Bündel sind unter einander durch Zellgewebe verbunden, und verhalten sich beim Kochen wie Fleisch [8]).

Die dicke muskulöse Wand der Vena cava inf., und die des Stammes der Vena portae, welche jedoch dünner ist, muß aber bei diesen Thieren einen besonderen Nutzen haben, und es ist daher gewagt, von dem Baue dieser Venen bei Thieren, auf die Beschaffenheit derselben bei den Menschen zu schließen. Selbst bei diesen Thieren ist dieser Bau nur auf die Vena cava nebst den Venis iliacis und auf die Vena portae, deren muskulöse Haut aber viel dünner ist, eingeschränkt, und schon die Venae hypogastricae und crurales besitzen keine muskulöse Haut. An dem Stamme der Vena portae dieser Thiere finden sich inwendig unter den Längenfasern auch Querfasern, welche Alexander Monro [9]) beschrieben hat, und welche ich gleichfalls bestätigen kann. An den Venen der Menschen dagegen haben sie zuverlässige Anatomen, wie Haller und J. F. Meckel

---

[1]) Sömmerring, Vom Baue des menschlichen Körpers, Th. IV. Frankfurt a. M. 1801. S. 412.

[2]) *Prochaska*, Lehrsätze aus der Physiologie des Menschen. Wien 1810. 8. p. 244.

[3]) Hildebrandt, in der 3ten Ausgabe dieses Handbuchs. Braunschweig 1803. Th. IV. p. 35.

[4]) *Cuvier*, Vorlesungen über die vergleichende Anatomie, übers. v. *Meckel*. Leipzig 1810. IV. p. 25.

[5]) *Rudolphi*, Grundriss der Physiologie. Th. I. Berlin 1821. S. 88.

[6]) *Senac*, traité de la structure du coeur, de son action et de ses maladies. Edit. 2. Tome I. à Paris 1774. p. 464, 65.

[7]) Portal, in den Anmerkungen zu der von ihm veranstalteten Ausgabe von Lieutauds Zergliederungskunst, übers. Leipzig 1782. S. 735.

[8]) Ich habe diese Beschaffenheit der faserigen Haut der Vena cava und der Vena portae bei dem Pferde und Rinde beschrieben und durch Abbildungen erläutert in *Weigel* Diss. de strato musculoso tunicae venarum mediae in quibusdam mammalibus majoribus. Lips. 1823. 4.

[9]) Alexander Monro, Vergleichung des Baues und der Physiologie der Fische, übers. von Schneider. 1787. S. 11.

Digitized by Google

der Jüngere, überall vergebens gesucht. Marr hat zwar eine Lage von Querfasern dicht an der innern Haut der Venen abgebildet, seine Bemerkung ist jedoch seitdem von Niemanden bestätigt worden. Eben so wenig ist die von Willis in den Venen gefundene Drüsenhaut neuerlich von Jemanden gefunden worden, und daher gänzlich in Vergessenheit gekommen. Mascagni [1]) nimmt, jedoch ohne hinreichende Beweise, wie bei den Arterien, so auch bei den Venen 4 Häute an.

Verhältnißmäßig geringe Zerreißbarkeit der Venenwände.

Alle Venen des Menschen, sowohl die Körpervenen, als die Lungenvenen, sind viel dünner, durchsichtiger, nachgiebiger und ausdehnbarer, als die Arterien. Sie zerreißen auch leichter, als sie, durch eine mit Gewalt in sie eingetriebene tropfbare oder luftförmige Flüssigkeit. Indessen zerreißen sie doch nicht um so viel leichter, als man verhältnißmäßig zur geringeren Dicke ihrer Wände erwarten sollte, und die Substanz der Wände an sich ist also fester, als die der Arterien. Bei manchen Säugethieren, z. B. bei den Pferden und Rindern, ist nun aber die Wand der Vena cava inferior auch fast eben so dick, oder sogar zuweilen noch dicker, als die neben ihr liegende Körperarterie. Es ist daher nicht zu verwundern, daß hier diese Vene schwerer zerreißt, als die Arterie. Wenn nun also Wintringham beobachtete, daß beim Schafe eine größere Kraft angewendet werden mußte, um die Vena cava inferior, als um die neben ihr liegende Aorta durch eingetriebene Luft zu zersprengen, so darf man hieraus nicht den Schluß ziehen, daß auch die Vena cava inferior des Menschen schwerer zerreißbar sei.

Haller nimmt an, indem er die bis jetzt angestellten Messungen, die zum Theil ein verschiedenes Resultat gegeben haben, zugleich berücksichtigt, daß die Wände der großen Stämme der Venen wenigstens 3mal dünner, als die der neben ihnen gelegenen und ihnen entsprechenden Arterien sind. Indessen ist dieses Verhältniß an verschiedenen Stellen des Körpers ein verschiedenes. Die Venen der Füße z. B., welche den Druck des oft senkrecht aufsteigenden Bluts auszuhalten haben, haben dickere Wände, als Venen an anderen Theilen von demselben Durchmesser. Die Venen der Knochen dagegen und die der harten Hirnhaut haben mit den andern Venen nur die innerste Haut gemein, welche hier die Zwischenräume in den Knochen und in der harten Hirnhaut, in welchen das Venenblut fließt, auskleidet, und folglich sind ihre hier von andern benachbarten Theilen unterstützten Wände äußerst dünn.

Nach Larrey [2]) nimmt aber die Haut einer Vene, welche bei einem unglücklichen Aderlasse so verletzt worden ist, daß das Blut der benachbarten, zugleich verletzten Arterie durch die Wunde mit großer Gewalt in die Vene hinüber strömt, eine Beschaffenheit an, die der sehr ähnlich ist, welche die mittlere Arterienhaut hat. Anfangs, so lange sie sich noch nicht so verdickt hat, kann die Vene dem gewaltigen Stoße des Pulses nicht widerstehen, dehnt sich sehr aus und schlängelt sich vielfach. Schottin fand bei einer Frau, bei welcher durch eine äußere Gewaltthätigkeit die Arteria radialis mit der Vena cephalica

[1]) *Mascagni*, Prodromo della grande anatomia. Firenze 1819. Fol. p. 64.

[2]) *Velpeau*, Anatomie chirurgicale. Paris 1825. 8. T. I. p. 368.

Digitized by Google

in Verbindung getreten, und 55 Jahre lang in Verbindung geblieben war, die Häute der aneurysmatisch ausgedehnten Venen nicht dicker, wohl aber glaubte er an einer Stelle neu entstandene Fleischfasern an denselben beobachtet zu haben.

Gefäße und Nerven der Venen.

So wie die Wände der Arterien mit Gefäßen, vasa vasorum, versehen sind, welche auf ihre Ernährung abzwecken, so sind es auch die Wände der Venen. Vorzüglich deutlich sieht man diese Gefäße bei Venen, die in einem geringen Grade entzündet sind. Unter diesen Umständen wird auf ihnen, wie Ribes [1]) bemerkt, ein Netz kleiner Gefäße sichtbar, dessen Zwischenräume noch weiß sind.

Mehreren Anatomen [2]) ist es nicht gelungen, Nerven zu den Häuten der Venen zu verfolgen. Bei großen Säugethieren, beim Pferde und Rinde, habe ich indessen nicht nur die Nerven bis zur Haut der Vena cava inferior, da wo sie in die Fossa der Leber eintritt, hin verfolgt, sondern auch dieselben zwischen den Häuten des Stücks dieser Vene, das in der Leber verborgen ist, und deswegen an dieser Stelle keine Nerven unmittelbar empfangen kann, weiter verlaufen und sich in Zweige theilen sehen [3]). Da aber diese Vene an dieser Stelle mit einer wahren Muskelhaut versehen ist, welche den Venen des Menschen überall fehlt, so würde ich hieraus keinen sicheren Schluß auf das Vorhandensein von Nerven in den Venen des Menschen zu ziehen wagen, hätte ich nicht von Wutzer erfahren, daß er auch an der nämlichen Stelle Aeste des sympathischen Nerven zur Vena cava bei den Menschen treten gesehen und verfolgt habe.

Empfindungsvermögen in den Venen.

Sömmerring [4]) sagt, daß Al. Monro in seinen Vorlesungen erzählt habe, daß er an seiner eignen bloßgelegten Armvene keine Empfindung von Anstechen und Oeffnen derselben gehabt habe. Nach Ribes [5]) empfindet aber ein Kranker, der an einer Entzündung einer Vene leidet, im Anfange des Uebels einen leichten Schmerz längs der afficirten Vene.

---

[1]) *Ribes*, recherches sur la phlébite, Revue médicale, Juillet. 1825. p. 5.

[2]) Noch neuerlich in *Mascagni* Prodromo della grande anatomia. Firenze 1819. Fol. p. 65.

[3]) Siehe diese Nerven von mir beschrieben und abgebildet in *Weigel* Diss. de strato musculoso tunicae venarum mediae in quibusdam mammalibus majoribus. Lipsiae 1823. 4. S. 29. Fig. 4.

[4]) S. Th. Sömmerring, Vom Baue des menschlichen Körpers. Th. IV. Frankfurt a. M. 1801. S. 412.

[5]) *Ribes*, recherches faites sur la phlébite. Revue médicale, Juillet 1825. p. 13.

Digitized by Google

Lebensbewegung der Venen [1]).

Ungeachtet die Venen eben so wenig als die Arterien ein Vermögen besitzen, sich so schnell zusammenzuziehen, daß man die Bewegung selbst sehen könnte, und ihnen also diese Eigenschaft der Muskeln abgeht, so können sie sich doch allmählig verengern, so daß man die Wirkungen ihrer Zusammenziehung und Wiederausdehnung, wenn sie einige Zeit fortgedauert hat, gewahr wird. Daß man an ihnen die Fasern, die diese Bewegung bewirken, nicht bemerkt und unterscheidet, ist hiergegen kein Einwurf, da die Lymphgefäße, welche gewissermaßen einen Anhang am Venensysteme bilden, mit noch viel dünneren Wänden versehen sind, und noch weniger unterscheidbare Fasern besitzen, und doch sich sowohl, wenn sie leer sind, mit Flüssigkeit, die sie einsaugen, füllen, als auch diese Flüssigkeit mit beträchtlicher Gewalt fortbewegen können, wobei sie durch die Kraft des Herzens nicht unterstützt werden, da sie mit den Arterien nicht ununterbrochen zusammenhängen.

Daß auch die Venen auf die Bewegung des Bluts in ihren Höhlen einen sehr merklichen Einfluß durch die Lebensbewegung ihrer Wände äußern, sieht man schon daraus, daß diese häutigen Venen, die nahe bei einander verlaufen und unter einander in Verbindung stehen, in einem sehr verschiedenen Grade mit Blute gefüllt und vom Blute ausgedehnt sind. Wären die Venen Canäle, die selbst keine bewegende Kraft hätten, und in denen das Blut nur durch die Kraft des nachdringenden Blutes emporstiege, so würden alle Venen, die unter einander zusammenhängen, so angefüllt sein, wie es ihre Weite mit sich bringt, und bevor nicht alle tiefer gelegenen Venen völlig angefüllt wären, könnte das Blut in den höher gelegenen nicht emporsteigen.

Dieses ist aber nicht nur nicht der Fall, sondern Kälte, Furcht, Schreck und andere Umstände bewirken auch eine ziemlich schnelle Verengerung der Venen. Ohnmachten beim Aderlassen haben zur Folge, daß das Blut selbst aus sehr großen Venen so lange auszufließen aufhört, als die Ohnmacht dauert, und Vorstellungen der Seele bewirken zuweilen, daß es sich in den Venen des Corpus cavernosum des männlichen Gliedes anhäuft. Auch die Versuche an entblößten Venen lebender Thiere bestätigen die von mir ausgesprochenen Sätze. Verletzte, durchschnittene und unterbundene Venen ziehen sich oft in Kurzem sehr stark zusammen [2]). Die Beweise, die man aber von mechanischen, chemischen,

[1]) Man sehe die oben S. 74 bei den Arterien genannten Schriftsteller, und von diesen vorzüglich Verschuir, ferner *Heinr. Marx*, Diatribe anatomico-physiologica de structura atque vita venarum, a medic. ordine Heidelbergensi praemio proposito ornata; c. fig. aere incisis col. Carlsruhae 1819. 8.

[2]) *Marx* a. a. O. p. 79.

Digitized by Google

electrischen Reizungen lebender Venen und von der Zusammenziehung in Folge der Berührung entblößter Venen mit der atmosphärischen Luft bemimmt, sind nicht so sicher. Ich habe Venen durch Berührung mit der Luft noch so lange nach dem Tode sich sehr zusammenziehen gesehen, daß man nicht mehr daran denken konnte, die Zusammenziehung für eine Wirkung einer Lebenskraft zu halten.

Bildungsvermögen der Venen und Krankheiten derselben.

In der gerinnbaren Lymphe, welche in entzündeten Theilen abgesondert wird, bilden sich nicht nur kleine Arterien, sondern auch kleine Venen. Schröder van der Kolk [1]) hat sie mit eingespritzter, gefärbter Flüssigkeit angefüllt und sichtbar gemacht. Daß dasselbe in der Substanz, durch welche ein gänzlich vom Körper getrennter Theil wieder anwächst, der Fall sei, folgt daraus, daß in einem solchen Theile der Kreislauf wieder hergestellt wird [2]).

Die Wunden größerer Venen heilen sehr leicht und sehr vollkommen, ohne daß dabei der Canal derselben verschlossen wird. Von dieser Erscheinung, durch welche sie sich so sehr von den Arterien unterscheiden, ist der Grund zum Theil ein mechanischer, denn das Blut übt in den Venen einen viel geringeren Druck gegen die Wände aus, als in den Arterien, und die Wunden klaffen wegen geringerer Steifheit der Wände nicht, und werden, weil die Venen sich nicht eben sehr zurückzuziehen streben, nicht so sehr auseinander gezogen. Richter [3]) untersuchte die Narben in mehreren Venen, die durch das Aderlassen verletzt worden waren, und rechnet die Venen zu den Theilen, die vorzüglich gut heilen.

J. Hunter [4]) hat zuerst die Entzündung der Venen bei Pferden und beim Menschen beschrieben. Sie entsteht zuweilen nach dem Aderlasse. Bei einem Menschen, dem an der Armvene zur Ader gelassen worden, war die Vene vom Ellenbogen bis zur Achsel entzündet. Die innere Haut war in Eiterung übergegangen, es hatten sich im Innern aus geronnener Lymphe bestehende Membranen und einige Abscesse gebildet. Peter Frank [5]) berücksichtigte auch schon die Entzündung der Venen. Sasse [6]) hat gute Beobachtungen über die Entzündung der Venen, die zum Theil von Ph. Meckel herrühren, bekannt gemacht. Travers beobachtete die Entzündung der Venen, welche nach Am-

[1]) *J. L. C. Schröder van der Kolk*, Observationes anatomico-pathologici et practici argumenti. Amstelodami 1826. 8. p. 43.

[2]) Siehe Th. I. S. 253.

[3]) *F. C. Richter*, Diss. inaug. chir. de vulneratarum venarum sanatione, praes. Autenrieth. Tubingae 1812. p. 8.

[4]) *F. Hunter*, Medical commentar. by a Soc. of Edinburgh. Vol. III. 1775. p. 1. Transact. of society for the improvement of medic. and chirurg. knowledge. T. I. p. 18. III. p. 65.

[5]) *P. Frank*, de curand. hom. morbis.

[6]) *Jo. Georg Sasse*, Diss. vasorum sanguiferorum inflammatione. Halae 1797.

Digitized by Google

putationen und nach dem Ausschneiden der Blutaderknoten entsteht. Vieles findet man gesammelt in der durch Anmerkungen bereicherten französischen Uebersetzung von Hodgsons Werke und in den Abhandlungen von Ribes [1], Gendrin [2], Velpeau und Dance [3], Blandin [4] und Dezeimeris [5], so wie in Otto's pathologischer Anatomie [6]. Die Venen röthen sich, wenn sie sich entzünden; wenn die Entzündung sehr heftig war, verdicken sich ihre Wände zuweilen in dem Grade, daß sie quer durchschnitten das Lumen offen behalten, zuweilen werden sie durch eiternde und schwärende Vertiefungen uneben. Unter diesen Umständen sieht man an ihrer innern Haut, wenn sie unter Wasser getaucht werden, Zotten, oder es bilden sich auch in ihnen Membranen aus geronnener, ausgeschwitzter Lymphe, die sich zuweilen durch eine beträchtlich lange Strecke einer Vene fortsetzen.

Lymphgefäße.

Die Lymphgefäße, vasa lymphatica, die man auch einsaugende Gefäße oder Saugadern, vasa absorbentia [7] nennt, sind durchsichtige, mit äußerst dünnen Wänden und sehr vielen Klappen (Ventilen) versehene cylindrische, und wenn sie nicht vollkommen angefüllt sind, platte Röhrchen, welche das Vermögen besitzen, Flüssigkeiten an den Oberflächen des Körpers und seiner Höhlen und aus den kleinen Zwischenräumen seiner Substanz einzusaugen, sich damit zu füllen, dieselben mit beträchtlicher Kraft fortzubewegen, in wenige größere Stämme zu sammeln und sie in die Venen zu ergießen, und dadurch in den Kreis-

---

[1] *Ribes*, in Mém. de la soc. méd. d'émulat. de Paris, 1816. T. VIII. p. 604 und Revue méd. Juillet 1825. p. 5.

Gendrin, Histoire anatomique des inflammations. Paris et Montpellier 1826, übers. v. Radius, Anatomische Beschreibung der Entzündung. Leipzig 1829. Th. II. S. 19 und 38 sq.

[3] *Velpeau*, in Archives gén. de méd. Oct. 1824. *Dance*, ebend. 1828.

[4] *Blandin*, in Mém. sur quelques accidens très graves à la suite des amputations des membres; Journ. hebd. de méd. T. II. p. 579.

[5] *Dezeimeris*, Archives gén. de Méd. Dec. 1829. p. 481 sq. wo viel Literatur angeführt ist.

[6] *A. W. Otto*, Lehrbuch der pathologischen Anatomie des Menschen und der Thiere. Berlin 1830. S. 344, in welchem trefflichen Werke nicht nur über alle Arten der krankhaften Abweichungen an den Venen die vorhandenen Thatsachen mit seltener Belesenheit und mit eigenem Urtheile zusammengestellt, sondern auch viele eigene Beobachtungen beigebracht worden sind.

[7] Aeltere Anatomen brauchten auch die Ausdrücke ductus lymphae, vasa serosa, Fleischwassergefäße, (ein Ausdruck der unpassend ist, weil man auch die durchsichtigen, nicht roth erscheinenden kleinen Arterien vasa serosa nennt), vasa valvulosa, diaphana, crystallina, lactea, chylosa, Milch- oder Speisesaftgefäße, welche 4 letzteren Namen nicht von allen Lymphgefäßen, sondern nur von den während der Verdauung eine milchweiße Flüssigkeit führenden, aus den Gedärmen kommenden Lymphgefäßen gebraucht werden dürfen, und von denen der erstere Ausdruck auch deswegen zweideutig ist, weil auch die Gänge der Brustmilchdrüse der Frauen, durch welche die Milch austritt, vasa lactea genannt werden können.

Digitized by Google

lauf zu bringen. Zwar sind auch die Venen so eingerichtet, daß das in ihnen befindliche Blut manche Stoffe, zu denen es eine Anziehung hat, durch die feuchten Wände hindurch an sich zieht. Allein man hat noch keinen hinreichenden Grund, anzunehmen, daß auch leere Venen, in welchen kein Blut vorhanden ist, Säfte hereinzuziehen, sich damit zu füllen und dieselben fortzubewegen fähig wären, vielmehr sprechen, wie später gezeigt werden soll, gegen eine solche Annahme wichtige Versuche. Die Säfte, die in den Saugadern fortbewegt werden, befinden sich demnach noch nicht im Kreislaufe, sondern nur auf dem Wege zu den Canälen des Kreislaufs, sie sind der Regel nach nicht roth, und also nicht Blut, aber demselben doch in anderer Rücksicht ähnlich. (S. Th. I. S. 100, 101.) Die Wände der Lymphgefäße und ihre Höhlen sind eine unmittelbare Fortsetzung der Wände und der Höhlen derjenigen Venen, in welche sie die Flüssigkeiten, die sie führen, ergießen, und sie selbst also als ein Anhang des Venensystems zu betrachten. Die Saugadern unterscheiden sich aber von den Venen nicht nur dadurch, daß sie eine vom Blute verschiedene Flüssigkeit führen, sondern noch, daß sie viel zahlreichere, nirgends ganz fehlende, und namentlich auch in den kleinen Zweigen vorhandene Klappen haben, noch dünnere und noch durchsichtigere Wände besitzen, sich nicht in jedem Organe in einen oder in einige wenige Stämme vereinigen, und daß sie endlich mit den Arterien in keiner so nahen Verbindung stehen, d. h., daß die Höhlen und Wände der Arterien sich nirgends in die Höhlen und Wände der Lymphgefäße auf eine solche Weise fortsetzen, daß eine Strömung von Säften aus jenen in diese während des Lebens möglich wäre. Hiermit ist indessen nicht geläugnet, daß allerdings Flüssigkeiten während des Lebens und nach dem Tode durch unsichtbare Poren aus den Arterien langsam in die Lymphgefäße übergehen können, erstlich nämlich durch eine Aushauchung, oder Durchschwitzung aus den kleinen Arteriennetzen, die sich an den Wänden der größeren Lymphgefäße ausbreiten, und dann durch eine Auffaugung von Seiten der kleinen Lymphgefäße, die sich unstreitig auch an den Wänden größerer Arterien befinden.

Endlich ist es aber eine die Lymphgefäße auszeichnende Einrichtung, daß sie die von ihnen eingesogenen Säfte, bevor sie dieselben in die Venen ergießen, einmal oder mehrmal durch röthliche, rundliche und zugleich plattgedrückte, härtliche Drüsen, Lymph- oder Saugaderdrüsen, glandulae lymphaticae, conglobatae, hindurchführen, eine dem Lymphgefäßsysteme ausschließlich zukommende Classe von Organen, welche dazu eingerichtet zu sein scheint, daß hier die Lymphe, indem sie aus größeren in viele kleinere vielfach gewundene und verschlungene Lymphgefäße vertheilt, und aus diesen wieder in größere Lymphgefäße zusammengeleitet wird, in einem kleinen Raume in eine

Digitized by Google

recht vielfache Berührung mit den Wänden der Lymphgefäße komme, an denselben sich recht langsam vorbei bewege, und daselbst dem Einflusse des Blutes ausgesetzt werde, das in unzähligen, viel dünneren Röhrchen, in den Haargefäßen, an den Wänden dieser Lymphgefäße langsam hinbewegt wird, und unstreitig sowohl gewisse Materien aus der Lymphe durch die Wände der Gefäße hindurch an sich ziehen, als auch andere Materien in die Lymphe absetzen kann, wodurch die Lymphe eine an vielen Stellen sichtbare Veränderung ihrer Farbe und ihrer Eigenschaften erfährt.

Wir wollen jetzt diese Eigenthümlichkeiten der Lymphgefäße im Einzelnen betrachten.

Klappen der Lymphgefäße und häufige Communication ihrer zahlreichen Stämme.

Da die Lymphgefäße nicht mit den Arterien in einer solchen Verbindung stehen, daß das vom Herzen fortgestoßene Blut in sie eindringen und sie anfüllen kann, so sind sie einer übermäßigen Ausdehnung noch weit weniger, als die Venen ausgesetzt. Ohne Nachtheil sind deswegen ihre Wände viel dünner, und daher auch zugleich durchsichtiger, als die der Venen, so daß sie, wenn sie mit der durchsichtigen Lymphe, die sie meistentheils führen, nicht sehr stark erfüllt sind, oder wenn sie nicht etwa eine weiße, oder anders gefärbte Flüssigkeit einschließen, nur mit einiger Anstrengung gesehen werden können. Dem Nachtheile, den die große Dünnheit der Wände für die Lymphgefäße mit sich bringen könnte, durch den geringfügigsten äußeren Druck zusammengedrückt zu werden, ist dadurch vorgebeugt, 1) daß die Stämme der Lymphgefäße von mittlerer Größe, wie schon erwähnt worden, noch in weit größerer Zahl neben einander liegen, als die Stämme der Venen, und auch in einer weit vielfacheren Verbindung unter einander stehen, als diese, wodurch bewirkt wird, daß der Lymphe, wenn ihr an einer Stelle der Weg versperrt wird, immer noch an einer andern ein Ausweg offen steht; 2) daß sie viel zahlreichere, halbmondförmige Klappen haben, die, weil sie in kleinen Zwischenräumen auf einander folgen, und an den mit Flüssigkeit erfüllten Lymphgefäßen meistens je 2 neben einander liegende Anschwellungen verursachen, den Lymphgefäßen das Ansehn knotiger Schnüre geben. Diese Klappen sind im Wesentlichen so eingerichtet, wie die der Venen, kehren, wie diese, ihren freien Rand nach dem Herzen zu, und verhindern das Zurückweichen der Lymphe nach den Aesten zu. Fast immer sind sie paarweis gestellt, sehr selten findet man eine 3fache oder eine einfache halbmondförmige Klappe. Bisweilen, z. B. in den

Digitized by Google

Lymphgefäßen der Leber sahe Lauth [1]) ringförmige Klappen, welche dadurch entstehen, daß 2 halbmondförmige in einen etwas niedrigeren, ringförmigen Vorsprung zusammenfließen, der indessen meistens nicht hinreicht, der mit einiger Gewalt eingetriebenen Flüssigkeit Widerstand zu leisten.

Es scheint sehr nützlich zu sein, daß die Klappen der Lymphgefäße viel zahlreicher sind, als die der Venen, und nirgends fehlen. Die in den Lymphgefäßen fortbewegte Flüssigkeit bildet nämlich in ihnen noch viel weniger als in den Venen eine continuirliche Flüssigkeitssäule, sondern die Saugadern sind stellenweise mit Flüssigkeit erfüllt und leer. Je kürzer nun aber die in ihnen enthaltenen Flüssigkeitssäulen sind, desto mehr Klappen sind erforderlich, wenn die Flüssigkeit nicht zurücksinken soll, da sie durch die nachfolgende Flüssigkeit nicht daran verhindert wird. Hiermit hängt es wohl zusammen, daß im Hauptsaugaderstamme, ductus thoracicus, wo die Flüssigkeit, weil sie von allen Seiten her in diesem engen Gange zusammengebracht wird, unstreitig mehr eine continuirliche Säule bildet, weniger Klappen vorhanden sind.

In den Lymphgefäßen der Fische fehlen die Klappen, nach Hewson, Sheldon und Fohmann [2]) ganz, wenigstens leisten sie keinen bemerkbaren Widerstand, wenn man Flüssigkeiten in der entgegengesetzten Richtung in sie einspritzt, als in welcher die Lymphe fließt. Bei den Schildkröten haben Cruikshank [3]) und Sheldon [4]) Klappen wahrgenommen, die aber auch nicht verhindern, daß Flüssigkeit, nachdem die Lymphgefäße sehr ausgedehnt worden, aus den Stämmen in die Zweige dringe.

Festigkeit und Ausdehnbarkeit der Wände.

Ungeachtet der großen Dünnheit, Durchsichtigkeit und äußerst beträchtlichen Ausdehnbarkeit der Wände sind die Lymphgefäße doch durch den Druck einer in sie eingetriebenen Flüssigkeit schwerer zerreißbar, als man glauben sollte. Werner und Feller [5]) behaupten, daß Blutgefäße, welche denselben Durchmesser als die von ihnen untersuchten Lymphgefäße hatten, immer von dem Drucke einer 12 Querfinger (Zolle?) hohen, in ihre Höhle gehenden Queckſilbersäule zerrissen wurden, daß aber die Lymphgefäße den Druck einer viel höheren Queckſilbersäule aushielten. Sie erfüllten einmal die Lymphgefäßstämme der unteren Extremitäten, und erhielten das Glied dabei in einer senkrechten Stellung, so daß die bis zum Anfange des Hauptsaugaderstammes reichende Queckſilbersäule wenigstens 4 Fuß hoch war, und doch zerrissen die sehr ausgedehnten Lymphgefäße des Unterleibes nicht. Hiermit stimmen Meckels [6]) und Sheldons [7]) Erfahrungen überein,

---

[1]) *E. A. Lauth*, Essai sur les vaisseaux lymphatiques. Dissertation etc. Strasbourg 1824. p. 4.

[2]) *Fohmann*, Das Saugadersystem der Wirbelthiere. Heft I. Heidelberg 1827. Fol. Das Saugadersystem der Fische.

[3]) *Cruikshank* a. a. O.

[4]) *Sheldon* a. a. O. S. 28.

[5]) *Werner* et *Feller*, Vasor. lacteor. atque lymphat. anatomico-physiologica descriptio, fasc. 1. c. tabb. IV. Lipsiae 1784. 4. p. 15, 16. Nota.

[6]) J. F. *Meckel* d. ä. sagt in seiner Diss. epistolaris de vasis lymphaticis, welche enthalten ist in Opuscula anatomica de vasis lymphaticis. Lipsiae 1760. 8. p. 81. »membrana fortiter dilacerationi ac tensioni, magis quam venae, resistens, id quod injectio mercurii ope nos docet, quem vi aliquot librarum in minorem ramulum adactum eum non dilacerasse, saepius expertus sum.

[7]) *J. Sheldon*, The history of the absorbent system, part the first, containing the chylography etc. London 1784. gr. 4. S. 27.

Digitized by Google

nach welchen die Haut der Lymphgefäße fester als die der Arterien und Venen von gleicher Größe ist, indem sie den Druck von einer höheren Queckſilberſäule, als Arterien und Venen von derſelben Größe und ſogar als noch 4 mal größere aushalten.

Weil nun aber die Lymphgefäße ſo leicht und ſo ſehr beträchtlich ausdehnbar und zugleich ſehr elaſtiſch ſind, ſo iſt ihr Durchmeſſer während des Lebens und nach dem Tode ſehr veränderlich. Saugadern, welche, wenn ſie angefüllt ſind, ſehr weite anſehnliche Canäle ſind, können, wenn ſie leer ſind, oft kaum geſehen werden. Von dieſer großen Ausdehnbarkeit rührt es auch her, daß die Klappen des Ductus thoracicus und zuweilen auch die der anderen Lymphgefäße nicht mehr zureichen, die erweiterte Höhle zu verſchließen, wenn Flüſſigkeiten ihnen entgegen aus den Stämmen in die kleinen Zweige eingetrieben werden. W. Hunter gelang es einmal, die Saugadern ſehr vollſtändig mit Luft anzufüllen, welche er in den Saugaderſtamm einblies.

Zahl und Beſchaffenheit der Häute der Lymphgefäße.

Schon aus der Gegenwart der halbmondförmigen Klappen im Inneren der Lymphgefäße, welche durch vorſpringende Falten der inneren Haut gebildet werden, kann man den Schluß ziehen, daß die Lymphgefäße wenigſtens 2 Häute beſitzen. Cruikshank [1]) wendete den Hauptſaugaderſtamm, ductus thoracicus, eines Pferdes um, ſo daß die innere Oberfläche zur äußeren wurde, und zog ihn hierauf auf einen Glascylinder, der dicker als der Saugaderſtamm war. Weil nun die innere Haut der Lymphgefäße zerreißbarer als die äußere iſt, ſo riß ſie hierbei, und hierdurch wurde die äußere Haut ſichtbar. E. A. Lauth [2]) erzählt, daß es auf dem anatomiſchen Theater in Straßburg gelungen ſei, auch mit Hülfe des Scalpells beide Häute von einander zu trennen. Faſern, die man für Muskelfaſern halten könnte, nimmt man an den Lymphgefäße nicht deutlich wahr. Es giebt zwar einige Anatomen welche wenigſtens am Saugaderſtamme großer Thiere kreisförmige Faſern gefunden zu haben behaupten, namentlich ſagt Cruikshank, daß e ihm zuweilen beim Menſchen beſſer als beim Pferde gelungen ſei, die ſchon vo Nuck beobachteten Faſern zu zeigen, und Sheldon [3]) ſagt ausdrücklich, da er am Ductus thoracicus des Pferdes Cirkelfaſern beobachtet habe. Auc B. N. G. Schreger [4]) glaubt ſolche Faſern bei dem Menſchen und bei de Kuh beobachtet zu haben.

---

[1]) *Cruikshank*, The anatomy of the absorbing Vessels of the human body, th second ed. London 1790. 4. p. 61, überſ. von *Ludwig*. Leipzig 1789. 4. S. 5

[2]) Essai sur les vaisseaux lymphatiques. Diss. Strasbourg 1824. 4. p. 2.

[3]) *Sheldon*, The history of the absorbent system, part the first, containing th chylography. London 1784. 4. p. 26.

[4]) *B. N. G. Schreger*, Fragmenta anat. etc. p. 9 — 12. Fig. 2 — 6.

Digitized by Google

Indessen konnten Anatomen, wie Mascagni, J. F. Meckel d. j. und Rudolphi, keine solche Fasern finden, und namentlich Rudolphi weder beim Menschen noch beim Pferde. Die Wand der Lymphgefäße hat, wie die glücklichen Einspritzungen des Mascagni [1]) und Cruikshank [2]) beweisen, ernährende Blutgefäße. Cruikshank [3]) fand es sogar wahrscheinlich, daß an den Wänden größerer Saugadern sich kleinere verbreiteten. Nerven hat man sich, unstreitig weil sie zu klein sind, noch nicht auf der Wand der Lymphgefäße verbreiten gesehen.

Durchmesser aller Lymphgefäße zusammengenommen.

Denkt man sich die Höhle aller Lymphgefäßstämme, die die Lymphe aus einem Theile, z. B. aus dem Oberschenkel, fortführen, in eine Röhre vereinigt, so kann man die Frage aufwerfen, wie sich wohl der Durchmesser derselben zu dem der Arterien und Venenstämme dieses Theils verhalte. Eine Antwort auf diese Frage ist sehr schwierig, weil wir den Durchmesser, den die Lymphgefäßstämme bei einem Gesunden während des Lebens haben, nicht kennen, und weil diese Gefäße, wenn sie künstlich mit Flüssigkeiten angefüllt werden, wegen ihrer großen Nachgiebigkeit sich über alle Erwartung ausdehnen. Nach Sömmerrings [4]) Schätzung würden die Saugadern eines Theils, wenn man sie in einen Stamm vereinigt dächte, wenigstens noch einmal so weit sein als die in einen Stamm vereinigten Arterien desselben, und nach J. F. Meckels [5]) Vorstellung würde das Saugadersystem ungefähr dieselbe Weite als das Venensystem haben, und jeder größere Arterien- oder Venenstamm wird nach ihm im Allgemeinen von wenigstens 10 Lymphgefäßstämmen begleitet. Sehr auffallend ist es aber, daß so zahlreiche Saugaderstämme nur in 2 Hauptstämmen von einem so geringen Durchmesser zusammenkommen, von welchem der größere nur etwa die Größe eines Rabenfederkiels oder eines Gänsefederkiels hat.

Mechanismus und Kräfte, wodurch die Einsaugung geschieht.

Sehr merkwürdig ist die Eigenschaft der Saugadern, Flüssigkeiten in sich einzuziehn, sich damit zu füllen und sie mit nicht unbeträchtlicher Gewalt weiter fortzutreiben. Wenn man z. B. den Ductus tho-

[1]) Mascagni, Geschichte der einsaug. Gefäße, übers. von Ludwig. S. 37.
[2]) Cruikshank, Geschichte der einsaugenden Gefäße, übers. von Ludwig. S. 57.
[3]) Cruikshank, ebendaselbst.
[4]) Sömmerring, vom Baue des menschl. Körpers. Th. IV. S. 528.
[5]) J. F. Meckel d. j., Handbuch der menschl. Anatomie. Halle 1815. Th. I. S. 216.

racicus bei lebenden, zuvor gefütterten Thieren unterbindet, so soll zuweilen die Gewalt der andringenden Lymphe diesen Gang zersprengt haben [1]), oder wenn man ihn, wie Tiedemann und Gmelin [2]) thaten, bei Säugethieren, die 2 Stunden zuvor gefüttert und dann durch einen Schlag auf den Kopf betäubt worden waren, unterbindet, so füllt er sich strotzend mit Speisesaft an, und treibt denselben, wenn man in ihn hineinsticht, mit einem mehrere Zoll hohen Sprunge, gleich dem aus einer Vene hervorgetriebenen Blute, in einem Bogen hervor. Unterbindet man ihn hierauf von neuem, so füllt er sich zwar einige Zeit darauf wieder an, aber seine Flüssigkeit fließt, wenn er nur angestochen wird, aus, ohne in einem Bogen hervorzuspringen. Das lebendige Bewegungsvermögen der Saugadern kommt indessen nicht mit dem der Muskeln überein, denn eine mechanische, chemische und electrische Reizung derselben veranlaßt keine schnelle sichtbare Zusammenziehung derselben.

Wenn man die Saugadern zerschneidet, oder sie mit der Luft, mit warmem Wasser, mit verdünntem Weingeiste in Berührung bringt, so verengern sie sich zwar nicht selten beträchtlich [3]), aber dieses geschieht so allmählig, daß man nur den verengerten Zustand, nicht aber die Bewegung, durch die die Verengerung zu Stande kommt, beobachten kann. Nur Schwefelsäure und vielleicht auch Spießglanzbutter und ähnliche Mittel, welche eine chemische Veränderung in der Substanz der Wände hervorbringen, indem sie z. B. die in derselben befindliche Feuchtigkeit an sich ziehen, veranlassen auch eine schnellere sichtbare Bewegung, ein Zusammenschrumpfen. Indessen ist kein Grund vorhanden, warum man jene langsame Verengerung, wenn es erwiesen ist, daß sie nicht von einer todten Kraft der Materie abhänge, nicht auch als die Wirkung der Reizbarkeit ansehen sollte.

Da nun überdies die Einsaugungsthätigkeit während des Lebens nach Verschiedenheit der Umstände hier und da bald gemindert, bald verstärkt wird, ohne daß man davon einen physikalischen Grund angeben kann, so sind Cruikshank, Sömmerring, Rudolphi, J. F. Meckel d. j., Tiedemann und die meisten Anatomen der Meinung, daß die während des Lebens, und die bald nach dem Tode, so lange ein Mensch noch warm ist, geschehende Einsaugung unter dem Einflusse einer Lebensthätigkeit erfolge.

Nach dem Tode, aber auch später, nachdem schon der Körper erkaltet ist, dringen noch Flüssigkeiten in die Saugadern ein, und erfüllen sie. Mascagni [4]) benutzte diese Eigenschaft derselben, um die allerkleinsten Saugadern mit gefärbten Flüssigkeiten anzufüllen, in die man von

---

[1]) *Haller*, Elementa Physiol. Lib. XXV. Sect. 2. §. 2. und §. 6., der de *Monro*, de hydrope p. 18 anführt. *N. Oudemann*, de venarum praecipue mesaraicarum fabrica et actione, 1794. 8. p. 190, führt auch in dieser Hinsicht de Hewson an.

[2]) *F. Tiedemann* und *L. Gmelin*, Versuche über die Wege, aus welchen Substanzen aus dem Magen und Darmkanale in's Blut gelangen, über die Verrichtung der Milz und die geheimen Harnwege. Heidelberg 1820. 8. S. 10.

[3]) Sömmerring, in seiner Gefäßlehre, S. 535. und *B. N. G. Schreger*, Tractatus de irritabilitate vasorum lymphaticorum, Lips. 1789, exp. 1 — 17. Lipsiae 1789. recuss. in *P. Frank*, Delectus opusculorum medicorum. Tom. X.

[4]) *Mascagni*, Vasorum lymphaticorum historia et ichnographia. Senis 1787. Fol. p. 22 und 14.

Digitized by Google

den Stämmen aus, weil es die Klappen verhindern, keine Flüssigkeiten eintreiben kann. Er mengte lauwarmem Wasser Dinte bei, und spritzte diese Flüssigkeit in die Brusthöhle, in die Bauchhöhle, in die Luftröhre u. s. w.; die Lymphgefäße saugten sie auf, und dadurch wurden äußerst dichte Netze derselben an der Pleura, an dem Peritonaeo und an der inneren Oberfläche der Luftröhrenäste sichtbar, von welchen manche aus so dünnen Röhrchen bestanden, daß Mascagni das Mikroskop zu Hülfe nehmen mußte, um sie deutlich zu sehen. Bei einem Kinde gelang dieser Versuch Schregern sogar, als er nach 40 Stunden nach dem Tode angestellt wurde. Von der 26sten bis zur 48sten Stunde gelang er bei Kindern und jungen Menschen dem Mascagni gewöhnlich, bei Erwachsenen aber wollte er nicht leicht später als 6 bis 8 Stunden nach dem Tode gelingen. Dem Cruikshank glückten diese Versuche gar nicht, aber Sömmerring bemerkte ganz deutlich, daß sich die Saugadern eines schon ein Paar Tage todten Seehundes sehr leicht mit der in den Därmen enthaltenen verdünnten schwärzlichen Masse füllten. Cruikshank [1]) und Sömmerring [2]) halten diese Aufsaugung für die Wirkung einer todten Haarröhrchenkraft, von der Cruikshank glaubte, daß sie während des Lebens auf irgend eine Weise verhindert sei, ihre Wirksamkeit zu äußern. J. F. Meckel d. j. dagegen scheint auch sie für die Wirkung einer noch längere Zeit nach dem Tode zurückbleibenden Reizbarkeit anzusehen, vielleicht aus dem Grunde, weil diese Einsaugung nach Mascagni's Erfahrungen, wenn eine gewisse Anzahl Stunden nach dem Tode verflossen sind, und bevor noch die Fäulniß eingetreten ist, aufhört, eine Erfahrung, die sich indessen auch mit Sömmerrings und Cruikshanks Ansicht verträgt.

In einzelnen Fällen läßt es sich also oft schwer bestimmen, ob die Einsaugung durch eine lebendige Thätigkeit, oder durch physikalische Kräfte bewirkt worden sei.

Diejenigen Physiologen, welche die einsaugende Thätigkeit der Saugadern durch eine Lebensthätigkeit derselben erklären, können sich entweder, wie Hunter, vorstellen, daß die Saugadern so eingerichtet wären, daß sie vermöge einer abwechselnden Erweiterung und Verengerung ihrer Röhre einsaugten, also auf eine solche Weise, wie das Einsaugen bei den Blutigeln und bei manchen saugenden Insecten geschieht, oder sie können sich denken, daß die einzusaugende Flüssigkeit durch Strömungen einer elektrischen Materie, welche durch eine lebendige Thätigkeit, z. B. der Nerven, erregt würden, in die Saugadern hereingezogen würden, oder endlich, daß die Flüssigkeiten zwar durch eine Haarröhrchenkraft in die Saugadern hereingezogen würden, daß aber dennoch ihre Aufsaugung und Fortbewegung von der lebendigen Thätigkeit der Saugadern abhängig wären, weil die Poren, die die Flüssigkeiten in die Saugadern hereinlassen, sich durch eine lebendige Kraft zu verengern und zu öffnen im Stande wären, und weil die Fortbewegung der aufgenommenen Flüssigkeiten durch die Reizbarkeit der Saugadern bewirkt würde.

Da man bis jetzt noch niemals aufsaugende Enden der Saugadern gesehen und mikroskopisch untersucht hat, so kann man keine von diesen und von noch andern möglichen Vermuthungen der Art bestätigen oder widerlegen.

Diejenigen Physiologen, welche die einsaugende Thätigkeit der Saugadern durch physikalische Kräfte zu erklären versuchen, behaupten entweder, daß die einzusaugenden Flüssigkeiten durch die Anziehung, welche die Materie der

---

[1]) Cruikshanks Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße, a. d. E. von Ludwig. Leipzig 1789. 4. S. 38.

[2]) Sömmerring, vom Baue des menschl. Körpers, Th. IV. S. 523.

Digitized by Google

Wände der Saugadern zu den Flüssigkeiten hätte, in sie hineingezogen würde, also durch eine Kraft, welche der ähnlich wäre, durch welche sich Schwämme und Löschpapier vollsaugen, oder sie nehmen an, daß die in den Saugadern befindlichen Säfte eine Anziehung gegen die aufzusaugenden Flüssigkeiten äußerten und sie hereinzögen, ein Vorgang, den Dutrochet Endosmose genannt hat, und durch welchen Flüssigkeiten mit beträchtlicher Kraft in häutige Canäle hereingezogen werden können. (Siehe S. 54.) Es ist dabei denkbar, daß die Säfte, die ein solches Anziehungsvermögen hätten, von den absondernden Blutgefäßen in die Canäle der Saugadern abgesetzt würden, und sich immer erneuerten.

Anfang der Lymphgefäße.

Die kleinen Lymphgefäße nahe an ihrem Anfange füllen sich nicht nur durch Einsaugung von Flüssigkeiten während des Lebens oder auch nach dem Tode, und werden dadurch sichtbar, namentlich in der Oberfläche der serösen und der schleimabsondernden Häute, sondern man kann sie zuweilen auch dadurch sichtbar machen, daß man das in die Lymphgefäße eingespritzte Quecksilber mit Gewalt rückwärts in die noch kleineren Zweige drückt, wo es dann zuweilen den Widerstand, den die Klappen leisten, überwindet. Haase [1]) drückte auf diese Weise das Quecksilber aus den Lymphdrüsen der Inguinalgegend in die Saugadern der Haut, wo es endlich durch die Hautporen herauskam. Endlich aber kann man Quecksilber, Luft und andere Flüssigkeiten, die man in das Zellgewebe oder in die Ausführungsgänge der absondernden Drüsen mit einiger Gewalt eintreibt, in die kleinsten Lymphgefäße bringen. Weniger leicht gelingt dieses, wenn man die Harnblase und den Darm damit sehr stark anfüllt. Sticht man, sagt Sömmerring [2]), ein mit Quecksilber gefülltes Rohr unter die Haut oder in den Hoden, so füllen sich die von diesen Stellen kommenden Saugadern, oder wird durch die Einsprizung mit dünnem Wachs, farbigem Oel oder gefärbtem Leime eine Arterie zerrissen, und die Materie ins Zellgewebe getrieben, so füllen sich zuweilen von dieser Stelle an die Saugadern. Sömmerring füllte durch einen solchen Zufall die feinsten Saugadern am Fuße mit Quecksilber. Tiedemann zeigte in der Versammlung deutscher Naturforscher in Berlin Präparate vor, wo die feinsten Saugadern dadurch angefüllt worden waren, daß er durch einen Einschnitt Luft ins Zellgewebe geblasen, und dann in Saugadern, welche sich hierbei mit Luft gefüllt hatten und dadurch sichtbar geworden waren, Quecksilber eingespritzt hatte. Die auf diese Weise sichtbar gemachten Saugadernetze sind oft so dicht, daß die Zwischenräume zwischen ihnen nur sehr klein sind. Es fehlt bis jetzt noch an mikrometrischen Messungen, wie klein der Durchmesser der kleinsten auf irgend eine Weise angefüllten und dadurch sichtbar gemachten Lymphgefäße sei. Aber die feinsten Lymphgefäße, welche ich gesehen, sind noch immer von einem sehr großen Durchmesser, verglichen mit dem der kleinsten blutführenden Haargefäße.

A. Monro d. 2te, Jo. Fr. Meckel d. ältere, Cruikshank, Mascagni, Sömmerring und mehrere ältere und neuere Anatomen haben viele Erfahrungen gemacht, daß Flüssigkeit mit einiger Gewalt in die Ausführungs-

---

[1]) *Haase*, De vasis cutis absorbentibus, siehe Ludwigs Anmerk. in seiner Uebersetzung von Cruikshanks Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße. S. 129.

[2]) Sömmerring, vom Baue des menschlichen Körpers. Th. IV. Gefäßlehre S. 497.

gänge der absondernden Drüsen gespritzt, in die Lymphgefäße übergehen. Vorzüglich häufig hat man das bei Eintreibung von Luft, Quecksilber und andern Flüssigkeiten in die Samenleiter der Hoden, in den Gallengang der Leber und in die Luftröhre der Lungen gesehen. Auch von Einspritzungen in die Ausführungsgänge der Milchdrüsen, in die Harnleiter der Nieren ist zuweilen dieselbe Wirkung beobachtet worden. Ob aber, wie Manche behauptet haben, in allen diesen Fällen eine Zerreißung vor sich gegangen, oder ob die Flüssigkeit durch natürliche Oeffnungen in die Saugadern getreten sei, läßt sich nicht entscheiden. So viel ist gewiß, daß in manchen Fällen, wo die Flüssigkeiten in die Saugadern übergingen, keine in's Zellgewebe ergossene Flüssigkeit gesehen wurde. Hieraus folgt indessen noch nicht, daß die Flüssigkeit auf natürlichen Wegen in die Saugadern übergegangen sei, sondern nur, daß die kleinen, leicht zerreißbaren Saugadern eine solche Lage an den Wänden der Ausführungsgänge haben, daß ihre dünne Haut mit der, welche die innere Oberfläche jener Canäle begränzt, da wo sie dieselbe berührt, verschmolzen ist, so daß die Haut der Ausführungsgänge an den Stellen, wo sie an die Saugadern stößt, zuweilen leichter zerreißt, als da, wo sie an die Zellen des Zellgewebes gränzt.

Mehrere Beobachter, **Lieberkühn, Hunter, Hewson, Cruikshank, Hedwig, Bleuland**, glaubten an den Zotten der dünnen Gedärme eine oder mehrere große, mit unbewaffnetem Auge sichtbare Oeffnungen gesehen zu haben, die sie für die einsaugenden Mündungen der Lymphgefäße hielten. **Haase** hielt die Hautporen, durch welche, wie vorhin erzählt worden ist, das von ihm in den Lymphgefäßen rückwärts gedrückte Queckſilber zum Vorschein kam, für die Oeffnungen der Lymphgefäße auf der Haut. Indessen läßt sich auf keine Weise darthun, daß diese Behauptungen wahr wären. Jene größeren Oeffnungen, die man an den Zotten zu sehen meinte, sind von vielen andern Beobachtern, namentlich von Rudolphi, A. Meckel, nicht bestätigt worden, und wenn sie auch vorhanden wären, so würde daraus immer noch nicht folgen, daß sie einsaugende Mündungen der Lymphgefäße wären; denn von den auf der Haut bemerklichen Oeffnungen ist es gewiß, daß sie nicht den Lymphgefäßen, sondern den Ausführungsgängen der Hautdrüsen angehören, und auf ähnliche Weise könnten die Oeffnungen an den Zotten kleinen Schleimdrüsen angehören. Bei den Fischen, bei welchen man Flüssigkeiten mit Leichtigkeit aus den Stämmen in die kleinen Zweige und bis dicht an die Oberfläche der Gedärme treiben kann, weil hier keine Klappen, die es hindern, vorhanden sind, ist doch nach Hewsons und Fohmanns [1]) Erfahrungen der freie Austritt derselben auf die Oberfläche der Gedärme oder auf andere Oberflächen des Körpers gehindert. Der mäßige Druck, durch welchen das Queckſilber eingespritzt wird, reicht hierzu nicht hin. Man muß das Queckſilber mit einiger Gewalt rückwärts streichen, damit es in die Höhle der Gedärme übergehe. Dieses kann entweder, wie Hewson vermuthet, daher rühren, daß, obgleich nicht in dem Canale der Saugadern, doch in den Mündungen derselben Klappen vorhanden sind, die einen Ausfluß der in den Lymphgefäßen befindlichen Flüssigkeit in die Gedärme hindern, oder wie Fohmann vermuthet, daß die Lymphgefäße keine offene Enden, sondern nur Oeffnungen, die durch ihre Wände schief durchgehen, besitzen. Unter diesen Umständen würde die eingespritzte Flüssigkeit eben so wenig aus den Lymphgefäßen austreten, als Flüssigkeiten, die in den Zwölffingerdarm gespritzt werden, von da aus in den Ausführungsgang der Leber und des Pankreas übergehen. Die Versuche von Leuret und Lassaigne [2]), daß der Chylus eines Säugethiers, wo-

[1]) *V. Fohmann*, Das Saugadersyslem der Wirbelthiere, Heft 1. Das Saugadersystem der Fische. Heidelberg 1827.

[2]) *Leuret* und *Laissagne*, Recherches physiologiques et chimiques, pour servir à l'histoire de la digestion. Paris 1825. 8. p. 66, 69, 0.

Digitized by Google

mit die Lymphgefäße sehr vollkommen angefüllt gewesen, in die Gedärme an vielen Stellen hervorgedrungen sei, als sie in den Ductus thoracicus lauwarmes Wasser eingespritzt hätten, bedarf noch sehr der Bestätigung.

Daß Luft oder Queckſilber, wenn ſie in das Zellgewebe eingetrieben werden, und die Zellen deſſelben ausdehnen, ſo leicht in die Lymphgefäße übergehen, beweiſt, wie mir ſcheint, auch nicht, daß die Lymphgefäße daſelbſt mit offenen Enden anfangen. Denn bekanntlich gehen Flüſſigkeiten, die in eine weite, membranöſe Höhle geſpritzt werden, ſehr ſchwer in häutige Canäle über, die ſich in derſelben mit engen Oeffnungen münden. So kann man z. B. durch Einblaſen von Luft in die Gedärme nicht einmal die Schleimdrüſen des Darmkanals aufblaſen, deren Ausführungsgänge doch viel weitere Oeffnungen haben, als die Saugadern haben können. Dagegen läßt es ſich wohl denken, daß bei der gewaltſamen Ausdehnung des Zellgewebes, Lymphgefäße, welche zwiſchen den Zellen verlaufen, zerriſſen, und daß ihre Wände ausgeſpreizt, und die Ränder der durch Zerreißung entſtandenen Oeffnung wegen ihrer Anheftung an benachbarte Zellen auseinander gehalten werden, ſo daß die Luft und das Queckſilber ſehr leicht in ſie übergehen kann.

Es bleibt alſo noch immer unentſchieden, ob die Lymphgefäße als offene Röhren anfangen, oder nur durch ſehr kleine Oeffnungen, die ſich in ihren Wänden befinden, einſaugen. Noch viel weniger darf man daraus, daß in viel ſeltneren Fällen Luft, Waſſer, Wachs und Queckſilber, welche in die Arterien oder in die Venen geſpritzt wurden, in die Saugadern übergingen [1]), folgern, daß ein ſolcher Zuſammenhang zwiſchen den Gefäßen des Kreislaufs und den Saugadern Statt finde, daß während des Lebens eine Strömung von Blut oder von Blutwaſſer aus den feinſten Verzweigungen der Blutgefäße in die Saugadern geſchehe. Gegen eine ſolche Annahme ſprechen ſehr viel Gründe,

---

[1]) Monro hat die hierüber gemachten Erfahrungen geſammelt. Siehe Opuscula de Vasis lymphaticis. Lipsiae 1760. 8. p. 32. sq. *Nuck* (Adenographia, p. 52) blies nämlich Luft in die Arteria splenica ein. Es erhoben ſich auf der Oberfläche der Milz Bläschen, und aus ihnen gingen mit Luft erfüllte Lymphgefäße hervor. Wenn er aber Queckſilber in die Milzarterie einſpritzte, ſo ging dieſes nicht in die Lymphgefäße über, obwohl es in manchen andern Theilen ſehr leicht den Weg aus den Arterien in die Lymphgefäße findet, wo der Verſuch mit der Luft oft nicht gelingt. Berger, Cowper, Liſter und Bartholin der Sohn ſahen auch andere Flüſſigkeiten aus der Milzarterie in die Lymphgefäße übergehen. *Morgagni* (Adversaria anatomica II. Animad 47.) trieb mit mäßiger Kraft Luft in die Vena lienalis, und ſah, daß ſich die Lymphgefäße an der Oberfläche derſelben damit füllten. Cowper hat daſſelbe beobachtet. Indeſſen hat Monro gezeigt, daß, wenn Queckſilber oder Luft auch ſehr langſam in die Milzvene eingebracht wird, dieſe Flüſſigkeiten doch die Zellen der Milz ſogleich anfüllen. Cowpern, dem es nicht gelingen wollte, Queckſilber aus der Arteria spermatica in die Vena spermatica hinüberzutreiben, gelang es ohne Schwierigkeit, es aus der Vena spermatica in die Lymphgefäße übergehen zu machen. Etwas ähnliches beobachtete Ruck. Cowper und Ruck ſahen auch den Uebergang von Flüſſigkeiten aus der Nierenvene in die Lymphgefäße. Tyſon und Cowper wollen ſogar Queckſilber oder Wachs aus der Arteria mesenteria in die Lymphgefäße übergetrieben haben. Monro, Mascagni und andere neuere Anatomen dagegen behaupten, daß dieſem Uebergange immer eine Zerreißung und eine Erfüllung des Zellgewebes vorhergehe.

Digitized by Google

Hunter [1]), A. Monro [2]), Hewson [3]), J. F. Meckel [4]) und Mascagni [5]) entwickelt worden sind.

ren solchen Zusammenhang der Blut- und Lymphge dessen die letzteren mit zu den Wegen gehörten, auf geschieht, so würden die Lymphgefäße bei leer Regel voll von den circulirenden Säften, und bei n so unerfüllt gefunden werden, sie würden sich wie e, die während des Lebens von dem Strome einer circuFlüssigkeit ausgedehnt werden, verhalten. Dieses ist aber nicht nicht der Fall, sondern sie enthalten sogar an vielen Stellen Säfte, nicht in den Blutgefäßen circuliren, und zwar oft in einem so concentrirten Zustande, daß sie nicht durch eine circulirende Flüssigkeit verdünnt worden zu sein scheinen. So enthalten z. B. die Lymphgefäße der Gedärme und des Gekröses von Thieren, während sie in der Verdauung begriffen sind, Chylus, die, welche von der Leber herkommen, zuweilen eine etwas durch Galle gefärbte, die welche von den schwärzlichen Stellen der Lungen anfangen, eine schwärzliche Flüssigkeit, die, welche von einer Stelle herkommen, an welcher Blut ins Zellgewebe ergossen war, eine blutig gefärbte Lymphe; und also eine Flüssigkeit, welche sie aus dem Zellgewebe und von den Oberflächen der Höhlen einzusaugen Gelegenheit haben, die aber nicht in den Arterien und Venen circulirt. Daß Flüssigkeiten, die von den Arterien oder Venen aus in die Haargefäße gespritzt worden, zuweilen in die Lymphgefäße übergehen, kann man, wie schon gesagt worden, in manchen Fällen dadurch erklären, daß die Flüssigkeit in Folge einer Zerreißung zuvor ins Zellgewebe getreten sei, und von da aus den Weg in die Lymphgefäße gefunden habe, wo dieses nicht sichtbar war, verliefen vielleicht die Blutgefäße und die Lymphgefäße so neben einander, daß ihre zarten Wände da, wo sie einander berührten, zu einer einzigen dünnen Haut verschmolzen, und also einer Zerreißung sehr ausgesetzt waren, vermöge welcher sich die Flüssigkeit, ohne in das Zellgewebe auszutreten, aus der einen Classe von Gefäßen in die andere ergießen konnte. Wenn endlich Flüssigkeiten, die in die Arterien oder Venen gespritzt werden, ungefärbt in die Saugadern übergehen, und gleich in die größern Höhlen des Körpers, so wie auch in die Zellen des Zellgewebes austreten, so können sie auch durch die Wege, durch welche während des Lebens die Aushauchung geschieht, oder durch eine Art von Durchschwitzung aus den Blutgefäßen, die sich an den Wänden der Lymphgefäße verbreiten, in die Lymphgefäße übergegangen sein. Die Milz und die Saugaderdrüsen sind Blutgefäßreiche Organe, in welchen ein Uebergang von eingespritzten Flüssigkeiten aus der einen Classe dieser Röhren in die andere vorzüglich leicht Statt findet, und zwar in der Milz aus den Blutgefäßen in die Lymphgefäße [6]), in den Saugaderdrüsen aus den Lymphgefäßen in die Blutgefäße (namentlich in die Venen). Wie wenig man aber Grund habe, daraus, weil in diesen Organen eingespritzte

---

[1]) *William Hunter*, Medical commentaries. London 1762. S. 5.

[2]) *Alex. Monro*, de venis lymphaticis valvulosis et earum potissimum origine. Berolini 1760. 8. Lipsiae 1780.

[3]) *W. Hewson*, Experimental inquiries into the properties of the blood, P. II. London 1774.

[4]) *Jo. Fried. Meckel*, Nova experimenta de finibus venarum et vasorum lymphaticorum in ductus visceraque excretoria. Berol. 1772. 8.

[5]) *Mascagni* a. a. O. Sect. III.

[6]) *Lobstein*, Diss. de liene. Arg. 1774. Nach ihm entspringen die Saugadern der Milz aus den Arterien und Venen derselben.

Digitized by Google

Flüssigkeiten sehr leicht aus der einen Classe von Röhren in die andere übergehen, zu schließen, daß dieses auf eine so uneingeschränkte Weise auch während des Lebens der Fall sei, sieht man aus dem, was man an den Lungen beobachtet. Man sehe in dieser Hinsicht das nach, was hierüber an der Stelle, wo über die Structur der Saugaderdrüsen gehandelt wird, gesagt werden wird.

Daß aber die Saugadern an der Oberfläche gewisser Häute und im Zellgewebe Flüssigkeiten einziehen und sich damit füllen können, sieht man nicht nur aus der Anfüllung der Lymphgefäße der Gedärme mit dem Speisesafte, sondern auch aus der Aufnahme gewisser Gifte in den Körper an den Stellen, wo sie mit Oberflächen, die mit Lymphgefäßen versehen sind, in Berührung kommen. Denn daß das venerische Gift, wenn es mit den äußeren Geschlechtstheilen in Berührung kommt, durch die Lymphgefäße aufgenommen werde, sieht man aus dem Umstande, daß die Inguinaldrüsen davon anschwellen, zu welchen die aus diesen Theilen kommenden Lymphgefäße gehen. Bei Ammen, welche durch venerische Kinder, welche sie säugen, angesteckt werden, schwellen zuerst die Achseldrüsen an [1]). Bei Geschwüren von mancherlei Art schwellen auch die nächsten Lymphdrüsen an, in welche die vom Geschwüre anfangenden Lymphgefäße gehen.

Fortgang der Saugadern.

Die Saugadern haben, wie schon gesagt worden, überall durch häufige Vereinigung und Verbindung der benachbarten Röhren die Form der Netze. Vorzüglich dicht scheinen diese Netze in der Nähe der Zotten der Gedärme zu sein. Unter den Zotten liegen kleine, runde, weiße Körper, welche Lieberkühn zu den Drüsen rechnete, von welchen Hedwig behauptete, daß sie das aufnähmen, was die Saugadern im Darme aufgesogen hätten, und welche nach Hewson und Rudolphi [2]) bei der Schildkröte, bei der man das Queckſilber aus den Stämmen der Lymphgefäße in die Zweige spritzen kann, ohne alle Gewalt anzuwenden, mit Queckſilber gefüllt werden und sich mit Lymphgefäßnetzen bedeckt zeigen. Während ihres Verlaufs nach dem Ductus thoracicus nimmt jeder Saugaderstamm im Allgemeinen am Durchmesser und an Dicke seiner Wand etwas zu. Am Fuße und Unterschenkel z. B. sind die Saugaderstämme enger und mit dünneren Wänden versehen, und am Oberschenkel, in den Weichen und im Becken nehmen sie immer noch zu, bis sie endlich in der Lendengegend, da, wo sie in den Hauptsaugaderstamm übergehen, am größten sind. Indessen da sie zuweilen an manchen Stellen sehr ausgedehnt oder zusammengezogen sind, so finden sich an vielen Stellen Abweichungen von dieser Regel. Die Saugaderstämme sind in manchen Organen vorzüglich groß. Die Saugadern der Hoden z. B. sind, nach Sömmer

---

[1]) *Monro* a. a. O. S. 61.

[2]) *Rudolphi*, Grundriß der Physiologie, B. II. Abth. 2. S. 214.

ring, im Saamenstrange, ehe sie noch einen langen Weg gemacht haben, und bevor sie in den Unterleib getreten sind, weiter und stärker, als irgend ein Saugaderstamm der unteren Gliedmaßen, und die der unteren Gliedmaßen sind wieder weiter und stärker als die Saugaderstämme der oberen. Die Saugadern des Kopfes aber sind am feinsten. In großen Leuten oder Riesen sind sie größer, als in Zwergen. In jungen Leuten endlich sind sie voller, als in alten.

In manchen Theilen nehmen sie, wie Sömmerring bezeugt, zu gewissen Zeiten sehr am Umfange zu, z. B. im Uterus während der Schwangerschaft, und in den Brüsten während des Säugens, in welchen letzteren Organen sie hin und wieder mehr als eine Linie im Durchmesser betragen.

Auch hat, wie Sömmerring bemerkt, ihre Verkettung und Zusammenmündung an verschiedenen Stellen eine eigenthümliche Form, so daß man oft schon an dieser Form erkennen kann, welchem Theile sie angehören, so sind z. B. die Saugadern der Oberfläche der Leber netzförmig, die des Hoden bündelförmig, die des Herzens baumförmig, und zwischen denen der Lungen befinden sich ungefähr rhomboidale Zwischenräume, Theile, in welchen die Saugadern in der größten Menge vorhanden, in welchen sie noch nicht mit Gewißheit beobachtet worden sind.

Wenn man die Substanz des Gehirns, das Rückenmark, die Augen, das Innere der Knochen und Knorpel, den dem Kinde im Mutterleibe angehörenden Mutterkuchen, die Eihäute und den Nabelstrang wegrechnet, so kann man behaupten, daß man an allen übrigen Theilen des Körpers Saugadern deutlich sichtbar gemacht habe. Am zahlreichsten sind sie an den Oberflächen absondernder Häute in den Drüsen und im Zellgewebe. Ihre Stämme verlaufen in der größten Zahl im lockeren Zellgewebe, theils nämlich in dem Zellgewebe, durch das die Haut so verschiebbar ist in der Nähe der Hautnerven, theils in den Lücken zwischen den größeren Theilen des Körpers, zwischen Muskeln, Knochen und andern Organen, in welchen auch große Blutgefäßstämme in lockerem Zellgewebe aufgehangen sind. Zwar behauptet Mascagni [1]), Saugadern auch im Auge gefunden und sie bis zu den Drüsen verfolgt zu haben. Cruikshank [2]) füllte Saugadern mit Quecksilber, die aus der Substanz eines Rückenwirbels hervorkamen, und in ihm in mehrere Zweige getheilt waren; Brugmanns soll in den hohlen Knochen der Vögel, und Schreger [3]), Uttini [4]), Mascagni und Fohmann [5]) glaubten in der Nachgeburt Lymphgefäße entdeckt zu haben. Indessen ist man bei der Erfüllung und Verfolgung der Lymphgefäße, wenn man sie nicht künstlich anzufüllen und sie bis zu den Lymphgefäßen zu verfolgen im Stande ist, so leicht einer Täuschung und einer Verwechselung der Lymphgefäße mit Venen ausgesetzt, daß auf die genannten Beobachtungen nicht viel gerechnet werden kann. Geschähe übri-

---

[1]) *Mascagni*, Vasorum lymph. hist. et ichnographia, p. 8. Uebers. von Ludwig. S. 11.

[2]) Cruikshank, Geschichte der Saugadern, übers. v. Ludwig, S. 172.

[3]) *B. N. G. Schreger*, de functione placentae uterinae. Erlang. 1799. 8.

[4]) *Uttini*, siehe *Meckels* Archiv, B. II. S. 258 und Memorie dell' istituto nationale Italiano, Tom. I. P. 2. Bologna 1806. p. 209.

[5]) *Vincenz Fohmann*, Das Saugadersystem der Wirbelthiere, Heft 1. Das Saugadersystem der Fische. Fol. Heidelberg u. Leipzig 1827. p. 11. Anmerkung.

Digitized by Google

gens die Aufnahme neuer Substanzen in die Blutgefäße des Kindes im Mutterkuchen nur durch Saugadern, so müßten im Nabelstrange so große Saugadern verlaufen, daß man über ihre Existenz nicht zweifelhaft bleiben könnte.

Saugaderdrüsen.

Theile des Körpers, an welchen die Lymphdrüsen liegen. Ihre Zahl und Größe.

Nur in sehr seltenen Fällen [1]) haben zuverlässige Anatomen [2]) eine Saugader von einer Gegend, wo keine Saugaderdrüsen liegen, bis zum Ductus thoracicus verfolgt, ohne daß sie durch eine Saugaderdrüse hindurch ging. In der Regel führt jede ihren Saft in eine Drüse, oder sogar, nachdem er schon durch eine hindurch gegangen ist, noch in eine zweite und in eine dritte. Diese Saugaderdrüsen sind am Rücken, an Händen und Füßen, in der Schädel und Rückgrathöhle, so wie auch in der Substanz der Organe noch nicht gefunden worden. An den Unterschenkeln und an den Vorderarmen kommen sehr wenige und nur sehr kleine Saugaderdrüsen vor. Aeußerst klein sind nach Lauth diejenigen, welche sich an dem Netze befinden. Die größten finden sich am Anfange (der Wurzel) des Gekröses und an der Lungenwurzel, in der Leistengegend, in der Achselhöhle und am Halse. Ihre Zahl ist bei verschiedenen Menschen an der nämlichen Stelle nicht dieselbe. Ist sie geringer, so sind die Drüsen dafür größer.

Der Durchmesser derselben beträgt bei den kleinsten etwa 1 Linie, und ist etwa also dem einer Linse gleich, bei den größten beträgt er über 1 Zoll. Sie sehen an den Gliedmaßen röthlich, im Gekröse während der Verdauung, wo sie mit weißem Speisesaft angefüllt sind, weißlich oder rosenroth, in der Nähe der Galle absondernden Leber etwas gelblich, in der Nähe der Milz, wie sie, braunröthlich, und in der Nähe der Luftröhrenäste erwachsener Menschen wie die schwärzlichen Flecke der Lungen schwärzlich aus.

Hüllen der Lymphdrüsen und ihr innerer Bau.

Sie besitzen einen ziemlich glatten, aus Zellgewebe bestehenden Ueberzug, der aber mit dem in den Drüsen befindlichen Zellgewebe auf das Innigste zusammenhängt, und sich daher nicht von der Oberfläche

[1]) *Hewson*, Opus posthumum anglice ed. M. Falconar, latine vertit van de Wynpersse. L. B. 1785. 8. p. 44.

[2]) *Cruikshank*, The anatomy of the absorbing vessels of the human body, second ed. London 1790. 4. p. 79. in Ludwigs Ueberss. S. 72.

Digitized by Google

der Drüsen leicht und rein ablösen läßt. An benachbarten Theilen sind sie durch lockeres, dehnbares Zellgewebe angeheftet, und daher im gesunden Zustande in einigem Grade verschiebbar. Fleischfasern nimmt man an ihrer Haut nicht wahr, wiewohl Malpighi dergleichen gesehen zu haben meinte.

Drüsen, deren Lymphgefäße nicht erfüllt sind, haben eine ziemlich glatte Oberfläche, und zeigen, wenn man sie durchschneidet, auf ihrer Schnittfläche eine ziemlich gleichförmige Substanz, die wegen der beträchtlichen Menge Blutes, welche diesen Drüsen zugeführt wird, röthlich aussieht. Sind aber die Lymphdrüsen mit Flüssigkeit sehr angefüllt, so wird ihre Oberfläche zugleich und ihre Substanz ungleichförmig gefärbt.

Die Lymphdrüsen bestehen aus Lymphgefäßen, Arterien, Venen, aus Zellgewebe und wahrscheinlich auch aus kleinen Nerven. Um eine vollständige Kenntniß vom Baue derselben zu haben, müßte man daher wissen, wie sich diese verschiedenen Arten von Canälen in ihnen verhalten, wie sie unter einander zusammenhängen. Vieles ist hierüber noch zweifelhaft.

Die Lymphgefäße machen den größten Theil der Organe aus, aus denen die Lymphdrüsen zusammengesetzt sind, sie sind die Grundlage, auf welcher sich daselbst die Arterien und Venen, die auch sehr groß und zahlreich sind, ausbreiten. Nerven gelangen zu den Saugaderdrüsen auch, aber die Anatomen sind noch darüber im Streite, ob sie nur an ihnen vorübergehen, oder sich wirklich in ihnen endigen. Walter [1]), Mascagni [2]), Schmidt [3]) und Sömmerring [4]) sahen keine Nerven, welche sich in den Saugaderdrüsen endigen. Hewson, Wrisberg [5]), Werner, Feller [6]) und Fischer [7]) bei Menschen, Schreger [8]) aber bei Hunden, glauben gesehen zu haben, wie Nerven, die durch die Saugaderdrüsen gingen, Zweige an kleineren Abtheilungen der Drüsen gaben.

Verlauf der Lymphgefäße durch die Lymphdrüsen.

Die Lymphgefäße, welche in eine Lymphdrüse eintreten und Flüssigkeit in sie hineinführen (Vasa inferentia), theilen sich auf der einen Seite in der Nähe der Drüse, oder in der Substanz derselben wiederholt

[1]) *J. Gottlob Walter*, Tabula nervorum thoracis et abdominis. Berol. 1783. Fol. in der Vorrede.

[2]) *Mascagni*, Vasorum lymph. hist. et ichnogr. p. 30.

[3]) *J. A. Schmidt*, Commentarius de nervis lumbalibus. Vindobonae 1794. p. 49, 62.

[4]) *Sömmerring*, vom Baue des menschl. Körpers, IV. 516.

[5]) *Wrisberg*, Comment. soc. Goettingensis 1788. Vol. IX.

[6]) *Werner* et *Feller*, Vasorum lacteorum atque lymph. anat. phys. descriptio, p. 22.

[7]) *J. L. Fischer*, Descriptio nervorum lumbalium, Vorrede.

[8]) *B. N. G. Schreger*, Beiträge zur Cultur der Saugaderlehre. Th. I. S. 249.

Digitized by Google

in kleinere Zweige. Die Lymphgefäße, welche aus einer Lymphdrüse austreten und die Lymphe aus ihr wieder fortführen (vasa efferentia), entstehen in derselben aus kleinen Lymphgefäßen, welche wiederholt zusammentreten, um auf der gegenüberliegenden Seite der Drüse einen austretenden Stamm oder mehrere solche Stämme zu bilden. Die Zahl der austretenden Lymphgefäße ist häufig kleiner als die der eintretenden, dafür sind jene aber auch dann etwas dicker. Die eintretenden Lymphgefäße gehen, nachdem sie sich in kleinere Zweige getheilt haben, ununterbrochen in die aus den Lymphdrüsen austretenden Lymphgefäße über, denn der Druck einer mäßig hohen Quecksilbersäule reicht nicht nur oft hin, um Quecksilber, ohne daß eine Ausleerung desselben ins Zellgewebe erfolgt, aus den einführenden Gefäßen in die ausführenden hinüber zu treiben, sondern der Widerstand, den das Quecksilber durch die Friction in den kleinen Lymphgefäßen der Drüse erfährt, hindert zuweilen nicht einmal, daß dieser Druck das Quecksilber in den austretenden Stämmen noch weiter treiben, und sogar durch eine zweite Lymphdrüse, in welche der ausgetretene Stamm von neuem eintritt und sich daselbst wieder auf die beschriebene Weise verhält, hindurchtreiben kann. Die kleinen Aeste der Lymphgefäße sind in der Substanz der Lymphdrüsen nicht selten vielfach geschlängelt und gewunden, fast wie die Samengefäße im Hoden, aber sie theilen sich bei weitem nicht in so enge Röhrchen, als die Blutgefäße, welche die Lymphgefäße mit einem Haargefäßnetze umgeben[1]).

So wie in den Lungen 2 verschiedene Flüssigkeiten, Luft und Blut mit einander dadurch in Berührung und in Wechselwirkung kommen, daß das Blut in äußerst feinen und dünnwandigen Röhrchen an der innern Oberfläche der Luftröhren, welche bei ihrer Theilung in kleinere Zweige einen viel größeren Durchmesser behalten, vorüberströmt, auf eine ähnliche Weise scheinen in den Lymphdrüsen 2 tropfbare Flüssigkeiten, Lymphe und Blut, dadurch mit einander in Berührung und in Wechselwirkung gesetzt zu werden, daß das Blut in unzähligen, äußerst feinen dünnwandigen Röhrchen an der Oberfläche der viel größeren Röhren der Lymphgefäße vorüberströmt. Bei dieser Art der Berührung der beiden Flüssigkeiten kann unstreitig jede von der andern Stoffe an sich ziehen, oder auch in die Höhle der 2ten Classe von Röhrchen gewisse Materien absondern.

Um den Verlauf der Lymphgefäße in den Lymphdrüsen genauer kennen zu lernen, darf man sich nicht begnügen, dieselben mit Quecksilber anzufüllen, sondern man muß sie auch wie Mascagni, bei jungen gesunden Menschen mit gefärbten Flüssigkeiten anfüllen, welche nachher erstarren, und muß dann die Lymphgefäße mit der Spitze feiner Nadeln und Messer auseinander zu ziehen und zu entwickeln suchen. Auf diese Weise hat sich Mascagni überzeugt, daß sich die Lymphgefäße in den Lymphdrüsen sowohl an der Oberfläche, als auch im Inneren

[1]) Siehe *Mascagni*, Vasorum lymphatic. hist. et ichnogr. p. 32. in Ludwigs Uebersetzung S. 48. Ich selbst habe mich durch mikrometrische Messung von der außerordentlichen Dünnheit der Röhrchen des Blutgefäßnetzes in Lymphdrüsen an einem in der Berliner Sammlung aufbewahrten Liberkühnschen Präparate überzeugt.

Digitized by Google

theilen und wieder zusammentreten, daß die Röhrchen derselben sich beinahe wie die den Samen führenden Gänge des Hoden und des Nebenhoden vielfach schlängeln, an manchen Stellen enger sind, an manchen sich erweitern, und unter einander vereinigen. An diesen weiteren Stellen, die manche Anatomen Zellen nennen, sind die Lymphgefäße, nach Mascagni's Untersuchungen, von einer dickeren Lage blutführender Haargefäße umgeben. Es ist kein hinreichender Grund vorhanden, die hier erwähnten Zellen für eine Einrichtung zu halten, durch welche die Vasa inferentia und efferentia unterbrochen würden, d. h., durch welche die Flüssigkeit gehindert würde, sich vermöge eines mäßigen Druckes, der sie in den Vasis inferentibus weiter treibt, in die Vasa efferentia fortzubewegen. Es ist bei dem Menschen keine einzige anatomische oder physiologische Thatsache bekannt, welche bewiese oder wahrscheinlich machte, daß in den Lymphdrüsen Zellen vorhanden wären, in welche die Lymphe durch sehr enge Lymphgefäße abgesetzt würde, oder aus welchen sie nicht geradezu weiterfließen könnte; sondern durch die eigne Thätigkeit enger Lymphgefäße wieder aufgesogen und weggeführt werden müßte. Man hat vielmehr alle Ursache, die Zellen, die man in den Lymphdrüsen gewahr wird, theils für etwas erweiterte Stellen der kleinen Lymphgefäße, theils für die Enden von Schleifen zu halten, welche die Lymphgefäße bei ihren vielfachen Verschlingungen bilden. Der Umstand, daß die Lymphgefäße in manchen angefüllten Lymphdrüsen gar keine zellenförmige Erweiterungen, sondern nur Geflechte ziemlich gleichförmig dicker, gewundener Röhrchen [1]), in anderen fast gar keine Geflechte bildeten, sondern in ihnen zwischen den baumförmig zertheilten dünnen Aesten der zu- und wegführenden Gefäße nur Zellen sichtbar waren [2]), daß sie nur im Inneren, nicht aber an der Oberfläche dergleichen erweiterte Stellen haben [3]), daß dieses zellige Ansehen bei Lymphdrüsen, deren Lymphgefäße noch nicht völlig erfüllt sind, deutlicher ist, aber wenn sie völlig erfüllt worden, oft wieder verschwindet, entweder, weil die oberflächlichen Netze die tieferen, mit Anschwellungen versehenen verdecken [4]), oder vielleicht auch, weil die Ausdehnung der Lymphgefäße in der Drüse dadurch gleichförmiger wird; endlich daß die Zahl und Größe der Zellen in den Drüsen so sehr verschieden gefunden wird, indem manche Drüsen nur eine große centrale, von Lymphgefäßgeflechten umgebene Höhle gehabt haben sollen [5]), während andere ganz aus kleinen Zellen zu bestehen scheinen; mit einem Worte, die große Veränderlichkeit der beobachteten zellenartigen Erweiterungen, und die Bemerkung, daß man sich zwar denken

---

[1]) J. F. Meckel der Großvater, Opuscula anatomica de vasis lymphaticis. Lips. 1760. p. 88 sq. und in den von ihm besorgten, aber nicht herausgegebenen, sondern von J. F. Meckel d. j. zu Sömmerrings Jubiläum bekannt gemachten Kupfertafeln, die in künstlerischer Hinsicht vor allen, welche die Structur der Saugaderdrüsen darstellen, den Vorzug verdienen: *Samueli Thomae Soemmerringio* anatomico et physiologico celeberrimo etc. gradum Doctoris med. et chir. gratulatur *J. F. Meckel*. Accedunt tabulae aeneae VI. Lipsiae 1828. Fol. Tab. III. — *Cruikshank*, The anatomy of the absorbing vessels. p. 85. Plate 3. Fig. 1, 2, 3. Uebersetzung p. 77. — *Werner* et *Feller*, Vasorum lacteorum atque lymphaticorum anatomico-physiologica descriptio. Lipsiae 1784. 4. Tab. II. Fig. 4. B. — *Mascagni*, Prodrome d'un ouvrage sur le système des vaisseaux lymphatiques, contenant 24 planches in Folio. à Sienne 1784. 4. Tab. I. Fig. 12.

[2]) *Cruikshank* a. a. O. Plate III. Fig. 4, 5, 6. — *Werner* et *Feller* a. a. O. Tab. II. Fig. 4. A. — *Mascagni*, vasorum lymph. hist. et ichnogr. Tab. II. Fig. 7.

[3]) *Cruikshank* a. a. O.

[4]) *Daselbst* a. a. O.

[5]) *Werner* und *Feller* a. a. O. p. 22.

Digitized by Google

kann, wie durch die Ausdehnung einzelner Stellen der gewundenen Lymphgefäße durch die eingespritzte Flüssigkeit Zellen entstehen, nicht aber, wie, wenn wirklich solche Zellen an der Oberfläche der Drüsen vorhanden wären, sie zu Geflechten von Röhrchen, die einen ziemlich gleichen Durchmesser hätten, umgewandelt werden könnten, macht es sehr wahrscheinlich, daß die Zellen, wenigstens zum Theil, von einem zufälligen Drucke der eingespritzten Flüssigkeiten auf einzelne Stellen der Lymphgefäße herrühren, oder dadurch vergrößert worden sind.

Malpighi und Ruck, welche beide unter den älteren Anatomen Zellen in den Lymphdrüsen annehmen, stimmen doch in der genauen Beschreibung dieser Zellen nicht überein, und Cruikshank, welcher als der vorzüglichste neuere Vertheidiger des Vorhandenseins von Zellen in den Lymphdrüsen angesehen werden muß, hat selbst nicht einmal die Meinung, daß die Zellen in den Lymphdrüsen eine Unterbrechung zwischen den einführenden und ausführenden Gefäßen hervorbrächten, deutlich ausgesprochen, seine Abbildungen zeigen vielmehr eine Reihe von Drüsen, von welchen manche nur aus verschlungenen, gewundenen Lymphgefäßen, ohne alle Zellen, andere nur aus Zellen und gar nicht aus gewundenen und verschlungenen Lymphgefäßen zu bestehen scheinen; eine Figur endlich zeigt auf eine sehr lehrreiche Weise den Mittelzustand [1]). An ihr sieht man, wie die Windungen und Schleifen der Lymphgefäße an manchen Stellen in den Drüsen eine Form allmählig annehmen, durch welche sie Zellen zu bilden scheinen, und diese Abbildung kommt sehr mit der von J. F. Meckel d. ä. [2]) auf mehreren Tafeln gegebenen Abbildungen überein. Wenn Cruikshank aber sich auch auf mit Quecksilber angefüllte, getrocknete, und dann durchschnittene Lymphdrüsen von Pferden beruft, in welchen er große, seitwärts unter einander zusammenhängende Höhlen fand, so stützt er sich auf keinen sehr haltbaren Beweis. Denn es ist bekannt, daß die Zwischenräume weicher thierischer Theile, wenn sie, während sie trocknen, mit Flüssigkeiten angefüllt sind, durch das Zusammenkleben und Zusammentrocknen mancher Stellen, die nicht angefüllt waren, und durch die Ausdehnung anderer oft ein Ansehen erhalten, das sehr von dem natürlichen abweicht. Eben so wenig widersprechen Werner und Feller, welche gewöhnlich als Vertheidiger des Vorhandenseins von Zellen in den Lymphdrüsen angesehen werden, der Ansicht, daß die in den Lymphdrüsen von Anderen beschriebenen vielen Zellen nur weitere Stellen der Lymphgefäßgeflechte sind, und nirgends behaupten sie, daß diese Zellen abgesonderte Räume wären, aus welchen die ausführenden Lymphgefäße mit so engen Oeffnungen entsprängen, daß die Lymphe nicht aus den Zellen in sie herüberfließen könnte, sondern durch eine aufsaugende Thätigkeit aufgenommen werden müßte, vielmehr sagen sie, daß in den größeren Lymphdrüsen, so oft sich 2 oder mehrere Lymphgefäße vereinigen, an dieser mit einer Klappe versehenen Stelle eine Zelle entsteht [3]). Meckel, Hewson und Mascagni erklären sich geradezu für die Meinung, daß die bei der Anfüllung der Lymphgefäße der Lymphdrüsen sichtbar werdenden Zellen nur erweiterte Stellen und Schlingungen der Lymphgefäße wären. Denn die Zellen, welche Hewson in den Lymphdrüsen erwähnt, dürfen ja nicht mit denen des Cruikshank verwechselt werden. Sie gehören gar nicht hierher, denn sie sind nach ihm so klein, daß sie nur durch stark vergrößernde Mikroskope gesehen werden können. Sie sind so klein, daß die gleichförmigste Röhre, welche mit unbewaffnetem Auge und mit Lupen angesehen, glatt aussähe, noch recht gut die Hewsonschen Zellen besitzen könnte; denn nach der in Hewsons Werken von diesen Zellen gegebenen Abbildung sind sie nur etwa so groß als die Blutkörnchen [4]).

Hinsichtlich der über die Zellen in den Lymphdrüsen des Menschen beobachteten Thatsachen sind also die neueren Anatomen im Wesentlichen nicht verschiedener Meinung. Fast alle haben diese Zellen beobachtet. Nur darüber, was

---

[1]) *Cruikshank* a. a. O. Tab. 3. Fig. 7.

[2]) *J. F. Meckel* a. a. O. Tab. V u. VI.

[3]) Werner und Feller behaupten vielmehr das Gegentheil, p. 24: »Absumuntur etiam (vasa lymphatica) majoribus ramificationibus in ipsam glandulam, in qua tamen serratum progressum ostendunt, ut bene expleta talis glandula ex innumeris minutis nodulis compositum corpus referat.«

[4]) *Hewson* a. a. O. Tab. IV. auf der 400mal im Durchmesser vergrößerten Figur.

Digitized by Google

aus den Beobachtungen gefolgert werden dürfe, weichen sie von einander ab. Bei den Thieren findet hinsichtlich der Lymphdrüsen eine große Verschiedenheit Statt. Bei manchen, z. B. bei den Wallfischen, scheinen die Lymphdrüsen Säcke mit gefäßreichen Wänden zu sein. Abernethy[1]) spritzte in die Lymphgefäße der Lymphdrüsen der Wallfische Wachs oder auch Queckſilber ein, und Knox wiederholte dieſe Unterſuchung beim Delphine und Meerſchweine. Die Lymphdrüſen dieſer Thiere ſchließen eine verhältnißmäßig ſehr große Höhle ein, in welche ſich Lymphgefäße und Venen mit weiten Mündungen öffnen ſollen. Eine 2te Claſſe von Lymphgefäßen bildet an der innern Oberfläche dieſer hohlen Drüſen ein Geflecht, in welchem ſie ſich vielfach unter einander verbinden. Dieſe gehen nicht in die Höhle der Drüſe, ſondern in die Vasa efferentia über. Knox hat dieſe Vasa efferentia nach vielen vergeblichen Bemühungen beim Delphin und Meerſchweine glücklich angefüllt, und den Uebergang zum Ductus thoracicus ſichtbar gemacht. Dieſer Bau der Lymphdrüſen bei den Cetaceen verdient eine wiederholte genaue Unterſuchung, aber auf die menſchlichen Lymphdrüſen kann man von ihnen keinen Schluß ziehen. Abernethy ſelbſt ſagt, in den Lymphdrüſen des Menſchen wären die Zellen ſo klein, daß ſie meiſtens nur durch das Mikroſkop geſehen werden könnten.

Die Lymphdrüſen ſind nur bei den Säugethieren ſehr ausgebildet, und unter dieſen ſind ſie wieder bei dem Menſchen bei weitem in größter Menge vorhanden. Bei den Vögeln fehlen ſie faſt ganz, bei den Amphibien und Fiſchen ſind ſie gar nicht vorhanden. Sie werden bei dieſen 3 Thierclaſſen durch Geflechte von Lymphgefäßen erſetzt. Bei den Vögeln bemerkte Lauth[2]) in dieſen Geflechten allemal da, wo Lymphgefäße ſich theilen oder vereinigen, Erweiterungen, die hier daſſelbe zu ſein ſcheinen, was man in den Lymphdrüſen der Säugethiere für Zellen gehalten hat.

Endigung der Lymphgefäße.

Ob alle Lymphgefäße des menſchlichen Körpers den Saft, den ſie führen, nur durch 2 bis 4 Stämme in die hinter den linken und rechten Schlüſſelbeine gelegenen großen Venen ergießen, oder ob ſie ſich auch an anderen Stellen in dieſelben öffnen, iſt eine neuerlich viel beſprochene und beſtrittene Frage, die man ſelbſt wieder in die 3 Fragen theilen kann: 1) ob es kleine Lymphgefäße gebe, die ihre Flüſſigkeit in kleine Venen, die noch nicht zu größeren Stämmen zuſammengetreten ſind, ergießen, eine Frage, die mit der, ob es einſaugende Enden der Venen gebe, faſt identiſch iſt; 2) ob eine ſolche Verbindung von Lymphgefäßen und Venen innerhalb der Lymphdrüſen Statt finde, daß die Säfte aus den Lymphgefäßen daſelbſt in die Blutgefäße hinüberfließen können; 3) ob ſich Lymphgefäßſtämme in größere Venen an anderen Stellen des Körpers als an den angegebenen endigen?

---

[1]) *Abernethy*, Phil. Tr. for the year 1796. — *Knox*, Edinburgh medical and surgical Journal, Jul. 1824. p. 23. überſ. in *Froriep*, Notizen 1824. Aug. p. 51. — *J. Ch. Ogilvie* in London, medical and physical Journal, Febr. 1827.

[2]) *E. A. Lauth*, Essai sur les vaisseaux lymphatiques etc. 4. Strasbourg 1824. p. 29.

Digitized by Google

Was die erste Frage anlangt, so reichen die bis jetzt hierüber gemachten Erfahrungen noch nicht hin, um sie zu bejahen. Eine der interessantesten Beobachtungen, die man dafür anführen kann, ist die von Fohmann: Sie bedarf aber noch einer ferneren Bestätigung. »Als ich 4 Tage nach dem Tode«, sagt Fohmann [1]), »die Bauchhöhle eines Selbstmörders öffnete, fand ich die Saugadern auf einem Stücke des Dünndarms strotzend von Milchsaft. Ich bedeckte dieses, um zuvörderst die Injection der Arterien und Venen vorzunehmen, mit einem in warmes Wasser getauchten Tuche. Kaum aber war die Einspritzung der Arterien beendigt, als ich die kurz zuvor so sichtbaren Milchgefäße sich vor meinen Augen entleeren sah, und obgleich das Stück des Dünndarms durch sie früher ein ganz marmorirtes Ansehen erhalten hatte, so war doch jetzt keine Spur mehr von ihnen wahrzunehmen. Die Venen waren blutleer, da ich aber in den Wurzeln derselben eine Flüssigkeit bemerkte, und sie deshalb einschnitt, so fand ich eine weiße, chylusartige Flüssigkeit in denselben.« Fohmann glaubt, daß die Lymphgefäße den Chylus, mit dem sie gefüllt waren, in die Venen ergossen hätten. Dieser Annahme stehen die Experimente von Hunter, Crnikshank, Mascagni und Anderen entgegen, welche niemals die Venen sich mit Milchsaft füllen sahen. Daraus aber, daß manche Gifte durch die Wände der Blutgefäße dringen und, vom circulirenden Blute angezogen, sehr schnell in den Kreislauf gelangen, auch wo kein Zusammenhang eines Theils mit dem übrigen Körper durch Lymphgefäße Statt findet [2]), oder wo der Ductus thoracicus zugleich unterbunden war [3]), wird, so viel ich einsehe, weder ein solches Einsaugungsvermögen der Venen, wie es die Lymphgefäße besitzen, noch ein Uebergang sehr kleiner Saugadern in kleine Venen bewiesen. Denn man muß das Vermögen einer in einer häutigen Röhre befindlichen Flüssigkeit durch die Poren der feuchten Wände hindurch eine außerhalb befindliche Flüssigkeit an sich zu ziehen, sehr von dem Vermögen einer Röhre, sich auch, wenn sie leer ist, mit Flüssigkeit zu füllen und die aufgenommene Flüssigkeit fortzuführen, unterscheiden. Die letzteren Eigenschaften besitzen, so viel wir wissen, nur die Lymphgefäße; die erstere, wobei genau genommen die in der Röhre enthaltene Flüssigkeit der einsaugende Körper ist, kommt offenbar auch den Venen zu, z. B. in den Lungen, wo das Blut ohne die Dazwischenkunft der Lymphgefäße unmittelbar durch die Wände der Blutgefäße hindurch Luft einsaugt. Emmert hat rücksichtlich einer solchen Einsaugung bewiesen, daß die Venen, wenn in ihnen das Blut circulirt; sich mit einem Gifte nicht erfüllen und dasselbe nicht weiter führen, ob sie es gleich, so lange in ihnen die Circulation des Bluts geschieht, sehr schnell aufnahmen und im Körper verbreiteten [4]).

Was die 2te Frage betrifft, so ist so viel erwiesen, daß die Lymphgefäße und die Venen in den Lymphdrüsen in einer solchen Lage zu einander gegenseitigen Berührung sind, daß Queckſilber, welches in die Lymphgefäße eingespritzt wird, und aus diesen Canälen einen Ausweg nimmt, fast eben so leicht in die Venen als in die Zellen des Zellgewebes übergeht.

---

[1]) *Vincenz Fohmann*, Anatomische Untersuchungen über die Verbindung der Saugadern mit den Venen, mit einer Vorrede von *F. Tiedemann*. Heidelberg 1821. 8. S. 28.

[2]) *Magendie* und *Délille* in *Magendie's* Physiologie, übers. v. *Heusinger*. I. S. 178 und 179. *Segalas* in *Magendie* Journal de Physiologie, B. II. 117 — 122.

[3]) *Mayer*, in *Meckels* Archiv für Physiologie, B. III. S. 496.

[4]) *Emmert*, Tübinger Blätter, B. 2. S. 88 sq. und *Meckels* Archiv für Physiologie I. S. 176, und *Schnell*, Historia veneni Upas Antiar. Tubing. 1815. S. 31.

Digitized by Google

Denn J. F. Meckel d. ä. [1]), Hewson [2]), Ph. F. Meckel [3]), Fohmann [4]), Lippi und mehrere Andere haben einen solchen Uebergang des Queckſilbers aus den Lymphgefäßen der Lymphdrüſen in die Venen geſehen, und mehrere von dieſen verſichern, ihn ſo oft und ohne eine Ergießung des Queckſilbers ins Zellgewebe beobachtet zu haben, daß an der Thatſache ſelbſt niemand zweifeln kann. Fohmann behauptet ſogar, daß er dieſen Uebergang in geſunden Drüſen und bei einem ſehr geringen Drucke beobachtet habe. Dieſer leichte Uebergang des Queckſilbers in die Venen macht wenigſtens ſo viel wahrſcheinlich, daß da, wo in den Lymphdrüſen die dünnen Wände der Venen und Lymphgefäße in Berührung ſind, kein Zellgewebe dazwiſchen liege, denn wäre dieſes der Fall, ſo müßte das Queckſilber, ehe es durch eine Zerreißung aus den Lymphgefäßen in die Venen gelangte, in das zwiſchen ihnen gelegene Zellgewebe ergoſſen werden, und könnte erſt dann durch eine neue Zerreißung der Wände der Venen aus dem Zellgewebe in die Venen übergehen, was nicht leicht vorkommen kann, weil Queckſilber, ſobald es einmal ins Zellgewebe gelangt iſt, ſich leichter daſelbſt neue Wege bahnt, als es von da aus die Wände der Venen zerreißt. Auch hat man den Uebergang von Queckſilber aus den Lymphgefäßen in die Venen bemerkt, wenn auch kein Queckſilber in das Zellgewebe ergoſſen war. Es iſt aber ſchon oben geſagt worden, daß eine ſo genaue Berührung der Venen und Lymphgefäße in den Lymphdrüſen, vermöge deren die Ströme dieſer 2 Flüſſigkeiten nur durch eine ſo ſehr dünne, leicht zerreißbare Wand geſchieden ſind, für die Verrichtung der Lymphdrüſen ſehr wichtig ſein können. Denn ſo wie in den Lungen, wo die feinſten Luftröhrenäſte und die Blutgefäße in einer ähnlichen Berührung ſind, die Luft und das an den Luftröhren offen vorbeifließende Blut durch die dünnen Wände hindurch eine wechſelſeitige Anziehung auf einander äußern, ſo daß das Blut gewiſſe Beſtandtheile der Luft, und die Luft gewiſſe Beſtandtheile des Bluts an ſich zieht, ſo kann wohl auch etwas ähnliches in den Lymphgefäßen und Blutgefäßen der Lymphdrüſen Statt finden, weil hier gleichfalls 2 verſchiedene Flüſſigkeiten, Lymphe und Blut, in

---

[1]) *J. F. Meckel*, Nova experimenta et observationes de finibus venarum ac vasorum lymphaticorum in ductus visceraque excretoria corporis humani ejusdemque structurae utilitate. Berolini 1772.

[2]) *G. Hewson*, Opus posthumum sive rubrarum sanguinis particularum et fabricae ususque glandularum lymphaticarum thymi et lienis descriptio, iconibus illustrata. Anglice ed. *M. Falconar*. Latine vertit *J. Th. van de Wynpersse*. Lugd. Bat. 1785. 8. p. 37.

[3]) *G. F. Lindner*, Specimen inaugurale medicum de lymphaticorum systemate. Halae 1787. p. 87.

[4]) *Vincenz Fohmann*, Untersuchungen über die Verbindung der Saugadern mit den Venen. Heidelberg 1821. 8.

Digitized by Google

ähnliche Berührung kommen. Da nun auch in den Lungen sehr leicht Flüssigkeiten, die in die Lungenarterie gespritzt werden, in die Luftröhrenäste übergehen, und dennoch daselbst bei Gesunden während des Lebens keine Oeffnungen da sind, durch welche Blut herüberfließen könnte, sondern nur gewisse Materien aus den Blutgefäßen in die Blutröhrenäste abgesondert, und gewisse andere in die Blutgefäße aus den Luftgefäßen hereingezogen werden; so ist es wohl nicht unwahrscheinlich, daß auch die Wege, durch welche das Queckſilber nach dem Tode in den Lymphdrüſen aus den Lymphgefäßen in die Venen übergeht, bei Gesunden während des Lebens nicht so offen stehen, daß Lymphe in Substanz hinüberfließen kann, sondern daß die 2 verschiedenen Flüssigkeiten nur durch die Wände ihrer Gefäße hindurch einen wechselseitigen Einfluß auf einander ausüben, und nur gewisse Substanzen an sich ziehen und fahren lassen, und folglich ist es umgekehrt, weil, wie ich zeigen werde, noch andere Umstände bei jenem Uebergange des Queckſilbers dafür sprechen, wahrscheinlich, daß das Queckſilber in den Lymphdrüſen nach dem Tode allerdings, in Folge einer Zerreißung der Gefäßwände oder der Ausdehnung von Poren, aus den Lymphgefäßen in die Venen übergehe.

Es sprechen nämlich mehrere von Mascagni und andern Anatomen bei diesem Uebergange beobachtete Umstände für eine Zerreißung der Gefäßwände. Einst [1]) füllten sich durch den gewöhnlichen Druck einer Queckſilbersäule die Vasa inferentia und efferentia der Lymphdrüſen, und das Queckſilber ging aus den zuerst erfüllten Drüſen in andere und nochmals in andere über, ohne daß aus den ersteren Drüſen Queckſilber in die Venen gelangte. Als nun aber der Widerstand zu groß wurde, und Mascagni das Queckſilber durch den Druck mit den Fingern weiter vorwärts trieb, so fing es plötzlich an, reißend schnell und in so großer Menge in die Venen überzugehen, daß nicht nur das Queckſilber, welches aus der Röhre ausfloß, gar nicht mehr in die Lymphgefäße drang, und vielmehr ganz in die Venen überging, sondern daß auch Queckſilber, welches die Lymphdrüſe und die Vasa efferentia erfüllt hatte, in die Venen zurückging, während diese Gefäße am Umfange abnahmen. Auch soll, nach Mascagni, wenn das Queckſilber in den Lymphdrüſen aus den Lymphgefäßen in die Venen übergeht immer irgendwo in der Drüſe eine Zerreißung und ein Austreten des Queckſilbers ins Zellgewebe Statt finden. Zuweilen sei dieses an der Oberfläche der Drüſe der Fall, wo es dann in die Augen fällt, zuweilen im Innern der Drüſe wo es, wenn man die Drüſe nicht zerschneidet, verborgen bleibt. Mascagni behauptet sogar, gesehen zu haben, daß eine auf diese Weise ausgedehnte Zelle des Zellgewebes einer Drüſe, die er aufschnitt, mit einer zerrissenen Vene in eine so offenbaren Communication stand, daß das Queckſilber selbst dann noch fortfuhr in die Vene hinüber zu fließen, als er die Zelle geöffnet hatte. Der Hewson ist es, fast zu der nämlichen Zeit als J. F. Meckel d. ä. seine Arbeiten über die Lymphgefäße bekannt machte, nicht selten vorgekommen, daß das Queckſilber in den Lymphdrüſen aus den Lymphgefäßen in die Venen übergieng, ohne daß das Queckſilber zugleich ins Zellgewebe austrat. Der Fall, den er ausführlich erzählt, ist dem von Mascagni sehr ähnlich. Auch hier wurde das Queckſilber, als es nicht weiter fortrücken wollte, durch den Druck mit den Finger vorwärts getrieben. Nun bemerkte er eine Abnahme des Queckſilbers die zuführenden Gefäße entleerten sich, das Queckſilber ging jetzt ganz leicht aber in sehr kleinen Kügelchen, durch eine aus der Drüſe kommende Vene in d

[1]) *Mascagni*, Vasorum lymphat. hist. et ichnogr. p. 32, 29.

Vena cava inferior über, und rückte von nun gar nicht durch die Drüse vorwärts. In kurzer Zeit war eine große Menge Queckſilber in die Vena cava gelangt, aber in das Zellgewebe der Drüse war kein Queckſilber ergoſſen. Hewſon [1]) iſt durch einige Beobachtungen ſelbſt überzeugt, daß eine unmittelbare Einmündung der Lymphgefäße in die kleinſten Blutgefäße Statt finde, aber auch ſeine Beobachtungen ſind keineswegs geeignet, dieſes zu beweiſen.

J. F. Meckels d. ä. Beobachtung [2]) iſt von derſelben Art. Die Drüse, in welcher der Uebergang aus den Lymphgefäßen in die Venen Statt fand, war halbſcirrhös. Selbſt eine 18 Zoll hohe Queckſilberſäule vermochte nicht, das Queckſilber in die Vasa efferentia überzutreiben. Endlich, da Meckel mit dem Finger auf die Vasa inferentia drückte, fühlte er ein ſchnelles Entweichen des Queckſilbers aus dieſen Gefäßen, und nun erſt beobachtete er den Uebergang von Queckſilber in die Venen.

Sogar die Beobachtungen Fohmanns (in welchen das Queckſilber gleichfalls leichter dann in die Venen überging, wenn es durch die Vasa inferentia ſeinen freien Fortgang nicht nahm), ſcheinen der Vermuthung günſtig zu ſein, daß der Uebergang in die Venen durch eine Zerreißung oder Ausdehnung faſt unangbarer Wege erfolge. Denn in vielen Fällen, in welchen er das Queckſilber in die Venen übergehen ſahe, füllten ſich die Vasa efferentia nicht damit. Dieſer Umſtand veranlaßte bei ihm ſogar die von Roſenthal [3]) widerlegte Vermuthung, daß es bei manchen Säugethieren, namentlich beim Hunde und Seehunde, Lymphaderdrüſen gebe, die gar keine Vasa efferentia beſäßen, ſondern bei welchen die Venen die Stelle derſelben verträten. Denn Roſenthal hat ſpäter dieſe Vasa efferentia ſehr glücklich angefüllt, und Rudolphi hat dieſelben beſtätigt.

Eben ſo verſichert Autommarchi [4]), und bewies es der von der Pariſer Academie ernannten Commiſſion durch Verſuche, daß ein Austreten des Queckſilbers aus den Lymphgefäßen in die Venen dann nicht Statt finde, wenn die Drüſen geſund ſind, wenn das Queckſilber ſie vollkommen erfüllt und ohne Hinderniß in die Vasa efferentia und bis in den Ductus thoracicus fortgeht; daß dagegen dieſer Uebergang vorzüglich in krankhaft veränderten Lymphdrüſen erfolge, und daß er, wenn er einmal beginnt, mit großer Leichtigkeit und Gewalt fortgehe, und die von Biancini [5]) in Piſa angeſtellten Verſuche haben daſſelbe Reſultat gegeben.

Wenn wir aber auch Fohmannen, deſſen treffliche Unterſuchungen anerkannt zu werden verdienen, zugeben, daß das Queckſilber oft auch in geſunden Drüſen und ohne daß ein zu ſtarker Druck angewendet wird, aus den Lymphgefäßen innerhalb der Lymphdrüſen in die Venen übergehe, und daß dieſes oft genug erfolge, ohne daß zugleich Queckſilber ins Zellgewebe ergoſſen wird, ſo folgt daraus doch keineswegs, daß während des Lebens ein ſolcher Zuſammenhang zwiſchen Venen und Lymphgefäßen da ſei, vermöge deſſen Säfte aus den Lymphgefäßen in die Venen hinüberfließen, und daß das beobachtete Hinüber-

[1]) *Guilielmi Hewsons* Opus posthumum sive rubrarum sanguinis particularum et fabricae ususque glandularum lymphaticarum thymi et lienis descriptio, iconibus illustrata. Anglice edidit *Magnus Falconar.* Latine vertit et notas addidit *J. Th. van de Wynpersse.* Lugd. Bat. 1785. 8. p. 37.

[2]) *J. F. Meckel* d. ä. a. a. O. p. 7.

[3]) *Rosenthal* in *Froriceps* Notizen, B. II. 1822. S. 5.

[4]) *Autommarchi*, Mém. sur la non-communication normale des vaisseaux lymphatiques et des veines, résultat de quelques expériences tentées devant la commission nommée par l'academie des sc., in *Férussac* Bullet. des sc. méd. Tome XVIII. 1829. 162. sq.

[5]) *Biancini*, Récherches sur le trajet des vaisseaux lymphatiques iléo-lombaires et chyliféres, et sur leur respectives terminaisons, in *Férussac*, Bullet. des sc. méd. Avril 1830. p. 1.

Digitized by Google

fließen des Queckſilbers nach dem Tode ohne eine Zerreißung oder ohn
die Ausdehnung von Poren geſchehe. Denn daß das Queckſilber in d
Regel bei Geſunden nicht in die Venen übergeht, ſondern daß da
Lymphgefäßſyſtem ſehr vollſtändig angefüllt werden kann, ohne daß ei
ſolcher Uebergang Statt findet, daß es, wenn es einmal in die Venc
überzugehen anfängt, dann plötzlich ſo leicht und ſo ſchnell in ſie hin
überfließt, und ſogar aus den vorher erfüllten Lymphgefäßen zurüd
fließt, um ſich in die Venen zu ergießen, und daß endlich bei Men
ſchen und Thieren, die während der Verdauung geſtorben ſind, oft d
Lymphgefäße und Lymphdrüſen des Gekröſes von weißem Chylus ſtrotze
und nachdem der Hauptſtamm unterbunden worden, bis zum Zerreiß
ausgedehnt worden, während die aus den Lymphdrüſen hervortretend
Venen rothes Blut enthalten, macht es faſt gewiß, daß, während d
Queckſilber ſich in die Venen plötzlich einen ſo offnen Weg bahnt, ei
Zerreißung vor ſich gegangen ſei. Denn gäbe es nur ſehr enge Ve
bindungscanäle zwiſchen den Lymphgefäßen und Venen in den Drüſe
welche in den meiſten Fällen den Uebergang des Queckſilbers aus d
Lymphgefäßen in die Venen nicht geſtatteten, ſondern ſich erſt dan
wenn das Queckſilber durch die Vasa efferentia weiter zu fließen g
hindert wäre, erweiterten, ſo würde dieſe Veränderung nicht ſo plötzli
vor ſich gehen, und die Wege würden ſich nicht ſo ſehr erweitern, d
das Queckſilber durch die geringſte Kraft hinüberfließen könnte. Gä
es dagegen in den Lymphdrüſen weite Verbindungscanäle zwiſchen d
Lymphgefäßen und Venen, ſo müßte das Queckſilber daſelbſt in d
Leichnamen geſunder Menſchen in der Regel aus den Lymphgefäßen
die Venen übergehen, es dürfte nicht ſo viele Beiſpiele geben, wo d
Queckſilber mehrere Lymphdrüſen durchläuft, die Lymphgefäße ſtrotze
erfüllt, und nicht in die Venen gelangt.

Man darf, wie ſchon erwähnt worden, nicht mit Fohmann e
gegnen, es ſei unbegreiflich, wie das Queckſilber die Gefäßwände v
zweierlei verſchiedenen Gefäßen, erſt die der Lymphgefäße (um aus ihn
auszutreten), dann die der Venen (um in ſie einzutreten) zerſpreng
könne, und daß das aus den Lymphgefäßen ausgetretene Queckſil
vielmehr zunächſt ins Zellgewebe austreten müſſe, und ſich da leich
weiter verbreiten, als die Wand einer Vene zerreißen werde. Denn
manchen Abſonderungsorganen, in welchen 2 Claſſen von Canälen
einer Berührung ſind, welche den Zweck hat, daß während des Lebe
aus der einen Claſſe derſelben in die andere etwas abgeſondert werd
ſoll, iſt es gewiß, daß dieſe Canäle mit ſo dünnen Wänden an ei
ander liegen, und daß ihre Wände da, wo ſie an einander liegen,
mit einander zu einer einzigen Wand verſchmolzen ſind, daß allerdin

Digitized by Google

auch nach dem Tode Flüssigkeiten, die in eine Classe von Canälen eingespritzt werden, in großer Menge und leicht durch eine Ruptur oder durch eine Erweiterung der Poren in die andere übertreten, ohne zuvor in das Zellgewebe auszutreten. Dieses ist, wie schon erwähnt worden, in den Lungen der Fall. Die Blutgefäße liegen daselbst so an der innern Oberfläche der Luftröhren, daß Flüssigkeiten, die nach dem Tode in die Arterien gespritzt werden, sogar leichter in die Luftröhrenäste, als in das Zellgewebe und in die Venen übergehen [1]), und daß sie durch einen Druck in die Luftröhre übergehen, der nicht größer ist, als der, welchen eine 1 Fuß hohe Wassersäule hervorbringt [2]); und doch ist es gewiß, daß sich das Blut während des Lebens nicht in die Luftröhrenäste ergießt. Gerade so, wie sich die Lymphgefäße der Lymphdrüsen dann nicht vollkommen durch eingespritztes Queckſilber erfüllen lassen, wenn das Queckſilber einen Ausweg in die Venen nimmt, eben so lassen sich, nach Reisseisen [3]), die Blutgefäßnetze der Lungen durch die in sie eingespritzte Flüssigkeit nicht vollständig erfüllen, wenn dieselbe einen Ausweg in die Luftröhrenäste nimmt. So wie es daher in den Lungen einen unmittelbaren Uebergang aus den Arterien in die Venen durch die Blutgefäßnetze giebt, eben so giebt es in den Lymphdrüsen aus den Vasis inferentibus einen unmittelbaren Uebergang in die Vasa efferentia durch die Lymphgefäßnetze, sowie es in den Wänden eines Blutgefäßnetzes der Lungen Poren oder kleine Oeffnungen giebt, die sich in die Luftröhren öffnen, welche aber im Leben im Stande sind, dem vorbeiströmenden Blute Widerstand zu leisten, und nach dem Tode leicht erweitert werden, eben so scheinen in den Lymphgefäßnetzen der Lymphdrüsen dergleichen in die Blutgefäße gehende Poren oder kleine Oeffnungen zu existiren, die sich nach dem Tode erweitern können, so wie endlich die in den Luftröhren der Lungen befindlichen luftförmigen Flüssigkeiten und das in den Blutgefäßen der Lungen an jenen Luftröhrenästen vorbeiströmende Blut eine gegenseitige Anziehung auf einander äußern, so daß das Blut Luft aus den Luftröhren, und die Luft in den Luftröhren Luft aus dem Blute an sich zieht, eben so scheint die in den Lymphgefäßen befindliche Flüssigkeit und das an den Wänden der Lymphgefäße in den Lymphdrüsen vorbeiströmende Blut eine Anziehung auf einander äußern zu können, vermöge deren die Lymphe Stoffe aus dem Blute, und das Blut Stoffe aus der Lymphe an sich zieht, ohne daß ein wirkliches Ueberströmen der Flüssigkeit aus der einen Classe von Canälen in die andere stattfindet. Mit dieser Vorstellung stimmt sehr wohl überein, daß der Durchmesser aller Lymphgefäße eines Organs zusammengenommen, von den Stellen an, wo sie durch viele Lymphdrüsen wiederholt durchgehen, kleiner wird, und daß endlich alle Lymphgefäße in dem engen Ductus thoracicus zusammenkommen. Denn da der Durchmesser der Gefäße der Menge von Flüssigkeit unter übrigens gleichen Umständen entspricht, die sie einschließen sollen, so kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, daß sich die Menge der in den Lymphgefäßen fortbewegten Flüssigkeit auf dem Wege durch die Lymphdrüsen auf irgend eine Weise vermindere. Vielleicht geschieht dieses in den Lymphdrüsen dadurch, daß etwas davon von dem Blute der Venen angezogen, und hierdurch, oder aus einem andern Grunde, in die Höhle der Venen abgesondert werde. Diese Vorstellung hat in der That auch deswegen viel für sich, weil es zweckmäßig scheint, daß bei dem wiederholten Durchgange der Lymphe durch die Lymphdrüsen der dem Blute schon in einer Drüse ähnlicher gewordene Theil der Lymphe, mit den noch nicht ver-

---

[1]) *Abraham Kaau*, Perspiratio dicta Hippocrati per universum corpus anatomice illustrata. Lugd. Batav. 1738. 8. §. 118. p. 54.

[2]) *E. Hales*, Haemastatique ou la statique des animaux; exp. hydrauliques faites sur des animaux vivans, traduit par *Sauvages*, à Geneve 1744. 4. p. 62.

[3]) *Franc. Dan. Reisseisen*, De fabrica pulmonum commentatio a regia acad. scient. Berolinensi praemio ornata. c. Tabb. VI. Berolini 1822. Fol. p. 16.

Digitized by Google

ähnlichten nicht gemengt bleibe, und mit ihm gemeinschaftlich eine 2te, und oft eine 3te, oder sogar eine 4te Drüse durchläufe, sondern daß er vielmehr davon getrennt und allmählig durch eine aus den Lymphgefäßen in die Blutgefäße geschehende Absonderung in das Blut gebracht werde.

Was die 3te Frage anlangt, ob sich die Lymphgefäßstämme in größere Venen an andern Stellen des Körpers, als an dem hinter dem Schlüsselbeine gelegenen, öffnen und endigen, so beweis't der Umstand, daß die Mehrzahl der Lymphgefäße, und sogar solche, welche von den vom Schlüsselbeine sehr entfernten Stellen, z. B. von den Füßen und von dem Hoden kommen, sich in den Ductus thoracicus begeben, und durch ihn erst auf einem so langen Umwege mit den Venen hinter dem Schlüsselbeine in Verbindung gebracht werden, offenbar, daß es nicht der Zweck der Natur sei, die Lymphe auf dem nächsten Wege in die Venen zu führen, vielmehr darf man wohl einen besonderen Zweck muthmaßen, warum hier erst hinter dem Schlüsselbeine Lymphgefäße von allen Stellen des Körpers zusammenkommen, um sich in die Venen einzumünden. Wenn es nun auch wirklich einzelne seltene Ausnahmen von der Regel gäbe, in welchen sich Lymphgefäße in die Vena cava inferior geöffnet hätten, so würde man unstreitig mit größerem Rechte diese für Naturspiele oder Abweichungen von der Regel halten, als dadurch die Annahme, daß ein allgemeinerer Zweck zu dem erwähnten Umwege der Lymphe Statt finde, für umgestoßen halten.

In der That aber sind die Beobachtungen, durch welche man bis jetzt eine offenbare Einmündung von Lymphgefäßen in die untere Hohlader oder in die Vena azygos zu beweisen gemeint hat, noch nicht von wichtigen Einwürfen frei. Haller [1]), der selbst dieser Meinung ist, führt zwar einige Anatomen an, die einen solchen Uebergang beobachtet haben, und neuerlich hat ihn Lippi [2]) nicht nur beschrieben, sondern auch mehrmals abgebildet. Indessen hat schon Haller gezeigt, daß die Beobachtungen der von ihm angeführten Schriftsteller nicht hinreichen, das zu beweisen, was sie beweisen sollen, und Lippi hat sich nicht gehörig vor der Täuschung sicher gestellt, der man bei dieser Art der Untersuchung häufig ausgesetzt ist, im Gegentheile enthält seine Schrift verschiedene voreilige Behauptungen, und verdient keineswegs ein unbedingtes Zutrauen. Es ist nämlich zuweilen schwer, kleine Venen, welche aus den Lymphdrüsen austreten, von Lymphgefäßen zu unterscheiden. Da nun das Queckſilber, wie schon gesagt worden, innerhalb der Lymphdrüsen ziemlich leicht in die Venen übergeht, so kommt man in die Gefahr, solche aus den Lymphdrüsen hervortretende, mit Queckſilber gefüllte Venen für Lymphgefäße zu halten, die sich in die nächsten größeren Venenstämme begeben. Selbst Fohmann [3]), der doch auch der Meinung ist, daß sich kleine Lymphgefäße auch außerhalb der Lymphdrüsen in kleine Venen öffnen, hat nie bei dem Menschen außerhalb einer Lymphdrüse den Uebergang eines Lymphgefäßes in eine große Vene gesehen, und er erklärt daher die Lippiſchen Beobachtungen für Täuschungen von der Art, wie ich sie erwähnt habe. Lippi

---

[1]) *Haller*, De partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus. Lib. II. Sect. 3. §. 13.

[2]) *Regolo Lippi*, Illustrazioni fisiologiche e pathologiche del sistema linfatico-chilifero mediante la scoperta di un gran numero di communicazioni di esso col venoso. Firenze 1825. grofs 4. Atlas mit 9 Steindrucktafeln in Fol. Tab. I—III.

[3]) *Fohmann*, Das Saugadersystem der Wirbelthiere. Heidelberg 1827. Fol.

Digitized by Google

selbst hat die Commission der Pariser Academie, welche übrigens sein Werk des Preises würdig hielt, durch die von ihm in Paris gemachten Injectionen nur davon überzeugen können, daß die Lymphgefäße innerhalb der Lymphdrüsen mit den Capillarnetze der Venen communiciren, nicht aber, daß sich Lymphgefäße in große Venen sichtbar öffnen. Von jener gleichfalls noch streitigen Communication ist aber jetzt hier nicht die Rede, sondern nur von dieser.

Außer dem Uebergange des Queckſilbers aus den Lymphgefäßen in die Venen innerhalb der Lymphdrüſen giebt es noch einen 2ten Umſtand, welcher gleichfalls leicht die Täuſchung veranlaſſen kann, als habe das Queckſilber einen Ausweg in die Venen gefunden; dieſer iſt, wie Rudolphi bemerkt, das ſchnelle Herunterlaufen des durch den Ductus thoracicus in die Vena subclavia gekommenen Queckſilbers ins Herz, in die Vena cava inferior und in ihre Aeſte.

Den ſehr geringen Durchmeſſer des Ductus thoracicus, vorzüglich in der Mitte der Bruſt, darf man nicht mit Conring [1]), der dieſes Argument zuerſt gebraucht hat, und mit Portal [2]) für einen Beweis halten, daß ſich Lymphgefäße in die Venen an andern Stellen als hinter dem Schlüſſelbeine auf eine ſichtbare Weiſe öffnen. Denn dieſe Einrichtung läßt ſich ſehr gut mit den übrigen Einrichtungen im Lymphgefäßſyſteme zuſammenräumen, wenn man, wie oben geſagt worden iſt, annimmt, daß ein beträchtlicher Theil von der in die Lymphgefäße aufgenommenen Flüſſigkeiten in den Lymphdrüſen durch eine Art von Abſonderung in die Venen gelange und dem Blute beigemiſcht werde, wodurch ſich die Menge der weiter zu führenden Lymphe ſehr vermindern muß, und wenn man zugiebt, daß das in den Venen fließende Blut, ſo wie in den Lungen Sauerſtoff, ſo in vielen andern Theilen Waſſer und andere Materien durch die feuchten Wände der Gefäße hindurch an ſich ziehen könne, ſo daß alſo nicht eine gleiche Quantität durch Abſonderung aus der Höhle des Gefäßſyſtems ausgetretene Flüſſigkeit durch den Ductus thoracicus in die Venen zurückgebracht wird. Bei den Vögeln begeben ſich die Lymphgefäße, nach den Unterſuchungen von Fohmann und Lauth, auf eine mit unbewaffnetem Auge ſichtbare Weiſe in die Venen des Schenkels und des Beckens, ohne zuvor durch eine Lymphdrüſe hindurch zu gehen. Da indeſſen dem Lymphgefäßſyſteme der Vögel die Lymphdrüſen faſt ganz fehlen, ſo iſt es offenbar ſehr von dem der Säugethiere verſchieden, und der Schluß, daß eine ſolche Einmündung auch bei den Säugethieren und bei den Menſchen Statt finden müſſe, iſt nicht erlaubt.

Krankheiten der Lymphgefäße.

Wenn man zuweilen nach Verletzungen, z. B. nach dem Aderlaſſen, zumal wenn giftige Stoffe in die Wunde kommen, oder auch bei Ge-

---

[1]) *Conring*, ſiehe citirt bei *Nic. Oudemann*, De venarum praecipue meseraicarum fabrica et actione, 1794. 8. p. 179.

[2]) *Portal*, Mém. sur le canal thoracique, in Mém. de l'ac. des sc. de Paris, 1770. und in *Férussac*, Bullet. des sc. méd. 1829. p. 327 sq.

Digitized by Google

schwülsten zwischen der verletzten Stelle und den nächsten Saugaderdrüsen, rothe, durch die Haut durchschimmernde, zuweilen schmerzhafte, Streifen entstehen sieht, welche in der Form und Lage mit den Lymphgefäßen Aehnlichkeit haben, und weil dann meistens zugleich die Lymphdrüsen, zu welchen sich jene Saugadern begeben, anschwellen, so schließt man, daß sich die Saugadern unter gewissen Umständen schnell entzünden. Gendrin [1]) hat einen Fall der Art mitgetheilt, in welchem er den Zustand der Lymphgefäße und des benachbarten Zellgewebes anatomisch zu untersuchen Gelegenheit fand. Das Zellgewebe, von dem sie umgeben waren, war roth und verdichtet, und mehr oder weniger mit einer eiterartigen und blutigen Flüssigkeit getränkt. Die Lymphgefäße wurden wegen ihrer Kleinheit nicht deutlich wahrgenommen, sondern nur als röthliche erhabene Fasern unterschieden. Derselbe Schriftsteller fand auch einmal bei einer an Entzündung des Bauchfells gestorbenen Wöchnerin den Ductus thoracicus entzündet, die Wände verdickt und den Anfang desselben in Vereiterung begriffen. Andral d. j. [2]) hat 2 Fälle der Art bekannt gemacht.

Astl. Cooper [3]) fand an 3 Stellen die Klappenpaare des Ductus thoracicus in Verschwärung, und denselben dadurch verschlossen. In demselben Aufsatze findet sich auch ein Fall verzeichnet, wo man in Folge der Anschwellung eines Hoden die Lymphgefäße des Saamenstrangs geschwollen, ihre Wände verdickt, und in gewissen Entfernungen mit kleinen Knoten versehen fand, welche durch ein Leiden der Klappen entstanden waren.

Mehrere andere Fälle, in welchen Cruikshank, Mascagni, Affalini, Walter, Poncy, Hopfengärtner, Nasse, Andral, Lobstein, den Ductus thoracicus durch geronnene Lymphe verstopft oder verwachsen fanden, und die man von Otto [4]) verzeichnet findet, will ich hier nicht erwähnen.

Sehr oft findet man die Lymphgefäße sehr erweitert, womit häufig ein gewisser Grad der Verstopfung der Lymphdrüsen verbunden ist, durch deren Lymphgefäße das Quecksilber nach Mascagni's Behauptung schwer oder gar nicht durchgeht, aber bei Anwendung einiger Gewalt in

---

[1]) A. N. Gendrin, Anatomische Beschreibung der Entzündung und ihrer Folgen, übers. und mit Nachträgen und mit einem Register vermehrt von Radius, Th. II. Leipzig 1829. 8. S. 69. 70.

[2]) *Andral*, in Arch. gén. de Méd. Tome VI. p. 503.

[3]) *Astley Cooper*, in Medical record. et researches from the papers of a private medical association. London 1798. Vol. I. p. 28. und bei *Gendrin* a. a. O. p. 72.

[4]) *A. W. Otto*, Lehrbuch der pathologischen Anatomie. Berlin 1830. B. 1. S. 399.

Digitized by Google

das Zellgewebe und in die Venen übertritt. Daher eignen sich auch Leichname mit sehr erweiterten und mit verhärteten Lymphgefäßen oft nicht zum Einspritzen des Queckſilbers. Zuweilen enthalten die Lymphgefäße in der Nähe großer Eiteransammlungen Eiter, in der Nähe großer Blutaustretungen Blut, und in der Leber, bei Verſtopfung der Gallengänge, nach Aſſalini, Saunders, Mascagni und Sömmerring, Galle. In der Nähe von Knochengeſchwülſten (zuweilen aber auch wo ſie nicht vorhanden waren), fand man in Saugadern, oder in dem Ductus thoracicus Kalkerde, und zwar manchmal in ſolcher Menge, daß die Saugadern dadurch verſtopft wurden. Otto führt in dieſer Hinſicht die Beobachtungen von Portal, Cheſton, J. G. Walter, Schreger, Mascagni, Aſſalini, Goodlad und Scarpa an. Bei Steinarbeitern, welche viel Staub einathmen, ſcheint derſelbe nach Sömmerring und Portal in den Lungen eingeſogen und in die Bronchialdrüſen abgeſetzt zu werden. Vielleicht rührt die ſchwarze Farbe, welche in großer Menge zwiſchen den Läppchen der Lungen nicht mehr jugendlicher Menſchen, und in noch größerer Menge in den Bronchialdrüſen enthalten iſt, von einem zerſetzten, von den Saugadern aufgeſogenen und in die Bronchialdrüſen abgeſetzten vegetabiliſchen Staube her. Andral [1]) hat indeſſen in vielen Fällen, wo er es erwartete und darnach ſuchte, niemals Eiter und Blut in den Lymphgefäßen gefunden, ſo daß er ſogar an der Richtigkeit der von Cruikshank, Mascagni, Sömmerring und Saunders gemachten Beobachtungen zweifelt.

Die mannichfaltigen krankhaften Veränderungen, welche die Lymphdrüſen erleiden können, die man entzündet, vergrößert, vereitert, verhärtet, verſtopft, und alſo für Flüſſigkeiten, die in den Lymphgefäßen vorwärts bewegt werden, ſchwer durchgänglich, erdige Concretionen enthaltend, und mit einer der Conſiſtenz und Farbe nach dem Käſe ähnlichen Subſtanz erfüllt findet, kann hier nicht die Rede ſein [2]).

---

[1]) *Andral*, in *Magendie* Journal de Physiol. exp. 1822. Cah. 3. p. 279. Siehe *Gerson* und *Julius* Magaz. d. ausländischen Lit. 1823. März 281.

[2]) Ich verweiſe auch in dieſer Hinſicht auf Otto's Lehrbuch der pathologiſchen Anatomie des Menſchen und der Thiere, Bd. 1. Berlin 1830. 8. S. 364 sq. und auf die reichhaltige, daſelbſt angeführte Literatur, und führe nur einige neue, hierher gehörende Schriften an: *S. Th. Soemmerring*, de morbis vasorum absorbentium corporis humani. Francofurti 1795. 8. — *Gilibert*, Essai sur le système lymphatique dans l'état de santé et de maladie. Paris 1804. — *Attenhofer*, Lymphatologie, oder Abhandlungen über das lymphatiſche Syſtem und deſſen Leiden. Wien 1808. — *W. Goodlad*, a practical essay on the diseases of the vessels and glands of the absorbent system. London 1814. 8. — *Andral's* und *Gendrin's* angeführte Schriften.

Das Herz. Cor.

Gestalt und Lage des Herzens.

Das Herz ist eine hohle, von häutigen und fleischigen Wänden umgebene, sackförmige Erweiterung an den größten Blut führenden Röhren des Körpers, welche durch Scheidewände in 4 Höhlen eingetheilt, in einem geschlossenen serösen Sacke, dem Herzbeutel, pericardium, eingehüllt, und im unteren und mittleren Theile der Brusthöhle aufgehangen ist.

Es liegt nicht genau in der Mittellinie, sondern schief. Es ist nämlich an seinem oberen und nach rechts und hinten gewendeten Ende breit, am unteren, nach links und vorn gekehrten spitz. Es ist aber nicht kegelförmig, denn die Abschnitte desselben, welche entstehen, wenn man es quer durchschneidet, sind nicht genau kreisförmig. Vielmehr hat es eine etwas abgeplattete, auf der unteren, sehr beweglichen Wand der Brusthöhle, auf dem Zwerchfelle, aufliegende und eine convexe gewölbte, nach oben gekehrte Seite, und diese beiden Seiten stoßen durch 2 stumpfe, abgerundete Ränder, durch den vorderen und den hinteren Rand an einander, welche vorn und nach links in der Spitze zusammenlaufen.

Bei den Säugethieren, bei welchen in der gewöhnlichen Stellung das Brustbein nach abwärts gekehrt ist, ruht das Herz auf dem Brustbeine in der mittleren Ebene, durch welche man sich den ganzen Körper in 2 gleiche Hälften getheilt denken kann, und kehrt seine Spitze nach der Mitte des vorderen Theiles des Zwerchfells, berührt aber dasselbe bei den meisten Säugethieren nicht. Bei dem zum aufrechten Gange bestimmten Menschen aber, bei welchem in der gewöhnlichen Stellung das Brustbein vorwärts gekehrt ist, und das Zwerchfell die tiefste Stelle der Brusthöhle ausmacht, liegt das Herz mit seiner ganzen platten Seite auf dieser gekrümmten muskulösen Scheidewand, und nimmt einen größeren Theil der linken als der rechten Hälfte der Brusthöhle ein, denn sein breites, nach hinten und zugleich ein wenig nach oben und rechts gewendetes Ende erstreckt sich nicht weit in die rechte Hälfte der Brusthöhle hinüber, während die Spitze und der nächste Theil des Herzens, welche zusammen wohl $^2/_3$ desselben ausmachen, ganz in der linken Hälfte der Brusthöhle liegen. Das breitere Ende liegt demnach hinter dem rechten Rande des Brustbeins, und reicht von der Befestigung des Zwerchfells am untern Theile des Brustbeins ungefähr bis zu der Gegend empor, wo die Knorpel der 4ten und 5ten Rippe sich mit dem Brustbeine verbinden, und der hinterste Theil desselben befindet sich hier in der Gegend des 8ten Brustwirbels ziemlich nahe an der Wirbelsäule, von der er durch die Speiseröhre und Aorta und durch den diese Organe überziehenden Theil des Herzbeutels getrennt ist. Der unterste Theil der Spitze des Herzens liegt bei Todten ungefähr in der Höhe des äußern Theiles des Knorpels der 6ten Rippe, oder des Zwischenraums, welcher zwischen ihm und dem folgenden Knorpel befindlich ist. Beim Lebenden, wo die Spitze während der Zusammenziehung eine kleine Bewegung aufwärts und vorwärts zu machen scheint, schlägt sie ungefähr zwischen der 5ten und 6ten Rippe an einer Stelle an, welche zwischen der Mittellinie des Brustbeins und dem Seitenrande der Brust ziemlich in der Mitte liegt.

Digitized by Google

Indessen ist diese Lage des Herzens, weil das Herz bei verschiedenen Menschen von verschiedener Größe, und sein Beutel unten an dem beweglichen Zwerchfelle angeheftet ist, nicht immer genau dieselbe. Denn beim Einathmen scheint das Herz mit dem Zwerchfelle ein wenig herabsinken, und beim Ausathmen wieder ein wenig heraufsteigen zu müssen, wiewohl die Bewegung des sehnigen Mittelpunktes des Zwerchfells nicht sehr beträchtlich sein mag, weil der Lage und Anfügung nach der hintere Theil dieser queren Scheidewand am meisten, der vorderste gar nicht, und der mittlere nur im mittleren Grade herauf- und herabbewegt werden kann, womit auch die von Morgagni und Portal an lebendig geöffneten Thieren gemachten Erfahrungen sehr wohl übereinstimmen, nach welchen sich der sehnige Mittelpunkt des Zwerchfells beim Athmen nur sehr wenig bewegt. Bei lebenden Menschen überzeugt man sich auch, daß sogar die Stellung des Körpers einen Einfluß auf die Lage des Herzens habe. Bei vielen Menschen fühlt man nämlich äußerlich den Herzschlag nicht, während sie auf dem Rücken oder auf der rechten Seite liegen, und hiermit stimmt das überein, was Morgagni bei Todten beobachtete, daß das Herz, während der Mensch auf dem Rücken liegt, mit seinem breiten Ende und mit dem dasselbe bedeckenden Theile des Herzbeutels auf der Wirbelsäule aufliege, daß es sich aber, wenn der Rumpf vorwärts gebogen wird, mit seiner Spitze den Rippen nähere.

Gewicht des Herzens.

Das Gewicht des Herzens und das Verhältniß desselben zum Gewichte des ganzen Körpers ist ziemlich veränderlich. Robinson hat sich bemühet durch eine Anzahl Wägungen das mittlere Verhältniß zu finden. Nach Sartorini wiegt das Herz etwa 1 Pfund, nach Tabor 10 Unzen. Bei Embryonen ist, wie Portal [1]) und J. F. Meckel d. j. gefunden haben, das Herz im Verhältnisse zum Gewichte des ganzen Körpers sehr viel schwerer, und verhält sich zu demselben im 2ten und 3ten Monate der Schwangerschaft wie 1 zu 50, beim reifen Fötus und in den ersten Lebensjahren wie 1 zu 120 [2]). M. J. Weber [3]) in Bonn fand bei 2 Hingerichteten fast gleich langen (5 Fuß 6 Zoll 6 Lin. und 5 Fuß 8 Zoll Rhnl. M.) Männern von 27 und 47 Jahren das Gewicht des Herzens nach abgeschnittenen Blutgefäßen fast gleich, nämlich 21½ und 21 Loth, ungeachtet das Gehirn bei beiden ein sehr verschiedenes Gewicht hatte (nämlich 3 Pfunde (Medicinalpfunde?) und 16¾ Lothe, und 2 Pfunde und 21 Lothe). Bei dem erstern Verbrecher wurde auch das Gewicht des ganzen Körpers bestimmt, und 134 Pfund gefunden, so daß also das Herz $\frac{1}{150}$ des ganzen Körpers ausmachte.

Der Herzbeutel, Pericardium.

Das Herz ruht, bei der aufrechten Stellung des Menschen nicht mit seinem ganzen Gewichte auf dem Zwerchfelle, und zieht dabei auch nicht mit demselben an den großen, zu den Lungen übergehenden, oder in der Brusthöhle emporsteigenden Blutgefäßstämmen. Wenn wir auf dem Rücken liegen, so drückt es nicht mit seinem vollen Gewichte auf die Speiseröhre und auf die große Körperarterie, was sehr leicht nach-

[1]) *A. Portal*, Cours d'anatomie médicale etc. Paris 1804. 8. Tome III. p. 35.

[2]) J. F. Meckel, Handbuch der menschl. Anatomie. B. 3. S. 44.

[3]) M. J. Weber, in Nasse's Zeitschrift für die Anthropologie. 1825. Heft 3. S. 81. sq.

theilige Folgen gehabt haben würde, und eben so wenig übt es einen nachtheiligen Druck auf die neben ihm gelegenen Lungen aus, wenn wir uns auf die eine oder auf die andere Seite legen; umgekehrt aber erfährt es auch bei seiner Bewegung kein beträchtliches Hinderniß von den benachbarten Organen, denn es ist in einem, in der Brusthöhle befestigten und ausgespannt erhaltenen, inwendig glatten serösen Beutel aufgehangen, und wird gewissermaßen schwebend erhalten.

Es befinden sich nämlich in der Brusthöhle außer dem unten und in der Mitte gelegenen Herzbeutel noch 2 seröse, zu beiden Seiten liegende große Säcke, die Brustfellsäcke, welche mit einem großen Theile ihrer Oberfläche oben, unten und seitwärts an den Wänden der Brusthöhle, die sie überziehen, angewachsen sind [1]). Der Theil dagegen, welchen diese 2 Säcke einander zukehren, ist zwischen der vorderen und hinteren, so wie auch zwischen der unteren Wand und dem oberen spitzen Ende der Brusthöhle ausgespannt, und bildet 2 durch die ganze Länge der Brusthöhle gehende Scheidewände, die sich in der Regel nirgends berühren, sondern oben und vorn, wo sie einander am nächsten sind, vorzüglich durch Zellgewebe und Fett, oben und nach hinten zu durch die großen Blutgefäßstämme, die Speise- und die Luftröhre, endlich unten durch das in seinem Herzbeutel eingeschlossene Herz von einander getrennt werden.

Der Herzbeutel, welcher unten ziemlich die Gestalt des Herzens hat, aber größer ist, liegt also zwischen diesen beiden Scheidewänden, und ist, so weit er sie berührt, in allen Punkten mit ihnen durch Zellgewebe verbunden. Unten liegt er mit dem Theile, welcher der platten Seite des Herzens entspricht, auf der gewölbten Fläche des Zwerchfells angeheftet, und überzieht den vorderen und mittleren, großentheils sehnigen, von den Brustfellsäcken nicht bedeckten Theil desselben. Dieser Theil des Zwerchfells ist größer als die platte Seite, und folglich größer als der größte Umfang des Herzens. Der Herzbeutel hängt hier bei Erwachsenen dem Zwerchfelle ziemlich fest an. Es beugen sich sogar Fasern, die bei älteren Personen ein sehniges Ansehen und große Festigkeit haben, vom Zwerchfelle zu dem nicht an ihm angewachsenen Theile des Herzbeutels hinauf, überziehen ihn und machen seine Haut, die schon durch Zellgewebe verstärkt ist, dicker, die daher inwendig serös, äußerlich aber von festem Zellgewebe bedeckt, und bei Erwachsenen vielleicht sogar in einigem Grade sehnig ist. Bei Embryonen und Kindern hängt der Herzbeutel nicht so fest mit dem Zwerchfelle zusammen, und er ist

[1]) Siehe A. W. Otto, von der Lage der Organe in der Brusthöhle, als Einladungsprogramm ꝛc. Breslau 1829. 4. mit 5 Tafeln Steindruck.

Digitized by Google

daher bei ihnen nicht so dick und sehnig. Zwischen dem Brustbeine und dem Herzbeutel befindet sich sehr lockeres, nachgiebiges Zellgewebe. Auf diese Weise wird nun der Herzbeutel durch jene 2 von den beiden Brustfellsäcken gebildeten Scheidewände und durch das Zwerchfell in seiner Lage und ausgespannt erhalten, und da diese 2 Säcke zuweilen nicht gleich groß sind, sondern der rechte sich weiter nach der Mittellinie des Brustbeins zu erstreckt als der linke, und der linke Brustfellsack nebst der linken Lunge so gestaltet ist, daß er Platz für den Herzbeutel und das Herz übrig läßt, so liegt der Herzbeutel eben so wie das Herz mehr in der linken Seite der Brusthöhle, als in der rechten. Oben erstreckt er sich aber beträchtlich höher hinauf, als das Herz, ungefähr bis zur 2ten Rippe und bis zum Handgriffe des Brustbeins; denn er bedeckt daselbst nicht nur das Herz, sondern auch die mit dem dicken Ende des Herzens in Verbindung stehenden großen Blutgefäßstämme, namentlich das Stück der Vena cava superior bis an die Stelle, wo die Vena azygos in sie hineingeht, die A. Aorta vorn bis in die Nähe des Ursprungs der A. anonyma, hinten (jedoch nicht so hoch herauf,) die A. pulmonalis gemeinschaftlich mit der Aorta, ohne zwischen beide Gefäße einzudringen, ferner die Lungenvenen der linken und rechten Seite und den zwischen ihnen gelegenen oberen Theil des linken Vorhofs, endlich die untere Hohlvene und den unteren Ast der rechten Lungenarterie.

Von allen diesen Stellen aus schlägt sich der Herzbeutel gegen das Herz um, überzieht es, und stellt also einen überall geschlossenen Sack dar, von welchem das obere Ende in die Höhle des untern hineingestülpt ist, ungefähr wie die eine Hälfte des Sackes einer Schlafmütze in die andere hineingeschoben wird. Das Herz ruht in diesem umgestülpten Theile desselben, füllt die nach oben offenstehende Höhle desselben aus, wird von ihm fest überzogen, und erhält daher, so wie auch der nächste Theil der großen Blutgefäßstämme, eine äußere Haut von ihm. Bläst man in den Herzbeutel Luft, so kann man die Stelle, wo sich der Herzbeutel an die großen Blutgefäße anlegt, und sie und das Herz zu überziehen anfängt, sehen. Schneidet man ihn auf, so sieht man, wie sich der umschlagende Theil des Herzbeutels zwischen die verschiedenen, mit dem Herzen zusammenhängenden Röhren hineinschlägt, und daher manche ringsum oder fast ringsum überzieht, z. B. »die rechten Lungenvenen, die linken Lungenvenen, den rechten Ast der Lungenarterie, die Vena cava inferior, und die Vena cava superior,« manche aber, z. B. die Aorta und den Stamm der Arteria pulmonalis, nicht einzeln, sondern gemeinschaftlich umgiebt, und sich also auch nicht zwischen sie hineinschlägt. Der an der Aorta sich umschlagende Theil des Herzbeutels ist der oberste Theil desselben. Hinten hängt dieser Theil den hinter der Aorta liegenden Luftröhrenästen locker an. Nicht bei allen Leichnamen schlägt sich aber der Herzbeutel genau an derselben Stelle der großen Gefäßstämme um. Bei manchen Menschen überzieht er ein größeres, bei anderen ein kleineres Stück derselben.

Läge das Herz so im Herzbeutel, daß es von einem am unteren Theile des Herzbeutels gebildeten Umschlage überzogen würde, so würde es mit seinem ganzen Gewichte auf dem Zwerchfelle aufliegen, und nicht ein Theil seiner Last durch den Herzbeutel unterstützt und getragen werden, und dadurch in seiner Bewegung mehr

Digitized by Google

gehindert sein. Der zwischen den Brustfellsäcken und dem Zwerchfelle ausgespannte Herzbeutel verhindert aber auch zugleich den Druck der Lungen auf das Herz, und den des Herzens auf die Lungen; und weil der freie und der angewachsene Theil des Herzbeutels, wie jede seröse Haut, an der nach der Höhle zugekehrten Oberfläche glatt und schlüpfrig ist, so gleitet die schlüpfrige Oberfläche des Herzens an der des Beutels ohne ein großes Hinderniß hin und her[1]). Der umgeschlagene und am Herzen angewachsene Theil des Herzbeutels ist viel dünner und durchsichtiger, als der freie nicht angewachsene, denn er ist nicht wie dieser durch eine dicke Lage dichten Zellgewebes und durch sehnige Fasern verstärkt.

Der den Herzbeutel während des Lebens erfüllende, von den Blutgefäßen desselben ausgehauchte Dunst scheint sich schon während des Lebens in geringer Menge, in größerer aber nach dem Tode zu Herzbeutelwasser, liquor pericardii, zu verdichten. Man findet etwa einen Theelöffel oder einen halben oder ganzen Eßlöffel voll, bei manchen Todesarten, ohne eine vorausgegangene Krankheit des Herzbeutels, auch beträchtlich mehr davon. Während des Lebens aber scheint in ihm viel weniger, indessen meistens doch etwas tropfbare Flüssigkeit vorhanden zu sein. Littre tödtete viele Hunde sehr schnell, indem er ihnen den Kopf abschnitt, und untersuchte sogleich, ob ihr Herzbeutel tropfbare Flüssigkeit enthielt, und fand immer etwas Herzbeutelwasser. Portal fand bei Thieren, die er sehr schnell tödtete, entweder sehr wenig oder auch gar keins. Bei jungen Thieren aber mehr als bei alten Thieren, was mit Duverney's und Hallers Beobachtung übereinstimmt, nach welchen der Herzbeutel des menschlichen Fötus weit mehr Wasser als der der Erwachsenen enthält. Das Herzbeutelwasser ist auch bei jungen Thieren röthlicher, als bei alten. Die Flüssigkeit selbst scheint nach Berzelius die Natur des Blutwassers zu haben, dem der größte Theil seines Gehalts an Eiweiß entzogen worden. Es nützt der Dunst, durch dessen Verdichtung es entsteht, indem er die Oberfläche des Herzens und des Herzbeutels schlüpfrig macht, und das Verwachsen beider verhütet. Hieraus sieht man auch, wie wichtig es ist, daß die Haut des Herzbeutels so dicht, undurchdringlich und überall geschlossen sei, damit das Herzbeutelwasser nicht ins Zellgewebe dringe und abfließe. Im Gegentheile aber befördert die abgesonderte Flüssigkeit des Herzbeutels, wenn sie viel Faserstoff enthält, und also die Natur der gerinnbaren Lymphe annimmt, das Verwachsen. Unter solchen Umständen verschwindet zuweilen die Höhle des

[1]) Man darf sich nicht vorstellen, man könne durch ein vorsichtiges Präpariren wirklich den Herzbeutel von der Oberfläche der großen Gefäßstämme und des Herzens so loslösen, daß er sich als ein unverletzter geschlossener Sack darstelle; denn hinter den 2 großen Arterien über den Atrien und vor den Lungenvenen befindet sich ein von der serösen Haut desselben ausgekleideter Zwischenraum. Man kann in der Höhle des aufgeschnittenen Herzbeutels hinter der Aorta und pulmonalis mit dem gekrümmten Finger herumgreifen. Sollte sich der Herzbeutel unverletzt abziehen lassen, so müßte in dieser Oeffnung eine Scheidewand befindlich sein. Man muß sich daher den eingestülpten Theil des Herzbeutels nicht als die Hälfte eines einfachen Stückes vorstellen, sondern ihn sich so denken, als ob quer durch denselben ein Canal durchginge, der an beiden Seiten des umgeschlagenen Theiles des Herzens der Höhle des Herzbeutels offen steht. Dieser Canal geht hinter der Aorta und A. pulmonalis und vor den Lungenvenen und Atrien hindurch.

Digitized by Google

Herzbeutels gänzlich, indem die beiden Abtheilungen desselben, der angewachsene und der freie, zusammenkleben und mit einander verwachsen, so daß Ungeübte sogar auf den Gedanken kommen können, der Herzbeutel fehle ganz, was nur in höchst seltenen Fällen, deren Verzeichniß Otto gegeben hat, Statt findet, z. B. bei Mißbildungen, vermöge deren das Herz frei zur Brusthöhle heraushängt.

So wie der Herzbeutel allen Wirbelthieren zukommt, so scheint auch sein Vorhandensein einen wesentlichen Vortheil für die Bewegung des Herzens zu haben, und es ist eine Sache der Pathologie, zu zeigen, welche Störungen in den Fällen beobachtet werden, in welchen die Höhle des Herzbeutels verschwindet.

Die Schlagadern des Herzbeutels kommen von den Arteriis mammariis internis, pericardiaco-phrenicis, phrenicis, mediastinis, thymicis, bronchialibus, oesophageis, theils auch aus der Aorta selbst; die Venen gehen in die gleichnamigen zurück.

Saugadern des Herzbeutels gehen theils zu den Drüsen, welche an der Mittelhaut, theils zu denen, welche im obern Theile der Brust liegen.

Ob der Herzbeutel von den Nerven, welche durch ihn zum Herzen gehen, selbst Fäden erhalte, ist noch zweifelhaft [1]). Empfindlichkeit hat er wenig oder gar nicht gezeigt [2]).

Um sich eine Uebersicht über die Lage und Bestimmung der 4 Höhlen des Herzens, über ihre Oeffnungen, über deren Zusammenhang mit den benachbarten großen Blutgefäßen zu verschaffen, dienen folgende Betrachtungen.

Die äußerlich sichtbare Längenfurche, die Querfurche und die Eintheilung des Herzens durch dieselben in vier Abtheilungen.

Schon von außen nimmt man auf beiden Oberflächen des Herzens, zumal wenn es angefüllt ist, eine Spur der in ihm liegenden Scheidewand als eine von der Spitze des Herzens bis zu seinem breiten Ende laufende, gekrümmte Längenfurche wahr, welche nicht ganz in der Mitte der beiden Oberflächen liegt. Sie ist die Gränze der beiden Hälften des Herzens. Eine viel tiefere Querfurche bildet die Gränze zwischen dem am dicken Ende gelegenen häutigen und dem übrigen fleischigen Theile des Herzens.

Da, wo diese Querfurche äußerlich sichtbar ist, finden sich inwendig 2 ringförmige Vorsprünge, und die von ihnen umgebenen Oeffnun-

[1]) Haller sagt (Elem. phys. I. p. 280.): „in eo sacco pauci manere videntur, neque satis noti“; und auch nach Walters Untersuchungen gehört der Herzbeutel zu den Theilen, welche keine Nerven enthalten. (tabb. nervor. thor. et abd. Praef. p. 2.

[2]) Haller, elem. physiol. I. p. 280.

gen, durch welche die Höhlen des häutigen Theils mit denen des fleischi-
gen communiciren. Die Längenfurche und die Querfurche durchkreuzen
sich vorn und hinten, und theilen das Herz in 4 schon äußerlich unter-
scheidbare Abtheilungen. Hinten ist diese Durchkreuzung sichtbarer, vorn
wird sie von den großen Arterienstämmen bedeckt. Die 2 Abtheilungen,
die im dünnwandigen Theile enthalten sind, heißen Vorhöfe, Vor-
kammern, atria, die im dickwandigen fleischigen Theile befindlichen
werden Herzkammern, ventriculi, genannt. Mit den dünn-
wandigen Abtheilungen hängen auch nur dünnwandige Blutgefäße,
Venen, mit den dickwandigen Abtheilungen auch nur dickwan-
dige Blutgefäße, Arterien zusammen. Jeder Vorhof und jede Kam-
mer hat einen blinden (verschlossenen) Zipfel. An den Vorhöfen wird
der blinde Zipfel Herzohr, auricula, genannt, und von dem übrigen
Theile des Vorhofs, sinus, unterschieden. An den Kammern wird der
blinde Zipfel, die Spitze, apex, genannt. Die Spitze der linken
Kammer reicht weiter herunter, als die daneben liegende Spitze der
rechten Kammer, und bildet daher die Herzspitze, apex, oder mucro
cordis. Indessen sieht man zuweilen auch die Spitzen beider Kam-
mern etwas hervorragen.

Die Vorhöfe sind rundliche, mit einigen stumpfen Winkeln ver-
sehene, neben einander liegende, durch eine dünne Scheidewand, sep-
tum atriorum, geschiedene Säcke, die am breiten Ende des Herzens,
basis cordis, liegen. Jeder Vorhof hat den erwähnten blinden An-
hang, das Herzohr, an seiner vorderen äußeren Seite. Das Herzohr
des rechten Vorhofs ist größer, das des linken Vorhofs zeichnet sich
durch einen durch noch mehr Einschnitte tiefer eingekerbten Rand aus.

Zweck der vier Herzhöhlen.

Es ist oben S. 25 erwähnt worden, daß das in allen Theilen
des Körpers bei der Ernährung dunkelroth gewordene Blut nach und
nach in immer wenigere und größere Röhren, und endlich in eine ein-
zige Röhre zusammengeleitet, dann in die Lungen geführt und durch
kleinere und immer kleinere Aeste zu allen Abtheilungen der Lungen verbrei-
tet werde, daß es ferner, nachdem es daselbst durch den Einfluß der Luft
beim Athmen hellroth geworden ist, durch Röhren, die sich in immer
wenigere und größere vereinigen, von den Lungen weggeführt, abermals
in einer einzigen Röhre zusammengebracht und nach den verschiedenen
Theilen des Körpers hinbewegt und zu ihnen vertheilt werde, um da-
selbst von neuem zur Ernährung beizutragen, wobei sich dann aber-
mals seine hellrothe Farbe in eine dunkelrothe verwandele, und es von
neuem auf dem schon angegebenen Wege nach den Lungen gebracht

Digitized by Google

werde, daß es mit einem Worte 2 Röhrenleitungen gebe, von welcher die eine dazu diene, das in den Lungen hellroth gewordene Blut aus allen Theilen der Lungen nach allen Theilen des Körpers, die andere dagegen das bei der Ernährung dunkelroth gewordene Blut von allen Theilen des Körpers zu allen Theilen der Lungen zu führen. Diese 2 Röhrenleitungen liegen dicht neben einander. An der Stelle, wo das dunkelrothe Blut rechts, das hellrothe daneben links fast in der Mitte des Körpers in einer Röhre zusammenfließt, befindet sich an beiden Röhren eine weitere, gewissermaßen sackförmige Stelle. Beide sackförmigen Erweiterungen liegen neben einander und bilden zusammen das Herz, die eine, durch welche das dunkelrothe Blut von den Theilen des Körpers nach den Lungen geht, liegt mehr nach vorn und nach rechts, die andere, durch welche das hellrothe Blut von den Lungen nach den Theilen des Körpers hinbewegt wird, nach hinten und nach links. Jede von diesen beiden erweiterten Stellen der Blutcanäle kann ihrer Form nach gewissermaßen mit einem Pfeifenstiefel verglichen werden, aus dem Grunde, weil der Eingang und Ausgang nahe bei einander am stumpfen Ende derselben liegen, und weil sie, wie wir sogleich sehen werden, ein spitzes Ende hat, das mit keiner Oeffnung versehen ist. Jede von beiden sackförmigen Erweiterungen ist, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, durch eine quere Einschnürung in 2 Abtheilungen, in eine obere und rechts gelegene, in welche das Blut aus 3 oder 4 Venen hereintritt, Vorhof, Vorkammer, atrium, und in eine untere linksgelegene, durch welche das Blut aus der Erweiterung in eine Arterie wieder austritt, Kammer, ventriculus, getheilt. Die obere Abtheilung ist, wie schon gesagt worden, mehr rundlich, die untere mehr wie ein länglicher Sack, der in eine Spitze ausläuft, gestaltet. In die, in jeder Herzhälfte gelegene Kammer, welche also unten einen spitz zulaufenden Sack bildet, tritt das Blut an dem oberen breiteren Ende ein, und eben daselbst auch wieder aus derselben aus. Denn an diesem breiteren oberen Ende liegen 2 Oeffnungen neben einander, von denen die eine (die venöse) das Blut aus der Vorkammer in die Kammer einzulassen, die andere (die arteriöse) das Blut aus der Kammer in die Arterie heraustreten zu lassen bestimmt ist. Die Spitze jedes Ventrikels ist folglich blind, oder mit andern Worten, sie hat keinen Ausgang.

Die dünne und zugleich sehr dichte Haut, welche die Höhle der Erweiterungen zunächst umgiebt und mit dem Blute in Berührung kommt, ist dieselbe, welche alle übrigen Blut- und Lymphgefäße inwendig überzieht.

Sie ist hier aber noch dünner und noch durchsichtiger als in den Arterien und in den Venen. Während die aus dieser Haut bestehende Röhre äußerlich in den Arterien von gelben, nicht weichen, elastischen

Digitized by Google

Cirkelfasern, und in den Venen von Zellgewebe und eingestreueten zarten Längenfasern umgeben ist, wird sie an der erweiterten Stelle, die das Herz bildet, von Fleischfasern, durch welche sie mit beträchtlicher Kraft verengert werden kann, und von dem angewachsenen Theile des Herzbeutels umgeben. Diese Fleischfasern sind von doppelter Art. Manche Fleischfasern erstrecken sich von der einen Erweiterung, durch welche das dunkelrothe Blut fließt, auf die andere hinüber, durch welche das hellrothe Blut bewegt wird, und sind also gemeinschaftliche Fleischfasern beider Herzhälften; andere gehören nur einer an. So hat z. B. jede Vorkammer ihre besondern, und beide haben auch gemeinschaftliche Fleischfasern, und eben so verhält es sich auch bei den Kammern. Indessen sind diese 2 Classen von Fleischfasern nicht lagenweise von einander getrennt, sondern unter einander verschmolzen, verflochten und oft schwer zu unterscheiden. Aber die Vorkammern und Herzkammern haben keine gemeinschaftlichen Fleischfasern, denn diese hängen nur durch Zellgewebe unter einander zusammen; daher trennen sich auch die Vorkammern, nach Lieutaud [1]), durch langes Kochen gänzlich von den Kammern, weil sich diese aus Zellgewebe und etwas knorpelartiger Materie bestehende Verbindung zu Leim auflöst. Unstreitig hängt es mit von der Einrichtung, vermöge welcher zwar beide Vorkammern unter einander, und eben so auch beide Kammern durch gemeinschaftliche Fleischfasern verbunden werden, keine Fleischfasern aber von einer Vorkammer ohne Unterbrechung auf eine Kammer übergehen, ab, daß während des Lebens sich beide Vorkammern gleichzeitig und eben so sich auch beide Kammern gleichzeitig, die Kammern und Vorkammern aber abwechselnd zusammenziehen.

Der Vorhof, oder was dasselbe ist, die obere Abtheilung der rechten und der linken Herzhälfte, ist nicht bestimmt, das Blut mit sehr große Kraft und sehr weit fortzutreiben. Denn das Blut geht aus ihm nu in die unter und vor ihr liegende Kammer über, welche er anfüllt, in dem er sich entleert. Hierzu reicht der Druck, den die viel dünne Lage von Fleischfasern, von der er umgeben ist, hervorbringen kann aus. Die Vorkammern, welche also nur von einer dünnen Lage vo Fleischfasern umgeben sind, besitzen nur dünne häutige, nicht dicke u sehr fleischige Wände, und da, wo beide mit ihrer einen Seite an ei ander stoßen, entsteht auch dadurch eine dünne häutige Scheid wand, septum atriorum. Die Vorkammern fallen auch aus dies Grunde, wegen der geringen Steifigkeit ihrer Wände, zusammen, we sie nicht durch die in ihnen enthaltene Flüssigkeit ausgedehnt erhalten werd

Die Kammer, d. h. die untere Abtheilung der rechten und der lin Herzhälfte ist dagegen bestimmt, das Blut mit sehr großer Kraft und j weit fortzudrücken.

---

[1]) Joseph Lieutaud's Zergliederungskunst nach der neuesten, von Portal vermeh Ausgabe, übers. B. I. Leipzig 1782. S 611.

Digitized by Google

Denn die linke Herzkammer schiebt die, alle Körperarterien erfüllende, bis in das sehr enge Haargefäßnetz aller Theile des Körpers reichende, hellrothe Blutsäule durch dieses Netz hindurch allmählig in die Körpervenen vorwärts, und auf ähnliche Weise drückt die rechte Vorkammer die, die Lungenarterie und alle Lungenarterienäste erfüllende, bis in das Haargefäßnetz aller Lungenläppchen reichende dunkelrothe Blutsäule durch dieses Netz hindurch allmählig gegen die Lungenvenen vorwärts.

Die beträchtliche Druckkraft, welche hierzu erforderlich ist, liegt in den dicken fleischigen Wänden dieser Kammern, die bei der linken Herzkammer noch viel dicker, d. h. ungefähr 3mal so dick, als bei der rechten sind; worüber man sich nicht wundern darf, da unstreitig eine größere Kraft erforderlich ist, um das Blut vom Herzen aus in alle Theile des Körpers, und durch das daselbst befindliche, im Allgemeinen engere Haargefäßnetz hindurch zu treiben, als es vom Herzen aus in die viel näher gelegenen Lungen, und durch das sie durchdringende, im Allgemeinen aus etwas weiteren Röhrchen bestehende Haargefäßnetz hindurch zu drücken. Die rechte Herzkammer unterscheidet sich also nicht nur dadurch von der linken, daß sie beim erwachsenen gesunden Menschen dunkelrothes Blut einschließt, daß sie mehr nach vorn und nach rechts liegt, sondern auch dadurch, daß ihre Wände dünner sind, und daß ihre Spitze, von außen angesehen, nicht ganz so tief nach unten herabreicht, als die der linken Herzkammer.

Da, wo die beiden, von ihren fleischigen Wänden umgebenen Herzkammern mit ihrer einen Seite an einander liegen, und äußerlich durch eine dünne Lage untereinander theils verwebter, theils verschmolzener Fleischbündel vereinigt sind, entsteht die Scheidewand der Herzkammern, septum ventriculorum, welche zwischen den beiden spitzigen Säcken von unten, und links bis zum breiten oberen Ende nach rechts und oben reicht, und zwischen den Ventrikeln etwas dünner als der größere Theil der übrigen Wände des linken Ventrikels ist. Am breiten Ende der Kammern befindet sich dicht neben der Scheidewand und mehr nach vorn der Ausgang in die Arterie, ostium arteriosum, und daneben weiter nach hinten und von der Scheidewand entfernter der etwas größere und etwas elliptische, aus der Vorkammer hereingehende Eingang in die Herzkammer, ostium venosum. Diese beiden Oeffnungen liegen am linken Ventrikel dicht neben einander, im rechten dagegen ist ein nicht unbeträchtlicher Theil der Wand des breiten Endes der Kammer zwischen ihnen.

Die von dünnen Wänden gebildeten Theile des Herzens, die Vorkammern oder Vorhöfe, stehen mit Röhren in Verbindung, die gleichfalls dünne Wände haben, mit Venen, die eben deswegen, weil sie das Blut dem Herzen zuführen, keinen heftigen Druck von Seiten des Herzens

Digitized by Google

erleiden, und daher auch ohne Schaden dünne Wände besitzen konnten.

Die von dicken fleischigen Wänden gebildeten Theile des Herzens, die Herzkammern, stehen mit Röhren in Verbindung, die den Druck des von den Herzkammern fortgestoßenen Blutes auszuhalten im Stande sind Die Dicke der Wände der Arterien entspricht also selbst wieder der Dicke der fleischigen Wände der Herzkammern, mit welchen sie zusammenhängen; denn die Körperarterie, welche von der dickeren und fleischigeren linken Herzkammer ausgeht und von ihr mit größter Gewalt vorwärts gepreßtes Blut aufnimmt, hat eine dickere Wand als die Lungenarterie, welche mit der etwas weniger fleischigen rechten Herzkammer in Verbindung steht.

Größe der Höhlen des Herzens.

Man hat hinreichenden Grund anzunehmen, daß die Höhlen der rechten Herzhälfte eben so weit als die der linken sind; denn da in einer gegebenen Zeit nothwendig eben so viel Blut durch die eine als durch die andere Herzhälfte fließen muß [1]), wenn nicht ein Mangel oder ein Uebermaß des Blutzuflusses in der einen oder andern Herzhälfte entstehen soll, und da die 2 Ventrikel, und eben so auch die 2 Vorkammern ihre Bewegung, durch die sie das Blut fortpumpen, gleichzeitig machen, so folgt schon hieraus, daß ihre Höhlen während des Lebens gleich sein müssen.

Santorini [2]), der die Arterien und Ventrikeln einzeln mit Wasser anfüllte, fand auch nach dem Tode die Größe der Höhlen der rechten und linken Herzhälfte gleich. Aehnliche Beobachtungen haben Lower [3]), v. Moor [4]), Weiß [5]), Lieutaud [6]) und Sabatier [7]) gemacht. Die entgegengesetzten, allerdings

[1]) Da die vom rechten Ventrikel aus in die Lungen getriebene Flüssigkeit, weil daselbst Wasserdampf und Kohlensäure ausgehaucht wird, etwas an Menge abnimmt, und die Luft, die daselbst ins Blut aufgenommen zu werden scheint, diesen Verlust unstreitig nicht ganz ersetzt, so könnte man meinen, daß aus diesem Grunde die Höhlen der linken Herzhälfte etwas enger sein müßten, als die der rechten. Allein die Ausdünstung durch die Lungen beträgt nach den Versuchen von Lavoisier und Seguin in 24 Stunden nur 13704 Gran. Da nun aber das Herz in diesem Zeitraume ungefähr 34000 bis 40000 mal Blut ausstößt, und auf die vielen Anfüllungen der Verlust an Flüssigkeit durch Lungenausdünstung zu vertheilen ist; so sieht jeder leicht ein, daß die linke Herzhälfte wegen jenes Verlustes nicht merklich enger sein könne. Noch viel weniger scheint aber die durch den Ductus thoracicus zum Blute hinzukommende Flüssigkeit einen größeren Durchmesser der rechten Herzhälfte verursachen zu können. Denn da der Mensch im gewöhnlichsten Falle an Gewicht nicht zunimmt, so muß man annehmen, daß von dem von der linken Herzhälfte ausgetriebenen Blute fast eben so viel Flüssigkeit durch Absonderungen aus den Blutgefäßen austritt, als durch den Ductus thoracicus in dieselben zurückkommt.

[2]) *Santorini*, Obs. anat. p. 144.

[3]) *Lower*, Tractatus de corde etc. London 1669. 8. p. 34.

[4]) *v. Moor*, cogitat. de instaurat. medic. Amst. 1695. p. 67.

[5]) *Lieutaud*, Essays anat. p. 230.

[6]) *Joh. Nic. Weiss*, de dextro cordis ventriculo post mortem ampliori. Altorfi 1767. 4.

[7]) *Ant. Chaum. Sabatier*, an in vivis animalibus ventriculorum cordis eadem capacitas. Paris 1772. 4. und Traité complète d'anat.

Digitized by Google

viel zahlreicheren Beobachtungen [1]), wo die rechte Herzhälfte bei Erwachsenen beträchtlich weiter gefunden wurde, als die linke, beweisen aber das Gegentheil nicht. Denn theils sieht jeder leicht ein, daß eine beim Sterben zeitig eintretende Stockung des Bluts in den Lungen eine krankhafte Ausdehnung der rechten Herzhälfte, die sich dann ihres Blutes nicht entleeren kann, zur Folge haben könne, theils daß die durch gewaltsame Einspritzung oder durch das Einfüllen von Quecksilber hervorgebrachte Anfüllung der Herzhöhlen bewirken könne, daß der nachgiebigere rechte Ventrikel mehr als der minder nachgiebige linke ausgedehnt werde, und aus diesem Grunde haben Santorini's und Portals Beobachtungen, wo Wasser und Wachs mit großer Behutsamkeit eingegossen wurde, ein vorzügliches Gewicht, bei Le Gallois [2]) und J. F. Meckels [3]) Beobachtungen aber, wo Quecksilber eingefüllt wurde, ist das große specifische Gewicht des Quecksilbers, und folglich der bedeutende Druck desselben mit in Anschlag zu bringen. Dadurch erklärt sich, wie der rechte Ventrikel bei Meckels Versuchen noch ein halbmal, noch einmal, oder sogar zweimal so weit als der linke erschien, während Portal [4]), der den Rauminhalt aller 4 Höhlen des Herzens in verschiedenen Altern und unter verschiedenen Umständen verschieden und nicht in einem gleichbleibenden Verhältnisse fand, zu dem Endresultate geführt wurde, daß im Allgemeinen alle 4 Höhlen des Herzens gleich weit wären. Anders verhält sich die verhältnißmäßige Weite der beiden Herzhälften bei dem Embryo, bei welchem ein in der Scheidewand der Vorhöfe befindliches Loch ein Ueberströmen des Bluts aus der rechten Herzhälfte in die linke gestattet.

Oeffnungen der vier Herzhöhlen und Klappen an einigen dieser Oeffnungen.

Die Oeffnungen, durch welche die Venen ihr Blut in die Vorkammern ergießen, haben, mit Ausnahme der Herzvene (welche mit einer einfachen, halbmondförmigen Klappe, valvula Thebesii, versehen ist) entweder gar keine Klappen, oder wenigstens keine, die den Rücktritt des Bluts aus den sich zusammenziehenden, mit Blut angefüllten Vorkammern verhindern könnten. Alle Oeffnungen der 4 Lungenvenen in der linken, und die der Vena cava superior in der rechten Vorkammer haben gar keine Klappen. Die der Vena cava inferior hat zwar bei dem Embryo, und zuweilen auch bei dem Erwachsenen eine vorspringende halbmondförmige Falte, valvula Eustachii, die aber an der vordern Seite mehr schief als quer gestellt ist, und den Rücktritt des Bluts niemals verhindern kann, übrigens bei dem Erwachsenen meistens bis auf eine kleine Spur verschwindet. Dagegen sind die 4 Oeffnungen, die sich am breiten Ende der beiden Herzkammern befinden, ostia arteriosa und ostia venosa der Kammern, mit Klappen versehen, die so eingerichtet sind, daß die an der Vorkammeröffnung, ostium venosum, befindlichen Klappen (valvulae tricuspidales des rechten, valvulae mitrales des linken Ventrikels) das Blut herein, aber nicht in die Vorkammer zurück, die an der

---

[1]) Schon der Verf. des dem Hippocrates zugeschriebenen Buches de corde nahm an, daß die Höhle der vorderen Kammer geräumiger sei. *Jo. Cl. Adr. Helvetius* Mém. de l'ac. roy. des sc. de Paris, 1718. p. 283 sq. fand sie um $^1/_6$ geräumiger. *Winslow* expos. anat. IV. n. 53. *Sénac* Traité du coeur, T. I. p. 191. 346. *Haller*, El. phys. I. 328. *Aurivillius*, De inaequali vasorum pulmonalium et cavitatum cordis amplitudine. Gottingae 1750. 4. in *Halleri* coll. VII. p. 257. Le Gallois und J. F. Meckel d. j. und Andere sind derselben Meinung.

[2]) *Le Gallois*, Dict. des sc. médicales, V. 440.

[3]) J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. Halle 1817. S. 46.

[4]) *A. Portal*, Cours d'anat. méd. Paris 1804. 8. III. p. 39, 40, und in Jos. Lieutauds Zergliederungskunst, nach Portals Ausgabe übers. Leipzig 1782. 8. B. 1. S. 659.

Arterienöffnung, ostium arteriosum befindlichen (valvulae semilunares) das Blut in die Arterien hinaus, nicht aber in die Kammer zurückweichen lassen. Die erstere Oeffnung jedes Ventrikels, welche das Blut aus der Vorkammer in die Herzkammer hereinläßt, ostium venosum ventriculi, liegt am breiten Ende jedes Ventrikels in einiger Entfernung von der Scheidewand, und ist von einem mehr elliptischen als runden, dichtem und etwas harten Ringe umgeben. Die 2te Oeffnung, welche das Blut aus der Herzkammer in die mit ihr in Verbindung stehende Arterie hinausläßt, ostium arteriosum ventriculi, liegt am breiten Ende jedes Ventrikels dicht neben der Scheidewand, ist enger und kreisförmiger; die des rechten Ventrikels (der Lungenkammer) liegt ganz vorn, die des linken Ventrikels (der Körperherzkammer) dahinter.

Der wesentlichste Theil der Klappe an jeder Vorkammeröffnung ist eine ringförmige Falte oder Verdoppelung der innersten Haut des Herzens, welche von dem die Oeffnung umgebenden festen, aus verdichtetem Zellgewebe bestehenden Rande ausgeht, und in die Höhle der Kammer hineinhängt. Schneidet man daher die Kammer in der Nähe der Vorkammeröffnung von der Vorkammer ab, so hängt diese häutige Falte ungefähr wie ein Mützenfutter, das man aus einer Mütze herausgezogen hat, aus der Vorkammer herunter. Diese ringförmige Falte hat aber in beiden Kammern keinen geraden Rand, sondern ist durch ziemlich tiefe Einschnitte in mehrere mit einer stumpfen Spitze versehene Lappen getheilt. In der rechten Kammer sind ungefähr 3 größere Einschnitte, und man kann daher meistens 3 abgerundete, nicht gleich große Zipfel unterscheiden, welche aber zuweilen durch noch kleinere Einschnitte in noch mehr Lappen zerfallen, oder auch durch Vereinigung zweier Lappen auf 2 Zipfel reducirt werden. Der größte Zipfel liegt nach vorn zu, und ist so gestellt, daß er den in der Nähe des ostium venosum gelegenen Theil der Kammer von dem in der Nähe des ostium arteriosum befindlichen trennt. Man nennt gewöhnlich diese Klappe die dreizipfliche oder dreispitzige Klappe, valvula tricuspidalis. In der linken Kammer ist die häutige Falte der Klappe meistens nur durch 2 Einschnitte in 2 Hauptlappen oder Zipfel getheilt, die auch so gelegen sind, daß der eine den Zugang zur Körperarterie vom Eingange in den Ventrikel scheidet, und heißt die mützenförmige, valvula mitralis. An beiden Klappen kommen aber sehr häufig in der Gestalt und Eintheilung in Zipfel Abweichungen vor, woraus man sieht, daß es hierauf im Einzelnen so sehr nicht ankomme.

Weil nun aber die ringförmige Falte in die Kammer hereinhängt, und die Vorkammeröffnung nur einen Theil der Wand am breiten Ende der Kammer einnimmt, so bleibt an diesem Ende nothwendig ein Raum zwischen den Wänden der Kammer und der Falte übrig. Das in demselben befindliche Blut, das, wenn sich das Herz zusammenzieht, keinen hinreichenden Ausweg hat, drückt die Lappen des herabhängenden häutigen Ringes aneinander, und verschließt sich dadurch den Rückweg in die Vorkammer; damit nun aber die Gewalt des Blutes die Lappen

Digitized by Google

des häutigen Ringes aneinander, nicht aber etwa zurückdrücke, so gehen von der den Herzwänden zugekehrten Oberfläche des häutigen Ringes und von den Rändern der Zipfel viele, dem Anschein nach sehnige, unter einander verwobene Fäden aus, die sich zu minder zahlreichen, dickern Fäden vereinigen, und sich an den Seitenwänden der Herzkammern befestigen. Es bedurfte indessen noch einer besonderen Vorrichtung, damit diese Fäden den Zweck, die Zipfel der Klappe und den ganzen Ring zurückzuhalten, erfüllen könnten. Denn die Seitenwände der Herzkammern nähern sich während ihrer Zusammenziehung der oberen Wand, wodurch die an sie befestigten Fäden der Klappen erschlaffen müßten, und deßwegen in diesem Momente nicht geeignet sein würden, die Klappe zurückzuhalten, wenn die meisten Fäden nicht an kleine Fleischkegel (warzenförmige Muskeln, musculi papillares) befestigt wären, welche sich auf der innern Oberfläche des Herzens erheben und nach der Vorkammeröffnung hingekehrt sind.

Durch diese Fleischkegel wird bewirkt, daß die Fäden auch während der Zusammenziehung des Herzens immer hinreichend straff bleiben, denn um eben so viel, als die Wand der Ventrikeln bei ihrer Zusammenziehung der Vorkammeröffnung näher kommt, scheint sich gleichzeitig die mit den Fäden der Klappe verbundene Spitze jedes Fleischkegels durch die Zusammenziehung des Fleischkegels davon zu entfernen. Oft sind mehrere solche Fleischkegel oder Warzenmuskeln unter einander verwachsen. Die Fäden, welche von einem Fleischkegel ausgehen, erstrecken sich in den Einschnitt zwischen 2 Zipfel, nicht aber an die Spitze des Zipfels. Ihre Zahl, Größe und Lage ist in verschiedenen Herzen verschieden. Jeder Zeit sind sie aber im linken Ventrikel viel dicker und größer als im rechten. Dieses war auch nöthig, weil im linken, fleischigeren Ventrikel die Gewalt, mit welcher die Klappen gedrückt werden, größer ist. Daher sind daselbst auch die Haut der Klappe und ihre Fäden fester und dicker. Im rechten sind sie nicht so sehr unter einander verwachsen, und ragen noch freier in die Höhle hinein, unstreitig weil der eine große Zipfel sehr in der Mitte des Ventrikels liegt. Den sehnigen Fäden, welche sich von den Warzenmuskeln aus an der gewölbten Oberfläche der häutigen Zipfel ausbreiten, kommen andere kürzere entgegen, die an dem Umfange des Ostium venosum ihren Anfang nehmen. Auch diese Fäden sind zuweilen mit sehr kleinen Warzenmuskeln versehen.

Digitized by Google

Die Ränder der vier Oeffnungen, an welchen die Fleischfasern des Herzens mit freien Enden anfangen oder sich endigen.

Das Herz besteht zum Theil aus solchen Fasern, welche die Höhlen desselben kreisförmig oder spiralförmig umgeben und deren Anfang und Ende verborgen bleibt. Indessen giebt es auch 4 Stellen am Herzen, wo viele Muskelfasernbündel offenbar ihren Anfang nehmen. Diese 4 Stellen sind die Ränder der 2 Vorhofsöffnungen, ostia venosa, und der 2 Arterienöffnungen, ostia arteriosa, an dem breiten Ende der Herzkammern.

Der Rand der 2 Vorhofsöffnungen ist zugleich die Gränze der Vorhöfe und der Kammern. Ein großer Theil dieses Randes entsteht dadurch, daß sich zwischen den Herzkammern und Vorkammern eine quere, ringsherum gehende Einschnürung befindet, die von außen gesehen die Querfurche zwischen den Vorhöfen und Kammern, von innen betrachtet aber jenen ringförmigen Vorsprung bildet, an welchem die Vorhofsklappe ansitzt. In dem tiefsten Theile dieser Einschnürung liegt ein dichtes, hartes Zellgewebe, welches dem vorspringenden Ringe der Vorhofsöffnungen seine Festigkeit giebt, und in diesem Zellgewebe bemerkt man, wenn man von außen in die Einschnürung eindringt, 2 fast knorpelartige, gekrümmte Streifen, von denen der eine im hinteren, der andere im vorderen, durch die Körperarterie verdeckten Theile der Querfurche liegt.

Der vordere sowohl als der hintere knorplige Streifen geht von der Einschnürung, die die rechte Vorkammeröffnung bildet, zu der, welche die linke bildet, hinüber, und verbindet beide mit einander, und es giebt daher, wenn die Knorpelfäden sehr ausgebildet sind, in der Querfurche an jeder Seite nur eine Stelle, wohin diese knorpligen Streifen nicht reichen. Der vordere knorplige Streifen liegt da, wo der hintere Rand der Körperarterie an die Querfurche stößt. An beiden Seiten der Körperarterie hat er 2 dickere Stellen, die hinter derselben durch eine dünnere Fortsetzung zusammenhängen. Der hintere knorplige Streifen hat auch 2 dickere Stellen [1]), welche durch eine dünnere, oft kaum mehr wahrnehmbar mittlere Stelle unter einander verbunden sind. Indessen ist der knorpelartige Streif nicht bei allen Menschen so sehr ausgebildet. Wolff fand ihn selbst einmal sehr unvollkommen.

Das harte Zellgewebe, welches in dieser Furche liegt, und die knorpelähnliche Substanz unterbrechen die Fleischfasern des Vorhofs und der Herzkammer. Denn es gehen, wie schon oben bemerkt worden, keine Fleischfasern von den Vorhöfen über die Querfurche weg zu den Herzkammern hinüber. An diesem harten Zellgewebe befinden sich also Enden

---

[1]) Auf Soders Tafeln CXIII. Fig. 248 und 51.

[2]) *C. F. Wolff*, De textu cartilagineo cordis etc. Acta acad. sc. imp. Petropro anno 1781. Petropoli 1784. p. 211. — und in der von Soder veranstalteten Copie seiner Figuren CXIII. Fig. 2. 49. 48. 50. 51. 52.

Digitized by Google

von Muskelfaserbündeln, welche einerseits zu den Vorhöfen, andererseits zu den Ventrikeln sich erstrecken.

An dem Ausgange jeder Herzkammer in die mit ihm in Verbindung stehende große Arterie, ostium arteriosum ventriculi, stoßen an einer ringförmigen, etwas härteren Stelle die gelben Fasern der Arterien mit den Fleischfasern des Herzens zusammen. In dem zunächst angränzenden Stücke der Arterie befinden sich die 3 halbmondförmigen Klappen, valvulae semilunares, deren Einrichtung und Zweck schon S. 28 beschrieben worden ist. Sie bestehen in 3 neben einander liegenden, halbmondförmigen Falten der inneren Haut der Arterien, zwischen jeder dieser Falten und der Wand der Arterie befindet sich ein nach dem Herzen zu verschlossener Zwischenraum. So entsteht eine Tasche, die ihre offene Seite vom Herzen abwendet, und mit den Taschen verglichen werden kann, welche man inwendig in Kutschen anzubringen pflegt. Jede derselben ist in der Mitte am tiefsten, und läuft seitwärts in 2 Spitzen, cornua, aus, eine Form, die dadurch entsteht, daß die linienförmige Stelle, an welcher die Falte an der Arterienwand anhängt, Cförmig gekrümmt ist, und ihre convexe Seite nach dem Herzen zu wendet. Die Spitzen aller 3 Falten stoßen in 3 Punkten zusammen, die an dem kreisförmigen Umfange der Arterie wie die Winkel eines gleichschenklichen Triangels liegen. Der freie Rand jeder solchen Tasche erstreckt sich also von einem dieser Punkte zum andern, und hat in seiner Mitte eine kleine, aus Zellgewebe bestehende Verdickung, Nodulus Arantii. Zwischen den 2 Blättern jeder Falte liegt zwar etwas Zellgewebe, an dem man auch etwas Faseriges unterscheidet, was man aber nicht für Muskelfasern halten kann. Die Klappen nebst ihren Nodulis sind in der Körperarterie dicker und fester als in der Lungenarterie, und stehen also mit der großen Muskelkraft der linken Herzkammer und mit den dicken Wänden der Körperarterie im Verhältnisse. Die Wand der beiden Arterien ist an den 3 Stellen, an welchen sie die 3 Taschen bilden hilft, etwas auswärts gebogen, und es entstehen daher 3 Sinus derselben.

Ueber die Fleischfasern des Herzens im Allgemeinen.

Der Bau des Herzens deutet darauf hin, daß es sich in allen seinen Durchmessern ziemlich gleichmäßig, aber rücksichtlich der verschiedenen Höhlen mit verschiedener Kraft zu verengen bestimmt sei.

Denn es giebt keine parallelen geraden Faserlagen, die von einer bestimmten Stelle zu einer 2ten gehen; es giebt keine Punkte, die als punctum fixum, als Anfangs- oder Befestigungspunkt, und als punctum mobile, als beweglicher Endpunkt der Fasern betrachtet werden könnten.

Digitized by Google

An der Gränze zwischen den Herzkammern und Vorhöfen sind zwar die Fleischfasern durch eine aus hartem dichten Zellgewebe bestehende Linie unterbrochen, und es giebt also hier sichtbare Enden von Muskelfasern. Allein diese Linie, so wie der Rand der arteriösen Mündungen der Herzkammern, sind viel zu klein, als daß sich die unzähligen Fleischbündel des Herzens daselbst unmittelbar ansetzen könnten, und die Anstalten, welche die Natur bei andern Muskeln getroffen hat, um eine große Anzahl von Fleischfasern auf einen einzigen kleinen Befestigungspunkt mittelbar wirken zu lassen, Sehnenfasern, an deren Seite sich Muskelfasern anfügen, fehlen hier gänzlich, auch würde man sich sehr irren, wenn man die genannten Linien für unbeweglicher als andere Stellen des Herzens, und also für Stütz- oder Befestigungspunkte hielte. Bei dem Gegeneinanderwirken der Muskelfasern müssen sich die Bewegungen an manchen Stellen allerdings aufheben und diese Stellen dadurch zu unbeweglichen werden; allein, welche Stellen dieses sind, läßt sich mit Gewißheit nicht ausmitteln. Sehr wahrscheinlich findet dieses an einer Stelle der Scheidewand der Herzkammern Statt.

Gerade Muskelfasern bringen, wenn sie sich verkürzen, mittelst ihrer Enden eine Bewegung anderer Theile hervor, gekrümmte Muskelfasern dagegen wirken durch die Veränderung ihrer Krümmung mittelst ihrer ganzen Seite auf benachbarte Körper. Bei geraden Muskelfasern summirt sich die bewegende Kraft, die die Verkürzung der Faser in allen ihren Punkten hervorbringt, an den Enden, und diese müssen daher sehr befestigt sein. Eine muskulöse Faser, die ringförmig in sich selbst zurückläuft, bedarf dagegen keines Befestigungs- und Endpunktes. Der Ring wird nur kleiner, wenn sie sich zusammenzieht. Wenn sie aber auch keinen geschlossenen Ring darstellt, sondern wenn sich die Enden derselben seitwärts an benachbarte Fasern anlegen, und in deren Scheiden mit eingeschlossen werden, so wird dieses doch dieselbe Wirkung haben, und die Verbindung der Fasern wird leicht die nöthige Festigkeit erhalten, weil eine solche Faser mittelst vieler Punkte ihrer Seitenfläche, und nicht bloß mit ihrer Spitze einer andern Faser anhängt, zumal wenn sich nicht viele Fasern an der nämlichen Stelle, sondern die eine sich hier, die andere da, in einem Bündel von Fasern endigt, so daß das Bündel ohne Ende ist, während es doch selbst aus mit Enden versehenen Fasern besteht. Wenn man daher die Structur des Muskelgewebes des Herzens untersucht, so darf man nicht erwarten, wie bei den meisten andern Muskeln, einen Anfang und ein Ende der meisten Fasern nachweisen zu können. Eine hier überall sichtbare Einrichtung ist, daß aus der Scheide des einen Bündels Fasern in die Scheide des andern hinübergehen und aufgenommen werden, und dieser Uebergang und Umtausch der Fasern findet

Digitized by Google

nicht nur zwischen den größeren Bündeln Statt, sondern, wenn man die größeren Bündel in kleinere, und diese in noch kleinere zu zerlegen sucht, so findet man, daß ein solcher Umtausch und Zusammenhang noch zwischen haarfeinen Muskelfasern beobachtet wird. (Siehe Th. I. S. 406.) Diese Verschmelzung und Trennung benachbarter Bündel wiederholt sich aber so oft, daß, wenn ein Bündel eine Strecke fortgegangen ist, es fast unübersehbar wird, ob es noch Fasern von denen enthält, aus welchen es an einer andern Stelle bestand.

Aber die Muskelfaserbündel des Herzens verschmelzen nicht nur vielfach unter einander, sondern sie verflechten sich auch an mehreren Stellen. Dieses geschieht ganz vorzüglich an der äußern und an der innern Oberfläche. Zwischen den gespaltenen Bündeln dringen Fasern von der Oberfläche zu tieferen Lagen, und diese wieder an die Oberfläche. Hierdurch wird die Zerlegung des Fleisches des Herzens in mehrere abgesonderte Lagen, strata, sehr erschwert, und diese Zerlegung kann daher nur künstlich, indem ein Theil der Fleischbündel durchschnitten oder zerstört wird, bewirkt werden. Auch die zu einer Lage gehörenden Fasern gehen häufig über einander und unter einander weg. Diese Verflechtung und Verschmelzung der Fasern oberflächlicher und tiefer Lagen des Fleisches scheint den Nutzen zu haben, daß die verschiedenen Faserlagen bei einer gleich kraftvollen Zusammenziehung alle ihre Wirkung äußern können, und daß die tieferen Lagen durch die oberflächlicheren (welche bei ihrer Zusammenziehung dick werden) nicht etwa in eine solche Erschlaffung versetzt werden, welche ihre Zusammenziehung nutzlos macht. Weil nun aber die verschiedenen Lagen nicht einzeln für sich wirken, so war es auch nicht nöthig, daß sie sich an einander beträchtlich zu verschieben im Stande wären, und es liegt daher auch kein sehr lockeres Zellgewebe, welches eine solche Verschiebung begünstigt, zwischen ihnen. Man kann daher die Lagen der Muskelfasern und den Verlauf der Faserbündel nur sehr im Allgemeinen untersuchen.

Muskelfasern der Vorhöfe [1]).

Die Muskelfasern des Herzens überhaupt und also auch die der Vorhöfe, liegen zwischen der innern (von der Gefäßhaut), und der äußeren, (vom Herzbeutel gebildeten) Haut des Herzens. An den Vorhöfen, vorzüglich im rechten, ist die Lage der zwischen diesen Häuten liegenden Muskelfasern so dünn, daß sich beide Membranen in den Zwischenräumen der unter einander verflochtenen Muskelbündel nicht selten berühren. Nimmt man die äußere, vom Herzbeutel fortgesetzte Haut der Vorhöfe weg, so sieht man, daß äußerlich an ihrer vorderen Seite platte Bündel von Fasern befindlich sind, welche im Ganzen eine quere, zum Theil auch schiefe Richtung haben, und von

[1]) Ich werde mich hierbei durch Ziffern auf die Wolffschen Abbildungen beziehen, und zwar, weil die Originale nicht leicht Jedem zu Gebote stehen, auf die in Loders Gefäßlehre enthaltenen Copien.

Digitized by Google

denen ſehr viele ununterbrochen von einem Vorhofe zum andern übergehen [1]). Manche von dieſen Bündeln fangen aus der Querfurche zwiſchen den Ventrikeln und Atrien an. Auf der hinteren Seite der Vorhöfe findet man zwar wenigere, aber doch einige Bündel, welche von einem Vorhofe auf den anderen in ſchiefer oder in querer Richtung übergehen [2]). Die obere Stelle des linken Vorhofs, in welche ſich die 4 Lungenvenen begeben, iſt aber von queren Faſern umgeben, welche nur dem linken Vorhofe angehören, und ſich nicht auf den rechten erſtrecken [3]). Daſſelbe gilt von der oberen Stelle des rechten Vorhofs, in welche ſich die obere Hohlvene öffnet, und von einigen Bündeln an der hinteren Wand des rechten Vorhofs [4]). Diejenigen Bündel, welche dieſen Venen zunächſt liegen, umgeben den Anfang der Venen ſelbſt mit kreisförmigen oder ſchief herumgewundenen Faſern.

Unſtreitig giebt es zwiſchen jenen queren Faſern, die von einem Vorhofe zu dem andern übergehen, auch viele, welche zwiſchen beide Vorhöfe drängen und die Scheidewand der Vorhöfe bilden helfen; allein die Muskelfaſern ſind ſo ſehr unter einander verflochten, daß es ſchwer iſt, ſie weit zu verfolgen.

Diejenigen Bündel von Faſern, welche über den obern Theil der Vorhöfe hinweggehen, und alſo oben herum von der vorderen Seite zur hinteren Seite gelangen, liegen größtentheils von jenen queren Faſern bedeckt. Sie bilden keine beſondere Lage, ſondern ſind mit jenen queren und ſchiefen Faſern vielfach verflochten und verſchmolzen.

Mehrere Bündel, die dieſe Richtung haben, liegen hinten längs der Gränze der beiden Vorhöfe am linken Vorhofe [5]), andere ziehen ſich über dem rechten Vorhofe von hinten herauf, und äußerlich neben der Vena cava superior vorbei, und gehören dem rechten Vorhofe allein an [6]). Gerdy [7]) hat auch ein Faſcikel von Längenfaſern beſchrieben und abgebildet, welches ſich von hinten her mitten über den linken Vorhof zwiſchen den rechten und linken Lungenvenen hinaufbeugt und ſich oben auf die vordere Seite herumkrümmt.

Man ſieht leicht ein, daß die queren Faſern die Vorhöfe der Quere nach verengern und ſie gegen die Scheidewand preſſen, daß ferner die Längenfaſern ſie gegen das feſte Zellgewebe in der Querfurche, und alſo an die Kammern andrücken und anziehen, wozu wahrſcheinlich auch die eigene Zuſammenziehung der Scheidewand das ihrige beiträgt, und daß endlich die vielen Faſern, die eine ſehr mannichfaltige Richtung haben, und die erwähnten beiden Arten von Faſern unter einander vereinigen, ſowie die netzförmig verflochtenen Bündel, die dicht an der innern Haut der Vorhöfe befindlich ſind, eine gleichförmige Verengerung der Vorhöfe nach allen Richtungen hervorbringen. Die die Venen an ihrer Einmündung zunächſt umgebenden Kreisfaſern wirken vielleicht wie Schließmuskeln (Sphincteren).

---

1) Siehe *Loders* Tafeln, CXIII. Fig. 2. 91 bis 108.

2) *Loder*, CXIV. Fig. 1. 129. 130.

3) *Loder*, CXIV. Fig. 1. 160. 167. 168. 169, und die dazwiſchen liegenden Nummern, ſo wie auch CXIII. Fig. 2. 113. 114. 117. 112. 119. und die dazwiſchen liegenden Nummern.

4) *Loder*, CXIII. Fig. 2. 120. 121.

5) *Loder*, CXIV. Fig. 137. 138.

6) *Loder*, CXIV. Fig. 1. 164. 148.

7) *Loder*, CXIV. Fig. 1. 142. 143. 140. 146.

8) *Gerdy*, Recherches, discussions et propositions etc. à Paris 1823. 4. Fig. 8. mm. k. p. 28.

Digitized by Google

Einer besonderen Erwähnung bedürfen noch die Bündel von Fleischfasern, welche den Herzohren eigenthümlich sind. Sie sind vorzugsweise sehr unter einander verflochten, und zeichnen sich durch ihre rundliche, nicht platte Form aus, und springen daher auch, wenn man die aufgeschnittenen Herzohren von innen betrachtet, sehr in die Augen, und machen die innere Oberfläche derselben uneben.

Allgemeine Beschreibung der Muskelfasern der Kammern.

An den Vorkammern haben, wie wir so eben gesehen haben, die Fleischbündel während ihrer Zusammenziehung die Wirkung, daß die Vorkammern sowohl an die in den Ventrikel führenden Ausgänge angedrückt, als auch der Quere nach zusammengeschnürt werden, und zwar theils durch Fasern, welche beiden Vorkammern gemeinschaftlich zukommen, theils durch solche, welche jeder eigenthümlich sind. Die Verflechtung und Verschmelzung der Fleischbündel hat zugleich den Nutzen, daß das gedrückte Blut, das nach allen Richtungen auszuweichen strebt, die innere Haut des Herzens nicht zwischen den Muskelfasern auswärts dränge, und daß die Vorkammern ziemlich gleichmäßig in allen Richtungen verengert werden können.

Die fleischigen Wände der Herzkammern sind viel dicker. Die Fleischbündel derselben gehen theils von einem Ventrikel auf den andern über, und gehören also 2 Ventrikeln zugleich an, theils sind sie einem Ventrikel eigenthümlich. Die ersteren sind von den letzteren nicht völlig geschieden, sondern beide an einigen Stellen verflochten. Die gemeinschaftlichen Fasern beider Ventrikeln liegen an der Oberfläche, und sind links gewunden, sie laufen am linken Ventrikel mehr der Länge nach, am rechten mehr der Quere nach. Sie concentriren sich am linken Ventrikel an der Spitze, beugen sich daselbst in die Höhle hinein, und hängen dort mit den innersten, netzförmig verflochtenen, an der Höhle des linken Ventrikels gelegenen Fasern zusammen, welche gleichfalls mehr der Länge nach laufen. Zwischen ihnen und diesen netzförmigen Fasern liegt eine 2te Classe von Fasern, die auch schief, aber mehr der Quere nach verlaufen, sich einander durchkreuzen, und den mittelsten Platz in der Dicke der Wände des linken Ventrikels einnehmen. An den Längenfurchen, vorzüglich an den der converen Seite des Herzens gelegenen, scheinen manche tiefere Fasern an die Oberfläche, und manche oberflächliche in die Tiefe zu dringen, und hier sind also manche Bündel der gemeinschaftlichen Fasern mit den der besonderen Fasern verflochten. Im Allgemeinen kann man aber doch vom Herzen behaupten, daß ein dünnwandiger und ein dickwandiger, von eigenthümlichen Fasern gebildeter Ventrikel neben einander liegen, da, wo sie sich berühren, eine Scheidewand bilden,

Digitized by Google

und in einer äußern, beiden gemeinschaftlichen Lage schiefer Fasern eingehüllt sind. Am breiten Ende der Ventrikeln, wo die Höhle am weitesten ist, ist auch die Wand am dicksten, am spitzen Ende dagegen am dünnsten, unstreitig aus dem nämlichen mechanischen Grunde, aus welchem diejenigen Herzen der Thiere, die eine kleine Höhle haben, auch weniger dicke Wände besitzen, als die welche eine weite Höhle haben.

Die Einrichtung, daß die Fasern auch hier so verschiedene Richtungen haben und unter einander verwebt und verschmolzen sind, hat denselben Nutzen, der rücksichtlich der Vorkammern so eben angegeben worden ist. Allein die große Menge von übereinander liegenden Fasern scheint hier noch die von mir beschriebene besondere Anordnung der verschiedenen Lagen nothwendig gemacht zu haben. Denn man sieht leicht ein, daß, wenn sehr viele Lagen von Cirkelfasern an den Herzkammern über einander gelegen hätten, und äußerlich von Längenfasern umgeben worden wären, die tieferen Lagen durch die Zusammenziehung und durch das damit verbundene Dickerwerden der äußeren Lagen nach innen gebogen, und dadurch abgespannt und unfähig gemacht worden sein würden, durch ihre Zusammenziehung den Druck zu vergrößern, den die Herzkammern auf das Blut ausüben. Diesem Nachtheile ist aber dadurch, wie es scheint, vorgebeugt worden, daß die schiefen Fasern des Ventrikels, welche mehr eine quere Richtung haben, und vollständige oder unvollständige Ringe bilden, zwischen jenen 2 Lagen von Längenfasern liegen, und unten an der Spitze eine Oeffnung übrig lassen, durch welche die 2 erwähnten Lagen von Längenfasern unter einander zusammenhängen. Denn die nahe an der Höhle liegenden netzförmigen Fasern, bei welchen die Richtung nach der Länge vorherrscht, werden durch die sich zusammenziehenden Querfasern nicht nur abgespannt, sondern im Gegentheile noch mehr gespannt, und umgekehrt, hindern sie auch die mehr der Quere nach laufenden Fasern ganz und gar nicht, ihre Wirkung zu thun, sondern sie ziehen dieselben näher an einander und verengern die Höhle durch die Verkürzung des Herzens. Am rechten Ventrikel, an welchem es nur eine Lage Fasern giebt, die sich sehr der Richtung der Länge nähert, liegt diese unstreitig aus demselben Grunde inwendig, und ist daselbst von 2 Lagen schiefer Fasern umgeben, welche sich sehr der queren Richtung nähern. Jeder Ventrikel hat also solche 2 Lagen schiefer Fasern, die sich sehr der queren Richtung nähern, und vollkommene oder unvollkommene Ringe bilden, und diese 2 Lagen durchkreuzen sich, und nur wenige Fasern liegen ganz quer.

Specielle Beschreibung der Muskelfasern der Herzkammern.

Entblößt man die Herzkammern von dem vom Herzbeutel zu ihnen übergehenden Ueberzuge, so werden linksgewundene Bündel von Fleischfasern, die

Digitized by Google

die oberflächliche Lage ausmachen, sichtbar, d. h., Fasern, die, man mag nun das spitze Ende des senkrecht aufgestellten Herzens nach unten oder nach oben kehren, und man mag das Herz so aufstellen, daß uns die platte oder die gewölbte Seite desselben zugekehrt ist, immer, wenn man sie von unten nach oben verfolgt, sich von unserer rechten Hand zu unserer linken in die Höhe krümmen [1]). Am linken Ventrikel geht dabei die Richtung der Fasern weniger quer, als am rechten, und am rechten selbst wieder ist sie an der platten Seite noch mehr quer, als an der converen [2]). Am linken Ventrikel sind die Fleischbündel dieser ersten Lage rundlicher, und unterscheiden sich dadurch von den Faserbündeln der tieferen Lagen desselben Ventrikels, die, mit Ausnahme der an der Höhle gelegenen netzförmigen, platt sind. Diese Lage ist übrigens dünn, denn schon in einer sehr geringen Tiefe ändert sich die Richtung der Fleischfasern nach meinen Untersuchungen sehr beträchtlich.

An der Längenfurche, welche an der gewölbten Oberfläche [3]) die inwendig liegende Scheidewand der Herzkammer andeutet, gehen, nach Wolff und nach meinen eignen Untersuchungen, manche Bündel deutlich von der rechten Kammer auf die linke ununterbrochen über, und es besteht also diese Lage zum Theil aus Fleischfasern, welche beiden Kammern gemeinschaftlich angehören. Manche machen in der Furche eine kleine Biegung, setzen aber dann ihren Weg fort. An einigen Stellen aber scheinen hier auch Fasern der rechten und linken Kammer in die Tiefe zu dringen, indem sie sich wie in einander geschobene Finger durchkreuzen. Auch bemerkt man in der Furche einen festen Zusammenhang der neben einander liegenden Fasern, der es sehr erschwert, sie weiter zu verfolgen. Dieses letztere findet auch in hohem Grade in der an der platten Seite gelegenen Längenfurche statt, wo es Wolffen aus diesem Grunde weit schwerer wurde, die Fasern von einem Ventrikel auf den andern zu verfolgen. Vielmehr findet man nach Wolff selbst einige der Länge der Furche nach verlaufende Bündel, welche mit den tief gewundenen verschmelzen [4]). Ich habe die Lage der Muskelfasern des Herzens, nachdem ich es besonders dazu zubereitet hatte [5]), wiederholt untersucht, und habe an der hinteren Längenfurche keine solche Fasern, wie sie Wolff abbildet, verlaufen gesehen, und vielmehr gefunden, daß die Fasern weit leichter auch die hintere Längenfurche vom einen Ventrikel zum andern, als auf der hinteren Oberfläche verfolgt werden konnten.

Es ist noch nicht gehörig bestimmt, wie viele von den Fleischbündeln an den Längenfurchen zur Scheidewand dringen und wie sie sich in derselben verhalten.

---

[1]) Ich folge hier dem in der Mechanik üblichen Sprachgebrauche: der Mechaniker stellt die Schraube, deren Windung er beschreiben will, senkrecht vor sich hin, gleichviel, ob der Schraubenkopf nach oben, oder abwärts gekehrt ist. Er sieht nur, wie der Theil der Schraubenwindung, den er sehen kann, läuft, wenn er ihn von unten nach oben mit den Augen verfolgt. Bei den im Handel gewöhnlich vorkommenden Schrauben läuft er von der Linken nach der Rechten des Beschauenden, und man nennt sie daher rechtsgewunden. Nach demselben Grundsatze bestimmt man die Windung der Schnecke des rechten und linken menschlichen Ohrs. Wenn man aber, wie Wolff, diejenige Windung rechts nennt, die von unten nach der rechten Seite des Leichnams hinaufgeht, dem das Herz gehört, und wenn man demnach die Fasern, welche auf der converen Seite liegen, als in entgegengesetzter Richtung gewunden betrachtet, als die, welche auf der platten Seite befindlich sind, so kommt man in die Gefahr, sich zu verwirren und mißverstanden zu werden. Ich werde daher bei der Beschreibung der Windungen der Herzfasern die Worte rechts und links nicht auf den Leichnam, sondern auf den Beschauenden beziehen.

[2]) *Loder*, CXIII, CXIV und CXV. Fig. 1. und 2.

[3]) *Daselbst*, CXIII, Fig. 1. und 2. CXIV. Fig. 2.

[4]) *Daselbst*, CXIV, Fig. 1. CXV. Fig. 2.

[5]) Ich füllte 2 frische Menschenherzen mit einer aus gekochtem Leinöl, gemeinem Terpentin und Mennige zusammengesetzten Masse an, welche die Eigenschaft hat, bei ihrer Bereitung im kalten Zustande flüssig zu sein, und in Kurzem sehr fest zu werden. Diese Herzen ließ ich 24 Stunden und länger kochen, indem ich, so bald als möglich, den vom Herzbeutel stammenden Ueberzug des Herzens hinwegnahm. Nachdem das Fett und das Zellgewebe großentheils entfernt worden waren, zergliederte ich die Muskelfaserlagen, die noch eine große Festigkeit hatten.

Aber so viel ist gewiß, daß weder alle zur Scheidewand gehen, noch daß si alle von einem Ventrikel auf den andern fortsetzen, und daß man sich also wed die 2 Ventrikel als 2 Behälter denken dürfe, von welchen jeder nur von sein eigenen Fleischfasern umwunden, und welcher nur an der Seite, wo er mit de andern zusammenstößt, an ihn angewachsen wäre, noch daß die äußere Lage v Fleischfasern eine beiden Ventrikeln völlig gemeinschaftliche dünne Schale bild welche die von ihren besondern Fleischfasern umgebenen 2 neben einander liegend Ventrikel einschließe, und keine Fasern enthalte, die zur Scheidewand übergin und nur einem Ventrikel angehörten.

Die Scheidewand der Ventrikeln ist bei weitem nicht so dick, wie die S tenwände derselben zusammengenommen, was der Fall sein würde, wenn je Ventrikel ringsum von einer gleichdicken fleischigen Wand umgeben wäre, w beide mit ihrer einen Wand an einander stießen. Da aber beide Ventrikel äu lich von einer ihnen großentheils gemeinschaftlichen Fleischfaserlage umgeben si so trägt diese wenig dazu bei, die Scheidewand dick zu machen.

Der Theil der Scheidewand, welcher dem rechten Ventrikel zugekehrt und von den fortgesetzten Fasern des rechten Ventrikels gebildet wird, ist m meinen Untersuchungen äußerst dünn, viel dünner als die Wand des rechten V trikels. Er besteht nur aus netzförmig verflochtenen Fasern, und selbst diese nicht allein von fortgesetzten Muskelfasern des rechten Ventrikels gebildet, s dern es gehen an der vorderen Längenfurche Muskelfasern des linken Ventrik in diesen Theil der Scheidewand über, und hängen sogar mit dem quer durch Höhle des rechten Ventrikels laufenden Fleischbündel zusammen. In der R der hinteren Längenfurche aber gehen die eignen Muskelfasern des rechten V trikels in diesen Theil der Scheidewand über.

Was die Enden der Fasern dieser oberflächlichsten Lagen von Fleisch langt, so sind viele derselben in der queren Gränzfurche zwischen Ventrikeln a Atrien an dem ans härterem Zellgewebe und aus knorpelähnlicher Materie beste den Ringe und an den Rändern der 2 Arterienöffnungen angeheftet. Viele komm aber auch aus der Längenfurche hervor, ohne daß man ihr Ende nachweisen kann.

Die Lungenarterie sitzt mit ihrem Anfange auf einer hohlen, kegelförmig fleischigen Verlängerung des rechten Ventrikels auf, welche zum Theil aus kr förmigen, etwas schief liegenden Fasern besteht [1]). Am breiten Ende des Herz erstrecken sich manche Fasern in die Zwischenräume, welche zwischen den hier befindlich 4 Oeffnungen, den 2 Vorhofsöffnungen und den 2 Kammeröffnungen befindlich sind.

An der Spitze der linken Herzkammer bilden die Fasern dieser äußeren L eine Art von Wirbel oder Mittelpunkt [2]). Durch eine Oeffnung, welche die b zu beschreibende 2te Fleischlage an dieser Stelle hat, schlagen sich vielleicht man von den hier zusammengekommenen Fasern der ersten Lage nach innen hinein, u gelangen dadurch an die innere Oberfläche, wo sie eine entgegengesetzte Richtu von dem spitzen nach dem breiten Ende, anzunehmen scheinen, sich aber wegen vielfachen Verflechtung sehr schwer verfolgen lassen. (Jener Verlauf findet in der Untersuchung mehrerer, unten genannter Anatomen Statt, nach Wo setzt sich die einen Wirbel bildende oberflächliche Lage an diesem Loche fest [3]), d die nächsten Fasern der 2ten Lage [4]) schlagen sich in das Loch hinein.) Es ma übrigens in der Wirkung keinen großen Unterschied, ob die sehr der Länge n laufenden Fasern der äußeren Oberfläche wirklich in die innere Oberfläche unun brochen übergehen, oder ob sie unten an der Seite des Herzens nur unter ander verwachsen sind. Die Fasern des rechten Ventrikels bilden an der Spitze selben keinen solchen Wirbel, sondern gehen theils an der vorderen Längenfurche Spitze des linken, theils an der hinteren Längenfurche in die Scheidewand rechten Ventrikels über.

Ich habe bis jetzt die äußerste Lage der Fleischfasern der Kammern besch ben. Nun wende ich mich sogleich zur Beschreibung der allerinnersten L

---

[1]) *Loder*, CXIII. Fig. 1, 48, 53. Fig. 2, 63, 58. CXIV. 42—47, 61, 62. CXVI. Fig. 2, 3—5, 6—11.

[2]) *Daselbst*, CXIII. Fig. 1, 151, 152. Fig. 2. vorzüglich deutlich CXIV. Fig. 19. 136—151. CXV. Fig. 2. 125.

[3]) *Daselbst*, CXVI. Fig. 3, 47, 48.

[4]) *Daselbst*, CXVI. Fig. 3, 46. Fig. 1, 88, 89.

Digitized by Google

welche mit der inneren Haut des Herzens in Berührung ist, und werde dann erst die zwischen diesen beiden Lagen befindlichen mittleren Lagen beschreiben. Die innerste Lage der Fleischfasern des rechten und des linken Ventrikels besteht aus netzförmig unter einander verflochtenen rundlichen Faserbündeln, die theils die Seitenwände überziehen, und an ihnen im Ganzen mehr der Länge nach verlaufen, theils aber auch nicht selten an der Spitze als ringsum freie Bündel von einer Wand zur gegenüberliegenden gehen, und die Spitze in viele kleine Zellen theilen. Sie werden von der sehr dünnen und durchsichtigen Haut des Herzens überzogen, die sich in die von ihnen gebildeten Zwischenräume hineinschlägt. Sie hängen mit den in die Höhle der Herzkammern hervorragenden Warzenmuskeln zusammen, deren bei der Beschreibung der Klappen Erwähnung geschehen ist. In der linken Herzkammer ist diese innerste Lage weit dicker als in der rechten, aber in der rechten giebt es in der Nähe der Spitze mehr querüber durch die Höhle des Ventrikels gehende freie Fleischbündel.

Zwischen der äußersten Lage, welche beide Herzkammern größtentheils gemeinschaftlich überzieht, und der innersten netzförmigen Lage, befindet sich an der rechten Herzkammer eine einzige dünne Lage, an der linken Herzkammer aber eine dicke Fleischlage, welche sich nach Wolff[1]) in 3 bis 4 Lagen theilen läßt. Die Fasern, von welchen sie gebildet wird, erstrecken sich meistens nicht von der einen Kammer auf die andere hinüber, sondern gehören, so wie die der innersten Lage, jedem der beiden Ventrikel einzeln an. Da die Fleischfasern des linken Ventrikels, welche an der Oberfläche linksgewunden und sehr der Länge nach hinaufsteigen, in den tieferen Lagen allmählig eine fast quere, zugleich aber noch immer links gewundene, dann nach und nach eine fast quere rechtsgewundene, hierauf eine rechtsgewundene und sehr der Länge nach gehende Richtung annehmen, und noch tiefere Fasern endlich fast gerade der Länge nach verlaufen, übrigens keine Grenzen, namentlich keine Lagen von Zellgewebe zwischen den verschiedenen Schichten bemerklich sind, so hängt es sehr von der Willkühr ab, wie viel verschiedene Lagen man an dieser mittlern Lage unterscheiden will, und es ist folglich darauf kein großes Gewicht zu legen.

Durchschneidet man bis zu einer gewissen Tiefe die oberflächlichste Lage der Fleischfasern des rechten Ventrikels und schält dieselbe gewissermaßen ab, was freilich nur mit einiger Gewalt und mittelst des Durchschneidens mancher an der Oberfläche in die Tiefe dringender, und aus der Tiefe an die Oberfläche gehender Fleischbündel gelingt, so entblößt man am rechten Ventrikel die mittlere Lage von Fasern[2]), die durch die Richtung ihrer Muskelfasern von der äußern unterscheidbar ist. Die Fleischfasern verlaufen nämlich an ihr ziemlich in Quere nach, zugleich aber meistens etwas rechtsgewunden, während die der äußeren Lage fast quer verlaufen, und zugleich linksgewunden sind. Die Lage dieser Fasern ist am linken Ventrikel sehr viel dicker, als am rechten. Sie besteht an rechten nicht einmal die ganze Oberfläche, sondern an manchen Stellen kommen die netzförmig verflochtenen Muskelfasern zum Vorschein[3]), welche die innerste Lage bilden; an vielen Stellen findet ein offenbarer Zusammenhang dieser innersten Lage mit der mittleren Statt. Daher kommt es auch, daß man, wenn man nach dem Beispiele Winslows die beiden Herzkammern von einander natürlich absondern und lostrennen, und dabei so wenig Fasern als möglich durchschneiden will, man den größten Theil der Scheidewand der Herzkammern am linken Ventrikel zurücklassen muß.

Am linken Ventrikel kann man das zwischen der äußersten und innersten Fleischlage gelegene Fleisch etwa in 3 Lagen theilen, 1) in die, welche auf die äußerste Lage zunächst folgt, und eben so wie sie linksgewunden hinaufsteigt,

[1]) *C. F. Wolff*, Diss. VII. De stratis fibrarum in universum; Nova Acta Acad. sc. imp. Petrop. Tomus III. ad annum 1785. Petropoli 1788. p. 227. — Diss. de fibris mediis fibrarum ventriculi dextri. Nova acta sc. imp. Petrop. ad annum 1786. Petropoli 1789. p. 211 und 242; ferner Diss. X. De strato secundo fibrarum ventriculi sinistri. Nova acta ad ann. 1788. Petropoli 1790. p. 217.

[2]) *Loder*, CXVI. Fig. 1 und 3.

[3]) *Daselbst*, CXVI. Fig. 1, 48. 49, 50, 53. 60. 65.

Digitized by Google

aber zugleich eine fast quere Richtung hat; 2) in eine 2te Lage, welche wie di vorige eine fast quere Richtung hat, aber entgegengesetzt rechtsgewunde hinaufsteigt; 3) in eine 3te Lage, welche wie die vorige rechtsgewunden i aber eine sehr der Länge nach gehende Richtung hat, und sich mittelst ihr innersten Fasern mit den netzförmigen Fasern vermischt, die von der inneren Ha des Herzens überzogen werden. Die fast querlaufenden Fasern lassen an d Spitze des linken Ventrikels eine Oeffnung, und es scheint, wie gesagt, als s sich hier einige Fasern gegen die Höhle des Ventrikels hineinschlügen, und sie daselbst mit den der Länge nach verlaufenden Fasern vermischten.

Die erwähnte 3te Lage, die sehr eine Richtung der Länge nach hat [1]), ge dem rechten Ventrikel gänzlich ab, und auch am linken Ventrikel bede sie vorn nur die 2 oberen Drittel, hinten nur ¼ der Oberfläche.

Alle diese Lagen zusammengenommen geben den Wänden der Ventrikel ei solche Gestalt, daß sie da dicker sind, wo die Höhle der Ventrikel weiter ist, u da allmählig dünner werden, wo die Höhle der Ventrikel enger wird, nämli nach der Spitze zu. Und so wie ein kleineres Herz eines Thiers dünnere, e größeres, z. B. das eines Pferdes, dickere Wände hat, und also die Dicke d Wände der Größe der Höhle proportional zu sein scheint, so ist auch die Wa an einer und derselben Höhle an den Stellen dünner, wo die Höhle enger ist.

Uebersehen wir nun das, was über die Lagen der Muskelfasern d den Herzkammern gesagt worden ist, noch einmal, so bemerken wir:

1) daß es am Herzen keine oder sehr wenige vom breiten En gerade zur Spitze herabsteigende, und daß es nur wenig genau querer Richtung verlaufende Fasern gebe. Daß vielmehr die meist Fasern mehr oder weniger schief gehen;

2) daß die oberflächlichste Lage die einzige sei, die deutlich beiden Ve trikeln zugleich angehöre, indem sich viele ihrer Fasern von dem einen a den andern begeben, daß sie aber da, wo sie den rechten Ventrikel um giebt, mehr eine quere, da, wo sie den linken umgiebt, mehr ei schief vom spitzen zum breiten Ende gehende Längenlage bilde;

3) daß demnach der rechte Ventrikel 2 fast quere Lagen (die ob flächlichste und die mittlere) besitze, von denen die äußere links, die 2 rechts emporgewunden ist, daß der viel fleischigere linke Ventrikel äuß lich von Fasern umgeben werde, welche mehr eine Richtung nach Länge als nach der Quere haben (oberflächliche Lage), daß aber un ihr 2 viel dickere, fast quer laufende Lagen (mittlere Lagen) folg deren Ringe in der Nähe des Ostium arteriosum den kleinsten Dur messer haben, von welchen die äußere Lage links, die innere rechts wunden ist, und daß hierauf inwendig noch eine Lage Muskelfas folge, die sich der Längenrichtung sehr annähert und rechtsg wunden ist, und daß folglich die Querfasern des linken Ventrik (die 2 mittleren Lagen) zwischen 2 Lagen von Längenfasern in

[1]) Es ist zu bedauern, daß die Lagen der Muskelfasern des Herzens, welche W beschreibt, von der 3ten an nicht durch Kupferstiche erläutert worden sind. Nach Anmerkung Wolffs, Nova acta acad. sc. imp. Petrop. Tom. III. ad ann. 1 Petropoli 1788. p. 236, hat Wolff die Zeichnungen dazu geliefert und der demie übergeben. Es wäre zu wünschen, daß die Bekanntmachung derselben nachträglich erfolgte.

Digitized by Google

Mitte liegen, von denen die oberflächliche Lage der Längenfasern links gewunden, die innere Lage von Längenfasern rechts gewunden ist;

4) daß endlich beide Ventrikel an ihrer innern Oberfläche netzförmig verflochtene Fasern (die innerste Lage) besitzen, bei welchen die Längenrichtung vorherrscht, und die mit den Warzenmuskeln der Klappen in Verbindung stehen. Aus dieser Darstellung sieht man ein, daß der rechte Ventrikel sowohl rechtsgewundene als auch linksgewundene, fast quere Fasern besitze, und daß bei dem linken Ventrikel nicht nur dasselbe Statt finde, sondern daß er auch 2 Lagen von sehr der Länge nach gehenden Fasern besitze, die nach entgegengesetzter Richtung gewunden sind. Daß der linke Ventrikel viel mehr Querfasern als Längenfasern, und viel mehr Querfasern als der rechte Ventrikel besitze, und daß er auch die Längenfasern vor ihm ganz voraus habe. Endlich, daß die an der äußeren Oberfläche des Herzens und die an der inneren Oberfläche desselben gelegenen Faserbündel durch eine Theilung derselben in Aeste verflochten und verschmolzen sind, und zum Theil eine mehr cylindrische Gestalt haben, während dagegen die in der Mitte gelegenen weniger ästig, und vielmehr platt sind.

Am rechten Ventrikel kann man demnach 3 Lagen von Fasern unterscheiden:

1) die oberflächliche Lage aus fast queren linksgewundenen, platten und ästigen Bündeln;
2) die mittlere Lage aus fast queren, rechtsgewundenen platten;
3) die innerste netzförmige Lage aus rundlichen, mehr nach der Länge laufenden ästigen Fasern bestehende.

Am linken Ventrikel kann man mit Wolff 5 Lagen von Fasern annehmen:

1) die oberflächliche Lage aus mehr der Länge nach laufenden, linksgewundenen, rundlichen, ästigen Strängen bestehende;
2) die mittlere Lage aus fast queren, linksgewundenen platten;
3) die auch zur mittlern Lage gehörige, aus fast queren rechtsgewundenen;
4) die innere Lage aus mehr der Länge nach laufenden, rechtsgewundenen platten;
5) die innerste Lage aus netzförmigen, verflochtenen, ästigen, rundlichen, meistens mehr die Längenrichtung habenden Fasern bestehende und in die Warzenmuskeln übergehende.

Vereinigt man nun die hier mit 2 und 3 bezeichneten Querfasern unter einem Namen, so erhält man nur 4 Lagen; theilt man dagegen die mit 5 bezeichnete innerste Lage in 2, so kann man sogar 6 Lagen unterscheiden, ohne in seiner Meinung abzuweichen. Wolff nimmt 5 bis 6 Lagen an.

Digitized by Google

In den wesentlichen Punkten stimmen die Beschreibungen mehrerer Anat
men, die sich mit der Structur des Herzens beschäftigt haben, Lancisi's
Winslow's, Glasse's, Senacs, Hallers, Wolffs, Gerdy's u
meine eigenen Beobachtungen sehr gut überein, und versteht man unter fibr
rectis Fasern, welche sich der Längenrichtung nähern, und unter fibris spira
similes gewundene Fasern, die sich der queren Richtung nähern, so vereinigen si
auch damit die Beschreibungen des Borellus und des Lower [1]), die alle
Andern hierin vorangegangen sind.

Alle diese Anatomen nehmen am linken Ventrikel äußere, mehr der Läng
nach laufende, mittlere, mehr quere, innere netzförmige, wieder mehr d
Länge nach laufende Fasern an.

Senac's Beschreibung der Muskelfasern des Herzens stimmen in der Haup
sache auch mit der von Wolff gegebenen überein, wie schlecht auch die er
ihm gegebenen Abbildungen sind. Denn am rechten Ventrikel erkannte Sena
3 Lagen äußere, von der Basis zur Spitze schief, und nach der linken Sei
des Herzens zu herübersteigende, die sich aber der queren Lage mehr nähern, a
die des linken Ventrikels, mittlere, die auch eine sehr quere Lage haben, ab
entgegengesetzt als die vorigen gewunden sind, und endlich innere netzförmig
Am linken Ventrikel steigen, nach Senac, die oberflächlichen Fasern vorn a
der Grundfläche zur Spitze nach der linken Seite des Herzens zu herab, d
nächsten tiefer liegenden Lagen behalten diese Richtung bei, nehmen aber immer
mehr und mehr, und endlich ganz die quere Lage an. Die noch tiefer liegend
werden wieder von neuem schief, aber in entgegengesetzter Richtung, und netzwe
je tiefer sie liegen, desto mehr eine von der Spitze zur Basis gehende Längenrich
tung an, und die innersten bilden dann endlich die netzförmig verflochtenen Bü
del, die man trabeculae carneae nennt [2]).

Unsere Kenntniß vom Baue des Herzens würde nun aber no
vollständiger sein, wenn wir den Verlauf der Fasern und di
Lagen, die sie bilden, nicht nur an den Seitenwänden, sondern au
an der Scheidewand genau kennten. Aber gerade die fibröse Struc
tur der Scheidewand ist von vielen Anatomen oberflächlicher untersuch
und sogar von dem genauesten Beschreiber der Herzfasern, von Wolf
ganz mit Stillschweigen übergangen worden.

Ich fand bei der von mir gemachten Untersuchung der Herzfaser
daß von der Scheidewand der Herzkammern nur eine sehr dünne La
dem rechten Ventrikel angehöre, eine Lage, die sehr viel dünner ist, a
die Seitenwände des rechten Ventrikels; denn wenn ich die Fleischfase
der Scheidewand von der Höhle des rechten Ventrikels aus abzuzieh
anfing, so gehörten nur eine sehr dünne Lage netzförmiger und sehr weni
rechts gewundene Fasern dem rechten Ventrikel, und unter ihnen folgt
sogleich Fasern, die dem linken Ventrikel angehörten und der Länge na
und etwas linksgewunden verliefen; dann folgten eine dicke Schic
schief, aber zugleich sehr quer verlaufender Fasern, bis endlich zuletzt
netzförmigen innersten Fasern des linken Ventrikels sichtbar gema
wurden. An der vorderen Längenfurche sieht man sogar, wie ich sch
an einer andern Stelle bemerkt habe, gar keine Fasern von der Ob

---

[1]) Borelli und Lowers Beobachtungen, siehe in Haller: De part. corp. hu
praecip. fabrica et functionibus. Lib. IV. Sect. 3. §. 22.

[2]) Sénac, Traité de la structure du coeur, seconde édit. à Paris 1774. 4. Tome
Tab. X et XI.

Digitized by Google

fläche und von der mittleren Lage des rechten Ventrikels sich zur Scheidewand desselben begeben, wohl aber die netzförmigen Fasern derselben ununterbrochen mit der 2ten Lage des linken Ventrikels zusammenhängen. Die dem linken Ventrikel angehörenden Fasern der Scheidewand lassen sich leicht von einander abziehn, und sie sind also in der Tiefe nicht so unter einander verflochten, wie an der Oberfläche in der Längenfurche, und gehen auch nicht wie da quer durch die Scheidewand.

Obgleich es ziemlich leicht ist, die beschriebenen Faserlagen des Herzens zu erkennen, so ist es doch sehr schwer, zu sagen, in welchem Zusammenhange sie unter einander stehen, z. B. ob die inneren, ziemlich der Länge nach verlaufenden Fasern des linken Ventrikels eine Fortsetzung der äußern, ziemlich der Länge nach verlaufenden Fasern sind, und welche Faserbündel-Cirkel, welche vielleicht Spiralen bilden u. s. w. Vieles, was hierüber geäußert worden ist, ist Vermuthung, und nur an einzelnen Stellen gelingt es, diesen Zusammenhang zu entwickeln.

Was die Frage anlangt, ob vielleicht die an der äußeren und an der inneren Oberfläche des linken Ventrikels verlaufenden Fasern, die sich der Längenrichtung nähern, sich unter einander verbinden, so ist schon lange bekannt, daß ein großer Theil der an dem breiten Ende der Ventrikel entspringenden, über den linken Ventrikel weggehenden Fasern unten an der Spitze des linken Ventrikels zusammenkommen und daselbst eine Art von Wirbel bilden. Es ist auch bekannt, daß die mittlere Lage von Herzfasern daselbst ein von gebogenen Fasern umgebenes Loch übrig läßt. Schon Borellus und Lower[1]), Lancisi[2]) und

---

[1]) Ich setze hier das her, was Haller sehr kurz und deutlich von dem Resultate ihrer Untersuchungen über den Bau des Herzens anführt (De partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus, Lib. IV. Sect. 3. §. 22.) Wenn man unter fibris rectis solche die sich von der Längenrichtung unter fibris spirae similes solche, die sich der queren Richtung nähern, versteht, so stimmen diese Beobachtungen ziemlich gut mit den der neueren Anatomen überein: »docuerat, fibras nempe rectas a basi ad mucronem euntes et in caveas ventriculorum reflexas: tum duo alia strata fibrarum, quae ad spirae modum ad mucronem descendunt, postquam secum sui similibus decussarunt, et partim columnas interni cordis effecerunt et partim ad basin redierunt.

[2]) Die Resultate der Untersuchungen des Lancisi an frischen, an gekochten und an in Essig macerirten Herzen, welche mit den Beobachtungen Wolffs und mit den meinigen sehr gut übereinstimmen, setze ich in einem kurzen Auszuge hierher, bei welchem ich der Kürze und Verständlichkeit wegen manches weggelassen habe.

»Fibrae ex extima facie auricularum oblique et spirali quasi ordine per extimam ventriculorum partem ad usque mucronem ducuntur, mole simul augentur crassum ventriculorum corticem componunt, exceptis paucis, quae in medio itinere« (in sulco longitudinali?) »introrsum penetrant, et spirales fibras hic illic vinciunt. Cum vero spirales fibrae ad mucronem pertigerint, facta simplici advolutione, introferuntur, intimamque ventriculorum, ac sinistri praesertim faciem eleganter constituunt. Etenim vel nudis oculis cognoscitur internas ventriculorum partes ac tendineos valvularum tricuspidalium funiculos ex iisdem fibris oriri, quibus externa ventriculorum facies coagmentatur.«

später Winslow[1]) waren der Meinung, daß von jenem Wirbel aus Fasern in das Innere des linken Ventrikels aufstiegen, und daß daher die Fasern in der Nähe der inneren Oberfläche, die sehr der Länge nach liegen, mit den Fasern an der äußeren Oberfläche, die sich auch der Längenrichtung nähern, ununterbrochen zusammenhängen. Dieselbe Ansicht hat auch Glaß[2]) vertheidigt, und selbst Wolff[3]) hat Beobachtungen gemacht, die ihr günstig sind, denn er hat nicht nur jene in der mittleren Lage befindliche Oeffnung an der Spitze des linken Ventrikels auch beobachtet, sondern auch gesehen, wie sich die Längenfasern der äußeren Lage an dieser Oeffnung feststetzen und sie verschließen, und wie sich einige Bündel der darauf folgenden Lage in die Oeffnung hineinschlagen.

Gerdy[4]) behauptet, die oberflächliche Lage von Fleischfasern, welche über die Längenfurchen von einem Ventrikel zum andern hinüberginge und beide Ventrikel vereinigte, entspränge am breiten Ende der Ventrikel an den Oeffnungen, durch welche die Atrien und die Arterien mit den Ventrikeln zusammenhingen. Die an der vorderen Seite des breiten Endes des rechten Ventrikels entsprungenen Fasern liefen über die vordere Längenfurche schief nach links herab, concentrirten sich an der Spitze, bildeten daselbst eine Krümmung, die mit dem unteren Theile einer 8 verglichen werden könnte, und liefen inwendig im Fleische des linken Ventrikels gegen das breite Ende desselben hinauf. Die oberen Enden dieser in Form einer 8 gekrümmten Fasern vereinigten sich also nicht, denn das eine wäre oben am rechten, das andere Ende oben am linken Ventrikel befestigt. Der oben am rechten Ventrikel entsprungene Theil dieser in Form einer 8 gekrümmten Fasern läge an der Oberfläche beider Ventrikel, der oben am linken Ventrikel endigende Theil dieser Fasern läge in der Tiefe zwischen andern Fleischfasern des linken Ventrikels. Die an der hinteren Seite des breiten Endes des linken Ventrikels entsprungenen Fasern krümmten sich

---

Alter fibrarum ordo occultatur a Natura inter supradictos spiralium fibrarum fasces, quas scilicet primo externam, et mox ultro productas internam cordis faciem componere memoravimus. Etenim alia multi generis strata fibrarum, quae centrum tenent crassitiei parietum sinistri praesertim ventriculi tamquam intra duplicatum istarum fasciarum marginem stricte continentur. Haec fibrarum strata ducuntur ordine, plus minus ad longitudinem cordis inclinato, ita, ut nonnulla acutum, nonnulla rectum efficiant: sed istae fibrae quasi vinctae non ea lege feruntur, ut per mucronem intra cavitates pertingant, sed in circulares tendines ad cordis basin locatos, a quibus exterius seu paulo superius ortum sumpserunt, majori ex parte interius seu paulo inferius recurrunt. *Jo. Mar. Lancisii* de motu cordis et aneurysmatibus opus posthumum. Lugd. Batav. 1740. Propositio 31, p. 106.

[1]) *Winslow*, Sur les fibres du coeur et sur les valvules avec la manière de les préparer pour les démonstrer, Mém. de l'Ac. roy. des sc. 1711. Ausgabe in 8. p. 197.

[2]) *Glass*, Halleri Coll. Disp. anat. select. Vol. II. p. 251. Clare igitur jam apparere putem, tres tantum praecipuos fibrarum esse ordines, qui cordis specubus circumdentur, *exteriores* videlicet, quae ab ejus basi ortae et spirali quasi reptatu oblique sinistrorsum delatae, minimam partem ad cordis cuspidem decurrunt, ubi ad interiora ejus reflexae, oblique sursum rursus assurgunt, cordis basin repetendo: quae igitur alteram fibrarum obliquarum seriem eamque *interiorem* sistunt Inter hosce binos fibrarum ordines tertius intercedit *medius*, in plures lamellas facile dividuus, qui ex villis plus minusve transversalibus conflatus, quorum quaedam utrumque cordis ventriculum complectuntur.

[3]) *Wolff*, Nova acta Petrop. T. X. 1792. p. 180, 181 sagt: Nimirum ubi ad oram aperturae hujus ventriculi (sinistri) fibrae flabellatae minores perveniunt, flexae circa oram in cavitatem ventriculi ea ratione descendunt, ut ad parietem eundem quem exterius hactenus texerant, se applicent et retrorsum oblique basin et marginem versus interius continuent fibrisque se immisceant parietalibus internis.

[4]) *P. N. Gerdy*, Recherches, discussions et propositions d'anatomie, de physiologie et de pathologie; à Paris 1823. 4. p. 24 sq.

Digitized by Google

über die hintere Längenfurche zum rechten Ventrikel hinüber, concentrirten sich aber nicht an der Spitze desselben, sondern drängen in die vordere Längenfurche in den rechten Ventrikel ein, würden aber schon vorher von Fasern der vorderen Seite des Herzens bedeckt. Sie hätten auch die Form einer 8, und die eine Hälfte der 8 wäre an der Oberfläche, die andere in der Tiefe am rechten Ventrikel gelegen, der Anfang dieser in Form einer 8 gekrümmten Bündel wäre hinten an den Oeffnungen des linken Ventrikels, das Ende derselben an den Oeffnungen des rechten Ventrikels angeheftet.

Zweitens beschreibt Gerdy in jedem Ventrikel Fleischbündel, die immer nur einem von beiden Ventrikeln angehören und sich nicht von einem auf den andern erstrecken. Diese bilden Ringe oder Stücke von Ringen, welche den mittleren Raum zwischen der oberflächlichsten und tiefsten Faserlage an den Wänden der Ventrikel einnehmen. Endlich beschreibt Gerdy tiefliegende Fleischbündel, welche an dem der platten Seite des Herzens zugekehrten Theile der Scheidewand quer aus der Höhle des einen in die Höhle des andern hinübergehen, und sich daselbst den eigenthümlichen Fasern jedes Herzens zugesellen, denen sie dann in ihrem weiteren Verlaufe gleichen. Ich muß gestehen, daß ich diese tiefen gemeinschaftlichen Fasern beider Ventrikel nicht gefunden habe. Ueberhaupt hat Gerdy das, was er beobachtet hat, von dem, was er sich zusammengereimt und was er geschlossen hat, nicht genug getrennt, und seine Arbeit ist nicht geeignet, die Dunkelheit aufzuklären, die über den Verlauf der einzelnen Fleischbündel noch herrscht.

Beschreibung der vier Abtheilungen des Herzens im Einzelnen.

Der rechte oder vordere Vorhof, oder der Hohlvenensack, atrium dextrum.

Der rechte Vorhof (oder mit andern Worten, die rechte Vorkammer, der Hohlvenensack), atrium dextrum, von Manchen auch Herzohr im weiteren Sinne des Worts genannt, bildet den am meisten nach rechts und nach vorn gelegenen Theil des breiten Endes des Herzens. Innerhalb des Herzbeutels tritt von oben die obere, von unten, wo der Vorhof auf dem Zwerchfelle aufliegt, die untere Hohlvene in ihn hinein. Beide Hohlvenen haben hierbei keine solche Richtung, daß sie, wenn man sie sich verlängert dächte, auf einander träfen, denn die obere steigt so herab, daß sie zugleich etwas von hinten nach vorn gerichtet ist. Das Herzohr, auricula, im eigentlichen Sinne des Worts, ist ein vom vorderen Theile desselben ausgehender gebogener platter, und an seiner Spitze verschlossener Zipfel, der den Ursprung der Körperarterie bedeckt. An der Stelle, wo sich äußerlich die Querfurche, und inwendig der Rand befindet, welcher die in die Kammer führende Vorhofsmündung umgiebt, ferner an der Scheidewand, an der ringförmigen Oeffnung der Hohlvene, und hinten weiter herunter ist der Vorhof nicht uneben. Dagegen ist der vordere und nach rechts gelegene, zwischen dem Herzohr und der untern Hohlvene befindliche Theil des Vorhofs durch die musculi pectinati, Kammmuskeln, uneben. Vom glatten Rande der Vorhofsmündung geht nämlich ein breites und dickes Fleischbündel aus, welches sich in viele kleine, rundliche Fleischbündel spaltet, die sich am ganzen erwähnten vordern, zwischen der Vena cava inferior und der Auricula

Digitized by Google

gelegenen Theile des Vorhofs aufwärts herumbeugen, und oben mit ähnlichen Bündeln zusammenstoßen, die vom vordern und inneren fleischigen Theile der glatten Mündung der Vena cava superior ausgehen. Mit diesen rundlichen Fleischfaserbündeln hängen auch die ununterbrochen zusammen, welche die Höhle des Herzohrs uneben machen, indem sie sich daselbst vielfach durchkreuzen.

An der ziemlich glatten Scheidewand, septum atriorum, befindet sich die von einem (vorzüglich oben dicken) fleischigen Ringe isthmus, umgebene ovale Grube, fossa ovalis, die dünnste Stelle der Scheidewand und die Spur einer hier bei der Frucht vorhanden gewesenen ovalen Oeffnung, foramen ovale, durch welche die beiden Vorhöfe unter einander communicirten. Neben der erhabensten Stelle des Isthmus in dem Winkel, wo sich die äußerlich sichtbare Längenfurche und Querfurche an der platten Seite des Herzens einander durchkreuzen, befindet sich im rechten Vorhofe die von einer einfachen, halbmondförmigen Klappe, valvula Thebesii, bedeckte rundliche Oeffnung der Herzvene, der kleinsten unter den in den Vorhof gehenden Venen.

Da, wo die Vena cava inferior in die vordere Nebenkammer übergeht, liegt ohnweit des Ostium venosum der vordern Herzkammer eine sichelförmige häutige Falte der inneren Haut, welche von ihrem Auffinder [1]) die Eustachische Klappe (valvula Eustachii) heißt. In der Mitte ist sie am breitesten, nach ihren zugespitzten Enden zu wird sie allmählig schmaler. Sie erstreckt sich von dem untern linken Theile des Ringes, der das Foramen ovale umgiebt, schräg vorwärts und rechts zu der vordern Seite der Mündung der Vena cava inferior, so daß ihr eines Ende an jenem, das andere an dieser liegt. Ihre vordere Fläche ist nach dem Ostium venosum der vordern Herzkammer, ihre hintere Fläche nach der Mündung jener Vene, und ihr concaver Rand aufwärts gewandt. Im Embryo ist sie unverletzt, und scheint den Nutzen zu haben, das Blut der Vena cava zum Foramen ovale zu leiten, indem sie, gleichsam als ein Damm, es von dem Ostium venosum der vordern Herzkammer abhält. Auch in Erwachsenen findet man sie in manchen Herzen ganz; in einigen aber findet man sie durchlöchert und nicht selten netzförmig, von mehreren großen Löchern durchbrochen. Bei manchen auch mehr oder weniger verschmälert, und in einigen vermißt man sie ganz.

In der Nähe des Isthmus befinden sich zuweilen Oeffnungen kleiner sich besonders mündender Herzvenen, foramina Thebesii.

---

[1]) *Eustach.* in libell. de vena sine pari. Antigramm. 11. Opusc. p. 289. Unrichtig sind die Abbildungen dieser Klappe in seinen Tafeln. Tab. VIII. f. 6. XVI. f.

Digitized by Google

Die rechte oder vordere Herzkammer, oder die Lungenkammer, ventriculus dexter oder anterior.

An dem dicken Ende der Lungenkammer kann man den mit dem rechten Vorhofe durch eine eingeschnürte Stelle zusammenhängenden Grundtheil und den mit der Lungenarterie in Verbindung stehenden arteriösen Kegel unterscheiden. Der Grundtheil umschließt die Vorhofsöffnung, ostium venosum, durch welche das Blut in die Kammer eintritt, der arteriöse Kegel umschließt die Arterienöffnung, ostium arteriosum, durch welche das Blut aus ihr austritt. Der Arterienkegel liegt vorn und verdeckt einen Theil der Quersurche und des Anfangs der Körperarterie. Es befinden sich folglich am dicken Ende 2 Vorsprünge, die die Eingangs- und Ausgangsöffnung bilden. In der Höhle wird die Vorhofs und Arterienöffnung durch einen an Warzenmuskeln befestigten großen vordern Lappen der Valvula tricuspidalis geschieden. Dieser vordere Lappen ist durch die sehnigen Fäden hauptsächlich mit 4 bis 5 oft zum Theil verwachsenen Warzenmuskeln, musculi papillares, verbunden, die nicht von der Scheidewand, sondern von dem mittleren und vorderen Theile der vorderen Wand entspringen. Nur vom obersten Theile dieses Lappens gehen einige Fäden an die Scheidewand und setzen sich an sie meistens ohne Papillarmuskeln an. Die hinteren Zipfel sind dagegen durch kleinere Warzenmuskeln, zum Theil auch durch Fäden, die sich an die glatte Wand setzen, befestigt, und großentheil an die Scheidewand angeheftet. An der Scheidewand ist der Ventrikel meistens glätter als an dem übrigen Theile seiner Seitenwände, welche durch rundliche, netzförmig verflochtene Fleischbündel, trabeculae carneae, uneben sind. Die Scheidewand kehrt der rechten Herzkammer eine convexe Oberfläche zu und beengt sie dadurch. Die Spitze zeichnet sich durch diese Bündel, die oft durch die Höhle quer zur gegenüber liegenden Seite hinübergehen, von der innern Haut überzogen sind, zuweilen rings herum frei liegen und eine Menge Zellen zwischen sich einschließen, vorzüglich aus. Es ist schon oben erwähnt worden, daß dieser Ventrikel nicht ganz bis zur Spitze des Herzens reicht, daß er bei Erwachsenen ungefähr 3 mal dünnere Wände, eine dünnere Vorhofsklappe und kleinere Warzenmuskeln als der linke Ventrikel habe. Im neugebornen Kinde aber, wo er das Blut nicht bloß in die Lungen, sondern auch durch den Ductus arteriosus in den Körper treibt, sind beide Ventrikel fast gleich groß und dick.

Digitized by Google

Der linke oder hintere Vorhof, oder der Lungenvenensack, atrium sinistrum oder posterius.

Er liegt etwas höher und mehr rückwärts als der Hohlvenensack, wird von vorn von der Lungenarterie und von der Körperarterie, die in einer zwischen beiden Vorhöfen befindlichen Einbeugung liegen, bedeckt, so daß man von vorn nichts von ihm sieht, als das links neben der Lungenarterie hervorragende Herzohr. Man muß daher das Herz von seiner platten Seite aus betrachten, um diesen Vorhof deutlich zu sehen. Daselbst treten in den oberen Theil des Vorhofs die 4 Lungenvenen, 2 rechts und 2 links ein. Die Oeffnungen der 2 rechten liegen nahe unter einander, und eben so auch die der 2 linken; dagegen befindet sich ein großer Zwischenraum zwischen den rechten und den linken Oeffnungen. An keiner einzigen Oeffnung ist eine Klappe vorhanden. Der der linken Herzkammer nähere Theil des Vorhofs nimmt keine Venen auf.

Das linke Herzohr, auricula sinistra, ist ein links hervorragender, mehrfach eingekerbter, durch seine Muskelfasern gefalteter Zipfel, dessen Gestalt und Größe nicht immer dieselbe ist. Es ist kleiner als das rechte Herzohr, und liegt nach links neben der Lungenarterie, wo sein eingekerbter Rand etwas herabhängt.

Inwendig unterscheidet sich der linke Vorhof dadurch von dem rechten, daß, wenn man die Höhle des Herzohrs abrechnet, in ihm keine rundliche, einzeln hervorspringende, verflochtene Fleischbündel vorkommen, indem die Oberfläche derselben meistens von einer dickeren Lage Fleisch bedeckt, und daher glatt ist, und keine musculos pectinatos zeigt.

Ein Theil der dünnen Stelle der Scheidewand, welche wir im rechten Vorhofe mit dem Namen fossa ovalis bezeichneten, wird oft im linken von einer halbmondförmigen Falte, valvula foraminis ovalis, bedeckt, welche ihren am Isthmus angewachsenen converen Rand nach der platten Oberfläche des Herzens, ihren freien concaven Rand nach der gewölbten Oberfläche desselben kehrt. An ihrer Stelle findet man oft nur einen kleinen gebogenen, etwas hervorspringenden Wulst. Sie ist das Ueberbleibsel einer Klappe, welche nach dem ersten Drittel des Lebens des Embryo von der platten Seite aus emporwächst und das foramen ovale immer mehr und mehr bedeckt, so daß beim Neugebornen nur noch eine enge Stelle übrig ist, durch welche die beiden Vorhöfe an dem der gewölbten Seite des Herzens näheren Theile des ovalen Lochs unter einander zusammenhängen.

Digitized by Google

Die linke oder hintere Herzkammer, oder die Aortenkammer, ventriculus sinister, oder posterior.

Sie hängt durch eine eingeschnürte Stelle mittelst einer großen elliptischen Oeffnung, ostium venosum, mit dem Lungenvenensacke zusammen, das in die Körperarterie führende ostium arteriosum liegt an dem breiten Ende dieser Kammer dicht neben dem ostium venosum und ganz an der Scheidewand, da es hingegen in der rechten Herzkammer um ein beträchtliches Stück von dem ostium venosum entfernt ist. Eine kegelförmige, zur Arterie hingehende Verlängerung des Ventrikels, welche an der rechten Herzkammer vorhanden ist, fehlt hier. Die Vorhofsklappe, valvula mitralis, besteht aus 2 Hauptlappen, von welchen der eine, der Scheidewand nähere, zwischen der Vorhofsöffnung und der Arterienöffnung, der andere auf der entgegengesetzten Seite der Vorhofsöffnung liegt. An die Seite dieser Zipfel, nicht an die Spitzen, setzen sich die Fäden von 4 oder 5 von der hinteren Wand entspringende Warzenmuskeln an, unter denen meistens 3 vorzüglich groß sind.

Die Scheidewand kehrt dem linken Ventrikel eine concave Oberfläche zu, und giebt dadurch seiner Höhle eine fast eiförmige Gestalt.

Inwendig liegen erhabene, unter einander verflochtene Bündel, die wie an den blinden Zipfeln der Vorhöfe und der Herzkammern überhaupt, so auch hier an der Spitze des linken Ventrikels, vorzüglich hervorspringend sind.

Mit dem Herzen stehen folgende große Blutgefäßstämme in Verbindung [1]).

---

[1]) *Bernhard*, (*C. A. Rudolphi*) Diss. de arteriarum e corde prodeuntium aberrationibus. Berol. 1818. 4.

Betrachtet man nicht allein die Abweichungen, die bei dem Ursprunge der Arterien und der Venen vom Herzen, sondern auch die, welche an den Hauptästen beobachtet werden, so überzeugt man sich, daß die Körpervenen Abweichungen in ihrem Ursprunge weit mehr als die Arterien unterworfen sind. Dieses ist an den kleineren Zweigen, z. B. an der Zungenvene oder an der ersten Intercostalvene noch weit mehr der Fall, als an den größten Stämmen, von welchen J. F. Meckel d. j. sogar zu beweisen suchte, daß sie seltener als die ihnen entsprechenden Theile des Arteriensystems in ihrem Ursprunge und Verhalten veränderlich wären. (J. F. Meckel, über den Verlauf der Arterien und Venen im deutschen Archive für die Physiol. B. 1. S. 285, worin ihm indessen A. W. Otto (Lehrb. d. pathol. Anatomie des Menschen und der Thiere, Bd. 1. Breslau 1830) und M. J. Weber (Meckels Archiv für Anatomie und Physiologie, 1829, S. 1) und wol die meisten Anatomen nicht beistimmen. Am meisten unbestimmt sind die Hautvenen. Bei einigen, zum Theil von anerkannten Anatomen (z. B. in einem von Winslow beobachteten Falle) gemachten Untersuchungen sollen bei Mißgeburten zugleich mit dem Herzen auch die Venen gefehlt haben. Siehe diese Fälle gesammelt von A. W. Otto (Lehrb. d. pathol. Anat. 1830. S. 346.). Aber wie Otto bemerkt, sind gewöhnlich die Venen selbst dann vorhanden, wenn das Herz und die Arterien fehlen.

Digitized by Google

1) Die vena cava inferior oder ascendens, die untere oder aufsteigende Hohlader, tritt unter allen Blutgefäßen an der tiefsten Stelle ins Herz, nämlich in den auf dem Zwerchfelle aufliegenden Theil des Hohlvenensacks, atrium dextrum;
2) die vena cava superior oder descendens, die obere oder herabsteigende Hohlvene, ist kleiner und liegt unter allen, oben mit dem Herzen in Verbindung stehenden Blutgefäßstämmen am meisten nach rechts, wo sie etwas vorwärts gewendet in den Hohlvenensack, atrium dextrum, herabsteigt;
3) die arteria pulmonalis, die Lungenarterie, ist unter den 3 oben und vorn mit dem Herzen in Verbindung stehenden großen Blutgefäßstämmen das mittelste, und steigt aus der obersten Stelle der Lungenkammer, ventriculus dexter, etwas schief nach links empor;
4) die arteria aorta, die Körperarterie, ist unter den 3 oben und vorn mit dem Herzen in Verbindung stehenden großen Blutgefäßstämmen das am meisten nach links gelegene.

   Ihr Anfang wird von der Lungenarterie zum Theil verdeckt, und sie steigt schief nach rechts aus der Aortenkammer, ventriculus sinister, empor, und ihr Anfang kreuzt sich demnach mit dem Anfange der Lungenarterie, hinter welchem er liegt. Sie hat eine dickere Wand als die Lungenarterie, und hat eine fast gleich große Höhle als sie. Ihre Oeffnung im Herzen ist aber etwas enger als der des ersten Stückes ihres Canals.
5) Die vier Lungenvenen sind nächst der eignen Vene des Herzens die dünnsten Blutgefäßstämme, welche mit dem Herzen in Verbindung stehen. Sie treten auch unter allen am meisten nach hinten und in querer Richtung in dasselbe ein. Man sieht sie daher nur deutlich, wenn man das Herz von seiner platten Seite aus betrachtet. Sie liegen paarweise, 2 rechte rechts, 2 linke links, zu beiden Seiten des Lungenvenensacks, in welchem auf jeder Seite wieder die eine etwas höher, die andere nahe dabei, aber etwas tiefer eintritt.

Digitized by Google

Entwickelung des Herzens und der großen Blutgefäßstämme.

Ueber die Entwickelung des Herzens beim menschlichen Embryo hat neuerlich J. F. Meckel [1]) wichtige Beobachtungen gemacht.

Wenn man das Gewicht des Herzens mit dem Gewichte des Körpers vergleicht, so findet man es bei Embryonen verhältnißmäßig größer als bei Erwachsenen, ganz vorzüglich bei sehr jungen Embryonen. Bei 2 bis 3 Monate alten Embryonen verhält sich sein Gewicht zum Gewichte des Körpers nach Meckel wie 1 zu 50, beim reifen Fötus und in den ersten Lebensjahren wie 1 zu 120. Bei einem 8½ Par. Linien langen, von mir zergliederten Embryo machte die senkrechte Höhe des Herzens von der Spitze bis zum obersten Punkte des linken Vorhofs fast ⅙ von der Länge des ganzen Körpers [2]). Die Lungen waren noch so klein, und das Herz so groß, daß der Herzbeutel einen großen Theil der Rippen überzog. Bis zum 4ten Monate liegt das Herz noch nicht sehr merklich mit der Spitze nach links gewandt.

Bei einem 5 Linien langen Embryo, den Meckel zergliederte, lag das Herz völlig senkrecht und symmetrisch, und erfüllte die ganze Brusthöhle; dasselbe war bei Embryonen von 6 und 7 Linien Länge der Fall, bei welchen die Lungen noch nicht unterschieden werden konnten. Die Vorkammern, vorzüglich die rechte, sind bei so kleinen Embryonen überaus groß, und viel größer als die Kammern.

So lange noch keine Lungen vorhanden sind, wird sowohl der rechte als der linke Ventrikel (nicht wie beim Erwachsenen der linke Ventrikel allein) für die Fortbewegung des Körperbluts benutzt. Daher war es auch nöthig, daß der rechte Ventrikel zu dieser Zeit eben so fleischig wäre als der linke, und man darf sich nicht darüber wundern, daß er in einer gewissen Periode des Embryolebens, in welcher die Lungen noch wenig oder gar nicht ausgebildet sind, sogar größer ist als der linke Ventrikel. Denn es giebt eine Periode, wo die aus dem rechten Ventrikel entspringende Arterie kein Blut oder fast gar kein Blut zu den noch nicht sichtbaren oder noch sehr kleinen Lungen führt, wo aber der schon sehr große und fleischige rechte Ventrikel das Blut durch seine Kraft hauptsächlich in die untere Körperhälfte und in die Eihäute treibt, während der linke Ventrikel und die Aorta das Blut hauptsächlich in die obere Körperhälfte, und namentlich in das außerordentlich große Gehirn und in das gleichfalls einen sehr großen Raum einnehmende

[1]) J. F. Meckel d. j., Handbuch der Anatomie, B. 3. S. 44, und Archiv für die Physiologie, B. 2. S. 404.

[2]) E. H. Weber, Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des menschlichen Embryo, in Meckels Archiv 1827. p. 254.

Digitized by Google

Fleisch des Herzens treiben. Bei jenem 8½ Linie langen Embryo fand ich 2 von dem breiten Ende der Ventrikeln emporsteigende Arterien, die eine, welche der Aorta entsprach, ging zu dem überaus großen Kopfe (Hals und Brustglieder fehlten noch) die 2te, die der Lungenarterie entsprach, stieg bogenförmig über die Atrien hinweg, und bildete ganz allein die Körperarterie für die untere Körperhälfte, Aorta descendens. Der Bogen der Aorta, der die Aorta ascendens mit der Aorta descendens in Verbindung bringen sollte, fehlte entweder ganz, oder wurde nur durch einen sehr viel dünneren, wegen seiner Kleinheit nicht unterscheidbaren, aus der Kopfaorta in die Aorta descendens gehenden Canal vertreten. Bei einem 2 Lin. langen Embryo fand Meckel die 2 genannten Stämme an ihrem Ursprunge so vereinigt, daß sie äußerlich nicht unterschieden werden konnten, nur wenn sie durchschnitten wurden, bemerkte er eine sie trennende Scheidewand. Auch hier schlug sich der eine Stamm als Kopfaorta zum Kopfe, der andere als Aorta descendens über die Atrien bogenförmig nach hinten zur unteren Körperhälfte, und es wurde kein Aortenbogen bemerkt. (Bei noch kleineren Embryonen konnte Meckel die Scheidewand zwischen den 2 Arterien nicht sehen, was bei der Kleinheit der Theile nicht zu verwundern ist.) Bei etwas älteren Embryonen bemerkt man, daß der Aortenbogen längere Zeit dünner ist als die 2 Arterien, die er verbindet. Zu jener Zeit circulirt das Blut durch die obere und durch die untere Körperhälfte fast in Form einer 8, und die aus den beiden Ventrikeln entspringenden 2 großen Arterien sind beide für Körperarterien anzusehen, von welchen die eine den Kopf, der zu dieser Zeit die obere Körperhälfte ausmacht, die andere die untere Körperhälfte und die Eihäute mit Blut versieht. Denn es fließt aus dem rechten Ventrikel fast ganz in die Arteria aorta descendens, von da zur unteren Körperhälfte und zu den Eihäuten, und von hier aus in die Vena cava inferior zurück, welche sich nach Wolffs [1]), Meckels [2]) und anderer Anatomen Bemerkung bei so kleinen Embryonen nicht in den rechten, sondern in den linken Vorhof begiebt. Hiermit ist der Blutlauf in der unteren Hälfte der 8 vollendet. Von hieraus geht das Blut in den linken Ventrikel, von da in die Aorta ascendens, und in die Zweige, die sich zum Fleische des Herzens, zu dem sehr großen Kopfe und Rückgrate in der oberen Körperhälfte begeben, fast gar nicht aber in die Aorta descendens. Von jenen Theilen fließt es nun durch die Vena cava superior in den rechten Vorhof und in den rechten Ventrikel. Hiermit ist dann der Lauf des Bluts in der oberen Hälfte der 8 vollendet, und es beginnt der Blutlauf in der unteren Hälfte der 8 von neuem. Der Blutlauf würde hiernach zu einer gewissen Periode des Embryolebens ziemlich in Form einer 8 vor sich gehen, fände nicht in gewissem Grade eine Vermischung des Bluts der beiden Herzhälften wegen der noch unvollständigen Scheidewand Statt. Diese Einrichtung des Blutlaufs, der also durch die obere und durch die untere Körperhälfte fast in Form einer 8 geschieht, und durch die obere Körper-

---

[1]) *J. C. Wolff*, Novi commentarii acad. sc. imp. Petropol. T. XX. p. 357. Tab. VII u. VIII.

[2]) *F. Meckel*, im Archive für die Physiol. B. II. 1816. p. 406, 411.

Digitized by Google

hälfte mittels des linken, durch die untere mittels des rechten Ventrikels bewirkt wird, hat unstreitig in dieser Periode des Embryolebens seinen großen Nutzen. Aus einem ähnlichen Grunde, aus welchem bei dem gebornen Kinde ein in gewissem Grade abgesonderter kleiner Kreislauf durch die Lungen, und ein großer durch den übrigen Körper Statt findet, und jener durch den rechten, dieser durch den linken Ventrikel bewirkt wird, scheint bei sehr kleinen Embryonen ein in gewissem Grade abgesonderter Blutlauf durch die untere Körperhälfte und durch die obere Körperhälfte Statt zu finden, und jener durch den rechten, dieser durch den linken Ventrikel bewirkt zu werden.

Denn bei sehr kleinen Embryonen sind auf der einen Seite das Herz, das Gehirn und das Rückenmark, die drei größten und thätigsten Organe, welche vorzüglich das zur Ernährung geschickte Blut zugeführt bekommen müssen, auf der andern Seite die Eihäute und die Leber die größten und fast einzigen Organe, in welchen das Blut diejenigen Mischungsveränderungen zu erleiden scheint, durch welche es zur Ernährung geschickt erhalten wird. Es scheint daher sehr zweckmäßig, daß das Blut erst in der oberen Körperhälfte circulire, und nachdem es daselbst zur Ernährung des Gehirns gedient hat, zur unteren Körperhälfte und in die Eihäute gebracht werde, um daselbst eine Mischungsveränderung zu erfahren, durch welche es von neuem brauchbar zur Ernährung wird [1]). Aus dem Vorgetragenen erhellet nun aber auch, daß es vielleicht sehr zweckmäßig sei, daß der rechte Ventrikel einige Zeit hindurch bei kleinen Embryonen der stärkere sei [2]), weil er das Blut bis in die sehr entfernten Eihäute treiben muß, während der linke dasselbe nur in die nahgelegene obere Körperhälfte verbreitet. Wenigstens sieht man ein, daß der rechte Ventrikel zu seiner Verrichtung beim Embryo ungeschickt gewesen sein würde, wenn er, wie beim Erwachsenen, viel dünnere Wände als der linke Ventrikel gehabt hätte. Sabatiers [3]) geistreiche

---

[1]) Vielleicht hängt mit dieser Einrichtung die Bildung zusammen, welche J. F. Meckel beobachtet hat, vermöge welcher, bei einem sehr kleinen Embryo, eine Vene (vena jugularis sinistra, in das linke Atrium sich getrennt von andern Venen öffnete. Denn da diese Vene den Saft des Ductus thoracicus aufnimmt, so würde auch dieser unter diesen Umständen mit in der oberen Körperhälfte circulirt haben. Indessen ist noch abzuwarten, ob wiederholte Beobachtungen diese Bildung als eine regelmäßige bestätigen. Siehe *Meckels* Archiv, B. II. 1816. p. 406.

[2]) Ich selbst beobachtete bei einem 8½ Linien langen Embryo, daß der rechte Ventrikel im ungefüllten Zustande größer als der linke war, und dasselbe beobachtete schon vor mir Meckel an Embryonen, die ungefähr auch so groß waren.

[3]) *Sabatier*, Hist. de l'ac. 1744. Paris 1778. p. 7. Mém. p. 198 sq. Bichat schloß sich an Sabatier an, dagegen bestritt *Lobstein*, observation sur la circulation du sang dans l'enfant qui n'a pas respiré, Sabatiers Lehre. Auch *Jo. Ger. van der Willige Louron*, De partibus, quae in foetus corpore sanguinis circulationi inserviunt etc. Lugd. Batav. 1820. p. 90, und endlich *H.F. Kilian*,

Digitized by Google

Idee, daß das Blut bei dem Embryo in Form einer 8 circulire, hat sich folglich wenigstens für eine gewisse Periode des Lebens kleiner Embryonen durch Wolffs und Meckels Beobachtungen bestätigt. Aber je mehr sich der Embryo seiner Reife nähert, desto weniger ist diese Idee mehr anwendbar. Denn das Herz und die großen Gefäßstämme erfahren während des Embryolebens und noch nach der Geburt eine Reihe Veränderungen, welche den Zweck haben, die erstere Form des Kreislaufs (wo das Blut in Form einer 8 durch die obere und durch die untere Körperhälfte circulirt, in die 2te Form zu verwandeln, wo das Blut, wie bei dem Erwachsenen, im doppelten Kreislaufe (im Körperkreislaufe und im Lungenkreislaufe) bewegt wird.

Sobald die Lungen entstehen und größer wachsen, wachsen nämlich von dem bis jetzt für die untere Körperhälfte bestimmt gewesenen Arterienstamme Aeste, die in die Lungen gehen. Je größer aber der Durchmesser dieser Aeste wird, desto kleiner wird die zur unteren Körperhälfte gehende Fortsetzung des Stammes, die man den Botallischen Gang nennt, und je kleiner diese Fortsetzung wird, desto mehr nimmt der mit ihr communicirende Aortenbogen am Umfange zu. So kommt es denn endlich dahin, daß der vorher sehr dünne Aortenbogen, der die Aorta ascendens und descendens verbindet, so dick wird, daß die Aorta descendens als Fortsetzung der Aorta ascendens, das ehemalige Anfangsstück der Aorta descendens aber als Arteria pulmonalis, und ihre Fortsetzung als Ductus arteriosus Botalli betrachtet wird.

In dem Maaße, als die zu den Lungen gehenden Arterienäste größer werden, schließt sich nicht nur die Oeffnung in der Scheidewand der Kammern, sondern die Vorkammern wachsen auch auf solche Weise, daß die Mündung der Vena cava inferior mehr und mehr rechts zu liegen kommt, so daß sie sich erst unter der Scheidewand, und dann im rechten Atrio befindet. Die Scheidewand, die als eine Art von Falte von der gewölbten Seite des Herzens nach der platten zu herabwächst und sich vergrößert, läßt bekanntlich eine Oeffnung, das ovale Loch in der Nähe der platten Seite, übrig. Ungefähr im Anfange des 3ten Monats erhebt sich von dieser platten Seite aus am unteren Rande dieses Lochs eine halbmondförmige Falte, die immer höher und höher wird, so daß ihr freier, nicht angewachsener, halbmondförmiger Rand dem oberen Rande des ovalen Lochs immer näher und näher kommt, und endlich im 6ten Monate, nach Meckel, noch über diesen Rand emporsteigt. Die nun diese Klappe des ovalen Lochs, valvula foraminis ovalis, an der

Ueber den Kreislauf des Bluts im Kinde, das noch nicht geathmet hat, Karlsruhe 1826, haben über diesen Gegenstand geschrieben und auch die Literatur angezeigt.

Digitized by Google

linken Seite der Scheidewand im linken Atrio liegt, so hindert sie das im linken Atrio befindliche Blut, in das rechte Atrium zu dringen, gestattet aber einem Theile des im rechten Atrio befindlichen Blutes (jedoch durch eine immer enger und enger werdende Oeffnung), ins linke Atrium hinüberzufließen, sobald das rechte Atrium stärker gefüllt ist, oder sich mit mehr Kraft zusammenzieht. Bei dem reifen Embryo geht, wie man aus dem Vorhergehenden einsieht, keineswegs die Oeffnung aus einer Vorkammer in die andere gerade hinüber, sondern das Blut wird zwischen der Klappe des ovalen Lochs und dem oberen Theile der Scheidewand in einer Art von Spalte empor, und so schief in das linke Atrium hinüber gedrängt.

Die Eustachsche Klappe ist eine halbmondförmige Falte, die am vordern Theile der Oeffnung der Vena cava inferior in die rechte Vorkammer festsitzt, sich mit ihrem Ende bis in die Nähe der Scheidewand erstreckt, und mit ihrem freien concaven Rande in der Höhle der Vorkammer emporragt. Sie scheint allerdings eine zeitlang den Uebergang des Bluts aus der Vena cava inferior in das ovale Loch zu befördern, und ihn in die rechte Kammer zu erschweren. Weil aber nach Meckels[1]) Messungen (an nicht mit eingespritzter Materie erfüllten Herzen, welche allerdings den Messungen nach gemachter Injection vorzuziehen sind), die in die Lunge dringenden Aeste der Lungenarterie schon im 5ten Monate einen gleichen Rauminhalt haben, als der in die Aorta übergehende Ductus arteriosus Botalli, und diese Aeste, ganz im Verhältnisse der Größe ihrer Höhle, auch mit circulirendem Blute erfüllt sind, und weil jeder Ast der Lungenarterie bei dem reifen Embryo noch weiter als der Ductus arteriosus Botalli ist, so sieht man leicht ein, daß beim Embryo auch schon lange vor der Geburt eine beträchtliche Menge Blut durch die Lungen circulire.

Das Herz des Embryo ist, nach Meckel, in allen seinen 4 Abtheilungen, vorzüglich aber in seinen Kammern verhältnißmäßig fleischiger als beim Erwachsenen, und zwar bei jüngeren Embryonen in einem höheren Grade als bei älteren. Merkwürdig ist es zugleich, daß der rechte Ventrikel, nach Senac, Sömmerring und Meckel, in der ersten Hälfte des Embryolebens wenigstens eben so dicke Wände als der linke hat, und daß noch beim reifen Kinde kein sehr merklicher Unterschied zwischen ihm und dem linken ist. Aber zu dieser Zeit sind auch beide

[1]) *Meckel*, im Archive für die Physiologie, B. II. 428. *Sénac*, Traité du coeur, T. I. p. 62. *Roederer*, De foetu perfecto, p. 86, und *Haller*, El. phys. T. VIII. p. 394, geben zwar den arteriösen Gang beim reifen Fötus weiter als die in die Lungen gehenden Aeste der Lungenarterie an, aber sie haben unstreitig diese Theile nach gemachter Injection gemessen, und der Ductus arteriosus ist ausdehnbarer.

Digitized by Google

Ventrikel Körperherzen, und bei ihrer Verbindung durch den Ductus arteriosus, würde, wenn die eine Herzhälfte die andere an Muskelstärke sehr überwöge, das Blut gehindert werden, sich aus der schwächeren Herzkammer gleichzeitig zu ergießen, denn das aus der stärkeren Herzkammer mit größerer Gewalt fortgestoßene Blut würde in die Arterie des schwächeren Ventrikels dringen und das Blut rückwärts drücken.

Nach der Geburt, jedoch nicht zu einer bestimmten Zeit, verschließen sich das ovale Loch, der arteriöse Gang, der venöse Gang der Leber, nebst den Nabelgefäßen. Der arteriöse Gang schließt sich, nach Haller[1]), früher als das ovale Loch. In einem Falle fand er ihn am 56sten Tage nach der Geburt ganz verschlossen, in einem andern am 90sten offen, und da ihn auch andere, von Haller angeführte Beobachter am 50sten, 60sten, 70sten Tage offen fanden, so mag ein anderer von Haller beobachteter Fall, wo der Gang schon 3 Tage nach der Geburt durch eine geronnene polypöse Masse fast verschlossen war, unter die Ausnahmen gehören. Das ovale Loch scheint sich, nach Haller, der Regel nach später als nach Ablauf eines Jahres völlig zu schließen

Gefäße des Herzens[2]).

Sie dienen zur Ernährung des Herzens und vertheilen sich in der Masse seiner Wände. Die Stämme dieser Gefäße liegen an der auswendigen Fläche des Herzens, und sind von der äußern Haut und von dem Fette bedeckt.

Das Herz besitzt 2 Schlagadern, die Kranzschlagadern, A. coronariae cordis. Beide gehen aus der Aorta, als die ersten Aeste

---

[1]) *Haller*, El. phys. L. XXX. Sect. 1. §. 5.

[2]) Nicht selten weichen dieselben hinsichtlich der Zahl ab. So sah Thebesius (Diss. de circulo sanguinis in corde. Lgd. Bat. 1716. 8. p. 6.) nur eine sehr große Kranzarterie aus der Aorta entspringen, die sich gleich nach ihrem Ursprung in 2 Aeste theilte. Dasselbe beobachtete Otto (Lehrb. d. pathol. Anat. 1. B. Berl. 1830. p. 506). Andremal finden sich deren drei, wie Winslow (exposition anat. de la struct. du corps humain, Par. 1732. p. 366.), *Fiorati* (Atti della Academia di Padova. Tom. III. P. I. p. 38.) und Meckel (pathol. Anat. 2. Bd. 1. Abth. 1816. p. 109.) beobachteten, ja es sollen selbst 4 vorkommen, wie Meckel (Handb. d. Anat. 3. B. S. 74.) einmal sah. Die zwei überzähligen waren bedeutend kleiner, und schienen nichts als früher abgehende Aeste zu sein (s. auch Morgagni, Ep. XVIII. 34. ep. 48. 34.); oder sie entspringen endlich an ungewöhnlichen Orten, z. B. hoch oben aus der Aorta (*Farre*, pathological researches. Lond. 1814. p. 2. ff.), oder einmal aus der Subclavia dextra (Mayer, in Gräfe's und Walther's Journ. Bd. 10. S. 44.).

Bisweilen ist eine oder die andere ungewöhnlich klein. So fand *Barclay* (descript. of the arter. of the human body, S. 6.) die rechte so klein, daß sie rechterseits nicht bis zur Scheidewand reichte, und der umgeschlagene Ast der linken ihre Stelle vertrat.

Digitized by Google

derselben, da, wo sie aus der hintern Herzkammer entspringt, unter einem stumpfen Winkel ab. Die beiden Oeffnungen, mit welchen sie entspringen, liegen nahe an den Endrändern der beiden oberen halbmondförmigen Klappen, eine derselben nahe an der hintern, die andere nahe an der vordern; doch so, daß sie nicht von denselben bedeckt werden, wenn sich diese bei dem Ausflusse des Blutes aus der Herzkammer an die inwendige Fläche des Ostium arteriosum legen.

Die **rechte Kranzschlagader**, arteria coronaria dextra, entspringt von der vordern Seite des Anfangs der Aorta, kommt zwischen dem Anfange der Arteria pulmonalis und dem vordern Herzohre hervor, geht geschlängelt an der Grenze der vordern Nebenkammer und der vordern Herzkammer, erst an der gewölbten Fläche des Herzens bis zum vordern Rande, dann an diesem zur untern platten Fläche bis an die Stelle, wo die Vena media cordis sich ergießt. Hier aber biegt sie sich, so daß sie die genannte Grenze verläßt, und nun geschlängelt, längs dieser Vene, gegen die Spitze des Herzens verläuft. An einigen Herzen beugt sie sich, ehe sie diese Vene erreicht, nach der Spitze zu, und geht dann an der vordern Seite der Vene zu ihr heran; an andern wird sie erst von der Vene von unten bedeckt, beugt sich jenseits der Vene, und geht anfangs an der hintern Seite derselben gegen die Spitze fort.

Auf diesem Wege giebt sie erst Aeste zum Anfange der Aorta, zum Anfange der A. pulmonalis, zur vordern Nebenkammer, zum vordern obern Theile der hintern Nebenkammer, ferner zum obern Theile der vordern Herzkammer, zum vordern Theile derselben, und so gelangt sie auf die platte Fläche des Herzens, zur Vena media, welche sie zur Spitze begleitet.

Das Ende dieser Schlagader theilt sich an der untern Fläche des Herzens unweit der Spitze in einige Aeste, deren einer an der Spitze mit dem Ende des vordern Astes der Arteria coronaria sinistra zusammenkommt. Die andern Endäste kommen theils am hintern Rande mit andern Aesten der Arteria sinistra, theils am vordern Rande mit den Aesten dieser Schlagader selbst zusammen, welche an der obern Seite der vordern Herzkammer gegen die Spitze gehn.

Die **linke Kranzschlagader** des Herzens, arteria coronaria sinistra, entspringt von der hintern Seite des Anfangs der Aorta, kommt zwischen dem Anfange der Arteria pulmonalis und dem hintern Herzohre hervor, und theilt sich in 2 oder 3 Aeste.

Der **vordere**, gemeiniglich der größte, geht an der hintern Seite des Ursprungs der Arteria pulmonalis vorbei, und dann geschlängelt auf der gewölbten Fläche des Herzens gegen die Spitze hin, so daß er allmählig mehr dem vorderen Rande sich nähert, und die Stelle bezeichnet, an welcher der vordere Rand der Scheidewand liegt. Auf diesem Wege giebt er erst dem Anfange der Aorta, dann dem Anfange der Arteria pulmonalis kleine Aeste, welche mit den Aesten der Arteria

Digitized by Google

dextra zusammenkommen. Ferner giebt er größere Aeste zur vorderen Seite der hinteren Herzkammer gegen den hintern Rand des Herzens, auch kleine Aeste zur vorderen Seite der vordern Herzkammer, welche mit Aesten der dextra zusammenkommen, und kommt endlich an der Spitze mit einem Aste der Arteria dextra, auf eine oder die andere Weise, zusammen.

Der hintere Ast, ramus circumflexus, geht an der Grenze der hintern Nebenkammer und der hintern Herzkammer, längs der Vena maxima fort, so daß er der Spitze des Herzens doch näher, als diese, liegt; erst an der oberen Fläche bis zum hintern Rande, dann an diesem umgeschlagen, auf dem hintern Theil der untern Fläche. Auf diesem Wege giebt er Aeste zur hintern Nebenkammer, und zur hinteren Herzkammer, erst an der obern, dann an der untern Seite des Herzens. Das Ende desselben verliert sich gemeiniglich an der untern Fläche unweit der Stelle, an welcher sich die Vena maxima ergießt; selten lenkt sie sich noch gegen die Spitze des Herzens, längs der Vena media, herab.

Zwischen diesen beiden Aesten kommt oft noch ein dritter Ast hervor, welcher sich nach der Gegend der Spitze zu lenkt, gemeiniglich aber unweit seines Ursprungs sich in die Wand des Herzens verbirgt.

Die eigenen Venen des Herzens, venae cardiacae, führen sein Blut größtentheils in die vordere Vorkammer, d. h. in den Hohlvenensack zurück.

Die größte derselben, Vena coronaria magna [1]), ist nach Verhältniß der Größe des Herzens von ansehnlicher Weite. Sie fängt erst als eine dünne Vene an der gewölbten Fläche des Herzens, in der Gegend der Spitze an, und hängt mit Aesten der Vena media an der Spitze zusammen, geht neben dem Ramus anterior der Arteria sinistra gegen die hintere Vorkammer, dann in veränderter Richtung an der Grenze dieser Vorkammer und der hintern Herzkammer zum hintern Rande, und dann an der platten Seite des Herzens bis in die Gegend fort, in welcher die Scheidewand der Vorkammern liegt. Auf diesem ganzen Wege wird sie allmählig dicker, und nimmt die kleineren Venen der hintern Vorkammer und der hintern Herzkammer in sich auf.

Diese Vene ergießt sich in eine große Mündung, ostium venae magnae, welche in dem untern hintern Theile des vordern Hohlvenensackes, zwischen der Valvula Eustachii und dem Ostium venosum der vordern Herzkammer sich öffnet, und an dieser ist die fortgesetzte Haut der Vene als eine dünne halbmondförmige Klappe, valvula Thebesii, so vorgezogen, daß der concave freie Rand derselben, welcher

[1]) *Galen*, de arter. et ven. dissert. c. 2.

zwischen sich und dem entgegenliegenden Rande der Mündung einen Zwischenraum läßt, rückwärts gewandt ist [1]). In einigen Herzen findet man auch diese Klappe durchlöchert und netzförmig. Sie gestattet dem Blute aus dieser und der folgenden Vene den freien Gang ins Herz; hindert aber bei der Systole der Nebenkammer einigermaßen den Rückgang aus dieser in die Venen [2]).

Auch die Mittelvene des Herzens, vena media cordis, ist von ansehnlicher Größe, doch viel kleiner als jene, liegt an der untern platten Fläche desselben, geht von der Spitze, an welcher sie mit Aesten der Vena magna zusammenhängt, zu der Grenze der vordern Nebenkammer und der vordern Herzkammer hin, so daß ihr Gang die Stelle bezeichnet, an welcher der untere Rand der Scheidewand des Herzens liegt, nimmt von der untern Seite beider Herzkammern kleinere Venen in sich auf, und ergießt sich in die eben beschriebene Mündung der Vena magna.

An einigen Herzen fand Hildebrandt eine dritte große Vene, die etwas kleiner war, als die Mittelvene, vom hintern Rande des Herzens an der platten Fläche desselben schräg zur Mündung der Vena magna ging, und sich in dieselbe ergoß. Sömmerring beschreibt den Fall, wo die mittlere kleinere Herzvene ein von der großen Herzvene getrennter Stamm ist, als den regelmäßigen, und nimmt auch an, daß in der Regel mehrere Venen von mittlerer Größe sich besonders in den Hohlvenensack öffnen, daß sich namentlich solche von der unteren Seite des Herzens kommende Venen an einer Stelle des rechten Vorhofs einmünden, welche der Einmündungsstelle der großen Herzvene gegenüber liegt. Sehr kleine Venen des Herzens öffnen sich an vielen Stellen der Vorkammern und Kammern des Herzens (sogar der linken Kammer), ihre Mündungen nennt man foramina Thebesii. Ueber diese Venen haben *R. Torsten*, Diss. quaestiones selectae physiologicae. Lugd. Batav. 1774. §. 3. und *Abernethy* in Phil. Tr. 1798. P. I. p. 103, und in *Reils* Archiv. B. V. p. 128 geschrieben. Abernethy macht darauf aufmerksam, daß bei 5 Lungensüchtigen diese Oeffnungen, namentlich in der linken Kammer, sehr groß gewesen wären, so daß die Injections-

---

[1]) Auch diese Klappe hat Eustachius entdeckt. S. dess. Schrift de vena sine pari. Antigr. 10. p. 263, 264, und Tab. VIII. f. 6. XVI. f. 3. Thebesius hat sie nachher genauer beschrieben.

Ad. Chr. Thebesius, de circulo sanguinis in corde, L. B. 1708. 4. 1716. 8. Lips. 1739. 4.

Casp. Fried. Wolff, de orificio venae coronariae magnae in act. acad. Petropolit. 1777. P. I.

Petr. Tabarrani, de eodem in Atti di Siena. VI.

[2]) Ueber die Abweichungen der Herzvene in ihrer Endigung sehe man Otto's pathol. Anat. 1830. p. 347, nach.

Die große Kranzvene des Herzens mündet in seltnen Fällen statt in das rechte Herzohr, in das linke ein (Meckel Handb. d. mensch. Anat. III. 67.). Lemaire, (Bullet. d. sc. méd. V. 1810) sah zwei Kranzvenen in die Lungenvenen treten; und in einem von Murray (Neue schwed. Abhandl. 2. Bd. 1784. p. 288) beschriebenen Falle fehlte die große Kranzvene ganz, die mittleren hingegen, welche nach dem stumpfen Rande des Herzens gehen, öffneten sich in die linke obere Hohlvene; dagegen eine dritte von der untern Fläche des Herzens kommende Vene sich in einen Ast ergoß, der ganz klein war und sich an der Stelle in den rechten Vorhof öffnete, wo sich gewöhnlich die Cava superior einmündet.

Einmal sah sie Le Cat (Mém. de Paris 1738. hist. p. 62.) in die linke Schlüsselbeinvene sich einsenken.

Digitized by Google

masse, wenn er die Arterien und Venen des Herzens anfüllte, daselbst deutlich hervortröpfelte. Bei Gesunden war das nicht der Fall, und er glaubt daher, daß die Foramina Thebesii dazu dienten, daß das Blut bei Hindernissen einer regelmäßigen Circulation sich nicht in dem Fleische des Herzens anhäufe.

Die kleineren Venen des Herzens haben an verschiedenen Herzen eine verschiedene Lage.

Die meisten kleineren Venen der hinteren Nebenkammer und der hintern Herzkammer gehen, wie gesagt, in die Vena magna, einige kleinere Venen beider Herzkammern an der untern Fläche derselben in die Vena media über.

Die meisten kleineren Venen der vordern Nebenkammer und der vordern Herzkammer ergießen sich in die vordere Nebenkammer selbst.

Die Venen des Herzens haben in der Regel keine Klappen [1]), wie auch der leichte Uebergang eingespritzter Flüssigkeiten aus der Vena magna oder media in die übrigen beweiset [2]).

Die Saugadern des Herzens kommen an der auswendigen Fläche desselben in Stämmen zusammen, welche längs den Blutgefäßen desselben hin, und nach oben zu den Saugaderdrüsen gehn, welche hinter und über dem Bogen der Aorta, und hinter der Arteria pulmonalis liegen. In diesen kommen sie mit den Saugadern der Lungen zusammen.

Nerven des Herzens.

Das Herz empfängt viele, aber sehr feine Nerven, nervi cardiaci, welche an beiden Seiten aus Fäden zusammengesetzt werden, die von den Gangliis cervicalibus des Nervus sympathicus magnus, vom Nervusgl ossopharyngeus und vom vagus kommen [2]).

---

[1]) S. jedoch *Morgagni* ep. anat. XV. n. 21., welcher Klappen in diesen Venen gefunden hat.

[2]) *Alb. de Haller*, resp. *Henr. Christ. Reymann*, de vasis cordis propriis. Goett. 1737. 4. In oper. min. I. p. 2.
Ejusd. iteratae de vasis cordis observationes. Goett. 1739. 4. Ibid.

[3]) De Beschreibung dieser Nerven wird erst unten im Buche von den Nerven folgen, wo auch die Schriften sollen aufgeführt werden.
Behrends (diss. qua demonstratur, cor nervis carere. Mogunt. 1792. 4.) behauptete, daß das Herz gar keine Nerven habe. Indessen hat nicht allein Scarpa (tabulae neurologicae ad illustrandum historiam anatomicam nervorum cardiacorum etc. Ticin. 1794. Fol.) die Herznerven vortrefflich beschrieben und abgebildet, sondern es ist auch Sömmerrings und Behrends Meinung nicht, dem Herzen die Nerven ganz abzusprechen; sie behaupten nur, daß die sogenannten Herznerven sich nicht in der Fleischmasse des Herzens, sondern in seinen Schlagadern, arteriae coronariae, verbreiten. Scarpa sagt aber §. 14: »in voluntariis musculis haud aliter ac in corde perpetua est nervorum cum arteriis societas, communis ratio divisionis, distributionisque« cet. und §. 10: »nervorum surculi arteriarum coronarium ramos in cordis carnem alte delitescentes comitantur.... ultra quam sedem repente in tantam subtilitatem extenuantur, ut exquisitissimis etiam adhibitis vitris, aciem visus eludant.« Sömmerring sagt da-

Digitized by Google

Von den

Gefäßen des kleinen Kreislaufs im Einzelnen.

Durch die Schlagadern dieses Systems geht das Blut aus der vordern Herzkammer in die Lungen, durch die Venen desselben kommt es aus den Lungen zum hinteren Vorhofe des Herzens zurück.

Die Lungenarterie, arteria pulmonalis.

Der Hauptstamm aller Schlagadern des Lungensystems wird Arteria pulmonalis genannt. Ihr Durchmesser ist ungefähr um $^1/_6$ kleiner als der Durchmesser der Aorta, im Embryo größer. Die häutige Masse ihrer Wand ist beträchtlich dünner und schwächer, als die der Aorta. Sie entspringt aus dem obersten Theile der Lungenkammer der rechten oder vordern Herzkammer, geht erst schräg rückwärts, auch etwas links in die Höhe, und krümmt sich dann noch mehr rückwärts. Bis hieher liegt sie weiter links und tiefer, als der vordere Theil des Bogens der Aorta, deren Anfangstheil sie von vorn verbirgt.

Nun, nachdem sie etwa einen Weg von 2 Zollen gemacht hat, theilt sie sich in einen rechten und in einen linken Ast, deren jeder an und unter seinem Aste der Luftröhre, zugleich aber etwas weiter nach vorn liegt. Ziemlich von der Mitte zwischen beiden Aesten steigt ein ungefähr 1 Linie dicker rundlicher Strang, schief nach links zur concaven Seite des Bogens der Aorta empor. Beim Embryo und bei Neugebornen befand sich hier ein offner Canal, ductus arteriosus Botalli, durch welchen Blut aus der Lungenarterie in die Körperarterie überging. Der rechte Ast, welcher länger und weiter ist, geht schräg rückwärts und rechts, unter dem Bogen der Aorta, und unter dem Bogen der Vena azygos durch, hinter der Vena cava superior und vor dem rechten Luftröhrenaste vorbei, und theilt sich gemeiniglich in 3 Aeste, die in den rechten Brusthautsack und zu den 3 Lappen der rechten Lunge gehen. Der linke, welcher kürzer und enger ist, geht ferner rückwärts und zugleich links, tiefer liegend, als der Bogen der Aorta, und theilt sich gemeiniglich in 2 Aeste, die in den linken Brusthautsack und zu den 2 Lappen der linken Lunge gehen.

Die Aeste der Arteria pulmonalis begleiten die Luftröhrenäste. Jeder derselben theilt sich baumförmig in kleinere Zweige, die sich in die

gegen in seiner Recension dieses Werks in den Götting. gelehrten Anz. 1795. Nro. 147. „Man kann die Endigung der Nerven in den willkührlichen Muskeln aufs deutlichste in das Muskelfleisch verfolgen, welches aber am Herzen unmöglich ist.“

kleineren Lappen der Lungen begeben. Die kleinsten Zweige endlich gehen zu der Oberfläche der mit Luft erfüllten Lungenbläschen, und verwandeln sich in ein sehr feines und dichtes Haargefäßnetz, das die innere Oberfläche derselben bilden hilft. Aus ihm nehmen die kleinsten Lungenvenen ihren Anfang. Es gelingt nicht selten, Flüssigkeiten aus den Lungenarterien in die Lungenvenen, und umgekehrt aus den Lungenvenen in die Lungenarterien hinüber zu treiben. Reisseisen gebrauchte hierzu Hausenblase mit feingeriebenem Bleiweiß gefärbt. Selten werden dadurch die Haargefäßnetze vollständig erfüllt, sehr leicht gehen dünne Flüssigkeiten in die Luftröhrenäste über, vortrefflich schön sah ich diese Netze am Lieberkühnschen Präparate in der anatomischen Sammlung in Berlin. Einige Aeste der Lungenarterie begeben sich auch zu den Luftröhrenästen, und stehen da mit nicht ganz engen Aesten der ernährenden Arterien der Lungen, den Bronchialarterien, in Verbindung, und noch kleinere endlich gehen zu dem serösen Ueberzug der Lungen [1]).

Die Lungenvenen. Venae pulmonales [2]).

Die kleinsten Aestchen der Lungenvenen, mit denen die Lungenbläschen netzförmig überzogen sind, kommen in größeren und immer größeren

---

[1]) Die Lungenarterie hat nicht leicht Abweichungen in ihrem Ursprunge und Verlaufe. Folgende Verschiedenheiten kommen daher nur selten, meistens bei Mißgeburten, vor.

Zuweilen sind ihre 2 Zweige Aeste der Aorta, und der Stamm fehlt dann entweder gänzlich, oder er geht ungetheilt als Ductus arteriosus in die Aorta. Zuweilen sieht es außer dem Stamme der Lungenarterie noch eine 2te, aus dem rechten Ventrikel entspringende Arterie. In sehr seltenen Fällen erhalten die Lungen außer der Lungenarterie eine dicke Arterie aus der Aorta descendens, die wohl für eine erweiterte Bronchialarterie gehalten werden muß. Häufiger kommt die Lungenarterie an einer tiefer liegenden Stelle des rechten Ventrikels hervor. Es kommt auch vor, daß sie aus dem linken Ventrikel entspringt, während die Aorta aus dem rechten hervorgeht, oder daß sie mit beiden Ventrikeln in Verbindung steht, wenn die Scheidewand am breiten Ende des Herzens ein Loch hat. Es steht auch wohl ein Ast der Lungenarterie in sehr seltenen Fällen mit einem Aste der Aorta in Verbindung, so der linke Ast mit der linken Arteria subclavia, der rechte mit der Arteria anonyma. Zuweilen ist die Aorta descendens die Fortsetzung der Lungenarterie, nachdem sie die Lungenäste abgegeben hat. Auch entspringt in seltenen Fällen aus der Theilungsstelle oder aus dem Ductus arteriosus die linke Subclavia oder Carotis, oder der Ductus arteriosus entspringt besonders aus der rechten Kammer.

Man sehe die von Meckel und von Otto gegebene Literatur über diese Fälle in deren Handbüchern der pathologischen Anatomie.

[2]) Zuweilen kommen auf der rechten Seite (unstreitig weil die Lunge daselbst 3 Lappen hat) 3 Lungenvenen in den linken Vorhof, so daß dann 5 Lungenvenen vorhanden sind. Noch viel seltener finden sich 3 auf der linken Seite, oder 3 auf beiden Seiten zusammen 6, oder 4 auf der einen Seite, und 2 auf der andern. Während, wie J. F. Meckel bemerkt, auf der rechten Seite leichter die Zahl der Lungenvenen größer wird, so findet das entgegengesetzte auf der linken Seite Statt. In den seltener oft vorkommenden Fällen nämlich, wo nur 3 Lungenvenen vorhanden sind, fehlt die eine Lungenvene der linken Seite. J. F. Meckel hat die Literatur über die vorhandenen Beobachtungen dieser Abweichungen gesammelt. Anat. B. III. 369. Weder als 4 Lungenvenen fand *J. F. Meckel*, Mém. de Berlin 1750. p. 167. *Haller* de part. c. h. fabr. II. 123. *Portal*, Mém. de l'ac. roy d. sc. de Par. 1771. p. 74. *Sandifort*, Obs. anat. pathol. L. III. p. 18.

Weniger als 4 fanden *Löseke*, observ. anat. Berol. 1754. p. 26. *Portal* a. a. O. *Haller* a. a. O. *Pohl*, de venis. Lipsiae p. 11. *Sandifort* a. a.

Digitized by Google

Aeſten zuſammen. Die größten Aeſte ſammeln ſich endlich in die Stämme der 4 Lungenvenen. Nämlich von jeder Lunge kommen 2.

Die Lungenvenen gehen einwärts, alſo einander entgegen, die von der rechten Seite links, die von der linken rechts, und ſo ergießen ſie ſich alle in den Lungenvenenſack, atrium sinistrum. Die linke obere Lungenvene liegt unter dem linken Aſte der Arteria pulmonalis, die rechte obere unter und vor dem rechten Aſte derſelben. Die linke untere liegt tiefer, als die rechte untere. Beide untere Lungenvenen liegen höher, als der unterſte Theil der hinteren Vorkammer [1]).

Die Venae pulmonales zuſammen ſind ein wenig enger als die beiden Aeſte der Arteriae pulmonalis zuſammen, obwohl bei den Venen anderer Theile es ſich umgekehrt verhält. Dieſer Umſtand bewirkt, wie oben S. 87 gezeigt worden iſt, daß das Blut auch ohne die Klappen, welche in vielen andern Venen befindlich ſind, regelmäßig durch die Lungenvenen fortfließt.

Nach Aurivillius [2]) (n. 8. p. 19.) iſt das Verhältniß der Durchmeſſer höchſtens = 11 : 12; nach Haller (elem. phys. III. p. 169.) = 3 : 5, oder 16 : 25, 3 : 4 u. ſ. w.

Von den Gefäßen des großen Kreislaufs des Bluts im Einzelnen.

Durch die Schlagadern dieſes Syſtems erhalten alle [3]) Theile aus der linken oder hintern Herzkammer ihr Blut; durch die Venen deſſelben kommt es aus allen Theilen zur rechten oder vordern Vorkammer des Herzens zurück.

Von den Schlagadern des großen Kreislaufs. Arteria Aorta [4]).

Der Hauptſtamm wird Arteria Aorta genannt. Die häutige Maſſe iſt beträchtlich dicker und ſtärker, als die der Arteria pulmonalis.

---

[1]) Weit ſeltener als die oben erwähnten Abweichungen kommen die vor, wo ſich eine, mehrere oder alle Lungenvenen in die obere Hohlvene, oder in den rechten Vorhof öffnen. Mir iſt ſelbſt ein Fall vorgekommen, wo ſich eine ſehr große Vene aus der linken Lunge in die Vena jugularis communis der linken Seite begab, die unſtreitig für eine ſehr vergrößerte Vena bronchialis zu halten war. Einen ſolchen Fall auf der nämlichen Seite, wo eine große Vene aus der linken Lunge in die V. subclavia ging, beſchreibt M. J. Weber (in Meckels Archiv 1829. Heft 1.) und bildet ihn ab.

[2]) *Samuel Aurivillius*, de inaequali vasorum pulmonalium et cavitatum cordis amplitudine. Goetting. 1750. 4.

[3]) Denn auch die ernährenden Arterien der Lungen gehören zum großen Kreislaufe.

[4]) Eine kleine beſondere Abhandlung hierüber hat neuerlich *J. N. Bayer*, praes. *Fr. Tiedemann*, Diss. de ramis ex arcu aortae prodeuntibus. Salzburg 1817. 4. c. tab. lith. herausgegeben.

Digitized by Google

Sie entspringt oben aus der hintern Herzkammer, namentlich an den 3 Stellen, an welchen ihre 3 halbmondförmigen Klappen liegen, wird, indem sie aus derselben hervorkommt, etwas weiter, sinus Valsalvae [1]), geht dann hinter dem Anfangstheile der A. pulmonalis schräg rechts hinauf, und aus dem Herzbeutel heraus, krümmt sich dann in einem Bogen, arcus aortae, der seine Convexität aufwärts richtet, zum Rückgrate hin. Dieser ganze Bogen lenkt sich allmählig schräg von vorn nach hinten, und zugleich von rechts nach links; der vordere Theil desselben steigt hinauf, der hintere Theil desselben geht wieder hinab. Der vordere Theil des Bogens liegt über dem Herzen zwischen der Vena cava superior (die neben ihm rechts und weiter hinten befindlich ist) und der A. pulmonalis

---

Zuweilen beobachtete man, daß die Aorta aus der rechten, die Lungenarterie aus der linken Hälfte des Herzens entsprang. Einen solchen Fall beschreibt und bildet ab Meckel (Icon. anat. path. fasc. II. Tab. IX. f. 1.) aus einem Kalbe, beim Menschen beobachtete ihn *Bailly* (Engravings, Fasc. I. fig. 1, 2.), *Farr*, (Pathological researches. Essay I. London 1814. fig. 14.), jener bei einem zweimonatlichen, dieser bei einem halbmonatlichen Kinde, und *Wistar* (System of anatomy. Pensylvaniae, vol. I. Gött. gel. Anz. 1817. fasc. 177. p. 1763).

Die Literatur mehrerer Fälle s. b. Otto, path. Anat. 1. Bd. S. 303 Anm. 13.

Einigemal sah man die Aorta aus beiden Ventrikeln entspringen. Dies beobachtete z. B. Sandifort bei einem 12jährigen Knaben (Obs. anat. path. Lib. I. cap. 1. p. 29 et 36. — Ejusd. mus. anat. Vol. I. sect. V. n. VII. p. 234. 241.). Eben dies fand er bei einem Fötus, und führt noch einen gleichen Fall an, den Louis bei einem achtjähr. Mädchen fand (Ibid. Lib. III. c. 1. p. 17 und Lib. IV. cap. X. p. 107). Nevin sah sie ebenfalls an ihrer Mündung sehr weit aus beiden Ventrikeln kommen (med. comm. year 1794. Dec. II. Vol. IX.). Eben so Burns (Herzkhtn. p. 320).

Zuweilen wird auch ihr Verlauf abnorm, so, daß sie z. B. bei normaler Lage der Eingeweide (nicht immer bei Versetzung derselben, wie ein von *Fox* in Lond. med. and phys. Journ. Juni 1824 beobachteter Fall beweist, wo sie wie gewöhnlich links an der Wirbelsäule herablief), über den rechten Luftröhrenast sich krummend, und rechts an der Wirbelsäule herablaufend, erst mehr oder weniger weit unten sich nach der gewöhnlichen Oeffnung im Zwerchfelle hinlenkt. Fälle dieser Art beobachteten *Klinkosch*, Pr. d. anat. foet. cap. monstr. Prag 1766. p. 15. — *Abernethy* in Phil. trans. 1793. p. 59. — *Fiorati*, in Saggi di Padova, Tom. I. p. 69. — *Sandifort*, museum anat. Vol. I. 273. II. Tab. 97. f. 1. 2. — *Caillot*, in Bull. de l'ecole de méd. 1807, p. 24. — *Obet*, in Bull. d. sc. méd. par *Grapcron*. II. 1808. p. 65. — *Legallois*, in Bull. de la soc. de méd. 1809. p. 99. — Meckel Hdb. d. path. Anat. 2. 1. S. 97. — Rudolphi, in *Bernhard* D. de arter. e corde prod. aberr. Berol. 1818. 4. (abgebildet bei Tiedemann, tab. art. IV. fig. 9.) — *Bréschet*, in Répert. gén. d'anat. Tom. II. p. 14. — Otto, seltne Beob. II. S. 69. — Seltner ist ein anderer von Otto (path. Anat. I. S. 305. No. 11.) beschriebener Fall, nämlich daß die Aorta descend., die aus der Lungenarterie entsprang, nach Abgabe der linken subclavia zwischen dem Schlunde und zweiten Rückenwirbel nach rechts lief, und sich unten wieder links zum Zwerchfellloche wendete.

Manchmal ist der Stamm der Aorta an seinem Ursprunge einfach, spaltet sich aber einige Zoll weit davon in zwei, wovon der eine vor, der andere hinter dem Luftrohrenstamme verläuft, die sich darauf zur absteigenden Aorta verbinden. Einen merkwürdigen Fall dieser Art beschreibt Hommel (Commerc. nor. 1737. Tab. II. fig. 1.)

[1]) Valsalva (diss. posth. II. p. 131.) unterscheidet drei Sinus der Aorta; 2 an der vordern Seite an den Ursprüngen der A. coronariae, den 3ten (sinus maximus) an der hintern Seite. An diesem entstehen nach seiner Meinung die Aneurysmata.

Digitized by Google

(die neben ihm links und weiter vorn liegt,) und krümmt sich über den rechten Ast der A. pulmonalis hinüber. Der hintere Theil des Bogens krümmt sich über den linken Ast der Luftröhre hinüber, und das hintere Ende des Bogens liegt dann hinter dem linken Aste der A. pulmonalis, an der Mittelwand des linken Brusthautsackes. Der höchste mittlere Theil dieses Bogens liegt ungefähr vor dem 2ten Brustwirbel. Das hintere Ende des Bogens erreicht die vordere Fläche des 5ten Brustwirbels, liegt aber hier nicht in der Mitte, sondern an der linken Seite desselben.

Der übrige ziemlich gerade Theil der Aorta [1]) liegt meistens gerade an der vordern Fläche des Rückgrates.

In der Brust geht die Aorta im Cavum Mediastini posticum an der linken Seite der vordern Fläche der Brustwirbel bis zum Hiatus aorticus des Zwerchfells hinunter, und liegt da erst links neben, dann tiefer unten auch hinter der Speiseröhre. In der Gegend des 9ten Brustwirbels lenkt sie sich mehr nach der Mitte.

Dann tritt sie durch den Hiatus aorticus des Zwerchfelles in die Bauchhöhle, und geht an der vordern Fläche der Bauchwirbelbeine, erst zwischen den Schenkeln des Zwerchfelles, und dann neben der Vena cava inferior, die weiter nach rechts liegt, herab. Endlich erreicht sie die vordere Fläche des 4ten Bauchwirbels, und endigt sich hier, indem sie sich in ihre beiden letzten Hauptäste, die Arterias iliacas, theilt.

Auf dem Wege von ihrem Ursprunge aus dem Herzen bis zu ihrem Ende giebt die Aorta folgende Aeste:

Indem die Aorta aus dem Herzen hervorkommt, giebt sie alsbald die beiden Arteriae coronariae cordis, welche zum Herzen zurückgehen.

Aus der obern Seite des Bogens der Aorta kommen gemeiniglich drei aufwärts gehende Aeste, welche von der rechten Seite gegen die linke so auf einander folgen:

a. A. anonyma, der gemeinschaftliche Stamm der
   1) A. subclavia dextra und
   2) A. carotis dextra.
b. A. carotis sinistra.
c. A. subclavia sinistra.

Da der Bogen eine schräge Lage hat, so liegt auch die A. anonyma

[1]) Den herabgehenden Theil der Aorta nennt man Aorta descendens, zum Unterschiede vom aufsteigenden Anfangstheile derselben, Aorta adscendens. Anfänger haben hier die irrige Vorstellung zu vermeiden, als ob es zwei verschiedene Aorten gäbe.

Digitized by Google

am meisten nach rechts und nach vorn, die Subclavia sinistra am meisten nach links und nach hinten [1].

---

[1]) Nicht eben selten ist der Ursprung der Arterien aus dem Bogen der Aorta Abweichungen unterworfen.

Zuweilen sind zwar auch nur drei Stämme da, aber die Schlüsselbeinarterien entspringen einzeln für sich, während beide Kopfpulsadern einen gemeinschaftlichen Stamm haben. Die linke Schlusselbeinarterie liegt dann in der Mitte, die rechte aber an der linken Seite. Dies beobachtete Walter, dessen Fall Tiedemann (tab. art. Taf. II. fig 8.) abbildet, und ähnliche Beobachtungen machten Hunauld (mem. de Paris 1737. p. 20. No. 7.), Hommel (comme.c. nor. 1737. p. 102.), Neubauer (de thyr. ima. §. 12.), Meckel (Epist. ad *Haller* III. 141.), Walter (mém. de Berlin 1785. III. fig. 3.) und J. F. Meckel d. j. (tab. an. path. fasc. II. tab. X. fig. 2.).

Merkwürdig ist hier der von Tiedemann abgebildete Fall (Tab. II. fig. 9. und III. fig. 1.), welchen einmal Walter (museum anat. p. 237) beobachtete. Die rechte subclav. vertebr. carotis und die linke carotis hatten einen gemeinschaftl. Stamm, die Vertebr. sinistra und subcl. sinistra entsprangen getrennt. In einem andern hatten die subcl. dextra, carot. dextra, und subcl. sin. einen Stamm, die subcl. sin. und vert. sin. waren getrennt.

Einen ähnlichen Fall hat auch *Sandifort*, Obs. anat. path. Lib. IV. p. 92 aus einem weiblichen Körper beschrieben.

In einigen Fällen lag der gemeinschaftliche Stamm für beide Carotiden in der Mitte, die subclav. dextra und subcl. sinistra entsprangen zu beiden Seiten (*Tiedem.* tab. anat. III. fig. 2. tab. III. f. 10.); in andern die anonyma neben d. car. sin. subcl. sin. und vert. sin. Aehnliche Fälle haben Winslow (S. 304 und Meckel (path. Anat. 2. 1. Abth. S. 109.).

Die Fälle, wo eine Vermehrung der Aeste zu bemerken ist, sind häufiger als wo eine Verminderung derselben Statt findet.

A) Am häufigsten übersteigt die Zahl der entspringenden Arterien die Norm um eine, so daß der Stämme also 4 aus dem Bogen heraustreten.

Diese Abweichung wird aber auf verschiedene Weise hervorgebracht; und zwar

a. dadurch, daß die linke Wirbelarterie, eigentlich ein Stamm der Schlüsselpulsader, unmittelbar aus dem Bogen der Aorta entspringt. Schon Haller bemerkte, daß diese Art der Vervielfältigung die häufigste sei (Elem. phys. II. p. 161.).

Merkwürdig hierbei bleibt es, daß gerade vorzugsweise die linke Wirbelarterie es ist, und nur höchst selten die rechte, die diesen abnormen Ursprung darstellt. In achtzehn Fällen dieser Art, die Meckel gesehen, entsprang in keinem die rechte, immer die linke Wirbelarterie aus der Aorta.

Uebrigens entspringt sie fast immer zwischen der Carotis und Schlüsselpulsader. Unter den vielen Fällen, die Meckel sahe, fand er nur in einem einzigen die linke Wirbelarterie mehr nach außen liegend, als die Schlüsselpulsader (pathol. Anat. B. 1. Abth. S. 109.). Manchmal ist bei diesem ungewöhnlichen Ursprunge der linken Vertebralis doch nicht die Zahl der Stämme vermehrt, indem häufig dann die linke Kopfpulsader ein Ast der anonyma wird. (Meckel Handb. 3. S. 81.)

b. Gehört hierher der, jedoch seltnere, Ursprung der inneren Brustarterie (mammaria interna) der einen oder der anderen Seite, oder einer Brustdrüsenarterie (art. thymica), oder einer unteren Schilddrüsenpulsader (art. thyreoidea inferior [*Neubauer* (de art. thyr. §. 8. Tab. 2., fig. 2. copirt b. Tiedemann, tab. II. fig. 11.), Huber (acta helvet. VIII. p. 83.), Walter (mem. de Berlin 178 Tab. 3. fig. 2.), Loder (Pr. de var. arter. Jenae 1781. p. 4.), Herr (diss. exh. obs. quasd. ad c. h. partium structuram. Marb. 1812. p. 1 und Tiedemann (expl. tab. art. p. 44)], oder der Ursprung der unteren, mittleren Schilddrüsenpulsader (art. thyr. inf. s. ima media), oder einer hinteren Herzbeutelarterie (art. pericardiaca post.) aus dem Bogen der Aorta.

c. Wenn statt des ungenannten Stammes auch die rechte Schlüsselbein- und Kopfpulsader jede besonders, wie die der linken Seite, aus dem Bogen der Aorta entspringt. Heister (comp. anat. p. 123 not.) in einem Weibe. Winslow (Exposition d'anat. III. 364.), *Ballay* (Journ. de med. 1758. April.), Neubauer (de art. thyr. §. 14.), *Nevin* (Edinb. med. comment. Dec. 2. Vol. 9.

Digitized by Google

Die Carotides geben dem Kopfe, namentlich dem Gesichte, der harten Hirnhaut und dem vordern Theile des Gehirns; die Sub-

---

Ryan (de quibusd. arter. aberr. p. 3.), *Meckel* (path. Anat. Bd. 2. Abth. 1. S. 107.), *Zagorsky* (mém. de Pétersb. Tom. I.), *Fleischmann* (Leichenöffn. 236.) *Tiedemann* (tab. art. III. 3.). Dabei nimmt die rechte Schlüsselpulsader entweder an der Stelle der Innominata den gewöhnlichen, oder einen abweichenden Ursprung und Verlauf.

α) So entstand sie z. B. entweder zwischen der rechten und linken Kopfpulsader, (*Tiedemann* tab. art. III. f. 4. *Huber*, Acta helvet. VIII. p. 75 fig. 4.); β) oder zwischen der linken Kopf- und Schlüsselpulsader (*Tiedemann*, tab. art. III. fig. 5. nach *Walter*, mém. de Berlin 1785. p. 62. Tab. III. fig. 5. und fig. 6. nach *Walter* ebendas. Tab. III. fig. 4.); γ) oder noch unterhalb der linken Schlüsselpulsader als der letzte Stamm der linken Seite. Dies beobachteten z. B. *Boehmer* (Hall. Diss. II. 452.), *Heister* (comp. anat. II. no. 64. p. 123.), *Winslow* (expos. anat. III. §. 19.), *Palfyn* (anatomie chirurg. II. 240.). In einem von *Otto* (seltene Beob. I. 100.) beobachteten Falle entsprang sie ganz links unter der linken subclavia an der hinteren Seite der Aorta, und krümmte sich hinter dem Schlunde, zwischen ihm und dem Rückgrate rechts zu ihrem Arme. Dasselbe Verhalten zeigt an 2 Präparaten M. F. *Weber* (in *Meckels* Archiv, 1829, S. 8.) an, und etwas abweichend, doch ähnlich ist der von *Wagner* (*Heusingers* Zeitschr. f. d. org. Phys. III. 340) beschriebene Fall, wo aus dem Bogen die Subclavia dextra als vierter Stamm entsprang, der zwischen Schlund und Wirbelsäule zum rechten Arme trat; manchmal indessen verläuft sie auch zwischen Speiseröhre und Luftröhre, oder vor dieser zum rechten Arme. Eine reichhaltige Literatur über diese Verschiedenheiten findet sich bei *Otto* (pathol. Anat. Berl. 1830. S. 307 ff.). In dem von *Monro* beobachteten und von *Burns* (Herzkrankh. p. 322) erzählten Falle, drängte sie sich in schräger Richtung zwischen der Luftröhre und dem Schlunde durch.

Es ist aber dieser regelwidrige Verlauf besonders in sofern wichtig, als nach den Beobachtungen mancher Aerzte derselbe zu *Dysphagie* Veranlassung geben soll, während andre, wie *Koberwein*, *Otto* und *Fleischmann*, keine Erscheinungen von gehindertem Schlingen hievon wahrgenommen haben.

2) *Fünf Stämme* entspringen aus dem Bogen:

a. wenn bei dem besonderen Ursprunge der rechten Schlüssel- und Kopfpulsader noch eine oder die andere der angegebenen untergeordneten Pulsadern aus der Aorta entspringt. *Meckel* (tab. anat. path. Fasc. II. Tab. X. f. 1.) bildet einen solchen Fall ab. Hier entsprangen nämlich die Carot. dextra, sinistra, vertebralis sin., Subclavia sin. und Subclav. dextra von einander getrennt.

Tiedemann, (tab. art. IV. fig. 1.) sah die rechte Schlüsselbein- und Kopfarterie, die linke Kopfarterie, die linke Wirbelarterie und die linke Subclav. aus dem Bogen entspringen. Auch *Petsche* (syllog. obs. §. 44.) und *Loder* (l. c.) beobachteten dies, und *Koberwein* (de vasor. decursu abnormi), welchen Fall *Tiedemann* fig. 2. abbildet, sah die rechte und linke Kopfarterie, die linke Wirbelarterie, die linke Subclavia und zuletzt die rechte Subclavia aus der Aorta entspringen, die hinter jenen Aesten und hinter der Luft- und Speiseröhre zum rechten Arme lief.

In einer weiblichen Leiche, etwa 40 Jahr alt, fand *Otto* (seltne Beobb. 2. Hft. 60 ff.) 5 Stämme, die von links nach rechts so auf einander folgten: 1) carotis sinistra, 2) dextra, 3) vertebralis dextra, 4) subclavia dextra, und 5) ganz hinten nach dem Rückgrate zu, fast aus der Aorta descendens die Subclavia sinistra, die zwischen der Wirbelsäule und dem Schlunde zum Arme lief.

Wagner (in *Heusingers* Zeitschr. III. 339) fand die Anordnung von rechts an so: Carot. dextra und sinistra, subcl. sinistra, vertebralis sinistra und subclavia dextra, die zwischen Schlund und Wirbelsäule zum rechten Arme ging.

b. Wenn bei dem gewöhnlichen Ursprunge der drei Hauptstämme noch 2 der angegebnen untergeordneten Aeste aus dem Bogen entspringen.

So entsprang in dem von *Boehmer* (de quat. et quinq. ram. ex arcu aortae prod. in Hall. coll. diss. anat. II. p. 451 sq.) noch die mammaria dextra und die vertebralis sinistra, (vgl. *Tiedemann*, tab. art. IV. fig. 3.) oder die untere Schilddrüsenarterie aus dem Bogen, wie *Meckel* (Hdb. d. Anat. III. S. 83.) zweimal sahe.

Digitized by Google

claviae der Brust, den Armen und dem hintern Theile des Gehirnes Blut.

---

3) Sechs Aeste entspringen aus dem Bogen.

Diese Abweichung gehört unter die sehr seltenen. Tiedemann sah sie einmal in dem Körper eines vierzigjährigen Mannes, und bildet sie Tab. art. IV. Fig. 5. ab. Die Arterien folgten so auf einander: 1) rechte Schlüsselbeinarterie, 2) rechte Wirbelarterie, 3) rechte Kopfarterie, 4) linke Kopfarterie, 5) linke Wirbelarterie, 6) linke Schlüsselbeinarterie. Eine ähnliche Abweichung giebt F. Müller, Prosector zu Kopenhagen an. (S. bei Meckel in s. Hdb. der Anat. III. S. 84.) Hier entsprangen die rechte Kopf- und Schlüsselpulsader abgesondert, zwischen ihnen die rechte Wirbelpulsader, und eben so zwischen der linken Kopf- und Schlüsselpulsader die linke Wirbelpulsader. Auch *Penada*, (Saggio terzo di observaz. patol. anat. Padova 1801. 1. 45.) hat eine ähnliche Beobachtung. Der ungenannte Stamm war in der gewöhnlichen Art da, aber zugleich entsprangen beide Wirbelarterien aus dem Bogen.

Fälle von Verminderung der aus dem Aortenbogen entspringenden Aeste sind folgende:

1) Zwei Stämme entspringen aus dem Bogen;

a. wenn die linke Kopfpulsader aus dem ungenannten Stamme entspringt. Oft entspringt die linke Kopfpulsader ganz nahe am Anfangstheile des ungenannten Stammes und selbst gemeinschaftlich mit ihm, so daß sich der ungenannte Stamm gleich an seinem Ursprunge in die linke Kopfpulsader und den eigentlichen ungenannten Stamm, der seine gewöhnliche Richtung und Theilung hat, spaltet.

Diese Abweichung, von älteren Anatomen als die Norm beschrieben und abgebildet, wurde in neuerer Zeit oft beobachtet. Petsche (syll. obs. anat. Hal. 1736. p. 14.) fand sie bei einem Weibe. Neubauer (de art. thyr. §. 11.) zweimal bei Erwachsenen, und einmal bei einem neugebornen Kinde. Huber (acta helvet. VIII. 71.) bei einem 6jährigen Mädchen und bei einem 12 Tage alten Knaben. Außerdem sahen sie J. F. Meckel (Epist. ad *Haller*. III. p. 140.) Malacarne (osserv. di Chir. II. 128), Walter (mém. de Berlin 1785. p. 61), Burns (Herzkrankheiten 324), *Heister* (comp. anat. 64.), *Nicolai* (de directione vasorum §. 7.), Ryan (de quarundam arteriarum in c. h. distrib. Edinb. 1812. p. 2), Meckel (tab. anat. path. Fasc. II. Tab. 10. fig. 11. Handb. d. path. Anat. 2. Bd. 1. Abth. S. 31.). Auch Tiedemann (expl. tab. art.) hat diese Var. häufig gefunden, besonders in Marburg, Würzburg und Heidelberg, (s. dess. Taf. II. Fig. 5.) und eben so M. J. Weber (in Meckels Archiv 1829. S. 8).

Die aus dem gemeinschaftlichen Stamme entspringende linke Kopfschlagader steigt immer in schräger Richtung zwischen dem Griff des Brustbeins und der Schilddrüse vor der Luftröhre aufwärts, eine Anordnung, die bei der Bronchotomie höchst wichtig ist.

b. Wenn die linke Kopf- und Schlüsselbeinpulsader mit einem kürzeren oder längeren gemeinschaftlichen Stamme aus dem Bogen der Aorta entspringen, wo dann ein gemeinschaftlicher Stamm für die linke Kopf- und Schlüsselpulsader vorhanden ist. Diese Abweichung wurde zweimal von *Malacarne* (osservazione in Chirurgia. Torino 1784. Tom. II. p. 119) und einmal von *Biumi* beobachtet (observationes anat. p. 133). Auch Tiedemann (expl. tab. art. p. 16.) sah einen Fall der Art in der anat. Sammlung in Berlin.

c. Wenn 2 Stämme vorhanden sind, deren einer sich in die beiden Kopf-, der andere in die beiden Schlüsselbeinpulsadern theilt, wobei diese Pulsadern anfangs einen unregelmäßigen Verlauf haben. (Tiedemann, tab. art. II. fig. 4.)

Eine Spalte im Stamme der Aorta, die hierher gezogen werden kann, ward zweimal v. *Vinc. Malacarne* (Observaz. in Chirurgia, Torino 1784. Tom. II. p. 119. und von *Biumi* (observat. anat. p. 133.) beobachtet. Meckel (tab. anat. path. II. Tab. 7. f. 3.) bildet den Fall von Malacarne ab. Sie war zwar an ihrem Ursprunge einfach, zeigte aber schon hier durch Gestalt, Größe und Klappenzahl Neigung zur Trennung. Nach Abgabe der Kranzarterien theilte sie sich, drei Linien über der Herzgrundfläche, in 2 Aeste, deren jeder 18 Lin. hielt, und die sich, nachdem sie vier Zoll hoch, von einander getrennt, herabgestiegen waren, zum Durchmesser von 14 Lin. verengt, wieder einander zur absteigenden Aorta vereinigten. Aus jedem entsprang erst die Schlüsselpulsader, dann die äußere, zuletzt die innere Carotis ihrer Seite. Die absteigende Aorta entsprang an der Vereinigungsstelle, eigentlich aus dem rechten, um das Doppelte weitern Stamme. (Auch Tiedemann, tab. art. IV. fig. 7. bildet diesen Fall ab.

Digitized by Google

An der untern Seite des Bogens, in der Gegend der Subclavia sinistra, kommt der Ductus arteriosus aus der Arteria pulmonalis in die Aorta, der bei Erwachsenen in ein Band verwandelt ist.

Bei ihrem Durchgange zwischen den 2 Brusthautsäcken giebt die Aorta von ihrer hintern Oberfläche die Arterias intercostales zu den Zwischenrippenräumen, die Bronchiales zu den Lungen und die Oesophageas zur Speiseröhre ꝛc.

An diese Bildung schließt sich eine von Hommel (commerc. nor. 1737. p. 162.) beschriebene und abgebildete an. Die Aorta stieg, über 2 Zoll hoch, ungetheilt in die Höhe, spaltete sich aber dann in einen vordern engeren, und einen hintern weiteren Ast, zwischen denen die Speise- und Luftröhre durchging, die sich dann zur absteigenden Aorta vereinigten. Die linke Carot. und Subclav. entsprangen aus der hintern, die rechte aus der vordern Aorta. (Abgebildet bei Meckel, Icon. anat. path. fasc. II. Tab. IX. f. 4. und Tiedemann, tab. art. IV. fig. 6.)

Einen dritten Fall beobachtete *Jos. Exup. Bertin*, traité des maladies du coeur. p. 433.

d. Wenn die rechte Schlüsselbeinpulsader ein rechter Stamm ist, und die beiden Kopf- und die linke Schlüsselbeinpulsader aus einem links liegenden gemeinschaftlichen Stamme hervorkommen.

Einen Fall dieser Art theilt Zagorsky mit (Acta Petrop. 1809. I. p. 384. Tab. 1.), den auch Tiedemann (tab. art. IV. fig. 8.) abbildet.

2) Die Verminderung bis auf einen Stamm gehört zu den seltensten Abweichungen.

Einen Fall dieser Art beobachtete Klinz (Abhandlungen der Josephin. med. chirurg. Akad. Wien 1787. 1. Bd. S. 271. Taf. VI. Fig. 1. 2.) in dem Leichname eines Soldaten. Die Aorta bildete hier eigentlich keinen Bogen, sondern sie theilte sich, sobald sie aus der linken Herzkammer entsprungen war, in einen aufsteigenden und einen absteigenden Ast, von denen jener 4 Zoll hoch, ungetheilt, gerade in die Höhe ging, und dann sich in den ungenannten Stamm, die linke Kopf- und Schlüsselbeinarterie spaltete. (Man findet ihn auch abgebildet bei Tiedemann, tab. arter. Tab. II. fig. 3. und Meckel, Tabulae anat. pathol. Fasc. II. Tab. IX. fig. 4.)

Wahrscheinlich gehört hierher auch ein von Haller (Elem. phys. II. p. 162.) angeführter Fall, wo bei einem Kinde die Aorta, ohne einen Bogen zu bilden, sich sogleich nach ihrem Austritte aus dem Herzen spaltete.

Zuweilen entspringen die Stämme ungewöhnlich nahe an einander, oder ungewöhnlich weit von einander. Im ersten Falle nähert sich die linke Carotis dem ungenannten Stamme; — oder sie ist davon entfernt, dagegen der linken Subclavia näher gerückt, oder zuweilen sind auch alle 3 Stämme so an einander gerückt, daß sie auf den ersten Blick bloß einen Stamm auszumachen scheinen. Rücksichtlich des zweiten Falles fand Meckel (Handb. d. Anat. 3. S. 86) eine merkwürdige Anordnung. Die linke Kopfpulsader war in einem etwa 2jährigen Kinde von dem gemeinschaftlichen Stamme etwa $^1/_2$, die linke Subclav. von der linken Carot. fast einen ganzen Zoll entfernt, der Bogen ungewöhnlich spitz, die linke Carot. aus dem Winkel entspringend.

Bisweilen findet auch eine Verwechselung der Ursprungsstelle Statt, so daß 1) von rechts nach links erst die linke Kopfpulsader und Schlüsselbeinpulsader, und zuletzt der ungenannte Stamm entsteht. (Münz, Gefäßl. 495.)

2) oder die rechte Kopf- und Schlüsselbeinpulsader entspringen einzeln, dagegen die der linken Seite mit einem gemeinschaftlichen Stamme;

3) die rechte und linke Schlüsselbeinpulsader entspringen einzeln, beide Kopfpulsadern aber mit einem gemeinschaftlichen Stamme;

4) beide Kopfpulsadern entspringen mit einem gemeinschaftl. Stamme, beide Schlüsselbeinpulsadern getrennt;

5) Die rechte Subcl. und beide Kopfpulsadern haben einen gemeinschaftl. Stamm, die linke Subcl. bildet den 2ten, und den 3ten macht eine oder die andere untergeordnete Pulsader.

Digitized by Google

Sobald sie durch den Hiatus aorticus des Zwerchfelles durchgekommen ist, giebt sie dem Zwerchfelle die Arterias phrenicas.

Dann schickt sie in der Bauchhöhle, da, wo sie zwischen den Schenkeln des Zwerchfelles liegt, erst die A. coeliaca, nicht weit unter dieser die mesenterica superior, dann die renales zu beiden Seiten, und weiter unten nicht weit von ihrer Endigung die mesenterica inferior. Die Arteriae spermaticae entspringen in der Gegend zwischen der mesenterica superior und inferior, höher oder tiefer, die lumbares in derselben Gegend, indem sie von oben nach unten auf einander folgen. Die coeliaca und die mesentericae gehen vorwärts in die Höhle der Bauchhaut, zu Magen, Leber, Milz, Pankreas und zu den Gedärmen; die renales gehen an beiden Seiten fast quer, wenig abwärts, zu den Nieren; die lumbares von ihrer hintern Seite zu den hintern Theilen der Bauchmuskeln und zu den Rückenmuskeln ꝛc., die spermaticae schräg auswärts hinab zu gewissen Geschlechtstheilen.

Endlich theilt sich die Aorta, indem sie sich endigt, an der vordern Fläche des 4ten Bauchwirbels in die beiden schräg auswärts und abwärts gehenden Arterias iliacas, welche den Eingeweiden des Beckens, dem vordern Theile der Bauchmuskeln und den Beinen bestimmt sind. Zwischen beiden kommt noch in der Mitte die Arteria sacra media aus der Aorta herab.

Diese Aeste der Aorta sind von verschiedener Dicke.

Die dickeren sind: die iliacae, subclaviae, carotides, mesenterica superior, coeliaca, renales, mesenterica inferior.

Die dünneren: die phrenicae, coronariae Cordis, lumbares intercostales, bronchiales, oesophageae, sacra media, spermaticae. Die nur einmal vorhandenen gehören Organen an, die auch nur einmal vorhanden sind.

Aeste der Aorta.

Arteriae Carotides.

Die beiden Arteriae carotides sind dem oberen Theile des Halses und dem Kopfe bestimmt, und etwas dünner, als die Arteriae subclaviae.

Die rechte entspringt gemeinschaftlich mit der Subclavia dieser Seite aus der A. anonyma, die linke aber aus dem Bogen der Aorta. Die rechte liegt weiter nach rechts; die linke weiter nach links; die rechte geht daher anfangs vor der Luftröhre, dann sich weiter rechts lenkend an der rechten Seite der Luftröhre hinauf; die linke geht gleich anfangs

Digitized by Google

an der linken Seite der Luftröhre hinauf. Uebrigens sind im Allgemeinen beide Carotides einander ähnlich, und es ist daher nur nöthig, eine derselben zu beschreiben.

Die Carotis steigt von ihrem Ursprunge, anfangs im obern Theile der Brust, dann am Halse neben der Luftröhre, bis zu der Gegend des Kehlkopfes hinauf. In der Brust liegt sie hinter der quergehenden Vena iugularis sinistra; am Halse liegt jede neben der Vena iugularis interna ihrer Seite ein wenig näher nach innen und vorn, und vor dem Nervus vagus, indem sie mit beiden durch Zellgewebe verbunden ist. Sie wird am Halse ganz vom Platysma, theils auch vom Musculus sternocleidomastoideus und vom Musculus omohyoideus, wo diese Muskeln sich mit ihr kreuzen, bedeckt. Oberhalb der Stelle, wo sie vom M. sternocleidomastoideus bedeckt wird, wird sie nur vom Platysma und von der Haut bedeckt. Hier kann man ihr Klopfen durch die Haut deutlich fühlen, und wenn es stark geschieht, deutlich sehen.

Sie geht ziemlich gerade hinauf, doch zugleich flach geschlängelt, und allmählig lenkt sie sich etwas mehr nach außen und hinten hin.

Bis zu der Gegend des Kehlkopfs giebt sie keinen Ast; ein oder das andere unbeträchtliche Aestchen ausgenommen, das man in einigen Körpern zu nahen Theilen gehend antrifft.

Wenn sie bis neben den Kehlkopf hinaufgekommen ist, so theilt sie sich in 2 Hauptäste. Diese Theilung liegt an der nämlichen Stelle, ein Mensch mag einen langen oder einen kurzen Hals haben. Von dem unteren Rande der Kinnlade dagegen scheint sie bei Neugebornen entfernter zu liegen, unstreitig weil bei ihnen der Zahnzellenrand allein ausgebildet ist, der die Zahnwurzeln einschließende Theil dagegen noch fehlt, und weil der Ast des Unterkiefers sehr niedrig ist [1]). Bis zur Theilungsstelle kann sie Carotis communis heißen.

I. Carotis facialis s. externa, die äußere Kopfschlagader. Diese geht in der Richtung des Stammes ferner hinauf, ist dem vordern Theile des Halses, dem Gesichte, der Hirnschale, den äußeren Theilen derselben und der harten Hirnhaut (aber nicht dem Gehirne selbst) bestimmt.

II. Carotis cerebralis s. interna, die innere Carotis. Diese geht mehr rückwärts und aufwärts hinauf: ist dem vordern Theile des Gehirns, dem Auge und der Stirn bestimmt.

Beide sind in der Dicke wenig verschieden; wenn die facialis die thyreoidea abgiebt, so ist sie ein wenig dicker, als die cerebralis; wenn die thyreoidea aus der Carotis communis kommt, so ist die facialis etwas dünner, als die cerebralis [2]).

[1]) *Allan Burns*, surgical anatomy of the head and neck. Edinburgh 1811. Aus d. Engl. von G. Ed. Dohthof, unter dem Titel: Bemerkungen über die chirurgische Anatomie des Kopfes und Halses, mit Anm. und 10 Kpft. Halle 1829. 8. p. 349.

[2]) Sie theilt sich zuweilen nicht an der gewöhnlichen Stelle in ihre beiden Hauptäste, son-

Digitized by Google

I. Carotis externa oder facialis, die äußere Kopfschlagader [1]).

Die Carotis facialis geht von der Gegend des Kehlkopfes, ein wenig auswärts und rückwärts, bis hinter den hintern Rand des Astes der untern Kinnbacke, vor dem Processus mastoideus und vor dem Ohrknorpel (wo sie von der Parotis bedeckt wird) in die Höhe, und endigt sich mit der Theilung in ihre beiden letzten Aeste. Sie liegt auf diesem Wege an der innern Seite des Nervus hypoglossus, des hintern Bauches des M. digastricus und des M. stylohyoideus, und giebt folgende Aeste: 3 nach vorn: 1) Arteria thyreoidea superior 2) lingualis 3) maxillaris externa; 3 nach hinten: 4) pharyngea 5) occipitalis 6) auricularis posterior, und 2 obere Endäste: 7) temporalis 8) maxillaris interna.

1. Arteria thyreoidea superior, die obere Schilddrüsenarterie [2]).

Sie entspringt von der innern Seite der Carotis facialis, sehr

---

dern weiter abwärts. Auf der rechten Seite liegt zuweilen die Theilungsstelle kaum in der Entfernung eines Zolles von dem ungenannten Stamme, oder an verschiedenen Orten zwischen dieser und der gewöhnlichen Theilungsstelle. *Morgagni* (de sed. et caus. Lib. III. epist. 29. art. 20); Burns, von den Herzkrankheiten. Aus dem Engl. 1813. p. 328, und *Ryan* (Diss. de quarundam arteriarum in c. h. distrib. Edinb. 1812. p. 4.).

Bisweilen theilt sich auch ihr Stamm erst über dem obern Rande des Schildknorpels in der Nähe des Unterkiefers. Dabei ist der Stamm der äußeren Kopf- oder Angesichtspulsader sehr kurz, und zerfällt auf einmal, wie buschelformig, in seine Aeste (Münz, Gefäßlehre, Taf. VI. f. IV. 6.), oder er fehlt fast ganz, so daß die Aeste gleich aus dem gemeinschaftlichen Stamme entspringen, und dieser nur als innere Kopfpulsader fortgeht. (Burns, Herzkh. 327. Surgical anatomy, Edinb. 1811. p. 95.) In einem Falle war die Carotis ein kurzer dicker Stumpf, der dem Stamme der Eingeweide-Arterie glich, und aus dessen oberen Ende eben so die großen Aeste entsprangen. In einem andern Falle gab dieselbe, statt sich zu theilen, Seitenäste ab, bis sie beträchtlich über den Winkel der Kinnlade hinaufgestiegen war; der Basis des griffelförmigen Forts. gegenüber theilte sie sich dann in 2 Aeste, wovon einer die innere Carotis, der andere der gemeinschaftliche Stamm der Temporal- und Maxillararterie war.

Die Carotis interna fehlte einmal ganz (Tode, med. chir. Bibliothek. Bd. X. S. 401.), und *Morgagni* (de sed. et caus. ep. 49. 18.) sah sie beide bei einem sehr alten Manne in der Mitte ihrer Länge ein paarmal gewunden wie eine Schnecke.

Noch gehört hierher der ungewöhnliche Ursprung größerer oder kleinerer Zweige aus dem gemeinschaftlichen Stamme der Carotis. Oft entspringt aus ihm die obere Schilddrüsenpulsader. (Münz, Gefäßl. Tab. VI. fig. 4. 2.) Bisweilen auch die untere Schilddrüsenpulsader, oder auch ein oder der andere Zweig an den Schlund.

Abweichungen des Anfangstheiles von seiner gewöhnlichen Richtung nach rechts oder links, mehr oder weniger geschlängelter Verlauf, oberflächlichere oder tiefere Lage bei ihrem Aufsteigen aus der Brusthöhle, ungleiches Verhältniß der Dicke des rechten und linken Stammes, sind ebenfalls keine sehr seltene Erscheinungen.

[1]) Eine vortreffliche Abbildung eines von Fr. Schlemm meisterhaft gearbeiteten Präparats, welches die oberflächlichen Arterien des Kopfes darstellt, nebst einer Beschreibung derselben, enthält dessen Schrift: Arteriarum capitis superficialium icon nova; acc. Tabb. duae. Berolini 1830. Fol.

[2]) Sie entspringt nicht selten aus der gemeinschaftlichen Kopfarterie höher oder tiefer als

nahe bei dem Ursprunge derselben aus der Carotis communis. Sie ist nach Verhältniß ihres Stammes und des Theiles, zu dem sie geht, von sehr ansehnlicher Dicke, und desto dicker, je dünner die A. thyreoidea inferior ist. Sie geht erst eine sehr kurze Strecke aufwärts und einwärts, krümmt sich dann einwärts, und ferner abwärts zu ihrem Lappen der Schilddrüse hin. Ihre Aeste sind folgende:

a. Muskeläste von unbestimmter Zahl, dem Musculus hyothyreoideus, sternothyreoideus, sternohyoideus, omohyoideus ꝛc. angehörend; nach vorn kommen auch kleine Aestchen zur Haut. Ein Zweig oder einige kleine Zweige gehen auch nach hinten zum Constrictor infimus Pharyngis.

b. Aeste, die in die Schilddrüse gehen. Diese haben theils besondere Stämme, theils solche, die ihnen mit den Muskelästen gemein sind. Sie haben nach unten mit den Aesten der A. thyreoidea inferior, auch nach der andern Seite mit den Aesten der gleichen Schlagader von der anderen Seite Gemeinschaft.

Sowohl aus den Muskelzweigen, als aus den Drüsenzweigen kommen Aestchen zur äußeren Fläche des Schildknorpels.

c. Arteria laryngea [5]). Sie geht zwischen dem obern Rande des Schildknorpels und dem Zungenbeine durch den M. thyreohyoideus

---

halb der Theilung derselben, selbst einen Zoll tiefer (Burns, Herzkhtn. S. 329. Meckel, path. Anat. 2. Bd. 1. Abth. S. 112. *Barclay*, a description of the arteries, p. 13.), und zwar zuweilen zugleich mit der Zungenarterie mittels eines gemeinschaftlichen Stamms (Burns, Herzkhtn. S. 329. *Barclay*, on arteries. p. 13.).

Die der einen oder anderen Seite fehlt bisweilen ganz, und wird durch die entsprechende stärkere untere oder obere Schilddrüsenpulsader durch die der anderen Seite ersetzt, oder sie ist dünner im Verhältniß zur anderen. (Münz, Gefäßlehre. Tab. VI. f. 5. p. 498.)

Aber sie ist auch gar nicht selten doppelt, aber beide Gefäße entspringen dann in nur geringer Entfernung über einander. Der vordere geht dann gleich rückwärts an den hintern Theil der Schilddrüse, oder erst von vorn über den vordern Zweig rückwärts, wodurch er oberflächlicher zu liegen kommt. (Münz, Tab. VI. f. IV. 3.) Bei diesem Zerfallen trennt sich häufig der Kehlkopfsast vom Schilddrüsenaste, und ist immer der obere Stamm.

Oefter nimmt der aus ihr kommende Kehlkopfzweig seinen Ursprung aus einem anderen Aste der äußeren Kopfpulsader (nach Meckel, Handb. d. Anat. 3. S. 92. in dem Verhältniß wie 1 : 8), meist aus der lingualis (Münz, Gefäßl. Tab. VIII. f. 1. 8.), oder höher aus dem Stamme der Angesichtspulsader selbst (ibid. Tab. VI. f. IV. 5.), nach Hildebrandt auch aus der Pharyngea.

[5]) Haller, Icon. anat. fasc. 2. p. 4. sah sie 5mal, und Tiedemann (expl. tab. art. p. 78. not. c.) oft aus dem Stamme der äußeren Kopfarterie entspringen. J. F. Meckel behauptet, daß sich die Fälle, in welchen sie gemeinschaftlich mit der A. lingualis aus einem Stämmchen der Carotis externa entspringe, zu den, wo sie aus der A. thyreoidea käme, wie 1 zu 7 verhielten. Handb. III. S. 94.

In der Regel dringt sie zwischen dem Zungenbeine und Schildknorpel in den Kehlkopf. Sehr selten geht sie zwischen dem Schild- und Ringknorpel ein, wie Sabatier (traité d'anat. Par. 1781. III. p. 151) und Murray (descript. arter. Lips. 1794. p. 11.) angeben, oder durch ein ungewöhnliches Loch des Schildknorpels. (Sömmerring V. p. 126.)

Digitized by Google

hindurch (selten durch ein eigenes Loch in dem obern Theile des Schildknorpels) in die Wände der Höhle des Kehlkopfes, und vertheilt sich zum Schildknorpel, zu den gießbeckenförmigen Knorpeln, zu dem Ringknorpel, zu dem Kehldeckel, zu der Kehlkopfshaut und zu dem vordern Theile des Schlundes.

2. Arteria lingualis, die Zungenarterie [1]).

Sie ist dicker, als die vorige, auch ein wenig dicker als die maxillaris externa, wenn nicht diese die A. sublingualis giebt. Sie entspringt höher als die thyreoidea, und steigt geschlängelt einwärts hinauf, über das große Horn des Zungenbeins, und wird dann vom Musculus hyoglossus bedeckt. Auf diesem Wege giebt sie kleine Aeste zu den nahen Muskeln der Zunge und des Zungenbeins. Einer ihrer Aeste, ramus hyoideus, verbindet sich mit dem von der andern Seite über dem obern Rande des Zungenbeins.

Ferner giebt sie folgende Aeste:

a. Arteria dorsalis linguae, die Arterie des Zungenrückens. Diese geht aufwärts zu dem hinteren Theile der obern Fläche der Zunge, giebt daselbst eine Menge Aeste, welche auf der obern Fläche der Zunge sich netzförmig vertheilen; rückwärts auch einige Aeste zum Kehldeckel.

b. Arteria sublingualis, Unterzungenarterie. Sie geht unter der Zunge am Musculus geniohyoideus vorwärts bis hinter das Kinn, giebt Aeste dem Musculus genioglossus, geniohyoideus, mylohyoideus, der Glandula submaxillaris, hat hinter dem Kinne mit der submentalis Gemeinschaft und ist in einigen Körpern ein Ast der A. maxillaris externa.

c. Arteria profunda linguae s. ranina, die Seitenzungenarterie. Diese ist die Fortsetzung des Stammes, und viel dicker, geht aufwärts und vorwärts in die Fleischmasse der Zunge, und geschlängelt in derselben bis zur Spitze fort, wo sie sich mit der von der andern Seite verbindet. Auf ihrem ganzen Wege giebt sie Seitenäste, die sich in viele kleine Aestchen vertheilen, welche in der Zunge verbreitet sind.

3. Arteria maxillaris externa, die Antlitzarterie [2]).

Sie entspringt nahe über der lingualis, da, wo die Carotis hinter und unter dem Winkel der untern Kinnbacke liegt, und geht, bedeckt

---

[1]) Sie entspringt bald höher bald tiefer aus der äußeren Kopfpulsader, in seltenen Fällen höher als die äußere Kieferpulsader, öfter bildet sie mit der äußeren Kieferarterie einen gemeinschaftlichen Stamm. Haller (icon. anat. fasc. II. p. 5.) sah dies in 50 Körpern 7mal. Tiedemann (explic. tab. art. p. 80.) sah es 10mal, und auch Burns (Herzkhn. 330.) erwähnt dieses Ursprungs.

[2]) Verschiedenheiten finden sich hinsichtlich des Ursprungs, der Größe, des Verlaufs und der Verzweigung sehr häufig.

Oefters bildet sie vor ihrem Uebergange über den Unterkiefer ins Gesicht starke Krümmungen, welche dann in dieser Gegend sehr oberflächlich liegen. (Münz, Gefäßlehre, Tab. VI. fig. IV. 8.) Oefters verläuft sie als stärkere Arterie mehr oder weniger gewunden bis zu dem innern Augenwinkel (ebdas. Tab. VI. f. II. 9 — 16).

Digitized by Google

vom hintern Bauche des M. digastricus, eine kurze Strecke aufwärts, selten mit dieser aus einem gemeinschaftlichen Stamme, und giebt folgende kleinere, sehr veränderliche Aeste:

a. Aeste, welche zum hintern Bauche des M. digastricus, zum stylohyoideus gehen. b. Arteria palatina adscendens, die aufsteigende Gaumenarterie, steigt zwischen dem M. styloglossus und stylopharyngeus hinauf, giebt Aeste zu diesen Muskeln, zum Gaumenvorhange, zur Mandel, zum hintern Theile der Zunge. c. Einen oder einige besondere Aeste zur Mandel. d. Einen oder einige besondere Aeste zum Gaumenvorhange. e. Zu den M. M. pterygoideis. (In einigen Körpern kommen diese Aeste (c. d. e.) alle aus dem Stamme der A. maxillaris externa, in andern einer oder der andere aus der A. palatina adscendens.) f. Ramus Glandulae submaxillaris, einer oder 2 Aeste zur Kinnbackenspeicheldrüse; aus dem Stamme der A. maxillaris, oder aus der A. submentalis.

Der Stamm der A. maxillaris externa geht hierbei in einer Furche der Glandula submaxillaris, von der sie bedeckt wird, weiter, und giebt die A. submentalis.

1. Arteria submentalis, die Unterkinn-Arterie [1]). Sie geht an der innern Seite des untern Randes der untern Kinnbacke zwischen dem M. mylohyoideus und dem vordern Bauche des digastricus vorwärts und allmählig gekrümmt einwärts, giebt Aeste dem M. mylohyoideus, dem vordern Bauche des M. digastricus, auch durchbohrende Aeste, welche durch das Platysma myoides dringen und in die Haut gehen, theils auch am untern Rande der untern Kinnbacke heraufkommen, und mit den Aesten der A. facialis, auch des Ramus mentalis posterior der A. maxillaris interna Gemeinschaft haben. Das Ende der A. submentalis hat mit dem Ende der A. lingualis, und an einer andern Stelle mit dem Ende der A. submentalis der andern Seite und mit der A. coronaria labii inferioris Gemeinschaft, oder kommt gar mit der Arterie der andern Seite in einem Bogen zusammen.

Die A. sublingualis ist in manchen Körpern ein Ast der A. maxillaris externa, und besonders der submentalis, weicht von dieser aufwärts ab, legt sich auf den M. mylohyoideus, geht am M. genihyoideus vorwärts ꝛc.

2. Der Antlitzast, ramus facialis, krümmt sich nun auswärts, nach dem untern Rande des Astes der untern Kinnbacke, und geht an diesem Rande zu der äußern Fläche desselben hinauf. Gemeiniglich ist am Knochen ihre Stelle durch einen flachen Eindruck bezeichnet. Sie wird

---

bisweilen verliert sie sich schon in der Gegend der Oberlippe und des unteren Theiles der Nase (ibid. Tab. V. f. I. 5. 6.), und ihre oberen Zweige werden dann durch Zweige der Schläfen-, Unteraugenhöhlen- und die der A. ophthalmica ersetzt. So fand Burns, Herzkrankheiten p. 330, daß die über die Kinnlade gehende A. maxillaris, die so dünn wie ein Zwirnsfaden war, nur zur Unterlippe ging, und daß die A. transversa faciei der Temporalis wie der Kiel einer Krähenfeder war und deren Stelle vertrat.

[1]) *Fr. Schlemm*, Diss. de arteriarum praesertim faciei anastomosibus. Berolini 1821. 4. c. tab. aen. Fol. p. 3.

Digitized by Google

hier blos vom Platysma und von der Haut bedeckt, so daß man außen ihr Klopfen deutlich fühlen kann. Sie giebt Aeste zum Masseter, Aeste zum M. triangularis und quadratus menti, die sich mit Aesten der A. coronaria inferior und des Ramus mentalis der A. maxillaris interna verbinden; Aeste zum Zahnfleische der untern Kinnbacke; Aeste zum Buccinator, die mit dem Ramus buccalis der A. maxillaris interna Gemeinschaft haben; Aeste zu den M. M. zygomaticis, dem Levator anguli oris. Die drei größeren Aeste, welche sie schickt, sind die beiden Arteriae coronariae Labiorum, Kranzarterien der Lippen, und die angularis. Entweder entsteht erst die A. coronaria inferior besonders, dann die coronaria superior und die angularis aus dem übrigbleibenden Stamme; oder sie schickt erst einen gemeinen Stamm beider A. A. coronariae, so daß der Stamm als A. angularis übrig bleibt.

a. Arteria coronaria Labii inferioris, Kranzarterie der Unterlippe. Sie geht einwärts, am Rande der Unterlippe bis zur Mitte derselben, wo sie sich mit der der andern Seite vereinigt; giebt abwärts Aeste zum M. triangularis und zum M. quadratus Menti, und aufwärts zum M. orbicularis.

b. Arteria coronaria Labii superioris, Kranzarterie der Oberlippe. Sie geht ein- und schräg aufwärts am Rande der Oberlippe bis zur Mitte derselben, wo sie sich mit der gleichen von der andern Seite vereinigt. Sie giebt aufwärts Aeste zum untersten Theile der äußern Nase, abwärts Aeste in den M. orbicularis. Ein Ast geht mit einem gleichen Aste von der andern Seite zum Septum mobile in die Nase hinein.

c. Arteria angularis, Augenwinkelarterie. Diese geht schräg einwärts bis zu der Gegend unter dem innern Augenwinkel und zum obern Theile der äußern Nase hinauf, so daß sie innerhalb der Musculi zygomatici, und außerhalb der übrigen Wangenmuskeln liegt. Sie giebt auf diesem Wege Aeste den Muskeln, an denen sie vorbeigeht, den zygomaticis, dem Levator anguli oris, dem Levator Labii superioris, dem Levator alae Nasi, dem orbicularis Palpebrarum, und der äußern Fläche der äußern Nase. Sie verbindet sich unterweges mit Aesten der A. infraorbitalis, der transversa faciei, und kommt endlich mit der nasalis, aus der ophthalmica, zusammen. Am Rande des Nasenflügels geht ein kleiner Ast derselben bis zur Spitze der Nase fort, der mit dem nämlichen Aste von der andern Seite zusammenkommt. Auch verbinden sich andere Aeste auf dem Rücken der Nase mit den Aesten von der andern Seite. Ein kleines Aestchen dringt gemeiniglich durch ein Loch des Nasenbeins in die Nasenhöhle.

Die oberflächlichen Aeste der A. maxillaris externa geben zugleich Ramos cutaneos für die Haut der untern Kinnbacke, der Wangen, der Lippen, der Nase, des untern Augenliedes.

4. Arteria pharyngea, die Schlundkopfarterie [1]).

Sie ist der kleinste Ast der Carotis facialis.

[1]) Sie entspringt bisweilen aus der Theilungsstelle der gemeinschaftlichen Kopfpulsader, oder

Sie entſpringt von der hintern Seite der Carotis facialis, tiefer in der Gegend der lingualis, oder höher in der Gegend der occipitalis, und ſteigt neben dem Schlunde einwärts hinauf. Sie giebt Aeſte zum Seitentheile und zum hintern Theile des Schlundes, zum Gaumenvorhange, zur Euſtachiſchen Trompete, zu den vordern Nackenmuskeln, zum Ganglion cervicale supremum ꝛc., auch ein oder das andere kleine Aeſtchen, das durch das Foramen condyloideum anterius, oder durch das Foramen iugulare zur harten Hirnhaut geht. Ein Aeſtchen dieſer Ader hat gemeiniglich mit dem Aſte der A. maxillaris interna Gemeinſchaft, der durch den Canalis Vidianus rückwärts geht.

5. Arteria occipitalis, die Hinterhauptarterie [1]).

Sie entſpringt aus der Carotis facialis von der äußern hintern Seite, in der Gegend, wo von der innern die maxillaris externa und die lingualis entſpringen. Sie geht, bedeckt vom hinterſten Theile des M. digastricus, nachher vom oberſten Theile des sternocleidomastoideus, und des trachelomastoideus, unter dem Processus mastoideus des Schläfenbeins, und dann über dem Processus transversus des Atlas, rückwärts, aufwärts und auswärts, indem ſie jenen Muskeln einige Aeſte giebt. So gelangt ſie an den untern Seitentheil des Hinterkopfs, und geht an demſelben, bedeckt vom Musculus splenius Capitis, ſchräg rückwärts und einwärts.

Zuweilen giebt ſie unter dem Processus mastoideus die A. stylomastoidea, die aber in manchen Körpern aus der A. auricularis posterior kommt. Dann entſpringt ein zum Nacken gehender Aſt, Ramus cervicalis, der ſich zu dem M. splenius Capitis, dem trachelomastoideus, dem complexus, dem biventer cervicis und dem cucullaris verbreitet. Ein mehr in die Tiefe dringender Aſt deſſelben tritt zwiſchen dem M. trachelomastoideus und dem M. complexus zu den tiefer liegenden Nackenmuskeln, den rectis und obliquis. Dieſer Aſt verbindet ſich, nach Schlemm, durch ſehr dünne Zweige mit der A. vertebralis und cervicalis ascendens [2]).

Da, wo die A. occipitalis hinter dem Processus mastoideus hinauf, am Foramen mastoideum vorbeigeht, ſchickt ſie gemeiniglich

---

von der Hinterhauptarterie (Hildebrandt), oder von der oberen Schilddrüſenarterie. (Tiedemann, explic. tab. art. p. 80.) Auch Haller (icon. anat. fasc. II. p. 4.) ſah einen ſolchen Urſprung. Sehr ſelten entſpringt ſie ſogar aus dem Anfange der innern Kopfpulsader.

Bisweilen finden ſich 2 Schlundkopfarterien, von denen eine aus dem Winkel der Carotiden, die andere aus der äußeren Kopfarterie, entweder unter- oder oberhalb der Zungenarterie, ihren Urſprung nimmt (Tiedemann, l. c.), oder eine entſpringt aus der äußeren Kopfpulsader, die andere aus einer der untergeordneten Arterien, oder aus der inneren Kopfpulsader. Bisweilen fehlt ſie ganz, und wird durch Aeſte der laryngea, lingualis und der Maxillaris externa erſetzt. (Hildebrandt.)

[1]) Tiedemann (expl. tab. art. p. 80.) ſah ſie 2mal aus der inneren Kopfarterie entſpringen. Einen ähnlichen Fall erzählt Haller (icon. fasc. II. p. 2.). Die der rechten und linken Seite haben oft ungleiche Dicke. Sie iſt in der Regel dünner, wenn die hintere Ohrpulsader ſehr ſtark iſt.

[2]) Schlemm ſah einmal eine Verbindung der A. occipitalis und vertebralis durch einen ſehr dicken Aſt, wobei es das Anſehen hatte, als ſei die A. occipitalis zu einem

Digitized by Google

eine Arteria meningea postica durch ein Foramen mastoideum zum hintern Theile der harten Hirnhaut hinein. Auch jene Rami meningei, welche die pharyngea giebt, sind in einigen Fällen Aeste der A. occipitalis.

Dann theilt sie sich in der Nähe des Querfortsatzes des Atlas in 2 Aeste, mit denen sie sich endigt.

a. Der obere aufsteigende Ast geht zwischen dem Ende des M. cucullaris und des splenius Capitis geschlängelt am Hinterhaupte zum Scheitel hinauf, theilt sich in mehrere Zweige, schickt meistens einen kleinen Ast durch ein Foramen parietale zur Diploë, oder zu der harten Hirnhaut hinein, und anastomosirt mittels eines mehr seitwärts emporsteigenden Zweiges mit der A. temporalis, mit der auricularis posterior mittels des mehr in der Mitte in die Höhe gehenden Astes mit der nämlichen Arterie der andern Seite, und mit der A. frontalis und temporalis.

b. Der untere absteigende Ast ist dünner als der obere, an einigen Körpern viel dünner, geht zwischen dem Musculus cucullaris und dem complexus einwärts, giebt seine Aeste dem obern Theile der Nackenmuskeln, die sich an die Linea semicircularis superior befestigen, und hat Gemeinschaft mit dem nämlichen Aste der andern Seite.

6. Arteria auricularis posterior, die hintere Ohrarterie[1]).

Sie ist in einigen Körpern ein Ast der A. occipitalis, in andern ein Ast der Carotis facialis selbst, und entspringt dann von der hintern Seite desselben, höher als die occipitalis. Sie ist der dünnste Ast der Carotis facialis, doch ist sie dicker, wenn sich ihre Aeste ungewöhnlich weit zum Scheitel hinauf erstrecken. Sie geht beinahe quer über den hinteren Bauch des M. digastricus nach hinten, und durch den (zwischen dem Aste des Unterkiefers und dem processus mastoideus gelegenen) Theil der Parotis hindurch, giebt dann in der Nähe des processus styloideus die A. stylomastoidea, geht hierauf schräg rückwärts hinter dem äußern Ohre hinauf, giebt kleine Aeste zur Parotis, Aeste zum hintern Theile des äußern Ohres, die mit den andern auricularibus Gemeinschaft haben; auch Aeste zum hintern Theile der Schläfe, und zu dem Theile derselben, der sich über dem äußern Ohre befindet. Diese haben nach vorn mit der A. temporalis, nach hinten mit der A. occipitalis Gemeinschaft. In einigen Körpern erstrecken die obern Aeste dieser Ader sich nur bis etwas über das äußere Ohr, in andern höher, bis zum Scheitel hinauf.

Die Arteria stylomastoidea, die Griffellocharterie, ist eine sehr dünne, aber ihres Ganges wegen merkwürdige Ader. Sie entspringt unter dem Processus mastoideus aus der A. auricularis posterior, oft auch aus der occipitalis, tritt durch das Foramen stylomastoideum in den Fallopischen Gang, und geht in demselben bis zu dem Aste der A. meningea media, der durch den Hiatus des Felsenbeins in

---

großen Theile aus der A. vertebralis entsprungen. Art. capitis superf. nova icon, p. 5.

[1]) Entspringt nicht selten aus der occipitalis nach Haller (Icon. anat. fasc. II. p. 8.)

Digitized by Google

denſelben Gang tritt, und der A. stylomastoidea entgegenkommt [1]). Sie giebt Aeſtchen in den Gehörgang, verbindet ſich mit einem Aſte der Arteria temporalis, und bildet mit ihm die Arterien des Paukenfells, ſchickt in die Paukenhöhle zu den Gehörmuskeln, zu den cellulis mastoideis und in den äußern Bogengang Zweige.

Wenn nun endlich die Carotis facialis dieſe Aeſte abgegeben hat, ſo befindet ſie ſich zwiſchen dem Processus mastoideus und dem hintern Rande des Aſtes der untern Kinnbacke, und iſt von der Parotis bedeckt. Sie giebt hier kleine Aeſte in die Parotis und zum Maſſeter, bisweilen einen anſehnlichen Ramus paroticus, und endiget ſich dann, in 2 Aeſte ſich theilend, in die A. temporalis und die A. maxillaris interna.

7. Arteria temporalis, die Schläfenarterie.

Dieſe Schlagader iſt, nach Schlemm, etwas dünner als die A. maxillaris interna, ſteigt, anfangs von der Parotis bedeckt, vor dem Tragus und dem knorpligen Theile des Gehörganges, hinter dem Processus condyloideus der untern Kinnbacke hinauf, und liegt dann an der äußern Fläche der Aponeurosis temporalis hinter der Wurzel des Processus zygomaticus. Ehe ſie ſo weit hinauf gelangt, giebt ſie noch einige kleine Aeſtchen in die Parotis; ferner Ramulos articulares zum Kinnbackengelenke, durch die Fissura Glaseri einen Ramulus acusticus in die Pauke, und einen andern in den Meatus auditorius zum Paukenfelle, der mit dem Aſte aus der A. stylomastoidea den Aderkranz des Paukenfelles zuſammenſetzt. Dieſe Ramuli acustici kommen gemeiniglich mit jenen Ramulis articularibus aus einem kleinen Stamme. Dann giebt ſie folgende Aeſte:

Arteria transversa faciei, die quere Antlitzarterie [2]). Dieſe geht quer vorwärts, unter dem Jochbogen, am obern Theile der äußern Fläche des Maſſeters, und kommt ſo auf die obere Gegend der Wange. Anfangs iſt ſie von der Parotis bedeckt, nachher begleitet ſie den Speichelgang der glandula Parotis. Sie giebt Aeſte in die Parotis, in den Maſſeter, die Musculos zygomaticos, in den untern Theil des M. orbicularis Palpebrarum ꝛc. und hat Gemeinſchaft mit der A. maxillaris externa und der infraorbitalis. Selten iſt ſie ſo groß, daß ſie den obern Theil der Wange bis zum

---

[1]) Schlemm beobachtete einmal, daß ſich die A. stylomastoidea daſelbſt nicht mit der A. meningea media, ſondern mit einem Aſte der A. carotis cerebralis verband. A. a. O. p. 5.

[2]) Die A. transversa faciei iſt in ihrem Verlaufe ſo unbeſtändig, daß ſie oft an demſelben Kopfe ſich auf beiden Seiten nicht gleich verhält.

Sie kommt bisweilen ſo groß vor, daß ſie alle Zweige zur Oberlippe und Naſe abgiebt, (ſiehe Haller, icon anat. fasc. III. p. 12. Burns Herzkrankh. p. 330.) zuweilen iſt ſie aber auch ſo klein, daß ſie ſich bloß in die Augenliedſchließer vertheilt.

Bisweilen entſpringt ſie ehe die Theilung der A. carotis in die A. temporalis und maxillaris interna Statt gefunden hat, und alſo aus dem Stamme der A. carotis ext. Sömmerring ſieht dieſe Art des Urſprungs ſogar als den regelmäßigen Fall an. Allein nach J. F. Meckel's Handb. d. Anat. III. 107, und nach mehreren Anatomen, die er citirt, iſt ihr Urſprung aus der Temporalis der häufiger vorkommende Fall.

Digitized by Google

obern Theile der äußern Nase ohne die A. angularis versorgt, da dann die A. maxillaris externa kurz über der labialis superior sich endiget [1]).

b. Arteria auricularis inferior, ein kleiner Ast, der rückwärts zum untern Theile des äußern Ohres geht.

c. Arteria auricularis anterior, ein größerer Ast, der vor dem äußern Ohre hinaufsteigt, und dem vordern Theile desselben Aeste giebt, welche mit der auricularis posterior und superior Gemeinschaft haben. In einigen Körpern kommt sie aus der transversa faciei.

d. Arteria temporalis media, mittlere Schläfenarterie, von manchen auch A. temporalis profunda genannt. Sie entspringt an dem oberen Theile des Anfanges des Jochfortsatzes, tritt unter die aponeurosis temporalis, und steigt am hinteren Theile des Musculus temporalis empor.

Wenn der Stamm der A. temporalis die äußere Fläche der Aponeurosis des Schläfenbeins erreicht hat, so theilt er sich in 2 Endäste: [2])

a. Arteria temporalis frontalis s. anterior, vordere Schläfenarterie. Diese geht im obern Theile der Schläfe schräg vorwärts gegen den obersten Theil der Stirne hinauf, giebt ihre Aeste dem vordern Theile der Schläfe, weiter oben dem vordern Theile ihrer Hälfte des Scheitels und des obern Theiles der Stirne, wo sie mit der A. frontalis aus der A. ophthalmica Gemeinschaft hat.

b. Arteria temporalis occipitalis s. posterior, hintere Schläfenarterie. Diese geht schräg rückwärts hinauf, giebt ihre Aeste dem hintern Theile der Schläfe, dem hintern Theile ihrer Hälfte des Scheitels, dem obern Theile des Ohres, und hat Gemeinschaft mit der A. auricularis posterior und der A. occipitalis.

8. Arteria maxillaris interna, die innere Kieferarterie [3]).

Diese Schlagader [4]) lenkt sich hinter dem Aste des untern Kinnbackenbeins über dem Ligamentum laterale desselben nach innen, und steigt etwas geschlängelt gegen den obern Theil der Fissura sphenomaxillaris oder pterygopalatina schräg einwärts vorwärts hinauf.

Auf diesem Wege geht sie meistens zwischen beiden Musculis pterygoideis durch, giebt eine tiefe Ohrarterie, Ramulus acusticus, an der innern Seite des Processus condyloideus entspringt, und rückwärts durch die Fissura Glaseri in die Pauke zum Musculus mallei externus geht, und kleine Aeste zum Kinnbackengelenke. Dann kommen aus ihr folgende Aeste:

---

[1]) Zu dem Arteriennetze des Gesichtes fließt das Blut vorzüglich durch die A. maxillaris ext., transversa faciei, infraorbitalis und ophthalmica zu. Ist die eine groß, so ist die andere kleiner.

[2]) Geschieht diese Theilung erst sehr spät, so giebt sie, nach Schlemm, zuvor eine Arterie, die sich über die Schläfen zur Außenseite des M. orbicularis palpebralis wendet, und mit der A. lacrimalis transversa faciei anastomosirt, und die Schlemm Zygomaticoorbitalis, Tiedemann A. temporalis anterior nennt.

[3]) In einem Präparate, das Münz besitzt, entstand sie erst über dem Jochbogenfortsatze des Schläfenbeines aus der Schläfenpulsader. (Gefäßl. S. 499.)

[4]) *Just. Godofr. Günz*, Commentatio de arteria maxillari interna. Lips. 1743. 4.

a. Arteria meningea media s. spinosa, mittlere Hirnhautarterie [1]). Diese Schlagader giebt der harten Hirnhaut den größten Theil des Blutes, das diese erhält. Sie geht zum Foramen spinosum der Ala magna des Keilbeins hinauf, giebt unterwegs kleine Aestchen dem Musculus pterygoideus externus und der Trompete, tritt durch das genannte Loch in die Hirnschale zur harten Hirnhaut, in derselben erst am vordern Theile der innern Fläche der Schuppe des Schläfenbeins hinauf, und theilt sich in einen hintern und einen vordern Ast, welche sich beide in der harten Hirnhaut baumförmig vertheilen, und, wie ihr Stamm, an der innern Fläche der Hirnschale Furchen bewirken, die man im todten und von der harten Hirnhaut entblößten Schädel als Spuren derselben sieht.

Ein Ohrzweig, Ramulus acusticus, dieser Schlagader geht vom Stamme derselben rückwärts auf die vordere Fläche des Felsenbeins und durch den Hiatus in den Fallopischen Gang, der A. stylomastoidea entgegen. In einigen Körpern ist dieser Ast gröser, und theilt sich in 2, deren kleinerer in den Fallopischen Gang geht, deren größerer sich zur harten Hirnhaut vertheilt.

b. Ramus temporalis profundus, die tiefe Schläfenarterie, wird vom Musculus temporalis bedeckt, und vertheilt sich in dem untern Theile desselben, theils auch im M. pterygoideus externus. Zuweilen geht ein Ast desselben durch einen Kanal des Jochbeins in die Augenhöhle, zur Periorbita, zum Fette der Augenhöhle, und giebt in einigen auch einen Ast zur Thränendrüse.

Die Rami pterygoidei für die Musculos pterygoideos entspringen in einigen Körpern theils aus der A. temporalis profunda, theils aus der A. maxillaris inferior, in andern eine oder beide besonders aus dem Stamme der A. maxillaris interna.

In manchen Körpern sind zwei Rami temporales profundi da.

c. Arteria maxillaris inferior s. alveolaris inferior s. dentalis inferior, die Unterkieferarterie oder die untere Zahnarterie. Diese geht mit dem Nervus maxillaris inferior zwischen den Musculis pterygoideis vorwärts herab, tritt durch das Foramen maxillare posterius in den Kanal des Unterkiefers, und geht in demselben bis zum Foramen mentale, und dann ferner bis unter die Zahnhöhle des ersten Vorderzahns fort.

Ehe die A. maxillaris inferior in diesen Canal tritt, giebt sie einen Ast zum Musculus pterygoideus internus, und die A. mylohyoidea, welche, von dem Foramen maxillare posterius an, in einer Furche der innern Seite des Astes der untern Kinnbacke schräg vorwärts herab zum Musculus mylohyoideus geht, und mit der A. submentalis Gemeinschaft hat.

Die A. maxillaris inferior selbst giebt aus dem Canale, in dem sie sich befindet, einzelne Aeste aufwärts für die einzelnen Zähne. Jeder Zahn erhält aus ihr so viel Aeste, als seine Wurzel Zinken hat; zu den

[1]) In manchen Körpern ist noch eine A. meningea media accessoria da, welche nahe bei dieser entspringt, der Trompete, dem Musculus circumflexus des Gaumens ꝛc. Aestchen giebt, und durch das Foramen ovale des Keilbeins zur harten Hirnhaut geht.

Digitized by Google

Zähnen, welche mehr Zinken haben, kommen entweder eben so viel einzelne Aeste, oder ein Ast, der sich in eben so viele Aeste theilt [1]). Jeder Ast geht durch ein Loch in der Zahnhöhle, und ein Loch an der Spitze der Wurzel in die Höhle des Zahns, und verbreitet sich in dem in der Höhle jedes Zahns liegenden Zahnsäckchen, nicht in der harten Zahnsubstanz.

Wenn diese Schlagader an das Foramen mentale gelangt ist, so giebt sie aus demselben einen Ast (Ramus mentalis) hervor, welcher dicker ist, als ihre ferner im Canale fortgehende Fortsetzung, und sich in der Mitte der vordern Fläche des Kinnes zum Musculus quadratus, triangularis und zur Haut vertheilt, indem er mit den Aesten des Ramus facialis und des Ramus submentalis der A. maxillaris interna Gemeinschaft hat.

d. Arteria buccalis s. buccinatoria, die Backenarterie [2]). Diese geht zum Musculus Buccinator, vertheilt sich in demselben, und in den benachbarten Theilen der Mundmuskeln und der Haut, und hat Gemeinschaft mit den Aestchen der A. infraorbitalis und der maxillaris externa.

e. Arteria alveolaris superior s. dentalis superior, die Oberkieferarterie oder die obere Zahnarterie. Diese giebt einen Ast zum Zahnfleische der obern Kinnbacke; dann geht ihr Ramus dentalis, als ihre Fortsetzung, durch das Foramen alveolare des obern Kinnbackenbeins in eine Rinne, die im Körper des obern Kinnbackenbeins am Sinus maxillaris liegt, und giebt einzelne Aeste zu den Zähnen, wenigstens zu den 5 hintern Zähnen.

Die folgenden letzten Aeste der A. maxillaris inferior entspringen im obern Theile der Fissura spheno-maxillaris.

f. Arteria infraorbitalis, die Unteraugenhöhlen-Arterie. Diese geht durch den Canalis infraorbitalis schräg vor- und abwärts zum Angesichte, und kommt daselbst aus der vordern Oeffnung dieses Canales bei dem Levator anguli Oris hervor. Ehe sie in diesen Canal tritt, giebt sie kleine Aeste zur harten Hirnhaut und durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle zur Periorbita, und zum Fette; auch hat sie mit der A. palpebralis inferior Gemeinschaft.

Aus dem Canale giebt sie kleine Aeste in den Sinus maxillaris hinab, deren einer Zweige für die Zähne giebt, welche mit der A. alveolaris Gemeinschaft haben, oder allein zu den 3 vordern Zähnen gehen.

Wenn sie endlich aus ihrem Canale ins Angesicht kommt, so vertheilt sie sich in den Muskeln der Wange, den Zygomaticis, dem Levator anguli Oris, dem Levator labii superioris, und hat Gemeinschaft mit der A. transversa faciei und mit der A. angularis.

g. Arteria palatina descendens s. palatina superior s. pterygo-

---

[1]) *Hunter*, Natural history of the human Teeth. London 1766. Platte XII.

[2]) Bisweilen kommt sie nicht aus dem Stamme, sondern aus dem Ramus temporalis profundus, oder dem maxillaris inferior.

Digitized by Google

palatina, die absteigende Gaumenarterie oder die obere Gaumenarterie, oder endlich die Flügelgaumenarterie. Sie geht aus der Fissura sphenopalatina nebst einem oder 2 Nebenästen derselben durch den Canalis pterygopalatinus maior durch die beiden Canales pterygopalatinos minores schräg vorwärts hinab. Sie und diese Nebenäste kommen so zum Gaumenvorhange, vertheilen sich in demselben und haben Gemeinschaft mit der A. palatina adscendens aus der maxillaris externa.

Aus ihr entspringt die Arteria palatina anterior, vordere Gaumenarterie, welche in der Gaumenhaut unter dem knöchernen Gaumen vorwärts geht, mit der andern in einen Bogen zusammenkommt, aus dem ein Ast in das Foramen palatinum anticum hinaufgeht, welcher sich in diesem Loche in 2 Aeste theilt, deren jeder durch seine obere Oeffnung dieses Loches auf die obere Fläche des Gaumens hinauf kommt, und daselbst sich in der Nasenhaut vertheilt.

Die Arteria pharyngea suprema s. pterygoidea s. Vidiana ist ein kleiner Ast, der aus der A. maxillaris interna selbst, oder aus der pterygopalatina kommt, durch den Canalis Vidianus rückwärts zu den Muskeln des Gaumenvorhangs und zum obersten Theile des Schlundes geht.

h. Arteria sphenopalatina s. nasalis, Keilbeingaumen-Arterie oder die hintere Nasenarterie. Diese geht quer einwärts durch das Foramen sphenopalatinum zum hintern obern Theile der Schleimhaut der Nase und zur Scheidewand derselben. Wenn 2 Foramina sphenopalatina da sind, so theilt sie sich in 2 Aeste, deren je einer durch eins dieser Löcher geht.

II. Carotis cerebralis, die innere Kopfarterie, oder die vordere Hirnarterie [1]).

Die Carotis cerebralis [2]) geht ungefähr neben dem Kehlkopfe von der Carotis communis so ab, daß sie im Hinaufsteigen ein wenig schräg rückwärts und auswärts weicht. Sie steigt zum Canalis caroticus hinauf, macht unter demselben erst eine oder einige meistens schwache Krümmungen, gemeiniglich so, daß sie sich abwärts und einwärts, und dann wieder aufwärts biegt. Nun tritt sie in den Canalis caroticus, geht nach der Richtung desselben erst aufwärts, und krümmt sich dann so, daß sie schräg vorwärts und einwärts geht, und kommt so in die Höhle der Hirnschale. Sie geht ferner in der Rinne neben den

---

[1]) Abweichend entspringen aus ihrem Stamme bisweilen ein oder der andere stärkere Zweig, die Schlundkopfpulsader, oder die Hinterhauptpulsader. Bisweilen geht ihr Stamm anfangs dicht an der äußern hintern Seite der äußern Kopfpulsader aufwärts, und erst in der Nähe des Winkels des Unterkiefers unter einer plötzlichen starken Krümmung rückwärts an die äußere Oeffnung ihres Kanals des Schläfenbeins über, wo dann die Carotiden in dieser Gegend stärkere Pulsationen zeigen.

[2]) Einen sonderbaren Fall, wo die Carotis cerebralis auf einer Seite ganz fehlte, findet man beschrieben in des Hrn. Prof. Tode Bibliothek. 10. B. S. 401.

Digitized by Google

Processibus clinoideis posterioribus des Keilbeins schräg aufwärts, tritt in den Sinus cavernosus, krümmt sich in demselben, von dem Blute desselben umgeben [1]), neben dem Sattel wieder vorwärts, und dann zwischen dem Processus clinoideus anterior und medius wieder aufwärts, zugleich etwas rückwärts und einwärts, durch die Lamina interna der harten Hirnhaut in die Höhle derselben, so daß sie hinter das Foramen opticum gelangt, und erreicht dann sofort die Grundfläche des Gehirns. Sie geht also im Ganzen von ihrem Ursprunge bis zur Grundfläche des Gehirns in einem Schlangengange.

Aus dem Canalis caroticus giebt sie ein kleines Aestchen vorwärts, das sich mit der A. Vidiana verbindet. Auf dem Wege vom Canalis caroticus bis zum Foramen opticum giebt sie 2 oder 3 kleine Aeste (arteriae sinus cavernosi s. receptaculi), welche sich in der harten Hirnhaut, in der Glandula pituitaria, auch im Sehnerven, im 4ten, 5ten und 6ten Hirnnerven, und zum grauen Hügel vertheilen.

Hinter dem Foramen opticum giebt sie die Arteria ophthalmica, und hierauf theilt sie sich über dem Foramen opticum an der Grundfläche des Gehirns in 4 Aeste: [2])

1) Ramus communicans s. posterior [3]).

2) Ramus choroideus.

3) Ramus externus s. Arteria Fossae Sylvii.

4) Ramus anterior s. Arteria Corporis callosi [4]).

In einigen Körpern kommt der Ramus communicans erst aus dem Stamme, und dann theilt sich dieser in den Ramus externus und anterior; in andern

---

[1]) Bei einigen Säugethieren, Hunden, Kühen, Schafen ꝛc. ist im Sinus cavernosus das sogenannte Rete mirabile, da die Carotis sich in mehrere Aeste theilt, die sich wieder mit einander verbinden, und endlich wieder in einem Stamme zusammenkommen.

[2]) Nicht immer ist ihre Anordnung symmetrisch, sondern nach Haller (Icon. anat. Fasc. VII. p. 6.), was auch Meckel (Handb. d. Anat. 3. S. 129) bestätigt fand, nicht selten dadurch unsymmetrisch, daß die beiden großen mittlern Pulsadern bloß aus der rechten, die kleinere vordere bloß aus der linken Carotis entspringen.

Bisweilen entsteht auch auf ähnliche Weise bloß die linke vordere Pulsader aus der linken innern Kopfpulsader, die 3 übrigen dagegen kommen aus der rechten. Meckel (Handb. d. Anat. 3. S. 130) sah dies einmal.

Selten geht an der Vereinigungsstelle der beiden Balkenpulsadern nach jeder Seite ein großer hinterer Ast ab, und der vordere Vereinigungsast wird der einfache Stamm des vordern Theils der Balkenpulsader, welcher sich nach einem kurzen Verlaufe in 2 große Aeste, einen rechten und einen linken, spaltet; oder beide entspringen aus einem gemeinschaftlichen Stamme, ohne einen Ast nach hinten abzugeben. (Siehe Meckel's Handb. d. Anat. 3. S. 128.)

[3]) Bisweilen ist sie ein Ast der vordern Hirnpulsader, seltener, wenn die hintere Hirnpulsader aus der innern Kopfpulsader entsteht, stammt sie aus der Zapfenpulsader.

Eine außerordentliche Seltenheit ist ihr gänzlicher Mangel. Eines Falles erwähnt Barclay, wo durch Injection der Kopfpulsader keine Flüssigkeit in die Wirbelpulsader, und aus dieser eben so wenig in die Kopfpulsader drang. (On arteries, p. 47.) Siehe Meckels Handb. d. Anat.

[4]) Ueber die feinere Verzweigung dieser Arterien sehe man S. Th. Sömmerring (de administrationibus anatomicis), Denkschriften d. königl. Acad. d. Wissenschaften zu München für das Jahr 1808.

Digitized by Google

Körpern theilt sie sich erst in diese 2 Aeste, und der Ramus communicans kommt aus dem Ramus externus.

Ramus communicans, der Verbindungszweig.

Dieser geht an der Grundfläche des Gehirns schräg rückwärts, einwärts, an der äußern Seite der Eminentia candicans und unter dem Pedunculus cerebri hin, so daß er mit dem von der andern Seite convergirt, und vereiniget sich mit der A. cerebri profunda aus der A. basilaris. Unterwegs giebt er Seitenäste in die benachbarten Theile des untern Theiles des Gehirns.

Arteria choroidea, Adernetzarterie [1]).

Sie geht etwas nach außen und hinten, längs dem hinteren Rande des Sehnervenursprungs über den vorderen Theil des Hirnschenkels weg in die Höhe, und verbreitet sich theils in die Gefäßhaut des vordern Theils des hintern Hirnlappens, theils in den Sehhügel, theils dringt sie durch die Spalte des untern Horns des Seitenventrikels zur innern Oberfläche des Gehirns und zum Plexus choroideus.

Arteria fossae Sylvii, Arterie der Querfurche des großen Gehirns, oder mittlere Hirnarterie.

Diese ist als Fortsetzung des Stammes anzusehen, geht an der Grundfläche des Gehirns schräg auswärts, legt sich in die Fossa Sylvii zwischen den vordern und hintern Lappen des großen Gehirns, und giebt diese rückwärts zum hintern, vorwärts zum vordern Lappen, und endigt sich am Ende der Fossa mit Aesten, welche sich zu der obern Fläche des Gehirns hinauf erstrecken. Bemerkenswerth ist, daß mehrere beträchtliche Aeste in der Fossa Sylvii nahe an der Grundfläche tief in das Mark des Gehirns eindringen, und sich im Sehhügel und gestreiften Körper vertheilen.

Arteria corporis callosi, Balkenarterie oder Arterie der Längenfurche des großen Gehirns, oder vordere Hirnarterie.

Diese geht an der Grundfläche des Gehirns, zwischen dem 2ten und 3ten Nerven, schräg vorwärts und einwärts, so daß sie mit der andern Seite convergirt, giebt Aeste dem 2ten und 1sten Nerven, und erreicht die innere Seite der Grundfläche des vordern Lappens. Dann geht aus der innern ein kurzer quergehender Ast (ramus communicans arteriarum

[1]) Siehe Meckels Handb. der menschlichen Anat. B. 3. S. 126, welcher eben so wie Sabatier, Boyer und Bichat fand, daß dieser Ast ein beständiger sei.

Digitized by Google

corporis callosi) in die der andern Seite über, so daß beide Arteriae corporis callosi durch denselben Gemeinschaft haben. Aus diesem Ramus communicans geht bisweilen ein kleiner Ast zum Ventriculus tertius ꝛc. hinauf.

Beide Arteriae corporis callosi laufen dann parallel vorwärts, krümmen sich aufwärts, ferner rückwärts, legen sich auf das Corpus callosum und gehen auf demselben parallel nach hinten hin. Jede derselben giebt auf diesem Wege Aeste zum vordern Lappen, zum Corpus callosum, und zu ihrem Hemisphaerium des großen Gehirns.

Arteria ophthalmica, Augenarterie.

Sie entspringt von der vordern Seite der Carotis cerebralis[1] da, wo dieselbe, aus dem Sinus cavernosus kommend, die innere Platte der harten Hirnhaut durchbohrt hat, und sich nun in der Höhle der harten Hirnhaut, unter der Grundfläche des Gehirns hinter dem Foramen opticum befindet. Von ihrem Ursprunge geht sie durch das Foramen opticum unter dem Nervus opticus, und etwas weiter nach außen liegend, selten über demselben schräg vorwärts, abwärts und auswärts in die Augenhöhle. Ehe sie in die Augenhöhle tritt, giebt sie kleine Aeste an harten Hirnhaut, und bisweilen einen größeren, den man Arteria meningea media nennt. Auch schickt sie kleine Aeste zum Nervus opticus. In der Augenhöhle giebt sie folgende Aeste, bei denen es aber in Rücksicht ihres Ursprungs aus dem Stamme, oder aus Aesten desselben, und der Ordnung, in welcher sie entspringen, so viele Verschiedenheiten giebt, daß sich darüber nichts festsetzen läßt, und daß man genöthigt ist, dieselben nach der Ordnung aufzuführen, in welcher die Theile liegen, zu welchen sie sich begeben. In dieser Rücksicht kann man die Aeste, welche sich zum Augapfel und zu dessen Muskeln, und die, welche sich zu andern Theilen begeben und wenigstens mit manchen ihrer Zweige zur Augenhöhle hinausgehen, unterscheiden.

a. Arteriae ciliares posticae, hintere Blendungsarterien. Unter diesem Namen werden diejenigen kleinen Schlagadern belegt, welche die Sklerotika durchbohren, zur Aderhaut, zum Corpus ciliare und zur Iris gehen. Ehe sie die Sklerotika durchbohren, geben sie feine Aeste an die auswendige Fläche derselben.

Gemeiniglich sind 2 dickere Stämme derselben da, deren einer mehr außen und oben, der andere nach innen und unten liegt. Sie entspringen beide oder nur eine aus dem Stamme der A. ophthalmica, und wenn letzteres ist, die andere aus dem Ramus muscularis inferi

[1]) Schon Ingrassias hat den Ursprung der ophthalmica gekannt (comm. in Gal. de ossib. p. 90.)

Digitized by Google

gehen geschlängelt neben dem Sehnerven vorwärts, dem sie feine Aeſtchen geben, und theilen ſich, gemeiniglich ohnweit dem Augapfel, in mehrere Aeſte.

Neben dieſer dickeren Arterie liegen einige dünnere, welche aus der A. ophthalmica, oder aus dem unteren Augenmuskelaſte, oder aus der Thränenarterie ꝛc. kommen, auch neben dem Sehnerven, aber gerader, vorwärts gehen.

Am hintern Theile des Augapfes theilen ſich dieſe Arteriae ciliares posticae in viele Aeſtchen, deren einige, welche dicker ſind (15, 18, 20 ꝛc.) die Sklerotika an ihrem hintern Theile, andere dünnere dieſelbe weiter vorn durchbohren und auch an der äußern Oberfläche der Sklerotika mit Aeſten der Arteriarum ciliarium anticarum zuſammenkommen.

Einige Zweige gehen zu der Stelle, an welcher ſich die harte Scheide des Sehnerven mit der Sklerotika verbindet, theilen ſich daſelbſt in Aeſtchen, und bilden einen Aderkreis, welcher den Eingang des Sehnerven in die Sklerotika umgiebt. Aus dieſem Aderkreiſe kommen Aeſtchen, welche die Sklerotika durchbohren, zum hinterſten Theile der Aderhaut. So gelangen die meiſten Zweige zur Aderhaut, vertheilen ſich in ihr in kleinere und kleinere Aeſte, welche vorwärts gehen und ſich unter ſehr kleinen Winkeln unter einander verbinden. An dem vordern Theile der Aderhaut treten ſie an die inwendige Fläche derſelben, ſo daß ſie auswendig von den Venis vorticosis bedeckt werden.

Sehr viele gehen endlich in das Corpus ciliare über. In jedem Processus ciliaris laufen längs deſſelben viele Aeſte, vielfältig mit einander verbunden, vorwärts bis zum ſtumpfen Ende deſſelben fort, an dem ſie ſich endlich in kurzen Bögen umſchlagen und rückwärts gehen. Einige von ihnen erreichen den vorderſten Theil der Aderhaut, der vom Orbiculus ciliaris bedeckt wird, theilen ſich in ihm in Aeſte, gehen jedoch nicht in einen eigenen Kreis zuſammen, ſondern endigen ſich in den von den vorderen Ciliararterien gebildeten Gefäßkreis der Iris.

b. Arteriae ciliares anticae, die vorderen Blendungsarterien. Dieſe ſind entweder Aeſte der A. ophthalmica ſelbſt, oder des Ramus supraorbitalis, oder der Augenmuskelzweige, oder endlich anderer Aeſte der A. ophthalmica, kommen zum vordern Theile der Sklerotika, und theilen ſich daſelbſt in mehrere Aeſte. Einige dieſer Aeſte vertheilen ſich an der auswendigen Fläche der Sklerotika: die meiſten aber gehen durch die Sklerotika hindurch in den Orbicularis ciliaris, und vorwärts zum Umfange der Iris auf die vordere Fläche derſelben. Dicht am Umfange der Iris theilt ſich jede derſelben in 2 oder 3 Aeſte, die ſich mit einander verbinden und den größeren Kreis der Iris zuſammenſetzen, zu welchem auch einige längere Aeſte der hinteren Blendungs-

Digitized by Google

arterien hinzustoßen. Wenige kleine Aeste gehen aus diesem großen Kreise rückwärts zur Aderhaut. Viele Aeste aber, welche Fortsetzungen der Stämme sind, oder welche aus dem Bogen des größeren Kreises entspringen, gehen, wie Strahlen, convergirend gegen den Rand der Sehe. Einige derselben kommen gerade und ohne Verbindung mit andern bis zum Rande der Sehe; einige verbinden sich, meist 2 und 2, ohnweit der Sehe in Bogen. Diese Bogen machen zusammen den kleinern Kreis aus, der aber nicht ganz ist, weil nicht alle diese Bogen sich mit einander verbinden. Von diesen Bogen gehen dann ferner Aeste mit denen des großen Kreises, die ohne Verbindung hieher kommen, convergirend zum Rande der Sehe hin. Beim Embryo, so lange sein Sehloch noch durch die Pupillarmembran verschlossen ist, fehlt dieser kleinere Kreis, und die kleinen Arterien laufen im Mittelpunkte der Membran zusammen, zuweilen findet man selbst bei Neugebornen Ueberbleibsel dieser Gefäße, welche quer über das Sehloch gehen [1]).

c. Arteria centralis, die Centralarterie der Markhaut [2]). Wie der Sehnerve in der Höhle der Hirnschale dünne Aestchen von der Carotis cerebralis erhält, so erhält er auch in der Augenhöhle kleine Aeste von der A. opthalmica und ihren Ramis ciliaribus. Die A. centralis ist ein besonders benannter dünner Ast der A. ophthalmica, der etwas dicker ist, als jene dünneren Aestchen. Sie entspringt aus der A. ophthalmica selbst, in einigen Körpern eher, als die übrigen Aeste derselben, in andern zwischen den ciliaribus; oder aus einem Ramus ciliaris, oder aus einer untern Augenmuskelarterie derselben. Sie dringt, den Scheiden des Sehnerven Aeste gebend, schief vorwärts in den Sehnerven bis in dessen Mitte, geht dann in der Axe desselben, so daß sie einen cylindrischen Canal, porus opticus, ausfüllt, in den Augapfel hinein. Hier giebt sie der inwendigen Fläche der Nervenhaut Zweige; ein bei ungebornen Kindern ganz deutlicher Ast aber geht mitten durch den Glaskörper bis zur Mitte der vordern Fläche desselben, wo die hintere Wand der Linsenkapsel daran anliegt, vorwärts. Hier zertheilt er sich in viele Aeste, welche sich divergirend zur Linsenkapsel begeben, und an ihrer hinteren Wand nach der Mitte zu laufen und unter einander anastomosiren [3]).

d. Arteriae musculares. Diese sind theils Aeste der A. ophthal-

---

[1]) *Jacob*, Inquiries respecting the anatomy of the eye; in Medico-chirurgical transactions, Vol. XII. p. II. p. 487. Tiedemann, in d. Zeitschrift für Physiologie, B. II. Darmstadt 1827. 4. p. 336.

[2]) *Albin*, Annot. acad. Lib. I. *Wrisberg*, Novi commentarii soc. reg. Goetting. 1772. Tab. I. Fig. 2, 3. *Blumenbach*, Comm. de oculis Leucaethiopum. Goettingae 1786. c. fig. et Inst. physiol. Goetting. 1787. Tab. 2.

[3]) *Wrisberg*, Novi commentarii soc. reg. Goetting. 1772. Tab. I. fig. 4. u. *Soemmerring*, Icones oculi humani.

Digitized by Google

mica selbst, theils Aeste anderer Aeste derselben, z. B. der Supraorbitalis. Gemeiniglich sind 2 größere A. musculares da, eine superior und eine inferior, welche dem M. rectus inferior, dem rectus externus, dem obliquus inferior, auch der Beinhaut Aeste giebt, und mit Aesten der A. infraorbitalis Gemeinschaft hat.

e. Arteria lacrymalis, die Thränenarterie. Sie entspringt gemeiniglich aus dem Stamme der A. ophthalmica, im Hintergrunde der Augenhöhle, entweder allein, oder gemeinschaftlich mit einem Muskelzweige; in einigen Körpern aus der A. meningea media, wo sie dann durch die Fissura orbitalis superior oder durch ein eignes Loch in die Augenhöhle kommt. Sie geht unter dem M. rectus superior nach außen und nach vorn, und giebt mehrere Aeste, deren merkwürdigste folgende sind: einen Ast oder 2 Aeste zu den Augenmuskeln, die an der äußern und untern Seite des Augapfels liegen, einen (welcher jedoch bisweilen fehlt) durch einen engen Canal, der von der Superficies orbitalis des Jochbeins zur Superficies malaris desselben geht, in die Schläfengrube, wo er mit der A. temporalis profunda Gemeinschaft hat, einen der schräg auswärts zur Thränendrüse hinaufgeht, und sich in derselben vertheilt, kleine Zweige zum Musculus orbicularis palpebrarum, und sich mit den Augenliedarterien verbindet.

f. Arteria supraorbitalis, Oberaugenhöhlen-Arterie. Diese geht aufwärts und einwärts, giebt Aeste dem M. trochlearis, dem Rectus superior, dem Rectus internus, dem Levator Palpebrae superioris, der Beinhaut; geht dann durch den Einschnitt oder das Loch des Stirnbeins zur Stirne hinauf, und vertheilt sich, vom M. frontalis bedeckt, auf der Stirne mit einem Aste, der nach innen, und einem, der nach außen hinaufsteigt.

g. Arteriae ethmoideae, Siebbeinarterien. Sie gehen einwärts zu den Foraminibus ethmoideis. Wenn nur ein solches Foramen da ist, so ist auch nur eine solche Schlagader, und zwar die vordere da. Diese geht über den N. patheticus hinter der Rolle des M. trochlearis in das vordere Foramen ethmoideum, giebt Aeste den vorderen Siebbeinzellen, den Stirnhöhlen, kommt in die Höhle der Hirnschale über die Siebplatte, giebt Aeste der harten Hirnhaut dieser Gegend, geht durch ein Loch der Siebplatte, oder schon getheilt durch zwei Löcher in den vordern Theil der Nase hinab, und vertheilt sich in der Schleimhaut der Scheidewand. Die hintere ist unbeständig und kleiner, entspringt weiter hinten, als jene, giebt Aeste dem M. rectus internus, dem Patheticus, und durch das hintere Foramen ethmoideum den hintern Siebbeinzellen ꝛc. Ihre Aeste verbinden sich mit den Aesten der A. sphenopalatina und der Ethmoidea anterior, und werden, wenn sie fehlt, durch dieselben ersetzt.

Wenn die A. ophthalmica alle diese Aeste abgegeben hat, so geht sie an der innern Seite der Augenhöhle über dem Ligamento palpebrali interno in die Höhe gegen den innern Augenwinkel zu, und giebt an demselben zuletzt folgende 4 Aeste:

Digitized by Google

h. Arteria palpebralis superior, die obere Augenliedarterie. Sie entspringt nicht selten mit der inferior aus einem gemeinschaftlichen Stamme. Sie geht in der Nähe des Augenwinkels zur Caruncula lacrymalis und zum obern Augenliede, wo sie in einem mit dem Rande des Tarsus parallelen Bogen nach der Mitte desselben läuft, und Aeste der Haut dem obern Augenliede, der obern Hälfte des M. orbicularis giebt. Sie bildet mit den ihr entgegenkommenden Aesten der Thränenarterie und des Augenbraunzweiges der Stirnarterie, oder mit einem Aste der A. transversa faciei einen einfachen oder doppelten Augenliedbogen.

i. Arteria palpebralis inferior, die untere Augenliedarterie. Diese Arterie steigt einwärts am Ligamentum palpebrale internum neben dem Saccus lacrymalis zum unteren Augenliede herab, und in einem mit dem Rande des Tarsus parallelen Bogen nach der Mitte desselben, und giebt der Haut des untern Augenliedes, der untern Hälfte des M. orbicularis, und dem Thränensacke Aeste. Sie bildet mit den ihr entgegenkommenden Zweigen der A. infraorbitalis, lacrymalis und nasalis, oder mit der transversa faciei, nach Schlemm, den unteren Augenliedbogen, arcus tarseus inferior.

k. Arteria nasalis, die Nasenarterie. Diese geht einwärts zur äußern Nase, giebt ein Aestchen durch ein Loch des Nasenbeins in den vordern Theil der Nase, vertheilt sich auf dem obern Theile der äußern Nase, und kommt mit der A. angularis zusammen.

Bisweilen kommen die eben genannten Arteriae palpebrales oder doch die inferior aus der Verbindung dieser A. nasalis mit der angularis.

l. Arteria frontalis, die Stirnarterie [1]), geht nach innen neben dem foramen supraorbitale am M. frontalis aufwärts zur Stirne, und vertheilt sich im obern innern Theile des M. orbicularis, im M. frontalis, in der Haut der Augenbraune und der Stirne.

Arteriae Subclaviae [2]).

Die beiden Schlüsselbeinpulsadern, arteriae subclaviae sind dicke Aeste der Aorta, welche aus der obern Seite des Bogens der

---

[1]) Sie giebt nicht selten, wie Schlemm bemerkt, die A. supraorbitalis. Sömmerring sah einen Ast der A. lacrymalis zu diesem Loche gehen. Zuweilen ersetzt ein Ast der A. temporalis zur Stirne herabgehender Ast die Stelle der A. supraorbitalis.

[2]) Wenn, wie schon bei der Aorta angegeben worden ist, bisweilen beide A. A. subclaviae aus dem Aortenbogen kommen, so befindet sich die rechte entweder an der ihr am meisten zukommenden Stelle rechts, nach außen von der Kopfpulsader, oder, was seltener ist, die rechte Schlüsselbeinpulsader entspringt weiter nach der linken Seite, und sogar zuweilen unter allen am meisten nach links, unterhalb der linken Schlüsselbeinpulsader. Sie schlägt sich dann hinter den übrigen Stämmen (seltner unmittelbar, häufig zwischen Luft- und Speiseröhre, am häufigsten zwischen dieser und den Halswirbeln) nach der rechten Seite zu ihrer Extremität. (Siehe Meckels Hdb. 3. S. 131.)

Digitized by Google

selben entspringen, aufwärts und auswärts gehen, und der Brust, dem Halse, dem hintern Theile des Gehirnes und den Armen bestimmt sind. Sie sind ohngefähr eben so dick, als die Carotides.

Die rechte entspringt höher, nämlich mit ihrer Carotis aus der A. anonyma, die linke aber besonders aus dem Bogen selbst. Die linke entspringt also tiefer, und steigt daher viel steiler aufwärts als die rechte. Uebrigens sind im allgemeinen beide A. A. subclaviae einander ähnlich, und es ist daher nur nöthig, eine derselben zu beschreiben.

Die Arteria subclavia steigt von ihrem Ursprunge im obern Theile der Brust so schräg aufwärts, daß sie sich allmählig auswärts krümmt, und gelangt so hinter das Schlüsselbein. Sie geht dann hinter dem M. scalenus anticus, vor dem medius, also in der Spalte zwischen beiden Muskeln in die Höhe, und in einem Bogen über die erste Rippe hinüber in die Achselhöhle, und wird nun Arteria axillaris genannt.

Von ihrem Ursprunge an geht sie hinter der quer herüber gehenden Vena jugularis sinistra hinauf; wo sie die M. M. scalenos erreicht, liegt sie hinter der Vena jugularis interna und der Vena subclavia ihrer Seite.

Mittelbar oder unmittelbar entstehen aus ihr: 1) Arteria vertebralis, 2) mammaria interna, 3) thyreoidea inferior, 4) cervicalis adscendens, 5) cervicalis superficialis, 6) transversa colli, 7) transversa scapulae, 8) cervicalis profunda, 9) intercostalis superior.

In einigen Körpern entsteht auch aus ihr, ehe sie noch die Vertebralis giebt, die Pericardiaca superior posterior. Die linke A. subclavia schickt bisweilen die Bronchialis sinistra.

1. Arteria vertebralis, die Wirbelarterie [1]).

Sie entspringt aus der A. subclavia, von der hintern Seite derselben, in der Gegend des ersten Brustwirbels. Sie ist der dickste Ast

---

[1]) Von ihrem Ursprunge aus dem Bogen der Aorta ist oben S. 174 gehandelt worden. Bisweilen dringt sie in das Loch des Querfortsatzes des 5ten, 4ten, 3ten, ja des 2ten Halswirbels, sehr selten aber in das des 7ten. *Bichat* (an. descr. IV. p. 193.), Tiedemann (expl. tab. ant. p. 108.) und Meckel in seinem Handbuche der Anat.

Henkel (Zweite Sammlung med. u. chir. Anmerk. S. 10. Fig. 4.) und Huber (Act. helvet. VIII. p. 73.) fanden in 2 verschiedenen Fällen zwei Wirbelarterien, von denen die eine an der gewöhnlichen Stelle, die andere aus dem Aortenbogen entsprang. Im Huber'schen Falle war die normale kleiner, vereinigte sich aber mit der anderen in der Gegend des 5ten Halswirbels, und trat in die Oeffnung seines Querfortsatzes. Im Henkel'schen Falle waren 2 Wirbelart. an der linken Seite, von denen die kleinere am gewöhnl. Orte, die größere aus der Aorta entsprang. (Den Huber'schen Fall bildet Tiedemann, tab. art. III. fig. 9. ab.)

Auch Meckel (path. Anat. 2. Bd. 2. Abth. S. 110.) sah die Wirbelarterie in zwei zerfallen, die beide von der Schlüsselpulsader kamen, von denen die eine in die Oeffnung des Querfortsatzes des vorletzten, die andere in die vom 3ten Halswirbel trat, wo sich beide bald vereinigten.

Sie ist auch nicht selten auf einer Seite sehr klein, und dafür auf der andern desto größer.

Bisweilen entspringen aber auch beide aus dem Aortenbogen, wie Meckel (Reils Arch. VI. 561) sah.

Digitized by Google

der A. subclavia. Nahe bei ihrem Ursprunge wird sie von einem gespaltenen Faden des Nervus sympathicus magnus umschlungen. Sie geht rückwärts und aufwärts, tritt in der Regel in das Loch des Querfortsatzes des 6ten, seltener in das des 7ten Halswirbels, noch seltener in das des 5ten, steigt dann flach geschlängelt durch die Querfortsätze der folgenden obern Halswirbel bis zum Epistropheus hinauf. Unter dem kürzeren Querfortsatze des Epistropheus krümmt sie sich einwärts, geht durch das Loch desselben aufwärts, krümmt sich wieder zu dem längeren Querfortsatze des Atlas auswärts, geht durch das Loch desselben ferner aufwärts, krümmt sich über demselben durch den Ausschnitt oder das Loch desselben wieder einwärts, endlich, die harte Hirnhaut durchbohrend, wieder aufwärts und vorwärts, und so durch das große Loch des Hinterhauptbeins neben und vor der Medulla oblongata in die Höhle der Hirnschale hinein [1]).

Auf diesem Wege giebt sie durch die Zwischenräume der Wirbel kleine Aeste zur harten Hirnhaut des Rückenmarks, auch zum Rückenmarke selbst, welche mit den Arteriis spinalibus Gemeinschaft haben, kleine Aeste zum Ganglion cervicale supremum, kleine Aeste zu den Nackenmuskeln, und gemeiniglich dicht unter der Hirnschale einen größeren Ast zu den Nackenmuskeln, und einen Ramus meningeus posticus durch das große Hinterhauptloch zur harten Hirnhaut des Hinterkopfes.

Wenn die A. vertebralis durch das große Loch des Hinterkopfs in die Höhle der Hirnschale gekommen, so geht sie vor der Medulla oblongata schräg einwärts und vorwärts hinauf, gelangt an den hintern Theil der untern Fläche der Brücke des Gehirns, und vereiniget sich daselbst mit der von der andern Seite in einen Stamm, welcher Arteria basilaris heißt.

Höchst selten wird sie dreifach. Einen Fall dieser Art beschreibt A. Meckel (in Meckels Arch. 1828. S. 170. Tab. VII. fig. 4.) aus einem 36jährigen Manne. Die beiden Hauptzweige, mit welchen sie entsteht, kamen unmittelbar aus der subclavia der rechten Seite, $^1/_2$ Zoll von einander entfernt; der tiefere, auf ungewöhnliche Weise aus der vorderen Fläche der Schlüsselbeinarterie entspringend, übertraf an Stärke den normalen, aus der hintern Wand des Stammes zum Loche des 6ten Querfortsatzes übergehenden Zweig, mit dem er sich dicht über dem 5ten Querfortsatze vereinigte; in beiden kam nun, eine Linie höher, die dritte kleinere aus der unteren Schilddrüsenarterie, und alle 3 gingen vereint vom 4ten Querfortsatze an den normalen Weg.

Eine Abweichung der rechten sah Otto (seltene Beobb. 2. Heft, 61.). Sie entsprang als erster Ast der Subclavia dextra, war nur $^1/_3$ so dick als gewöhnlich und als die linke, lief vor den Querfortsätzen des 7ten, 6ten und 5ten Halswirbels, die keinen Canal für sie hatten, in die Höhe, und trat erst beim 4ten Halswirbel in den Canal.

In einem Falle, den Otto (path. Anat. 1. S. 309. Anm. 7. nach einer Abbildung im anat. Mus. der Josephsakademie in Wien) anführt, ward sie in ihrem obersten Theile vom Nervus hypoglossus durchbohrt.

Ein besonderes Programm über diese Arterien schrieb *Aug. Fried. Walter* Progr. de vasis vertebralibus. Lipsiae 1730. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. II. p. 759.

[1]) Der Nutzen der Biegungen bei dieser Ader und bei der Carotis cerebralis ist vielleicht der, den Andrang des Blutes gegen das Gehirn zu schwächen, und der, die Arterie bei der Bewegung des Kopfs vor einer Dehnung in die Länge zu sichern.

Digitized by Google

Ehe die A. A. vertebrales zu dieſer Vereinigung gelangen, giebt jede einwärts und abwärts die Arteria spinalis anterior, und kleine Aeſte in die Furche zwiſchen dem hintern Rande der Brücke und den Corporibus pyramidalibus. In einigen Körpern giebt ſie ſelbſt auch die A. spinalis posterior.

Die Arteria spinalis anterior, die vordere Rückenmarksarterie, geht nach innen und unten, beide Stämme convergiren an der vordern Fläche der Medulla oblongata, gehen durch das große Loch des Hinterkopfes und dann ferner an der vordern Fläche des Rückenmarkes hinab, vereinigen ſich höher oder tiefer, zertheilen ſich wieder und vereinigen ſich wieder zu einer nur einmal vorhandenen Arterie. So ſteigt ſie geſchlängelt in der Mitte der vordern Fläche des Rückenmarks bis zum Ende deſſelben, und dann ferner mitten zwiſchen den Nerven der Cauda equina, von einer Fortſetzung der weichen Hirnhaut wie mit einer Scheide umgeben, bis zum Steißbeine hinab.

Sie giebt auf dieſem ganzen Wege dem Rückenmarke Aeſte, welche mit den von den A. vertebralibus intercostalibus lumbaribus hinzukommenden Arteriis spinalibus Gemeinſchaft haben.

Arteriae spinales posteriores entſpringen auch oft aus der Arteria cerebelli posterior, nachdem ſich dieſe auf die hintere Fläche der Medulla oblongata herumgeſchlagen hat, gehen an derſelben convergirend nach innen und unten, durch das große Hinterhauptloch, und dann ferner an der hinteren Fläche des Rückenmarks bis zum Ende deſſelben in der Nähe des 2ten Lendenwirbels hinab, und verbinden ſich oft mit einander durch Seitenäſte.

Arteria basilaris, die Hirngrundarterie.

Dieſe merkwürdige unpaare Schlagader geht in der Mitte der untern Fläche der Brücke bis zum vordern Rande derſelben hinter die Eminentias candicantes vorwärts fort, und ſchickt außer einer Menge kleiner Arterien, die in die Brücke ſelbſt eindringen, auf jeder Seite folgende größere Aeſte:

a) Arteria cerebelli inferior. Sie entſpringt aus der A. basilaris an jeder Seite nahe am hintern Theile der Brücke, oder aus jeder A. vertebralis, ehe ſie ſich mit der andern vertebralis vereiniget hat, geht auswärts, rückwärts und abwärts, am hintern Theile der untern Fläche der Brücke und des Cerebellum, und giebt hier auswärts und rückwärts Aeſte. Die Fortſetzung des Stammes oder ein beſonderer größerer Aſt krümmt ſich zwiſchen dem Cerebellum und der Medulla oblongata herum auf die hintere Fläche der Medulla oblon-

Digitized by Google

gata, giebt hier dem Cerebellum Aeſte, zuweilen ſchickt ſie auch die Arteria spinalis posterior.

b) Arteria cerebelli superior. Sie entſpringt aus der A. basilaris, an jeder Seite am vordern Theile der Protuberantia annularis geht auswärts und rückwärts, zum vordern Theile und zur oberen Fläche des Cerebellum, und theilt ſich hier in mehrere Aeſte, welche mit den Aeſten der A. cerebelli inferior anaſtomoſiren. Zuweilen ſind, ſtatt einer, an jeder Seite 2 kleinere da.

c. Arteria cerebri profunda. Endlich ſpaltet ſich die A. basilaris am vordern Theile der Brücke in 2 Arterias cerebri profundas, die durch den 3ten Hirnnerven von der vorhergehenden Arterie geſchieden ſind, und verbreitet ſich an die Hirnſchenkel und an den Trichter, nimmt den communicirenden Aſt von der Carotis auf, verbreitet ſich, nachdem ſie ſich um die Hirnſchenkel herumgeſchlagen hat, theils an den Windungen des hintern Theils des großen Gehirns (und communicirt hier mit der Balkenarterie und mit der A. fossae Sylvii) theils zu den in den Ventrikeln und an den am großen Eingange derſelben gelegenen, Theilen, zu den Vierhügeln, Sehhügeln, zum Plexus choroideus, zu den Wänden des Seitenventrikels [1]). Beim Neugebornen, wo die Blutgefäße der weißen Gehirnſubſtanz weit ſichtbarer ſind, überzeugt man ſich, daß dieſe Arterie von den Wänden des Seitenventrikels aus in die Markſubſtanz des Gehirns mit unzähligen Aeſten eindringt, die der Richtung der Markfaſern folgen, und ſowohl bis in die Nähe der Oberfläche gelangen, ohne ſich mit den Arterien der Corticalſubſtanz zu verbinden, als auch mit den Querfaſern des Balkens in den Balken übergehen. Jede von ihnen krümmt ſich vor der Arteria cerebelli superior auswärts, und dann um den Hirnſchenkel aufwärts, wo ſie anfangs dieſem, nachher dem Plexus choroideus, dem Ventriculus tertius, dem Ventriculus lateralis, dem Septum pellucidum, dem Fornix und dem hinteren Theile der Halbkugeln des großen Gehirns Aeſte giebt.

Ein beſonderer kleiner Zweig der A. basilaris ſelbſt, oder einer ihrer Aeſte, iſt die Arteria auditoria interna, welche auswärts geht, und mit den Nervis acusticis in den Meatus auditorius internus tritt. Sie theilt ſich daſelbſt in die Arteria cochleae, welche in die Schnecke,

---

[1]) Nicht ganz mit Recht nennt man die vordere Gehirnarterie arteria corporis callosi, denn ſie gehört vielmehr der Corticalſubſtanz der Windungen des vorderen Theils des Gehirns an, und nur wenige und kleine Zweige endigen ſich im Balken. Dagegen iſt die A. cerebri profunda die wichtigſte Arterie für die Markfaſern des großen Gehirns, und es iſt ſehr merkwürdig, daß kein ſichtbares Zuſammenſtoßen zwiſchen den in der Rindenſubſtanz und den in der Medullarſubſtanz zertheilten Aederchen wahrgenommen wird.

Digitized by Google

und in die Arteria vestibuli, welche in den Vorhof und in die Bogengänge geht.

Circulus Willisii.

Jede Arteria cerebri profunda nimmt, wie schon gesagt worden, ohnweit ihres Ursprungs aus der basilaris an der äußern Seite der Eminentia candicans einen Ast, der schräg rückwärts und einwärts aus der Carotis cerebralis zu ihr kommt, auf.

So entsteht also durch die Verbindung der Arteriarum vertebralium und Carotidum an der Grundfläche des Gehirns ein merkwürdiges Siebeneck, welches Circulus Willisii heißt, und aus folgenden Schlagadern besteht:

1. 2. Die beiden Arteriae cerebri profundae, in welche die A. basilaris sich spaltet.

3. 4. Die beiden Rami communicantes, deren jeder aus der A. Carotis cerebralis in die A. cerebri profunda geht.

5. 6. Die beiden Arteriae corporis callosi.

7. Der Ramus communicans, welcher die beiden Arterias corporis callosi verbindet.

2. Arteria mammaria interna, die Brustarterie [1]).

Sie entspringt aus der A. subclavia von der vordern untern Seite derselben, ist dünner als die A. vertebralis, geht vorwärts, und krümmt

---

[1]) Unter die, jedoch seltener vorkommenden, Abweichungen dieser Arterie gehören:

1) ihr Ursprung aus dem ungenannten Stamme.

[Fälle dieser Art haben Neubauer (de thyr. ima. P. 10.) und Walter, (mém. de l'ac. d. Berl. 1785. Tab. I.), und Tiedemann giebt (Tab. art. IV. fig. 10.) eine Abbildung.]

Oder 2) aus dem Bogen der Aorta selbst. (Siehe S. 175.)

Oder 3) höher aus der Schilddrüsenpulsader. So sah sie Huber (Act. helvet. VIII. p. 92.) einmal aus der unteren Schilddrüsenpulsader abgehen, und Tiedemann (expl. tab. art. p. 120.) sah diesen Ursprung zweimal.

Oft entspringt sie aber gleich mit dem Anfangstheile der unteren Schilddrüsenpulsader.

Zweimal sah sie Münz (Gefäßlehre, Landsh. 1821. 8. S. 535) aus dem Anfangstheile der Achselpulsader entspringen, einmal bald nach dem Durchgange der Schlüsselpulsader zwischen den Rippenhaltern, einmal noch weiter davon entfernt; von hier lief sie über die erste Rippe vor dem vorderen Rippenhalter in die Brusthöhle zurück, an die Seite des Brustbeins, und setzte von hier an regelmäßig ihren Verlauf fort.

Einmal bildete sie (an einem Präparate in Kopenhagen) drei, wohl 3 Zoll parallel neben einander herablaufende Gefäße, deren beide äußere nur durch einen kleinen Queraft sich verbanden. (Otto path. Anat. 1. Bd. S. 308.) In einem anderen Falle gab sie einen starken äußeren Ast, der über die 4 ersten Rippen lief. (Otto, seltne Beob. Hft. 2. S. 62.)

Eine merkwürdige Abweichung, die bei Rippenbrüchen, bei der Operation eines Empyems u. s. w. leicht zu gefährlichen inneren Blutungen Veranlassung geben kann, sah

Digitized by Google

ſich zugleich abwärts, geht dann neben dem Bruſtbeine hinter den Knorpeln der wahren Rippen, faſt ſenkrecht und parallel mit der der andern Seite, bis zum 6ten Rippenknorpel hinab.

Ehe ſie die hintere Fläche der Rippenknorpel erreicht, giebt ſie Aeſte, deren merkwürdigſte dieſe ſind:

a) Rami thymici, kleine Arterien zur Thymusdrüſe. Ein oder 2 Aeſte, die zur Thymus gehen, und bei dem neugebornen Kinde, bei welchem die Thymus groß iſt, ſichtbar, beim Erwachſenen aber ſehr klein ſind oder fehlen, ſobald die Thymusdrüſe, wie häufig nach dem 12ten Jahre der Fall iſt, verſchwindet.

b) Arteria bronchialis anterior, eine vordere Luftröhrenarterie, die nur zuweilen vorhanden iſt.

c) Arteria pericardiaco-phrenica, die obere Zwerchfellarterie. Dieſe kleine Arterie kommt aus der A. mammaria ſelbſt, oder aus einer A. thymica, geht, in Begleitung des Nervus phrenicus, am Herzbeutel bis zum Zwerchfelle herab, giebt ihre Aeſte der Thymus, der Mittelhaut, dem Herzbeutel, dem Zwerchfelle, den daſelbſt liegenden Lymphdrüſen, und anaſtomoſirt mit den untern Zwerchfellarterien.

Indem ſie hinter den Knorpeln der wahren Rippen hinabgeht, giebt die A. mammaria interna folgende Aeſte:

a) Rami intercostales, vordere Zwiſchenrippenarterien, die an ihrer äußeren Seite entſpringen und an den Intercoſtalmuskeln, von der Bruſthaut bedeckt, verlaufen. Zu jedem Zwiſchenraume zwiſchen 2 Rippen geht wenigſtens eine Arterie, die am unteren Rande jeder Rippe, hingeht; oft kommen zu ihm (vorzüglich an den mittleren Rippen) 2 Arterien, ſo daß eine am oberen und eine am unteren Rande jeder Rippe hinläuft und ſich mit den Aeſten der hinteren Zwiſchenrippenarterien verbindet. Die für den 8ten, 7ten und 6ten Zwiſchenraum kommen nicht unmittelbar aus dem Stamme der Mammaria, ſondern aus dem äußeren Endaſte derſelben.

b) Rami sternales, kleine Aeſte, die von der dem Bruſtbeine zugekehrten Seite der A. mammaria entſpringen, zur Beinhaut des Bruſtbeins, zum M. triangularis deſſelben gehen, und durchbohrende Zweige, rami perforantes, zwiſchen den Rippenknorpeln der 1ſten,

---

Otto (ſeltne Beobb. 2. 62.). Es entſprang nämlich aus der rechten Mammaria oben, wo ſie ſich zum Bruſtbeinrande herüberbog, ein anomaler Aſt, der vom oberen Rande der erſten Rippe, innerlich an der Bruſtwand, zwiſchen dieſer und dem Bruſtfelle ſchräg nach unten und außen über die 4 erſten Rippen lief. Er gab Aeſte den Intercoſtalmuskeln, ward unten dünner, und mündete ſich am unteren Rande der 4ten Rippe in die Intercoſtalarterie.

Heiſter (obs. med. Hall. coll. Diss. anat. VI. 725.) ſah ſie in einem Kinde von 3 Jahren doppelt.

Digitized by Google

2ten, 3ten, 4ten ꝛc. Rippe zu dem Musculus pectoralis major, zur Mamma und zur Haut der Bruſt ſchicken. Auch manche Aeſte der vorderen Zwiſchenrippenarterien durchbohren die Muskeln und gelangen zur Haut und zur Milchdrüſe der Frauen.

c) Ramus phrenico-pericardiacus, der ſich zum vorderen mittlern Theile des Zwerchfelles und mit aufſteigenden Aeſten zum untern Theile des Herzbeutels vertheilt, und zuweilen ein Aſt des Ramus musculo-phrenicus iſt, oder auch bisweilen ganz fehlt.

Wenn endlich die A. mammaria interna die Gegend des ſechsten Rippenknorpels neben dem Processus ensiformis erreicht hat, ſo endiget ſie ſich, indem ſie ſich in 2 Aeſte theilt.

a) Ramus musculo-phrenicus, der äußere Endaſt, geht ſchräg abwärts an der Gränze der Bruſthöhle über die Befeſtigung des Zwerchfells an den Rippenknorpeln nach außen, vertheilt ſich im vordern äußern Theile des Zwerchfells, und im angränzenden Theile des Musculus rectus, transversus, obliquus internus, obliquus externus und der Haut, und giebt dem 6ten und 7ten, zuweilen auch dem 8ten Spatium intercostale, Ramos intercostales.

b) Ramus epigastricus, der innere Endaſt. Dieſer geht unter dem Knorpel der 7ten Rippe zum Musculus rectus hinab, vertheilt ſich an deſſen hinterer, theils mit kleineren durchbohrenden Aeſten an deſſen vorderer Fläche, und hat mit der Arteria epigastrica Gemeinſchaft, die ihm von unten entgegenkommt. Ein Aſt deſſelben geht zuweilen oben durch ein Loch des Processus ensiformis, oder unter ihm durch zur Haut des weißen Streifes hinab; er iſt auf der rechten Seite öfter als auf der linken vorhanden, und erſtreckt ſich daſelbſt zu dem Ligamentum suspensorium der Leber.

3 bis 7. Einige vordere Hals- und Nackenarterien [1]).

Es folgen nun 5 leicht zu verwechſelnde Arterien, von denen oft mehrere aus einem gemeinſchaftlichen Stamme entſpringen, 2 mehr ſenk-

---

[1]) Ueber die A. thyreoidea ima hat Joh. Ernſt Neudauer eine Diss. geſchrieben, resp. *Erdmann* descriptio anatomica arteriae innominatae et thyreoideae imae, c. II. Tab. aen. Jenae 1772. 4. recus. in *Neubaueri* opera anatomica collecta, ed. *G. C. Hinderer*. Francof. et Lips. 1786. 4. p. 269—318.

Sie entſpringt bisweilen aus dem ungenannten Stamme. So fand es Tiedemann (tab. art. Tab. IV. fig. 11.) im Leichname eines Knaben. Dieſe oft vorkommende Abweichung ſahen auch Haller (Icon. anat. Fasc. 8. p. 60. not. 30.), Neudauer (de thyr. ima §. 6.), Huber (Acta helvet. VIII. p. 83.). Loder (obs. angiol. p. 4.) und Sömmerring (de corp. hum. fabr. V. p. 123. not. 9.). Tiedemann (l. c. p. 58.) ſah ſie viermal. Auch Münz (Gefäßl. S. 145) ſah dies bei einem Kinde. Sie entſprang aus dem Theile des ungenannten Stammes, der eigentlich der Kopfſchlagader angehört. Bisweilen entſpringt ſie aus dem Stamme der Kopfarterie, der in der Regel keine Aeſte abzugeben pflegt. Dieſe Abweichung ſahen Nicolai (de directione vasor. p. 28. not. 9.), Haller (Elem. phys. III. p. 403.), *Vink* (van de bloed vaten p. 50.), Böhmer (Diss. de confluxu trium cavar. in dextro cordis atr. Hal. 1763.), Meckel (Epist. ad *Haller.*

recht in die Höhe steigende und 2 mehr in querer Richtung verlaufende: Die Arteria thyreoidea inferior liegt dicht neben der A. carotis communis, geht vorzüglich zur glandula thyreoidea in die Höhe, und die Cervicalis ascendens, die fast immer mit der A. thyreoidea gemeinschaftlich entspringt, steigt ziemlich senkrecht vor den Musculis scalenis empor, beide Arterien haben daher eine mehr senkrechte Richtung, und die folgenden unterscheiden sich daher von ihnen dadurch, daß sie eine mehr quere Richtung haben. Die Cervicalis superficialis ist selten ein besonderer Ast der A. subclavia, sondern entweder ein Ast der Cervicalis ascendens oder der A. transversa colli, sie zeichnet sich dadurch aus, daß sie unten quer über die 3 Musculos scalenos zu den Nackenmuskeln geht, die A. transversa colli geht hinter dem Scalenus anterior in einiger Entfernung vom Schlüsselbeine in querer Richtung zu den Nackenmuskeln und zum hintern Rande des Schulterblatts, und liegt also etwas tiefer als die vorher genannte Arterie, endlich die A. transversa scapulae geht immer sehr nahe hinter dem Schlüsselbeine in die Fossa supraspinata und infraspinata des Schulterblatts, und entspringt häufiger als die A. transversa colli

---

Vol. II. p. 258.), Huber (Acta helvet. VIII. 84.), Neubauer (de thyr. ima §. 7.). Tiedemann (l. c. p. 60.) sah dieses zweimal. Meckel bildet sie tab. anat. path. fasc. II. Tab. X. fig. 3. ab.

Zu einem Präparate, das Burns (Herzkrankh. S. 531.) beschreibt, entstehen beide thyreoidea imae als ein Stamm aus der rechten Subclavia, und anstatt den unteren und hinteren Theil der Drüse zu umfassen, dringen sie an der Seite der Luftröhre tiefer herab, als die Drüse liegt, und nachdem sie dann die vordere Fläche der Luftröhre erreicht haben, theilen sie sich in 2 Aeste, wovon der rechte längs der Luftröhre herabgeht, der linke innerhalb des Ringknorpels hinaufsteigt.

Zuweilen sind 2 untere Schilddrüsenart. zugegen, von denen eine am gewöhnlichen Orte, die andere aus der gemeinschaftlichen Kopfarterie entspringt. Burns sah einmal einen gemeinschaftlichen Stamm der rechten und linken Seite aus der rechten Schlüsselbeinpulsader entspringen.

Bisweilen kommt eine 3te unterste Schilddrüsenpulsader (art. thyr. media ima) vor. Sie entspringt aus einem oder dem andern gemeinschaftlichen Stamme der Kopfpulsadern gewöhnlich gleich am Anfangstheile desselben, oder aus dem ungenannten Stamme der rechten Seite, oder aus dem Bogen der Aorta selbst, oder sie entsteht mit dem gleichnamigen der entgegengesetzten Seite durch einen Stamm aus der Schlüsselbeinpulsader.

Manchmal ist sie nur auf einer Seite vorhanden, giebt kleine Zweige an den unter der Schilddrüse befindlichen Theil der Luftröhre, an den unteren Theil der Schilddrüse, bisweilen auch einige Zweige rückwärts an den Schlund und an einige benachbarte Muskeln. Ein Verlauf, der beim Luftröhrenschnitt gefährlich werden kann.

Sie ist bisweilen sehr groß, ersetzt die fehlende oder dünnere thyr. inferior einer, oder selbst beider Seiten. Eine sehr dicke unterste Schilddrüsenpulsader, während die unteren Schilddrüsenpulsadern sehr dünn waren, beobachtete Münz bei einem Kinde. (Gefäßl. 536. Tab. XIII. f. VI.)

Häufiger kommt diese Abweichung nach Meckel (Handb. d. Anat. 3. 152.) auf der rechten als auf der linken Seite vor. Huber (acta helv. VIII. 84.) sah diese Art viermal auf der rechten, und nur einmal auf der linken; so sah auch Neubauer die rechte aus der Aorta, ebendieselbe Ramsan (Edinb. med. and surg. journ. Vol. VIII. 281 — 283. Taf. I. fig. 2.) aus dem rechten ungenannten Stamme, Loder zweimal aus der Aorta zwischen der rechten Kopf- und Schlüsselbeinpulsader entspringen.

Digitized by Google

aus einem gemeinschaftlichen Stamme mit der Thyreoidea inferior. Da nun häufig mehrere von diesen Arterien gemeinschaftlich entspringen, so herrscht bei den Anatomen auch hinsichtlich ihrer Namen eine nicht geringe Sprachverwirrung. Der mehreren von diesen Aesten gemeinschaftliche, aus der A. subclavia entspringende, aufwärts gehende kurze Stamm ist bei Kindern zuweilen so dick, als die Fortsetzung der A. subclavia, und auch bei Erwachsenen ist er sehr dick, wenn nicht nur die Thyreoidea inf., die Cervicalis ascendens, die Cervicalis superficialis und die Transversa scapulae (wie das meistens der Fall ist) gemeinschaftlich aus ihm entspringen, sondern noch mehr, wenn außer ihnen, was seltener vorkommt, auch die Transversa colli aus ihm hervorkommt, oder wenn, was noch seltener beobachtet wird, sogar die A. mammaria interna aus diesem gemeinschaftlichen Stamme hervorgeht. Wir wollen nun diese Aeste einzeln betrachten:

3) Arteria thyreoidea inferior, die untere Schilddrüsenarterie. Diese geht neben der Carotis geschlängelt hinauf, wendet sich hierauf hinter ihr weg nach der Luftröhre und dem Kehlkopfe hin, giebt der Luftröhre einen Ast oder mehrere Aeste, dem untern Theile des Kehlkopfs die Arteria laryngea inferior, und zuweilen dem M. longus colli einen Zweig, vertheilt sich dann in dem untern Theile der Schilddrüse, und hat mit der A. thyreoidea superior, auch mit der inferior der andern Seite Gemeinschaft.

4) Arteria cervicalis adscendens, die aufsteigende Nackenarterie. Diese entspringt fast immer mit der thyreoidea inferior gemeinschaftlich, geht vor dem Musculus scalenus anticus, neben dem Nervus phrenicus, an der Seite der untern Halswirbel hinauf, und vertheilt ihre Aeste zum M. scalenus anticus und medius, zum Longus colli, Rectus capitis anticus major und zum Levator Scapulae.

5) Arteria cervicalis superficialis, die oberflächliche Nackenarterie. Sie entspringt gemeiniglich aus einem gemeinschaftlichen Aste der Arteria subclavia und zwar entweder mit der A. cervicalis, oder mit der transversa Colli.

Sie geht am äußern Rande des M. scalenus anticus schräg auswärts, und vertheilt dann ihre aufwärts und abwärts gehenden Aeste zu den M. M. scalenis, zum Omohyoideus, Levator scapulae, Cucullaris, Transversus cervicis, Spinalis cervicis, Splenius capitis und Splenius colli, Complexus, Biventer u. s. w.

6) Arteria transversa colli, die quere Nackenarterie oder die Rückenschulterblattarterie. Gewöhnlich ist sie ein unmittelbarer Zweig der A. subclavia. Indessen entspringt sie bisweilen auch aus einem gemeinschaftlichen Aste der Arteria subclavia mit der A. transversa scapulae, und dieser gemeinschaftliche Ast in einigen Körpern aus der A. subclavia besonders, in andern gemeinschaftlich mit der Cervicalis adscendens, mit der Cervicalis superficialis und mit der Thyreoidea inferior. Sie geht, tiefer liegend als die Cervicalis superf.,

Digitized by Google

vor dem Musculus scalenus anticus auswärts und rückwärts, giebt aufsteigende Aeste den Musculis scalenis, dem Omohyoideus, dem Levator scapulae, dem Cervicalis descendens, dem Trachelomastoideus, dem Splenius capitis, dem Cucullaris, dem Supraspinatus und der Haut dieser Gegend, auch Aeste in den Plexus nervorum brachialium. Der längste Zweig derselben, der den Namen Arteria dorsalis scapulae führt, geht am hinteren Rande des Schulterblatts herab zwischen der Anfügung des M. serratus anticus major und der des M. rhomboideus, und giebt diesen Muskeln so wie dem M. serratus post. sup. Zweige, und verbindet sich mit der Subscapularis. Nicht selten ist sie ein Ast der folgenden Arterie.

7) Arteria transversa scapulae s. dorsalis scapulae, die obere oder quere Schulterblattarterie [1]). Sie geht tiefer, als die A. transversa colli, vor dem M. scalenus anticus, oder zwischen dem Scalenus anticus und medius durch, giebt diesem kleine Aeste, tritt an den obern Rand des Schulterblattes, und meistens durch die daselbst befindliche Incisura scapulae in die Fossa supraspinata, giebt Aeste dem M. supraspinatus, geht zwischen dem Condylus scapulae und dem Acromium hinab in die Fossa infraspinata zu dem M. infraspinatus etc., und hat Gemeinschaft mit der A. subscapularis.

8. Arteria cervicalis profunda, die tiefe Nackenarterie [2]).

Sie entspringt von oben von der hinteren Seite der Arteria subclavia unter allen bis jetzt genannten Aesten am weitesten nach außen, und ist der dünnste Ast derselben. Sie geht aufwärts, vertheilt sich in den Musculis scalenis und den Intertransversariis cervicis. In manchen Körpern giebt sie einen ansehnlichen Ast (Arteria vertebralis accessoria), welcher neben der A. vertebralis durch die kleineren, weiter nach außen liegenden Löcher der Querfortsätze der Halswirbel hinaufsteigt, aber die Hirnschale nicht erreicht, sondern höchstens über dem Querfortsatze des vierten Halswirbels sich endigt, entweder indem er in die A. vertebralis übergeht, oder indem er sich in kleine Aeste vertheilt.

9. Arteria intercostalis superior, obere Zwischenrippenarterie.

Sie entspringt von der hinteren und unteren Seite der A. subclavia, geht etwas auswärts zu der inwendigen Fläche der obern Rippen herab, giebt zuweilen Aeste dem Musculus scalenus posterior, an der linken Seite auch der Speiseröhre, in einigen Körpern die Arteria bronchialis superior oder die inferior, immer aber einen, 2, seltener 3 hintere Zwischenrippenarterien für den 1sten, 2ten, seltner auch für den 3ten Zwischenraum, in welchem jede bogenförmig am unteren Rande der Rippen nach vorn läuft und sich mit den vorderen Zwischenrippenästen der Mammaria

[1]) Sehr oft entspringt sie gemeinschaftlich mit der A. transversa colli, oder mit der Thyreoidea inferior. Tiedemann sah sie einmal aus der A. mammaria kommen. Tab. art. explic. p. 84.

[2]) Sehr häufig hat sie und die intercostalis superior einen gemeinschaftlichen Stamm.

Digitized by Google

interna verbindet, und sich überhaupt eben so wie die unten beschriebenen Arteriae intercostales inferiores verhält.

Arteria axillaris, die Achselschlagader [1]).

Die Arteria axillaris ist der fortgesetzte Stamm der A. subclavia. Nachdem dieselbe nämlich zwischen dem Musculus scalenus anticus

[1]) Sehr häufig geschieht die Theilung der Armarterie nicht in der Armbuge selbst, sondern weit höher, ja selbst in der Achselgrube. (Abbild. s. bei Tiedemann, tab. art. Tab. XIII — XVIII. Meckel, Tab. anat. pathol. fasc. III. tab. 11. Münz, Arterien. Taf. IX.) Eine besondere Abhandlung über diesen Gegenstand gab:

Fr. Tiedemann, Beobachtungen über die hohe Theilung der Armschlagader in die Speichen- und Ellenbogen-Schlagader. Denkschriften d. Akad. d. Wiss. zu München. Bd. 6. S. 3 ff.

Andreas Laurenti (hist. anat. corp. hum. Frcf. 1600. Fol. p. 103.) scheint ihrer zuerst Erwähnung zu thun. Er und auch Bidloo (vid. *Idonis Wolff* observationes chir. med. Quedlinb. 1704. 4.) beschreiben sie, aber fälschlich, als normal.

In der That kann man wohl noch 32 verschiedene Beobachter aufzählen, die die hohe Theilung schriftlich angemerkt haben, und es wird wohl kaum ein Anatom sein, dem sie nicht vorgekommen ist. Desto auffallender ist es, daß Pet. Camper (demonstr. anat. path. Lib. 1. p. 15.) die hohe Theilung der Armarterie in Zweifel zog. Diese hohe Theilung der Armpulsader kommt bisweilen, jedoch nicht immer an beiden Armen zugleich vor, ungeachtet Trew (comm. nor. 1737. p. 187.) diese Abweichung nie auf beiden Seiten zugleich gesehen zu haben versichert.

Häufig finden sich bei dieser Abweichung die sogenannten Vasa aberrantia, Aeste, die aus der oberen Gegend der Armpulsader entstehen, und sich entweder in ihr unteres Ende, oder in einen Ast der Vorderarmpulsadern, namentlich in die Speichenpulsader einsenken.

So entsteht an der Insertionsstelle des Deltamuskels oft ein Gefäßzweig, der größer ist als der Kiel einer Krähenfeder, und der sich immer am Armgelenke verliert. Burns (Herzkht. S. 342) sah fünf Fälle dieser Art, worunter 2 besonders bemerkenswerth sind. Im ersten gab das von einer Stelle der Arterie zur anderen gehende Gefäß vor seiner Vereinigung mit der Speichenarterie, die eine Strecke weit heraufstieg, um es aufzunehmen, den größern anastomosirenden Ast ab. Im zweiten Falle entstand dieser Ast von der Armpulsader, und das abweichende Gefäß gab auf seinem Wege bloß Zweige an die Muskeln.

Alle abweichenden Gefäße verlaufen gewöhnlich parallel mit der großen Arterie, stehen in Berührung mit ihr und werden von der Binde bedeckt.

Bei weitem am gewöhnlichsten ist die Speichenpulsader das höher abgehende Gefäß, der fortlaufende Stamm dagegen der gemeinschaftliche Stamm der Ellenbogen- und Zwischenknochenpulsader; indessen ist der hohe Ursprung der Ellenbogenpulsader, wenn er gleich weniger häufig ist, keineswegs eine seltene Erscheinung. Wenn sich die A. axillaris in die A. radialis und ulnaris theilt, so verlaufen sie, nach Münz, bisweilen am Oberarme und am Vorderarme, meistens sehr oberflächlich, unmittelbar unter der Haut außerhalb der Fascia und über der sehnigen Ausbreitung des M. biceps. Geschieht aber die Theilung nicht in der Achselhöhle, sondern tiefer, so verlaufen die Arterien meistens, wiewohl nicht immer, unter der sehnigen Ausbreitung des M. biceps.

Beide Gefäße weichen aber unter diesen Umständen von ihrer gewöhnlichen Richtung häufig ab. Die Radialis lief in einigen Fällen, die Münz beobachtete, eine kürzere oder längere Strecke weit, anfangs an der Ellenbogenseite des Oberarms, und die Ellenbogenpulsader lag an ihrer Radialseite; höher oder tiefer, der Ellenbogenbuge näher, kreuzte sich dann die Speichenpulsader mit der Ellenbogenpulsader, und ging über dieser an die Speichenseite. (Münz, Gefäßl. Taf. IX. f. 1. 3. 4.)

Zuweilen ist das Verhältniß der Dicke beider umgekehrt, so daß die Speichenpulsader die stärkere ist, und dann entspringt aus ihr auch die Zwischenknochenpulsader, bisweilen auch die zurücklaufende Ellenbogenpulsader (Münz Taf. IX. f. 5.). Später aber, wenn Kreuzung Statt findet, kehrt sie zu ihrem normalen Verhältnisse zurück.

Digitized by Google

und medius hervorgetreten ist, geht sie unter dem Schlüsselbeine, ziemlich in der Mitte desselben und über der ersten Rippe, und folglich auch unter dem M. subclavius und pectoralis minor und major in die Achselgrube. Sie macht einen Bogen und hat auf der 1sten Rippe den Plexus brachialis nach oben und außen, die Vena subclavia nach unten und innen neben sich liegen. Von der Stelle an, wo sie unter dem Schlüsselbeine hervortritt, erhält sie den Namen Arteria axillaris, und behält ihn, bis sie dahin, wo sich der Pectoralis major und minor endigen, gelangt, denn hier bekommt die vom M. biceps bedeckte Arterie den Namen Arteria brachialis.

Sie kann da, wo sie über die 1ste Rippe hinweggeht, am leichtesten durch Druck, den man hinter der Mitte des Schlüsselbeins abwärts hervorbringt, zusammengedrückt werden, eine Operation, welche dann nöthig ist, wenn der Arm nahe am oder im Gelenke amputirt werden soll. Um sie zu unterbinden, kann man sie leichter durch einen Einschnitt am vorderen als am hinteren Rande des Schlüsselbeins entblößen. Ihre merkwürdigsten Zweige sind folgende:

1. Arteriae thoracicae externae, die äußeren Brustarterien, sind 2 oder 3 in ihrem Ursprunge sehr veränderliche Zweige der Axillaris. Wo ihrer 3 vorhanden sind, unterscheidet man die

a) Arteria thoracica externa superior s. prima, erste äußere Brustarterie, sie geht, bedeckt vom Musculus pectoralis major, schräg abwärts einwärts, giebt Aeste diesem Muskel, dem Pectoralis minor, dem Serratus anticus major, der Haut und der Mamma.

b) Arteria acromialis, Schulterbrustarterie. Sie ist in einigen Körpern ein Ast der Arteria axillaris selbst, in anderen der thoracica inferior. Sie geht, bedeckt vom M. pectoralis major, unter dem Schlüsselbeine auswärts, giebt Aeste zu dem M. serratus anticus major, zum Acromium, nach dem Schultergelenke und zum Deltoideus. Außer den genannten Zweigen entstehen noch einige unbestimmtere kleinere Arterien in der Achselhöhle, die zum M. subscapularis und zu den Achseldrüsen, oder zu anderen benachbarten Muskeln gehen.

c) Arteria thoracica externa inferior, 2te oder untere äußere Brustarterie, A. mammaria externa. Sie entspringt weiter nach außen, kommt aber zuweilen aus der A. subscapularis. Sie ist dicker als jene, geht ebenfalls schräg abwärts einwärts, tiefer als die obere und als der untere Rand des M. pectoralis major, giebt Aeste diesem Muskel, dem Serratus anticus major, den Intercostalibus, der Haut und der Mamma.

2. Arteria subscapularis, oder scapularis inferior, Unterschulterblatt-Arterie.

Sie ist der dickste, oder wenigstens einer der dicksten Aeste der Arteri

Digitized by Google

axillaris, geht am äußern Rande des Schulterblatts hinab abwärts und rückwärts, und giebt ihre Aeste dem Musculus subscapularis, dem Serratus anticus major, dem Teres minor, dem Teres major, dem Latissimus dorsi.

a) Ein sehr langer Zweig derselben, den man mit Meckel die lange äußere Brustpulsader nennen kann, A. thoracica externa longa, geht zwischen dem M. serratus anticus major und dem M. latissimus dorsi längs der äußeren Wand der Brusthöhle herab, versieht diese Muskeln mit Zweigen, und vertritt häufig die Stelle der oft fehlenden thoracica externa inferior.

b) Ein 2ter sehr dicker Ast derselben (Arteria circumflexa scapulae) schlägt sich am Caput longum des Anconaeus um den Hals des Schulterblattes herum, zu dessen hinterer Fläche, vertheilt sich auf derselben von den Muskeln bedeckt, und verbindet sich in der Fossa infraspinata mit den Aesten der A. transversa Scapulae.

3. Arteria circumflexa humeri anterior, vordere Kranzarterie des Armes.

Diese kleine Arterie geht unter dem Kopfe des Oberarmknochens vorwärts und dann gekrümmt auswärts, von dem Musculus coracobrachialis und dem Caput breve M. bicipitis bedeckt, gegen das Caput longum dieses Muskels fort, giebt einen Ast abwärts zum Knochen, der zwischen dem M. pectoralis major und dem M. deltoideus hinabgeht, und endiget sich theils mit Aesten, die in das Caput longum M. bicipitis, theils mit Aesten, die zum Schultergelenke gehen.

4. Arteria circumflexa humeri posterior, hintere Kranzarterie des Armes.

Diese ist viel dicker, als die anterior, gemeiniglich wenig dünner, als die A. subscapularis. Sie geht unter dem Kopfe des Oberarmknochens zwischen ihm und dem Anconaeus longus rückwärts und dann gekrümmt auswärts, größtentheils vom M. deltoideus bedeckt, giebt Aeste dem M. teres major, dem Anconaeus longus und externus, dem Teres minor, dem Deltoideus und dem Schultergelenke ꝛc. Sie wird vom Nervus axillaris begleitet.

Das Schultergelenk wird mit einem Netze feiner Schlagäderchen umgeben, welches von vorn von der A. circumflexa anterior, von hinten von der A. circumflexa posterior herkommt.

Arteria brachialis, die Armarterie [1]).

Die Arteria brachialis ist der fortgesetzte Stamm der Arteria axillaris. Sie geht an der innern Seite des Oberarmes, neben dem in-

[1]) *Alb. Haller* resp. *Adolph Bernh. Winkler*, Diss. de arteria brachii. Gött. 1745. 4.

Digitized by Google

nern Rande des M. biceps, zur innern Seite des Ellenbogengelenkes hinab, giebt auf dieſem Wege kleinere Aeſte dem M. coracobrachialis, dem Biceps, dem Brachialis internus und der Haut, und außerdem auch einen oder einige Aeſte, welche am Ellenbogen mit Aeſten der Vorderarm-Arterien zuſammenſtoßen und collaterales genannt werden; mit einem Worte, ſie verbreitet ſich zu den an der vorderen Seite des Oberarmes gelegenen Theilen. Sie ſchickt aber auch eine wichtige Arterie, die den an der hinteren Seite des Oberarms gelegenen Theilen Blut zuführt, nämlich: die

Arteria profunda brachii, die tiefe Armſchlagader.

Sie geht in dem zwiſchen den 3 M. anconaeis und dem Oberarmknochen befindlichen Zwiſchenraume in Begleitung des Nervus radialis hinab, lenkt ſich an dem M. anconaeus longus ſchräg rückwärts, hinter den Oberarmknochen und nach der äußern Seite deſſelben zu. Sie liegt dann zwiſchen dem M. anconaeus externus und dem M. brachialis internus, geht zwiſchen dieſen Muskeln hinab und giebt über dem Urſprunge des M. supinator longus ihre letzten Aeſte.

Aeſte der Arteria brachialis und brachialis profunda.

Arteria collateralis radialis prima. Dieſe iſt in manchen Körpern eine Fortſetzung der A. profunda brachii; in andern kommt ſie aus der A. brachialis beſonders. Sie geht am äußern Winkel des Oberarmknochens hinab, giebt Aeſte dem M. anconaeus externus, dem Supinator longus, dem Extensor radialis longus, dem hintern Theile des Ellenbogengelenks, und hat Gemeinſchaft mit der A. recurrens radialis, auch mit der andern A. collateralis radialis.

Arteria collateralis radialis secunda. Dieſe giebt Aeſte dem M.

Chr. Gottl. Ludwig, Progr. de variantibus arteriae brachialis ramis in anevrysmatis operatione attendendis. Lipsiae 1767. 4.

Joh. Fr. *Meckel*. über den regelwidrigen Verlauf der Armpulsadern. Meckels Archiv. Bd. 2. S. 117.

Bisweilen iſt der Anfangstheil des Stammes der Oberarmpulsader ungewöhnlich dick, und es entſtehen aus ihm erſt Zweige, die in der Regel ſchon aus der Achſelpulsader hätten entſtehen ſollen. Hierher gehört beſonders der Fall, wo die Unterſchulterblattspulsadern und die Kranjadern des Oberarms aus ihr entſpringen. In 3 Fällen 2mal am rechten (1mal ſehr tief), und 1mal am rechten und am linken Arme zugleich, ſah Münz (Gefäßlehre, p. 537.) die Unterſchulterblatts- und Kranzpulsadern des Oberarms gleich am Anfangstheile der Oberarmpulsader entſpringen. (Taf. IX. Fig. 5.) In einem anderen Falle theilte ſich der Stamm der Oberarmpulsader in einiger Entfernung von ſeinem Anfangstheile in 2 Hauptäſte (ibid. fig. 6.), wovon der eine als tiefe Oberarmpulsader einen Muskelzweig an den Biceps, die Kranzpulsadern des Oberarmes und die ſonſt etwas tiefer aus der einfachen Oberarmpulsader entſpringende eigentliche tiefe Armpulsader abgab; die ſtarke Kranzpulsader lief hinter der Inſertion der Sehne des Latiss. dorsi und Teres major aufwärts, und verzweigte ſich dann auf die gewöhnliche Art.

Digitized by Google

supinator longus, geht zwiſchen ihm und dem Brachialis internus gegen den Condylus externus des Oberarmknochens hinab, giebt auch dieſen beiden Muskeln und dem Ellenbogengelenke Aeſte, und hat Gemeinſchaft mit der A. recurrens radialis. Sie iſt gewöhnlich ein Aſt der Arteria brachialis.

Arteria collateralis ulnaris prima. Dieſe entſpringt zuweilen aus der A. profunda brachii, zuweilen aus der A. brachialis ſelbſt. Sie geht neben dem Ligamentum intermusculare internum, an der innern Seite des M. anconaeus internus, gegen den Condylus internus hinab, giebt Aeſte dieſem Muskel, dem M. anconaeus longus, und hat Gemeinſchaft mit der A. recurrens ulnaris, auch mit der andern A. collateralis ulnaris. — Bisweilen geht ſie unmittelbar in die A. recurrens ulnaris über, ſo daß ſie mit dieſer eine Arteria communicans ausmacht, welche aus der A. brachialis in die A. ulnaris geht.

Arteria nutritia magna ossis brachii entſpringt aus der A. brachialis unter dem Musculus coracobrachialis, giebt Aeſte dem M. brachialis internus ꝛc. und tritt dann durch ein großes Foramen nutritium in das Oberarmbein.

Arteria collateralis ulnaris secunda. Dieſe entſpringt meiſtentheils von dem Stamme der A. brachialis ohnweit des Ellenbogengelenks am M. brachialis internus, giebt Aeſte dieſem Muskel, und einen größern Aſt, der durch das Ligamentum intermusculare internum durchgeht und über dem Condylus internus des Oberarmknochens mit der A. recurrens ulnaris Gemeinſchaft hat.

Endäſte der Arteria brachialis.

Je näher die Arteria brachialis dem Ellenbogengelenke kommt, deſto mehr verbirgt ſie ſich unter dem Biceps, indem ſie ſich nach dem Condylus externus des Oberarms hinlenkt. Endlich tritt ſie an der Beugſeite des Ellenbogengelenks unter die Aponeuroſe, welche ſich von der Flechſe des M. biceps ausbreitet, und theilt ſich am M. pronator teres in ihre beiden Hauptäſte, in einen dickeren, die Ellenbogen-Arterie, Arteria ulnaris, und in einen dünneren, die Speichenarterie, Arteria radialis. Dieſe Theilung geſchieht gemeiniglich am Ellenbogengelenke, oder wenig höher, ſelten ſchon weiter oben am Oberarme.

1. Arteria ulnaris oder cubitalis, **Ellenbogenarterie** [1]).

Die Arteria ulnaris geht unter dem oberſten Theile des Pronator teres und der Flexores ſchräg abwärts gegen die Ulna fort, giebt die-

[1]) Auch die Ellenbogenpulsader entſpringt, wie ich oben bemerkte, zuweilen höher oben, u. zwar:
1) aus der Achſelpulsader, wie Mayer, Burns, Ryan, Monro, Barclay, Fleiſchmann, Meckel und Tiedemann (a. d. a. O.) beobachteten, oder
2) ſeltner aus der Oberarmarterie. Dieſe Abweichung ward bemerkt von Petſche, Pohl, Sandifort und Meckel (l. citatis). Tiedemann (expl. tab.

sen Muskeln Aeste, und giebt ohnweit des obern Endes der Ulna die A. interossea, die Zwischenknochenarterie.

Die Arteria recurrens ulnaris entspringt aus der Arteria ulnaris, zuweilen bevor, zuweilen aber nachdem die A. interossea abgegeben worden ist, geht rückwärts, bedeckt vom Flexor ulnaris und von dem Flexor sublimis, gegen den Condylus internus hinauf, und hat mit den A. A. collateralibus ulnaribus Gemeinschaft. In einigen Körpern geht sie unmittelbar in die A. collateralis ulnaris prima über.

Die Fortsetzung des Stamms der Arteria ulnaris lenkt sich gegen die Ulna, und geht längs der innern vordern Fläche derselben, bis zu ihrem untern Ende zwischen dem Flexor ulnaris und dem Flexor sublimis hinab. Sie giebt auf diesem Wege diesen Muskeln, und dem Flexor profundus Aeste.

In der Nähe des untern Endes der Ulna schickt sie den dünnen *Ramus dorsalis*, der unter der Flechse des Flexor ulnaris auf die Rückenseite der Handwurzel tritt, dem Abductor digiti minimi einen Ast giebt, und dann zum Rete carpeum dorsale beiträgt.

Die Forsetzung des Stammes oder der Ramus volaris geht an der innern Seite des Os pisiforme weiter zur Hohlhand herab, trägt zum Rete carpeum volare bei, giebt Aeste dem Flexor digiti minimi, dem Abductor desselben, und theilt sich dann unter dem Hamulus des Hakenknochens in 2 Aeste.

a. Ramus sublimis. Dieser ist dicker, geht, von der Aponeurosis palmaris bedeckt, gekrümmt gegen das Latus radiale der Hand, bildet den Arcus volaris sublimis, und kommt in demselben mit dem Hohlhandzweige, Ramus volaris, der Arteria radialis zusammen.

b. Ramus profundus. Dieser ist dünner, senkt sich in die Tiefe, so daß er von den Flechsen der Flexorum bedeckt wird, und bildet den

---

art. 174.) sah diese Anordnung am rechten Arme eines 12jährigen Knaben. Die Ellenbogenpulsader verlief zwischen der Haut und der Sehnenbinde des Armes. Münz (Gefäßlehre) beobachtete einmal 2 stärkere Ellenbogennebenpulsadern.

Einen ganz ungewöhnlichen Verlauf beobachtete Burns (Herzkrankheiten, S. 341. Tiedemann, tab. art. XVII. fig. 1.) In 3 weiblichen Leichen theilte sich die Oberarmarterie nicht eher, als in der Nähe des Armgelenkes. Sobald sie sich getheilt hatte, durchbohrte die Ellenbogenarterie, statt unter den Beugemuskeln der Handwurzel herabzugehen, die Fascia, und befestigte sich an die Vena basilica, mit welcher sie nach dem Handgelenke herabstieg. Ein Fall, der bei Venäsection leicht gefährlich werden kann.

In der Regel giebt die Ellenbogenarterie, wenn sie hoch entspringt, den großen anastomosirenden Ast ab, der, um nach dem hinteren Theile des innern Gelenkhöckers des Oberarmbeines zu gelangen, die Sehnenbinde durchbohrt. In diesem Falle müssen jedesmal Zweige des dem Laufe der Interossea folgenden Gefäßes, welches, wenn die Ellenbogenarterie unter der Haut läuft, widernatürlich groß ist, die Stelle der beiden zurücklaufenden Ellenbogenarterien vertreten haben. (Burns, Herzkh. S. 340.)

Digitized by Google

Arcus volaris profundus mit dem Rückenzweige, Ramus dorsalis, der Arteria radialis, welcher zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigefingers vom Handrücken in die Hohlhand kommt. Nicht selten ist aber der Hohlhandzweig der A. radialis sehr klein, so daß beide Hohlhandbogen, der Arcus sublimis sowohl, als der Arcus profundus, durch eine Vereinigung der Zweige der A. ulnaris mit dem zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigefingers durchgehenden Aste des Ramus dorsalis und der A. radialis gebildet werden.

Die *Arteria interossea*, die Zwischenknochenarterie [1]), entspringt aus der A. ulnaris, selten aus dem Theilungswinkel der A. brachialis, so daß diese sich in 3 Aeste theilt, und sehr selten aus der Radialis, wenn die Ulnaris schon am Oberarme allein entspringt. Sie geht gerade abwärts, und theilt sich ohnweit ihres Ursprungs aus der A. ulnaris in 2 Aeste.

a. Arteria interossea dorsalis s. externa. Diese geht durch das Ligamentum interosseum auf die Rückenseite desselben, giebt die Arteria recurrens interossea, welche hinaufgeht, dem gemeinschaftlichen Kopfe der Extensorum, dem M. anconaeus parvus und dem Supinator brevis Aeste giebt, und an der äußern Seite des Olecranum mit der A. collateralis radialis Gemeinschaft hat.

Dann geht sie an der Rückenseite des Ligamentum interosseum herab, zwischen dem Extensor ulnaris und dem Extensor communis digitorum herab, giebt diesen Muskeln, ferner dem Extensor Digiti minimi, dem Abductor longus und den Extensoribus pollicis Aeste.

Am untern Theile des Unterarms hat sie mit kleineren, die Zwischen-

---

[1]) Sie entspringt zuweilen aus der Oberarmarterie (Arteria brachialis).

Dieses ward beobachtet von Ludwig (l. c.) in dem Körper einer Frau, von Sabatier, Hildebrandt, Monro, Barclay und Tiedemann, der sie jedoch nur einmal sah. Zweimal beobachtete sie Münz (Gefäßlehre, p. 539. T. XIII. f. VII.) einmal am linken Arme eines Mannes, einmal am linken Arme eines Kindes.

Außerdem ward auch zuweilen eine ungewöhnliche oberflächliche Zwischenknochenpulsader bemerkt. Der tiefliegende Ast ist dann sehr klein, und ehe er den viereckigen Muskel erreicht, fast ganz verschwunden, der oberflächliche Ast hingegen, der zwischen dem gespaltenen Fingerbeuger und dem Speichenhandwurzelbeuger hingeht, so groß, wie die Speichen- oder Ellenbogenarterie. Hat der letztere Ast nun in unverminderter Größe das Ringband erreicht, so geht er mit den Sehnen der Beugemuskeln unter demselben zur inneren Handfläche, wo er zuweilen einen Verbindungszweig an die Ellenbogenarterie abgiebt, häufiger aber ein besonderer Stamm wird, der seine Aeste an die Ulnarseite des Daumens, an die beiden Seiten des Zeigefingers und an die Speichenseite des Mittelfingers vertheilt. Hierauf hat dieses ungewöhnliche Gefäß über dem Handgelenke eine eben so oberflächliche Lage wie die Speichenarterie, und kann wie diese leicht verletzt werden. Einen Fall dieser Art bildet Tiedemann ab (tab. art. XVI. fig. 2.). Einen ähnlichen Fall hat Haller (Icon. anat. fasc. VI. p. 33.) beobachtet; auch Ludwig (de var. art. brach. ram. p. 9.), Sabatier (traité d'anat. T. III. p. 69.), Burns (Herzkhn. p. 348.) und Barclay (l. c. p. 120.) haben diese Anordnung der Zwischenknochen-Pulsader beschrieben.

Hildebrandt bemerkte einst zwei A. A. interosseas internas, eine, welche dicht am Lig. interosseum blieb, die andere, welche unter dem Flexor sublimis und profundus, ferner unter dem Lig. carpi proprium hindurchging.

Digitized by Google

knochenhaut durchbohrenden, Aeſten der Arteria interossea interna Gemeinſchaft; auch, wenn ſie ſo weit herabreicht, mit dem Ramus dorsalis der A. interossea interna, einem großen durchbohrenden Zweige.

Zuweilen iſt ſie ungewöhnlich kurz und dünn, ſo daß ſie ſich nur auf den obern Theil des Unterarms beſchränkt.

b. Arteria interossea interna s. volaris. Dieſe bleibt an der Hohlarmſeite des Ligamentum interosseum, geht an demſelben hinab, giebt dem Ligamentum interosseum, dem Pronator quadratus, dem Flexor profundus und dem Flexor pollicis longus Aeſte, auch eine Arteria nutritia radii. Am untern Theile des Unterarms durchbohren einige ihrer Zweige das Ligamentum interosseum, und gelangen zu den Muskeln an der Rückenſeite dieſes Bandes, welche mit Zweigen der A. interossea externa Gemeinſchaft haben. Wenn die A. interossea externa kürzer iſt, ſo ſind dieſe durchbohrenden Zweige größer.

Am untern Ende des Ligamentum interosseum geht die Fortſetzung des Stammes an der Superficies volaris der Handwurzel hinab, und trägt zum Rete carpeum volare bei. In einigen Körpern geht ſie bis unter das Ligamentum Carpi proprium hinab, zum Arcus volaris sublimis, oder giebt, wenn kein Arcus da iſt, die mittleren Ramos digitales.

Ein Zweig lenkt ſich aber zwiſchen der Ulna und dem Radius auf die Rückenſeite der Handwurzel, und giebt mit den daſigen Aeſten der Ulnaris und Radialis das Rete carpeum dorsale.

2. Arteria radialis, die Speichenarterie [1]).

Die Arteria radialis iſt dünner, als der Stamm der A. ulnaris oben iſt, bevor die A. interossea abgegeben worden. Sie iſt der Fortſetzung

---

[1]) Nach dem Vorhergehenden iſt der Urſprung dieſer Arterie folgenden Verſchiedenheiten unterworfen.

1) nämlich nimmt ſie ihren Urſprung aus der Axillaris. So ſahen ſie Heiſter, am rechten Arme einer Frau, Böhmer, am rechten Arme eines Mannes, Ludwig, am rechten Arme einer Frau (die Armſchlagader verlief auf die gewöhnliche Weiſe, und bildete in der Armbuge eine große Anaſtomoſe mit der Speichenarterie); Sandifort, am rechten Arme; Mayer, Ryan, an 5 Armen; Joh. Fr. Meckel (Arch. II. S. 127.) in 3 Fällen. Tiedemann (expl. tab. art. p. 166.) in 8 Fällen, bald auf der rechten, bald auf der linken Seite. In allen dieſen Fällen verläuft ſie entweder innerhalb der Sehnenbinde des Armes, oder ſie durchbohrt dieſe und ſteigt unter der Haut mit der Speichenhautvene herab. Münz (Gefäßlehre, p. 537.) ſah ſie 2mal am rechten Arme eines Mannes, und 1mal am Arme eines Kindes (Tal. VII. p. 6.).

2) Sie entſpringt aus der Armpulsader, eine Abweichung, die am häufigſten vorkommt. Sie ward beobachtet von Heiſter, Möbius, Trew, Petſche, Eſchenbach, Winkler, Schmiedel, Haller, Hebenſtreit, Ludwig, Ballan, Penchienati, Sandifort, Sömmerring, Monro d. Jüng., Burns, Barclay, Meckel (tab. anat. path. fasc. II. tab. 11. fig. 5. 7.) und Tiedemann, an den angeführten Stellen. Sie iſt unter dieſen Verhältniſſen entweder von der Sehnenbinde des Armes bedeckt, oder ſie verläuft zwiſchen dieſer und der Haut mit der Speichenhautvene.

Zuweilen giebt die Radialis bald nach ihrem Urſprunge die flache Hohlhandarte-

Digitized by Google

derſelben aber entweder gleich, oder doch wenig von derſelben verſchieden. Sie geht längs dem Radius, an der innern Seite deſſelben, zwiſchen dem Supinator longus und dem Flexor radialis hinab.

An ihrem oberen Theile giebt ſie die Arteria recurrens radialis, welche, vom Supinator longus bedeckt, gegen den Condylus externus hinaufgeht, dieſen Muskeln und dem Brachialis internus und dem Ellenbogengelenke Aeſte giebt, und mit den Arteriis collateralibus radialibus Gemeinſchaft hat.

Ferner giebt ſie in ihrem Fortgange Aeſte dem Supinator longus, dem Extensor radialis longus, dem Pronator teres, dem Flexor pollicis longus, dem Flexor radialis, dem Flexor sublimis, dem profundus, dem Pronator quadratus und der Haut.

Am untern Ende des Radius liegt ſie an der innern Seite deſſelben neben dem Processus styloideus, dicht unter der Haut, ſo daß man hier den Puls derſelben deutlich fühlen kann.

---

rie ab, die lang, klein und in einigen Fällen gewunden iſt, und in der Richtung der nach dem Rücken der Speiche ſich wendenden Speichenarterie nach unten geht. Tiedemann (l. c. Tab. XVII. fig. 2.) bildet einen ſolchen Fall ab. Die Speichenarterie wendet ſich nämlich in der Mitte der Speiche zum Rücken der Hand, und zwar oberflächlich verlaufend über den langen Rückwärtswender, die, äußeren Speichenmuskeln, den Abzieher und die Strecker des Daumens.

Dieſer Verlauf bewirkt, daß am gewöhnlichen Orte kein Puls bemerkt werden kann. Daſſelbe iſt der Fall, wenn, wie Otto (path. Anat. I. S. 309.) anführt, die Radialis ganz fehlt. Er beobachtete dies bei einer bejahrten Frau; von der Radialis war nur die Recurrens und ein Paar kleine Muskeläſte vorhanden, der herablaufende Stamm fehlte ganz, dafür war die Interossea größer, und gab auch den Handrückenaſt, den ſonſt die Radialis giebt.

Manchmal finden ſich ſtatt einer, 2 Speichennebenpulsadern. Münz (Gefäßlehre, S. 539. Taf. IX. f. 5.) ſah ſie einmal mit einem gemeinſchaftlichen ſtärkeren Stamme, öfters jede beſonders, höher oder tiefer aus der Armpulsader, einmal ſogar die eine aus der tiefer aus der Armpulsader kommenden Kranzpulsader des Oberarmes entſpringen. (Taf. IX. f. V. 4.)

Einen höchſt ſonderbaren Verlauf der A. radialis beobachtete Otto (ſeltne Beobachtungen 2s Hft. S. 62.). Sie entſprang ſehr hoch oben, war aber ungewöhnlich dünn, nur etwa 1 Linie ſtark, und lag tief, nicht weit vom Hauptſtamme, und ſtieg ohne Aeſte abzugeben, bis zur Ellenbogenbeuge, wo ſie von innen her einen Verſtärkungsaſt bekam, der dicker als ſie ſelbſt in einem rechten Winkel aus der Brachialis entſprang; die nun viel ſtärker gewordene Radialis nahm nun den gewöhnlichen Verlauf. Aus der Brach. aber entſprang, außer der Ulnaris und Interossea, ein 3ter Aſt, der in der Mitte der innern Seite des Vorderarms zwiſchen dem tiefen und oberflächlichen Fingerbeuger und unter dem Lig. carpi volar. propr. herablief, ſeine Richtung gegen den Daumen nahm, ſich in die Art. poll. ulnar. radial., ind. und eine 5te ſpaltete, die ganz oberflächlich unter der Haut in der Mitte zwiſchen Daumen und Zeigefinger nach dem Handrücken lief.

Der Hohlhandzweig der Speichenpulsader zum oberflächlichen Hohlhandbogen entſpringt öfter ſchon höher als gewöhnlich am Vorderarme aus der Speichenpulsader, ſo, daß dieſe ſich ſchon höher in 2 Aeſte, in den Hohlhand- und Rückenzweig der Hand theilt. (Münz Gefäßl. S. 540.) Oft fehlt auch dieſer oberflächliche Hohlhandzweig gänzlich oder größtentheils. (Ibid. Taf. III. f. 2.)

Außerdem iſt noch zu bemerken, daß wenn die Speichenarterie hoch oben am Arme entſpringt, ſie gewöhnlich nach der Hand geht, ohne mit der Ellenbogenarterie zu anaſtomoſiren; in einigen Fällen jedoch ſah Burns (Herzkht. S. 341), daß jene von dieſer am Ellenbogengelenke einen ganz kleinen Zweig empfing. Wo die Speichenarterie klein iſt, da vertritt ein Zweig der Ellenbogenarterie die Stelle der zurücklaufenden Speichenarterie.

Digitized by Google

Unter dem untern Ende des Radius theilt sich die Arteria radialis in 2 Aeste.

1) Ramus volaris, der Hohlhandzweig. Dieser ist viel dünner als der Rückenzweig, zuweilen ungewöhnlich dünn. Er giebt dünne Aeste zum Rete carpeum volare, geht dann neben dem Ligamentum Carpi proprium volare hinab, giebt zuweilen die Arteria volaris radialis pollicis, und geht dann zwischen den Fasern des Abductor brevis, oder ganz von diesem Muskel bedeckt, selten an der auswendigen Fläche dieses Muskels, in die Vola zum Arcus volaris sublimis.

2) Ramus dorsalis, der Rückenzweig. Dieser ist viel dicker, und lenkt sich, bedeckt von den Flechsen des Abductor longus und Extensor minor pollicis auf den Rücken der Handwurzel, giebt seinen Ramus carpeus dorsalis zum Rete carpeum dorsale. Ein Zweig desselben geht zwischen den Flechsen der beiden Extensorum radialium hinab.

Dann geht er zwischen dem Os metacarpi des Daumens und des Zeigefingers weiter hinab, und giebt 3 Arteriae digitales dorsales, die radialis pollicis, die ulnaris pollicis, und die radialis indicis; die beiden letztgenannten gemeiniglich aus Einem Stamme. Die dicke Fortsetzung des Ramus dorsalis geht zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigefingers in die Hohlhand über [1]), durch-

---

[1]) Der Hohlhandzweig der A. radialis und ulnaris liegt in manchen Fällen bei seinem Uebergange in die Hohlhand sehr oberflächlich. Er ist zuweilen sehr dick (Bukus, Herkrankh. S. 344.) und bildet mit der A. ulnaris den oberflächlichen Arcus sublimis, auf eine solche Weise, daß jener Ast einen beträchtlichen Theil desselben ausmacht und noch eine Fingerarterie zum Zeigefinger schickt. Bisweilen wird der Arcus volaris sublimis von dem oberflächlichen Hohlhandaste der A. ulnaris und von dem am Mittelhandknochen des Daumens in die Hohlhand kommenden Handrückenaste der A. radialis gebildet, wo dann zuweilen der Hohlhandast der A. radialis sehr klein ist oder ganz fehlt, so daß alle Arterien des Daumens, und zuweilen sogar der des Zeigefingers von jenem Handrückenaste der A. radialis entspringen.

Bisweilen tritt in den Arcus volaris sublimis eine sehr dicke Fortsetzung der A. interossea ein.

Bisweilen fehlt der Arcus volaris sublimis ganz, und der Hohlhandast der Ulnararterie und der Radialarterie gehen, ohne sich unter einander zu verbinden, in die Fingerarterien über, wobei dann der Ast der Ulnararterie meistens der größeren Anzahl der Finger Zweige giebt.

Bisweilen giebt ein Ast der A. interossea des Vorderarms, der hoch oben, oder auch tiefer unten entspringt, und den Mediannerven begleitet, gemeinschaftlich mit der Radialarterie, oder auch allein, die Fingerarterien an den einander zugewendeten Rändern des Daumens und des Zeigefingers, wo dann auch der Arcus volaris sublimis fehlen kann.

Bisweilen kommen die Fingerarterien dieser Finger aus dem Aste der Radialarterie, welcher sich zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigefingers vom Handrücken in die Hohlhand hereinschlägt. Da nun bald die vom Rücken in die Hohlhand kommende Fortsetzung der Radialarterie sehr dick, und der Volarzweig derselben sehr dünn ist, bald die A. A. interosseae des Vorderarms in die Hohlhand mit starken Zweigen übergehen, und dafür der in dieselbe kommende Ast der Ulnararterie oder der Radialarterie dünn ist, so ändert sich die Ordnung, in welcher die Fingerarte-

Digitized by Google

bohrt dann den M. interosseus externus des Zeigefingers, giebt ihm und dem Abductor pollicis Aeſte, und geht in den Arcus volaris profundus, zuweilen auch in den Arcus volaris sublimis über.

Allgemeine Bemerkungen über die Vertheilung der aus dem Bogen der Aorta emporſteigenden Arterien.

Die A. carotis führt dem Kopfe ſammt dem vordern Theile des darin eingeſchloſſenen Gehirns und dem oberen Theile des Halſes, die A. subclavia dem Gehirne und Rückenmarke, dem übrigen Theile des Halſes und dem Arme Blut zu. Zugleich bringt dieſe letztere durch die an der vordern Seite des Rumpfes der Länge nach herabſteigende Arteria mammaria interna eine durch enge Aeſtchen vermittelte Verbindung des oberſten und des unterſten Theiles der Aorta hervor, denn am Bauche verbindet ſich die aus der A. cruralis entſprungene A. epigastrica mit der A. mammaria interna. Die der Länge nach am Rumpfe verlaufenden Arterienäſte ſind ſehr merkwürdig. Es giebt nur an den 2 entgegengeſetzten Seiten des Rumpfes ſolche Arterien, nämlich die genannten Arterien an der vordern Wand der Bruſt- und Bauchhöhle, nicht weit von der Mittellinie, und die aus der Vertebralis entſprungenen Arteriae spinales anteriores und posteriores in der Rückgrathöhle. Alle andern aus der Aorta für die Wände der

---

rien bald mehr aus dieſen, bald mehr aus jenen Zweigen entſpringen, ſo mannichfaltig ab, daß ſich die Varietäten kaum alle aufzählen laſſen. Da die Arterien, welche an den einander zugekehrten Rändern der Finger in der Hohlhand verlaufen, ihr Blut aus dem Arcus volaris sublimis, und meiſtens zugleich auch durch communicirende Aeſte aus dem Arcus volaris profundus zugeführt erhalten, ſo ändert ſich auch das Verhältniß, in welchem ſie mehr Blut aus jenem als aus dieſem Gefäßbogen zugeführt erhalten, mannichfaltig ab, ſo daß es Fälle giebt, wo ſie faſt allein aus dem tiefen Gefäßbogen entſpringen.

Eine ähnliche Bewandniß hat es mit den Gefäßen des Handrückens. Je nachdem die A. interossea mehr zu der Bildung des Rete carpeum dorsale beiträgt, tragen die Handrückenäſte der A. radialis und ulnaris dazu weniger bei. Je kleiner die aus dieſem Rete carpeum entſpringenden 3 A. A. interosseae dorsales (die 3 kleineren Mittelhandarterien des Handrückens) ſind, welche zwiſchen den Mittelhandknochen der 4 kleineren Finger verlaufen, je mehr ſie Blut durch die, am Anfange dieſer Zwiſchenräume liegenden, durchbohrenden Aeſte, an die Arterien der Hohlhand abgeben, und je kleiner folglich die aus ihnen entſpringenden, auf dem Rücken der Finger zu jeder Seite derſelben gehenden Fingerarterien ſind, deſto mehr tragen die von der Hohlhandſeite auf die Rückenſeite am Anfange der Finger ſich heruberſchlagenden Aeſte zur Bildung dieſer Arterien bei. —

Eine ältere Abhandlung über die Arterien der Hand rührt von *Andr. Pitzler*, peculiaris arteriarum situs in manibus. Ephemer. nat. cur. Centur. IX. et X. p. 329. her.

Digitized by Google

Bruſt- und Bauchhöhle und für das Rückgrat dieſer Gegend entſpringenden, ſpäter zu beſchreibenden Arterien, die Zwiſchenrippen- und Lendenarterien, A. A. intercostales und lumbales, haben eine quere Richtung, und erſtrecken ſich einerſeits an den Wänden des Bauches und der Bruſt vorwärts gekrümmt bis zu den Aeſten der genannten 2 vordern Längenarterien, A. A. mammariae internae, andererſeits, in die Rückgrathöhle durch die Intervertebrallöcher eindringend, zu den hintern Längenarterien, Spinalarterien, A. A. spinales.

Für den Hals und Kopf ſind die 2 wichtigſten der Länge nach verlaufenden, und in der Schädelhöhle ſich vereinigenden Arterien die A. carotis und die A. vertebralis. Die Carotis iſt eine oberflächlich verlaufende, die Vertebralis eine tiefe, im Vertebralcanale vor der Zuſammendrückung geſchützte Arterie. Die Vertebralis gehört dem hinteren Theile des großen Gehirns, dem kleinen Gehirne und dem verlängerten Marke, die Carotis dem vordern Theile des großen Gehirns an. Am und im Gehirne ſtoßen ſie beide zuſammen, nicht nur durch den Circulus arteriosus Willisii an der Grundfläche, ſondern auch durch viele zum Theil beträchtliche Aeſte an der Oberfläche der Rindenſubſtanz des hintern Hirnlappens und an der innern Seite der Halbkugeln des großen Gehirns, endlich aber auch in den Hirnventrikeln ſelbſt, wohin die Endäſte der A. vertebralis (die A. A. profundae cerebri) durch die Mitte der großen Querſpalte der Ventrikel, die A. choroidea der Carotis von dem vorderſten Theile dieſer Spalte aus gelangt. Die Vertebralarterie gelangt bekanntlich durch das große Hinterhauptloch in den Schädel, und tritt da, wo ſie an dem unpaaren markigen Theile des kleinen Gehirns, pons Varolii, hinläuft, ſelbſt von beiden Seiten her in eine unpaare Arterie, A. basilaris, zuſammen. Die Arterien für die graue Rindenſubſtanz des kleinen Gehirns, die A. cerebelli inferior und superior, bilden Gefäßkränze um das kleine Gehirn, die von der untern Seite deſſelben anfangen, und ſich auf der oberen ſchließen. Durch dieſe Vertheilung und Vereinigung der Arterien wird bewirkt, daß keinem Theile des Gehirns, weder der Rindenſubſtanz, noch der Markſubſtanz (welche letztere ihre beſonderen Arterien großentheils von den Ventrikeln aus erhält), jemals das Blut gänzlich fehlen kann, ſelbſt in dem Falle, wenn 1 oder 2 der zuführenden Blutgefäße Blut zuzuführen gehindert würden, denn jede von ihnen kann zu allen Stellen des Gehirns Blut führen. Die Vertebralis iſt außerdem noch intereſſant, weil ſie die queren Rückgratsarterien durch die Intervertebrallöcher des Halſes und die langen Rückgratsarterien, A. A. spinales, hergiebt. In der Schädelhöhle entſpringt auch aus ihr die in den Meatus auditorius internus dringende Arterie des innerſten Ohrs.

Digitized by Google

Die durch den Canalis caroticus in die Schädelhöhle eingehende arotis cerebralis iſt den vorn in der Schädelhöhle, den in der Augen- hle und den in dem obern Theile der Naſenhöhle gelegenen Theilen be- mmt, und erſtreckt ſich auch äußerlich bis auf die Stirn. Für das ehirn giebt ſie 2 Arterien, die vorzüglich Arterien der grauen Rinden- bſtanz ſind; nämlich eine in die Längenfurche, A. corporis callosi, id eine in die Querfurche, die A. fossae Sylvii. Für den oberen Theil r Augen- und Naſenhöhle und für die Stirn iſt der durch das Fora- en opticum gehende Zweig, die A. ophthalmica beſtimmt. Die eſe derſelben gehen durch das Foramen ethmoidale, in die Naſe, en an der großen Oeffnung der Augenhöhle zur Stirn, inwendig aber ren ſie dem Augapfel mit ſeinen Hülfswerkzeugen Blut zu.

Die Carotis facialis führt faſt ganz allein den knöchernen Wän- n des Schädels, ſeinem äußern und innern häutigen Ueberzeuge, dem ntlitze und dem oberen Theile des Halſes Blut zu. Dem Hinter- pfe und Nacken durch die A. occipitalis, dem Seitentheile des opfs durch die Auricularis post. und Temporalis, dem Antlitze durch e Maxillaris externa und interna, endlich dem obern und vordern heile des Halſes, namentlich den mit dem Zungenbeine zuſammenhän- nden Theilen, der Zunge, dem Kehlkopfe nebſt der Schilddrüſe und m Schlunde, pharynx, durch die A. lingualis, thyreoidea sup. id pharyngea.

Die Antlitzarterien verlaufen wieder entweder mehr in den Höhlen er mehr an der Oberfläche des Kopfes. Die A. maxillaris in- erna nämlich iſt die Arterie für die Höhlen, und ihre Zweige gehen rch viele verborgene Spalten und Löcher. Sie liegt nämlich unter dem ckbogen und in der Fissura sphenomaxillaris, durch welche die ugenhöhle und die Schläfengrube verbunden ſind, verſteckt, und von er aus dringt ihr Aſt, die A. meningea media, durch das Foramen pinosum in die Schädelhöhle, wo ſie die größte ernährende Arterie s Knochens iſt; die Arteria pterygo-palatina dringt durch Canäle ieſes Namens in die Mundhöhle, die Spheno-palatina durch einen anal dieſes Namens ſeitwärts in die Naſenhöhle, ihr Aſt, die Arteria nfraorbitalis dringt in den Boden der Augenhöhle, und nebſt der lveolaris sup. in die ſeitlichen Nebenhöhlen der Naſe und in die ahnhöhlen, die Alveolaris inferior endlich gelangt in den Zahncanal nd in die Zahnhöhlen der Unterkinnlade. Außerdem kommen auch noch leinere Aeſte ins innere Ohr. Alle dieſe Höhlenarterien dringen durch ewiſſe Löcher zur Oberfläche hervor, und treten mit der an der Ober- fläche liegenden äußeren Antlitzarterie und mit den Seitenarterien des Kopfs in Verbindung. Die Ophthalmica dringt zur Augenhöhle oben her-

Digitized by Google

aus und ſeitwärts in die Schläfengrube durchs Jochbein; die tiefe Antlitzarterie dringt durch das Foramen infraorbitale und mentale nach außen, und verbindet ſich mit den Geſichts- und Schläfenarterien.

Die Arterien für die am Zungenbeine hängenden 3 Organe, für die Zunge, den Kehlkopf, für die Schilddrüſen und für den Pharynx, haben mehr einen queren Verlauf.

Rechnet man von den oben ausführlich beſchriebenen Aeſten der A. subclavia die zum Kopfe aufſteigende Vertebralis und die zum Bauche herabſteigende Mammaria, und noch die ſehr kleine Intercostalis prima weg, ſo bleiben nur die dem Halſe beſtimmten Zweige übrig, die Thyreoidea inf. für den vordern und untern Theil des Halſes, die Cervicalis ascendens für den Seitentheil des Halſes und die Transversa scapulae und colli für den hintern Theil des Halſes oder den Nacken. Dieſe letzteren 2 Arterien bilden mit den Arterien der Achſelhöhle Gefäßkränze um das Schulterblatt herum. Die A. transversa colli um den hintern Rand des Schulterblattes, die A. transversa scapulae um die Fossa supra- und infraspinata.

Außerdem, daß von der Achſelhöhle aus von der A. axillaris die großen Muskeln des Arms, welche vom Rumpfe kommen, mit Zweigen verſehen werden, verſieht die Subscapularis das Schulterblatt auf ſeiner hohlen Seite und Rückenſeite. Die kleine vordere und die große hintere Kranzarterie des Oberarms bilden um den Kopf deſſelben einen Kranz.

Der mittlere und untere Theil des Oberarms hat 2 Stämme, von welchen die denſelben benachbarten Theile ihr Blut beziehen: den Stamm der Armarterie, der auf der Beugeſeite, die tiefe Armarterie, die auf der Streckſeite im Zwiſchenraume zwiſchen den 3 zuſammenſtoßenden Köpfen des M. triceps liegt.

Am Ellenbogen entſtehen mehrere dieſes Gelenk umgebende Gefäßkränze durch Zweige, die von der A. brachialis und von der brachialis profunda hinabſteigen (Arteriae collaterales), und von den Arterienſtämmen des Vorderarms heraufſteigen (Art. recurrentes).

Am Vorderarme zerfällt die Armarterie oben in die 2 Stämme, die unten den Vorderarm wieder verlaſſen und zur Hand weitergehen. Sie werden nach den 2 Knochen des Vorderarms, an welchen ſie auf der Hohlarmſeite verlaufen, A. radialis und ulnaris genannt. Die A. ulnaris giebt einen Stamm, von welchem 2 tiefere Vorderarm-Arterien, A. interosseae, die beim Vorderarme faſt ganz verbleiben, entſpringen, und zwiſchen den 2 Vorderarmknochen (die eine auf der Hohlarmſeite, die andere auf der Rückenſeite des Ligamentum interosseum) verlaufen. So giebt es alſo am Vorderarme 4 Blutgefäßſtämme, von wel-

Digitized by Google

chen die Theile am Vorderarme ihr Blut beziehen, 2 oberflächlichere und 2 tiefere, die A. radialis, ulnaris, interossea dors. u. inteross. vol.

Die Achſelarterie liegt an der Beugeſeite des Achſelgelenks, und eben ſo die Armarterie an der Beugeſeite des Ellenbogengelenks; die Handarterien dagegen gehen zur Hand, die ſich vorwärts und rückwärts faſt um gleichviel beugen kann, nahe an den 2 Seitenrändern über. Auf dieſe Weiſe ſind dieſe Stämme vor einer ſchädlichen Dehnung geſichert.

Die Rückenſeite der Hand hat viel kleinere Arterien als die Hohlhandſeite. Denn es liegen die zur Hand übergehenden größeren Arterienſtämme mehr auf derjenigen Seite, nach welcher zu die Hand mehr als nach der Rückenſeite gebogen werden kann. Auch bedurfte die Rückenſeite nur kleinerer Arterien, weil ſie weniger fleiſchig iſt, als die Hohlhandſeite.

Von der A. ulnaris geht nur ein ſehr kleiner Zweig, ramus dorsalis, etwas über der Handwurzel, unter dem M. Flexor carpi ulnaris weg, zum Rücken der Handwurzel, ein viel größerer zwiſchen dem Os pisiforme und zwiſchen dem Ligamentum carpi volare proprium und dem Palmaris brevis in die Hohlhand, welcher letztere theils den auf den Sehnen der Beugemuskeln liegenden Arcus volaris sublimis, theils den unter ihnen liegenden Arcus volaris profundus bildet, welcher in der Regel auch mit den durchbohrenden, zwiſchen je 2 Mittelhandknochen vom Handrücken in die Hohlhand dringenden Aeſten der Mittelhandarterie des Handrückens in Verbindung ſteht.

Von der A. radialis geht zwar auch nur ein ſchwächerer Zweig, ramus volaris, bedeckt vom M. abductor und flexor pollicis brevis, an dem os naviculare zur Hohlhand, und hilft daſelbſt den Arcus volaris sublimis bilden, und der viel ſtärkere Ramus dorsalis zum Handrücken, aber dieſer Rückenaſt geht größtentheils ſelbſt wieder zwiſchen dem Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigefingers in die Hohlhand, und hilft dort den Arcus volaris profundus, zuweilen auch den sublimis bilden. Hieraus ſieht man, daß die fleiſchigere Hohlhand größere Arterien als der Handrücken empfängt. Zugleich erkennt man, auf wie vielfache Weiſe die verſchiedenen zur Hand und zu den Fingern übergehenden Arterien unter einander anaſtomoſiren, und dadurch dem Nachtheile vorbeugen, der ſonſt leicht von einem Drucke entſtehen könnte, welchem die Hand und die Finger nicht ſelten ausgeſetzt ſind.

Die A. radialis und ulnaris anaſtomoſiren unter einander ſowohl auf dem Handrücken als in der Hohlhand. Auf dem Rücken der Handwurzel wird aus dünnen Aeſten dieſer 2 Arterien und aus den hinzukommenden kleineren Aeſten der A. interossea ein Gefäßnetz,

Digitized by Google

rete carpeum dorsale, gebildet, welches an den zwischen den 4 kleineren Metacarpusknochen gelegenen 3 Zwischenräumen mit den tiefen Arterien der Hohlhand zusammenhängt und 3 A. interosseae, Mittelhandarterien, giebt, welche den Muskeln gleiches Namens angehören, und außerdem gabelförmig in 2 Fingerarterien, Art. digitales dorsales, gespalten werden, welche auf dem Handrücken an den einander zugewendeten Rändern der 4 kleineren Finger verlaufen, wo sie sich mit Aesten vermischen, die von den Fingerarterien der Hohlhand zu ihnen übergehen. In der Hohlhand bildet der dicke Ramus volaris sublimis der A. ulnaris, und der dünne Hohlhandzweig der A. radialis, den zwischen den Sehnen der Beugemuskeln und der Aponeurosis palmaris liegenden Arcus volaris sublimis. Der Ram. vol. profundus der A. ulnaris stößt in dem unter den Sehnen der Beugemuskeln gelegenen Arcus volaris profundus mit dem zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigefingers durchgehenden Rückenzweige der A. radialis zusammen. Aus ihm gehen die Arteriae interosseae der Hohlhand hervor, welche theilweis, zuweilen auch alle, mit den Fingerarterien in Verbindung stehen, und immer die M. M. interossei und einige kleine Muskeln des kleinen Fingers und des Daumens mit Blut versorgen. Die Arterien der einander zugewendeten Ränder der Finger entspringen an der Hohlhandseite gabelförmig aus dem Arcus volaris sublimis, stehen aber auch meistentheils mit Aesten des Arcus volaris profundus in einiger Verbindung, die sich nahe an der gabelförmigen Spaltung mit ihnen vereinigen. Jeder Rand eines Fingers hat eine Arterie, die Arterien der beiden Ränder, die je 2 Finger, vornehmlich die 4 kleineren Finger, einander zukehren, entspringen meistens aus einem gemeinschaftlichen Stämmchen, die am abgewendeten Rande des Daumens und des kleinen Fingers einzeln. An der Spitze, zum Theil auch an den beiden andern Gliedern der Finger vereinigen sich die 2 A. volares der Finger durch Anastomosen mit einander, auch gehen Aeste auf den Fingerrücken, welche sich mit den Fingerarterien des Fingerrückens verbinden.

Aeste des absteigenden Theils der Brustaorta, Aorta thoracica descendens.

Die Arterien, welche von der durch die Brusthöhle und durch die Bauchhöhle verlaufenden Aorta entspringen, lassen sich in solche eintheilen,

Digitized by Google

welche den Wänden dieser Höhlen angehören, und in die, welche den in den Höhlen befindlichen Organen bestimmt sind.

Weil nun das Herz seine Blutgefäße schon vom Anfange der Aorta erhält, und die Lungen eine eigenthümliche Arterie besitzen, so giebt es in der Brusthöhle keine großen Organe, die von der Aorta descendens Blutgefäße bekommen könnten, und es entspringen daher daselbst, außer einigen Arterien für die in die Lungen dringenden Luftröhrenäste und für die Speiseröhre, keine von ihrer vordern Seite, wohl aber hinten auf jeder Seite 10 Zwischenrippenarterien für die Wand der Brust.

Vordere Aeste der Aorta in der Brusthöhle.

Arteriae bronchiales, Luftröhrenarterien,

nennt man die Arterien, welche sich an den 2 Aesten, in die sich die Luftröhre spaltet, verbreiten, mit ihnen in die Lungen eindringen, und daselbst theils zur Ernährung der Lungen, theils zur Absonderung des Dunstes in dem Brustfellsacke und in der Schleimhaut der Luftröhre beitragen. Sie sind aber sowohl ihrer Zahl als ihrem Ursprunge nach bei verschiedenen Menschen so verschieden, daß sich kaum eine einfache Regel darüber aufstellen läßt. Im Allgemeinen läßt sich nur sagen, daß 1 oder 2 oder 3, selten 4 solche Arterien von der vordern Seite der absteigenden Aorta nahe unter ihrem Bogen entspringen, daß gewöhnlich die rechte Bronchialarterie größer ist und aus einem Stamme entspringt, der ihr mit der ersten von der Aorta kommenden Zwischenrippenarterie, A. intercostalis, gemeinschaftlich ist, und daß diese oft nicht nur dem einen, sondern beiden Luftröhrenästen Zweige giebt, und in diesem Falle zuerst zum linken, und dann zum rechten Luftröhrenaste einen Zweig schickt. Auf der linken Seite entspringen oft 1 oder 2 Bronchialarterien aus der Aorta selbst [1]).

Die rechte Bronchialarterie schickt nicht selten der Speiseröhre einen Zweig, und den an den Luftröhrenästen befindlichen Lymphdrüsen, Glan-

[1]) *Haller*, De arteriis venisque bronchialibus et oesophageis. Gottingae 1743. Coll. Disp. anat. select. Vol. III. Gottingae 1746. 4. p. 4. et 5. — Derselbe, Icones anatomicarum c. h. Fasc. III. Gottingae 1747. Fol. p. 36. Er fand, als er den Verlauf der Bronchialarterien 25mal untersuchte, in 13 Fällen, daß die Arteria bronchialis dextra zugleich mit der ersten aus der Aorta kommenden (in den 3ten, oder 4ten, oder 5ten Zwischenraum gehenden) A. intercostalis entsprang. Von der linken Bronchialarterie sahe er, daß sie in den meisten Fällen aus der Aorta ihren Ursprung nahm, und zwar, wenn sich die rechte Bronchialarterie mit zu dem linken Luftröhrenaste erstreckte, eine, wenn das nicht der Fall war. Da nun auch bisweilen eine A. bronchialis aus der A. subclavia oder A. mammaria interna entspringt, so sind dann die genannten untern Bronchialarterien kleiner, oder es fehlt die eine oder die andere ganz.

Digitized by Google

dulae bronchiales, mehrere kleine Zweige zu; doch erhalten diese Drüsen nicht selten auch eine Arterie aus der A. mammaria oder subclavia. An jenem Aste der Luftröhre windet sich meistens nicht bloß ein Zweig der Bronchialarterie hin, sondern mehrere. Wenn ein Ast mehrere Bronchialarterien erhält, so anastomosiren sie unter einander. Haller und Reisseisen [1]) beobachteten auch eine Verbindung der Bronchialarterien mit kleinen, jedoch noch sichtbaren Aesten der Lungenarterie, welche sich zu der Luftröhre begaben. Bis zu den Lungenbläschen selbst gelang es Reisseisen nicht, die Bronchialarterien zu verfolgen. Sie drangen in die faserige Haut der Luftröhrenzweige ein, und gelangten zur Schleimhaut derselben.

Außer den an den Luftröhrenästen hinlaufenden Zweigen schicken die Bronchialarterien nach Reisseisens Untersuchung zahlreiche Seitenäste [2]) zu andern Theilen der Lungen hin. Schon an der Stelle, wo die Bronchien in die Lungensubstanz eintreten, gehen beträchtliche Aeste ab, welche unter der die Lungen überziehenden Haut im Zellgewebe zwischen den Einschnitten jedes Lungenflügels hinlaufen, und sich in ein vorzüglich an der Oberfläche sehr großes Netz von Haargefäßen verbreiten und daselbst mit den Haargefäßen der Lungenarterien zusammenstoßen. Die Bronchialgefäße sind daher die ernährenden Gefäße der Lungen.

Arteriae oesophageae.

Außer den andern Schlagaderästen, welche die Speiseröhre erhält, entspringen 1, 2, 3, oder mehrere Arteriae oesophageae aus der Aorta selbst, im Cavum mediastini posticum, von der vordern Seite derselben, theils höher, theils tiefer. Sie sind alle dünne Schlagadern; je mehrere aber da sind, desto dünner sind sie.

In manchen Körpern kommt eine dieser Schlagadern mit einer Arteria bronchialis aus Einem Stamme.

Sie vertheilen sich alle an der Speiseröhre, namentlich in dem Zellgewebe zwischen der eigenen Haut und der Fleischhaut; geben aber auch gleich der Brusthaut und dem Herzbeutel Aeste.

Arteriae pericardiacae.

Außer den bisher genannten Aesten, welche die Aorta schickt, indem sie im Cavum mediastini posticum hinabgeht, giebt sie in einigen Körpern noch einige besondere Arterias pericardiacas zum untern hintern Theile des Herzbeutels.

---

[1]) *Haller*, El. Phys. III. p. 155. Reisseisen, über den Bau der Lungen. Tab. IV. Fig. 5. ee.

[2]) Reisseisen, über den Bau der Lungen. Berlin 1822. Fol. Tab. V. a.

Digitized by Google

Hintere Aeste der Aorta in der Brusthöhle.

Arteriae intercostales inferiores, untere Zwischenrippenarterien.

Es giebt überhaupt 11 Paar Intercostalarterien. Von diesen sind 1, oder 2, oder 3, selten 4 obere Aeste der A. intercostalis superior, welche aus der A. subclavia entspringt.

Die Arteriae intercostales inferiores sind dünne Aeste der Aorta, welche, im Cavum mediastini posticum, von der hinteren Seite der Aorta entspringen, und es sind ihrer daher an jeder Seite so viele, als Spatia intercostalia von der oberen Zwischenrippenarterie nicht mit Blut versorgt sind, also etwa 8 bis 10. In einigen Körpern ist auf einer Seite eine mehr als auf der andern, wenn nämlich die A. intercostalis superior an einer Seite einen Ast weniger als auf der andern giebt. Zuweilen entspringt eine oder die andere mit einer nächsten aus einem gemeinschaftlichen Aste. In einigen geht ein Ast aus einer in eine benachbarte über.

Die obern der aus der Aorta entspringenden Zwischenrippenarterien gehen schräg aufwärts und auswärts, die übrigen quer auswärts, jede zu ihrem Spatium intercostale. Hier giebt jede Arteria intercostalis, unweit ihres Ursprungs, am hintern Theile ihres spatium intercostale ihren

1. Ramus dorsalis. Dieser selbst schickt einen Ramus musculoris, welcher rückwärts durch den hintersten Theil seines Musculus intercostalis internus und externus durchgeht, sich in diesem und dem nächsten Theile der Rückenmuskeln vertheilt; und einen Ramus spinalis, der einwärts durch sein Foramen intervertebrale in den Canal des Rückgrats tritt, zum Rückenmarke geht, und mit den Arteriis spinalibus Gemeinschaft hat.

2. Die Fortsetzung des Stammes tritt in den Zwischenraum beider Rippen auswärts, geht an der Rinne des untern Randes der obern Rippe seines Zwischenraums vorwärts, und schickt einen dünnern Ast, der in der Nähe des obern Randes der untern Rippe seines Zwischenraums verläuft. Beide gehen längs den Rippen gekrümmt auswärts, und dann vorwärts, an der innern Fläche ihres innern Intercostalmuskels, inwendig von der Brusthaut bedeckt. Sie geben Aeste den Intercostalmuskeln, der Brusthaut, zum Theil dem Zwerchfelle, auch durchbohrende Aeste nach außen zu den Muskeln, die an der äußern Fläche der Brust liegen, welche mit den Arteriis thoracicis externis Ge-

meinschaft haben. An den vordern Theilen der Rippen kommen sie mit den Ramis intercostalibus der A. mammaria interna, an den vordern Theilen der untern Rippen mit den Aesten des Ramus musculo-phrenicus dieser Schlagader zusammen.

An der rechten Seite gehen die Arteriae intercostales inferiores hinter der Vena azygos fort. Nicht selten gehen Zweige aus einem Zwischenraume über eine Rippe oder über 2 weg zu einer benachbarten Intercostalarterie und communiciren mit ihr. Immer communicirt die erste aus der Aorta entspringende mit der A. intercostalis superior.

Aeste des im Unterleibe verlaufenden Theiles der Aorta. Aorta abdominalis.

Die aus diesem Abschnitte der Aorta entspringenden Arterien kann man in 3 Classen theilen; denn entweder gehören sie den Seitenwänden der Bauchhöhle an, Lendenarterien, Arteriae lumbales, welche mit den Intercostalarterien viel Aehnlichkeit haben und, wie sie, mehr von der hintern Seite als alle übrigen Aeste entspringen, oder sie gehören den in der Unterleibshöhle gelegenen Eingeweiden und dem Zwerchfelle an, und entspringen vorn oder an der Seite der Aorta, oder endlich sie sind die in das Becken tretenden Endzweige der Aorta.

Arterien für die Seitenwände der Bauchhöhle, Arteriae lumbales, Lendenarterien.

Die Arteriae lumbales sind dünne Aeste der Aorta, welche ziemlich weit nach hinten vor den Körpern der Lendenwirbel paarweise entspringen. Ihrer sind, wenn man die unterste mitzählt, welche aus der A. sacra media oder der hypogastrica, und also nicht unmittelbar aus der Aorta entspringt, 5; wenn man aber nur die rechnet, welche unmittelbar aus der Aorta kommen, meistentheils 4.

Jede Arteria lumbalis geht auswärts und hinter dem Psoas weg. Die oberen gehen auch hinter den Schenkeln des Zwerchfells nach außen. Unweit ihres Ursprungs giebt jede einen Ramus spinalis, der durch das benachbarte Foramen intervertebrale in den Canal des Rückgrats tritt, zum Rückenmarke geht, und mit den Arteriis spinalibus Gemeinschaft hat. Dann entspringen Muskelzweige für den M. longissimus dorsi, den Sacro-lumbaris, den Quadratus lumborum, den Psoas. Die

Digitized by Google

Fortsetzung des Stammes geht ferner auswärts, und vertheilt sich im Musculus transversus, obliquus internus und obliquus externus, theils auch in der Haut des Bauchs, und hat mit den untersten Aesten der A. mammaria externa, mit den Aesten der A. epigastrica ꝛc. Gemeinschaft.

Das oberste Paar giebt auch Aeste der Pars lumbalis des Zwerchfelles, und den Nebennieren.

Auch die Bauchhaut erhält Aeste von ihnen.

Zuweilen entspringen mehrere, vorzüglich von den weiter unten gelegenen Lendenarterien, aus einem gemeinschaftlichen Stamme.

Arterien für die in der Unterleibshöhle gelegenen Organe.

Diejenigen Aeste der Unterleibsaorta, welche sich zu Organen erstrecken, die nur einmal vorhanden sind, sind selbst unpaare, namentlich die Coeliaca, welche zum Magen, zur Leber, zur Milz, zum Pankreas und zum Netz geht; ferner die A. mesenterica superior, die zu den dünnen Därmen und zur rechts gelegenen Abtheilung des Dickdarms geht; endlich die A. mesenterica inferior, welche zur links gelegenen Abtheilung des Dickdarms sich erstreckt. Alle 3 entspringen von der Mitte der vorderen Seite der Aorta, und laufen vorwärts und abwärts. Die Nebennieren, die Nieren und die (beim Embryo in früherer Zeit auch in der Bauchhöhle liegenden) Hoden (oder bei dem weiblichen Geschlechte die Eierstöcke) sind doppelt vorhanden, und ihre Arterien entspringen paarweise. Das Zwerchfell, welches aus 2 symmetrischen Hälften besteht, und keine über die Mittellinie laufende Muskelfasern besitzt, hat meistentheils auch 2 Arterien, von welchen wenigstens die der einen Seite nicht unmittelbar aus der Aorta, sondern aus der Coeliaca zu entspringen pflegt. Indem die Aorta durch den Hiatus aorticus in die Unterleibshöhle tritt, giebt sie den neben ihr liegenden Zwerchfellschenkeln und dem Fette, in welchem der Ductus thoracicus liegt, einige kleine Aeste.

Arteriae phrenicae inferiores [1]).

Die Arteriae phrenicae inferiores sind die dicksten Arterien des Zwerchfells, die zur unteren Oberfläche desselben gelangen.

[1]) Die vielen hier vorkommenden Abweichungen haben Haller (Icon. anat. fasc. III. p. 53.) und Tiedemann, bei welchem man zugleich Hallers Beobachtungen vereinigt findet, aufgezählt.

In 21 Leichen entsprang sie, nach Haller, dreimal einzeln aus der Aorta, zweimal aus der Coeliaca. Sechzehnmal fanden sich 2 Stämme, und zwar entsprangen beide sechsmal aus der Coeliaca, zweimal aus der Aorta: zweimal gab die rechte die

Digitized by Google

Ihrer sind gemeiniglich 2, seltener entspringen indessen beide aus Einem Stamme, der, wenn er ja vorhanden ist, öfter aus der A. coeliaca, als aus der Aorta unmittelbar kommt. Auch wenn 2 Arteriae phrenicae vorhanden sind, entspringen sie beide häufiger aus der A. coeliaca, als aus der Aorta. Indessen kommt es auch sehr oft vor, daß die eine (die rechte oder die linke) aus der A. coeliaca, und die andere aus der der Aorta entspringt, und zwar jene aus der A. coeliaca kommende zuweilen gemeinschaftlich mit der Coronaria ventriculi. Seltene Ausnahmen sind es, wenn die coeliaca aus der Nierenarterie oder gemeinschaftlich mit der Kranzarterie des Magens aus der Aorta entspringt. Bisweilen entspringt die linke aus der A. coronaria ventriculi, selten eine aus der einen A. renalis ꝛc. Nach Haller, Bichat, J. F. Meckel d. j. und Tiedemann sind die Fälle häufiger, wo eine von beiden, oder beide aus der Coeliaca entspringen, als wo beide aus der Aorta entstehen. Aus der Aorta selbst entspringen sie gemeiniglich dicht unter der untern Fläche des Zwerchfelles.

Beide steigen aufwärts hinauf zur untern Fläche des Zwerchfells, theilen sich in einen äußeren, der Pars costalis, und in einen innern, der Pars lumbalis angehörenden Zweig. Auf der rechten Seite wird das Foramen venae cavae von zusammenstoßenden Aesten dieser 2 Zweige mit einem Gefäßbogen umgeben, und ein durchbohrender Ast geht durch dieses Loch zur obern Fläche des Zwerchfelles, und zum unteren Theile des Herzbeutels.

Außerdem gelangt der innere Zweig der rechten und linken Zwerchfellschlagader zur oberen Oberfläche, und diese beiden Zweige haben sowohl auf dieser als auf der untern Fläche des Zwerchfells mit einander Gemeinschaft.

Auf der obern Fläche verbinden sie sich auch mit den Ramis phrenicis der Arteriarum mammarium internarum, an der Pars lumbaris mit den Lumbaribus, an der Costalis mit den Intercostalibus, an der unteren Seite des Zwerchfells schickt die Zwerchfellschlagader, ehe sie sich theilt, auch Aeste an die Nebenniere, und auf der rechten Seite kleine Aeste zur Leber.

Arteria coeliaca [1]).

Die Arteria coeliaca ist ein dicker unpaarer Ast der Aorta, welcher dem Magen, dem Netze, dem Zwölffingerdarme, der Leber, dem

---

Coeliaca, und die Aorta die linke; zweimal entsprang die rechte aus der Coronar ventr. major, und die linke aus der Aorta; zweimal gab die Aorta die rechte ab, und die linke die Coeliaca; einmal entsprang die rechte aus der Renalis, die linke aus der Aorta; einmal endlich fanden sich vier Arterien, von denen zwei die Aorta, zwei die Coeliaca abgab.

Zu diesen Abweichungen fügt Tiedemann eine neue (expl. tab. art. p. 222.) sie bildete nämlich mit der Kranzarterie des Magens einen besonderen Stamm, der aus der Aorta entsprang.

[1]) Sehr oft sahe sie Otto (seltne Beob. I. 101.) variiren. Dreimal fehlte sie ganz, indem ihre drei Aeste unmittelbar und von einander getrennt aus der Aorta entsprangen. Mehrmals hatte sie nur 2 Aeste, indem die Hepatica aus der Mesent. super. oder die Coronaria ventriculi aus der Aorta selbst kam, was schon vor ihm J. F. Meckel, pathol. Anat. B. II. 1. Abtheil. S. 121, beobachtete.

Einmal theilte sie sich in 4 Aeste, in die 3 gewöhnlichen und die Gastro-epiploica dextra, die gleiche Dicke wie die Coronaria hatte, und etwa einen Zoll von ihrem Ursprunge aus der Coeliaca sich durch einen gleichdicken Ast mit der Hepatica verband, so daß beide mit diesem Verbindungsast ein regelmäßiges Dreieck bildeten.

Digitized by Google

Pankreas und der Milz, mit einem Worte, allen über dem Mesocolon transversum gelegenen Eingeweiden beſtimmt iſt. Sie iſt dünner als die Arteria mesenterica superior. Sie entſpringt vor dem 12ten Bruſtwirbel, wo die Aorta durch den Hiatus aorticus des Zwerchfelles in die Bauchhöhle gekommen iſt, und ſich noch zwiſchen den Schenkeln deſſelben befindet, von der vordern Seite der Aorta, und geht hinter dem obern Theile des Magens ſchräg vorwärts abwärts und rechts in die Höhle der Bauchhaut hinein.

Der Stamm derſelben iſt nur kurz, und giebt in einigen Körpern eine A. phrenica.

Ungefähr einen Zoll weit vom Urſprunge theilt ſich der Stamm gemeiniglich in 3 Aeſte:

1) A. coronaria ventriculi major; 2) splenica; 3) hepatica.

In einigen Körpern entſtehen alle 3 Aeſte an Einer Stelle, in andern entſteht erſt die A. coronaria allein, in andern erſt die splenica allein. In einigen entſpringt erſt die A. coronaria allein, und dann theilt ſich doch die übrige Coeliaca in 3 Aeſte, indem 2 hepaticae vorhanden ſind.

1. Arteria coronaria ventriculi sinistra, die linke Kranz- oder des Magens, oder die Magenarterie.

Sie iſt der dünnſte Aſt der A. coeliaca, ſelten kommt ſie aus der Aorta ſelbſt.

Sie geht vorwärts und links gegen das linke Ende des obern concaven Randes des Magens. In einigen Körpern giebt ſie die A. phrenica sinistra; in einigen giebt ſie einen dünnen Ramus pancreaticus zum Pankreas hinab; in einigen einen dünnen Ramus splenicus, der zum obern Theile der Milz geht.

Wenn ſie die Stelle, wo der Magen mit der Speiſeröhre zuſammenhängt, erreicht hat, ſo giebt ſie einen oder einige Ramos oesophageos, die aufſteigend ſich am untern Theile der Speiſeröhre vertheilen, und mit den andern Arteriis oesophageis Gemeinſchaft haben.

Meckel fand ſie (path. Anat. 2. Bd. 1. Abth. S. 120.) nicht ſelten in 2 oder 3 Aeſte regelwidrig geſpalten; ſo z. B. bei einem Knaben in einen etwas größeren, oberen, mehr links gelegenen, aus dem die Milz- und Magenarterien kamen, und einen rechten kleinern, aus dem die Leber- und linke Magennetzarterie entſprang. Morgagni (de sed. et caus. morb. ep. LXX. c. 9.) beobachtete daſſelbe. In einem andern Falle entſprangen alle drei Arterien getheilt aus der Aorta.

Bei einem Manne hatte ſie zwar die drei gewöhnlichen Aeſte, aber der dritte, der gewöhnlich zur Leber geht, ging an die rechte Nebenniere. Den Aſt an die Leber gab die Mesent. sup. ab, aus der nun auch die anderen Aeſte hervorgingen (*Petsche* b. *Haller*, Diss. anat. VI. p. 776.).

Jo. Nicol. Weifs, resp. *Jo. Sigism. Leincker*, Diss. de arteriis viscerum propriis. Altorf. 1744. 4.

Aug. Fr. Walther, Progr. quod arteriae coeliacae tabulam in anatomes studio desideratam sistit. Lipsiae 1729. 4. In *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. III. p. 11.

Digitized by Google

Am Lobulus Spigelii der Leber giebt ſie, zwiſchen dieſem und dem Lobus sinister, einen dünnen Aſt in die Leber (ramus hepaticus) zum linken Ende der Fossa transversa. In einigen Körpern iſt dieſer Aſt anſehnlicher, wenn der Ramus sinister der A. hepatica kleiner iſt.

Dann geht ſie, einfach oder in 2 Aeſte getheilt, am concaven Rande des Magens rechts gegen den Pylorus fort, kommt mit der Arteria coronaria dextra zuſammen, und geht in einem Arcus continuus in ſie über, indem auch dieſe entweder einfach oder in 2 Aeſte getheilt ihr entgegenkommt. Auf dieſem Wege giebt ſie zur vordern und zur hintern Fläche des Magens abwärts Aeſte, welche mit den Magenäſten der Arteria gastro-epiploica sinistra Gemeinſchaft haben, und auf dieſen Oberflächen des Magens ein Netz bilden.

2. Arteria splenica s. lienalis, die Milzarterie.

Sie entſpringt aus der Arteria coeliaca, iſt dicker, als die Coronaria sinistra, und bisweilen dicker, bisweilen dünner als die Hepatica. Sie krümmt ſich links, und geht geſchlängelt gegen die Milz hinter dem Magen, längs dem obern Rande des Pankreas fort, und liegt in dem Zwiſchenraume zwiſchen dem Magen und der Milz an dem Ligamentum gastro-lienale und dem Omentum gastro-colicum.

Sie giebt unterweges viel dünne Aeſte dem Pankreas. Auch findet man in einigen Körpern Aeſtchen, welche zur hintern Wand des Magens gehen. Links kommt aus dem Stamme ſelbſt oder aus dem untern Hauptaſte deſſelben ein anſehnlicher Aſt, die Arteria gastro-epiploica sinistra, die linke Magennetzſchlagader. Dieſe krümmt ſich vorwärts zu dem converen Bogen des Magens hinab, und dann nach rechts an der Grenze zwiſchen dem großen Netze und dem Magen fort. Er giebt abwärts Ramos epiploicos in das Omentum, aufwärts Ramos gastricos zum converen Bogen und zu beiden Flächen des Magens, welche mit der A. coronaria sinistra Gemeinſchaft haben. Das Ende dieſer Ader hat mit der A. gastro-epiploica dextra, ſowohl am Magen als im Omentum, Gemeinſchaft, und kommt im Omentum mit ihr in einem Bogen zuſammen.

Ferner entſtehen theils aus dem Stamme unweit der Milz, theils aus den Ramis lienalibus deſſelben die Arteriae ventriculi breves, 3, 4 oder 5 zum Saccus coecus des Magens gehende Aeſte, die mit den andern Arterien am linken Theile des Magens Gemeinſchaft haben.

Ohnweit der Milz theilt ſich die Arteria splenica in ihre Ramos lienales, gemeiniglich erſt in 2 Hauptäſte, dann in mehrere Aeſte, welche durch den Hilus der Milz in die Milz hineintreten.

Digitized by Google

3. Arteria hepatica, die Leberarterie [1]).

Die Leberarterie iſt deſto dünner, je dicker die Leberäſte aus der A. mesenterica superior und aus der A. coronaria ventriculi major ſind. Sie geht rechts gegen den hintern Theil der Leber zu, bedeckt vom kleinen Netze, weiter vorn und weiter links liegend, als die Vena portarum, giebt in einigen Körpern erſt die Arteria coronaria ventriculi dextra, die manche auch die pylorica nennen, und theilt ſich dann in 2 Aeſte, die A. gastro-duodenalis und die A. hepatica.

1) Die Arteria coronaria ventriculi dextra, die rechte Kranzarterie des Magens, kommt bisweilen aus dem Stamme der Arteria hepatica, bisweilen aus einem gemeinſchaftlichen Aſte mit der A. gastro-duodenalis, in andern aus dem Ramus hepaticus, geht gegen das rechte Ende des concaven Bogens des Magens, tritt hinter daſſelbe, und dann, einfach, oder in 2 Aeſte getheilt, am concaven Rande des Magens nach links, und kommt mit der Arteria coronaria sinistra in einem Bogen zuſammen. Auf dieſem Wege giebt ſie zur vordern und zur hintern Fläche des Magens abwärts Aeſte, welche mit den Magenäſten der A. gastro-epiploica dextra Gemeinſchaft haben.

2) Arteria gastro-duodenalis, die Magen-Zwölffingerdarmſchlagader. Dieſe geht hinter dem Pylorus ſchräg rechts hinab, giebt Ramos pyloricos zum Pylorus, duodenales superiores zum obern Theile des Zwölffingerdarms, und theilt ſich dann in 2 Aeſte. a) A. pancreatico-duodenalis, die Zwölffingerdarms-Bauchſpeicheldrüſenarterie. Dieſe geht zwiſchen dem Zwölffingerdarme und dem dicken Ende des Pankreas hinab, giebt jenem an ſeinem mittlern und untern Theile Zweige, dieſem einen Aſt, welcher quer links in daſſelbe hineingeht. b) A. gastro-epiploica dextra, die rechte Magennetzſchlagader.

---

[1]) Selten entſpringt ſie als ein beſonderer Stamm aus der Aorta. (*Sandifort* obs. anat. path. Lib. II. p. 126.)

Bisweilen iſt ſie ein Aſt der oberen Gekröspulsader. Meckel (path. Anat. 2. Bd. 1. Abth. S. 120.), Haller (Icon. anat. Fasc. VIII. p. 36.).

Es giebt zuweilen mehrere Leberarterien, von denen eine am gewöhnlichen Orte entſpringt, die andere aus der größeren Magenarterie, oder aus der oberen Gekröſchlagader. Meckel (path. Anat. 2. Bd. 1. Abth. S. 120.) ſah ſie von 3 verſchiedenen Stellen kommen. Die größte, vom Stamme der Mesent. superior, vertheilte ſich an die rechte Seite der Leber, die zweite, kleinere, von der Coeliaca, ging in den mittlern Theil der Pforte, die dritte, noch kleinere, von der Cor. vent. sin., zog in die Grube des venöſen Ganges.

Die linke Leberarterie entſpringt nicht ſelten aus der großen Magen-Schlagader. (Tiedemann, expl. tab. art. p. 230.) *Petsche* (*Haller* Diss. VI. 776.). Ein andermal kam dieſer 2te Aſt von der Mesenterica sup., begleitete mit einigen Aeſten die Pfortader, und gab 2 Arterias cysticas.

Eine ältere Abhandlung über dieſe Arterien iſt von *Jo. Locquet*, Diss. de arteria hepatica, Lgd. Bat. 1693. 4. S. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. VII. p. 507. eq.

Digitized by Google

Diese ist dann die Fortsetzung der A. gastro-duodenalis, und kommt links abwärtsgehend unter dem Pylorus hervor. Sie geht im großen Netze unter dem converen Bogen des Magens der A. gastro-epiploica sinistra entgegen, hat mit derselben Gemeinschaft, und kommt endlich in einem Bogen mit ihr zusammen. Sie giebt abwärts Zweige zum Netze und aufwärts Zweige zu beiden Flächen des Magens, welche mit der A. coronaria dextra Gemeinschaft haben.

3) Die Fortsetzung der Arteria hepatica, der Leberast, geht hinter dem kleinen Netze schräg rechts hinauf, giebt bisweilen die Arteria coronaria dextra, tritt unter den hintern Theil der untern Fläche der Leber, und theilt sich in 2 Aeste. Der rechte Ast ist gemeiniglich dicker, doch desto dünner, je dicker der Ramus hepaticus aus der A. mesenterica superior ist. Selten fehlt er ganz, und wird durch den Ramus hepaticus der A. mesenterica ganz ersetzt. Er geht unter dem Tuberculum papillare, der Leber und unter dem linken Aste der Pfortader rechts, giebt die Arteria cystica zur Gallenblase, Aeste zum Lobus quadratus und zum Lobus dexter, und zu dem Lobulus Spigelii.

Die Arteria cystica geht rechts zum Halse der Gallenblase, ein Ast derselben läuft an der oberen, an der Leber anliegenden, ein 2ter an der unteren Oberfläche der Gallenblase hin. Aus beiden erhält auch die Leber noch Aestchen.

Der linke Ast ist dünner, und desto dünner, je dicker der Ramus hepaticus aus der A. coronaria sinistra ist. Er giebt bisweilen die A. coronaria ventriculi dextra, geht unter dem linken Theile der Pfortader zum linken Theile der Fossa transversa, giebt einen Ast zum Lobulus quadratus, einen zum Lobulus Spigelii, und vertheilt sich in dem Lobus sinister. Zuweilen sind drei Aeste der eigentlichen A. hepatica, nämlich noch ein Ramus medius vorhanden.

Arteria mesenterica superior, die obere Gekrösschlagader[1]).

Die Arteria mesenterica oder auch mesaraica superior ist ein dicker unpaarer Ast der Aorta, welcher fast dem ganzen dünnen Darme und der rechten Hälfte des dicken Darmes bestimmt ist. Sie entspringt

---

[1]) Selten bildet sie einen gemeinschaftlichen Stamm mit der Eingeweidepulsader. Haller (icon. anat. fasc. VIII. p. 35. no. 11.) sah diese Anordnung einmal, Meckel fünfmal (Handb. d. Anat. Th. II. p. 215.), die Galen, Riolan u. a. als Norm beschrieben hatten.

Velse (*Hall.* Coll. Diss. anat. VII. 155.) fand sie in zwei, dicht neben einander entspringende, Stämme zerfallen.

Zu den an ihr bemerkten Varietäten gehört auch der gänzliche Mangel der großen Anastomose zwischen der oberen und unteren Gekrösarterie, die *Vicq. d'Azyr* (mém. de l'acad. des sc. 1776. p. 220.) einmal beobachtete; der aufsteigende Ast der unteren, und der mittlere Grimmdarmast der oberen krümmten sich gegen ihren Ursprung zurück, und anastomosirten nur durch kleine Zweige mit einander.

Digitized by Google

vor dem ersten Bauchwirbel, oder vor der Verbindung des ersten Bauchwirbels und des letzten Brustwirbels, zwischen den Schenkeln des Zwerchfelles, dicht unter der Arteria coeliaca, von der vorderen Seite der Aorta, und ist etwas dicker, als die A. coeliaca.

Sie geht hinter dem obern Stücke des Zwölffingerdarms und dem Pankreas, dann vor dem untern Stücke des Zwölffingerdarmes, hinter dem Mesocolon transversum schräg vorwärts herab, krümmt sich ferner in einem großen Bogen, welcher seine convexe Seite links und seine concave rechts wendet, abwärts und nach dem rechten Darmbeine zu. Unweit ihres Ursprunges giebt sie gemeiniglich einen dünnen Ramus hepaticus zum rechten Lappen der Leber. In manchen Körpern ist er ziemlich dick, zuweilen so dick, daß er größtentheils oder ganz statt der Arteria hepatica dextra dient. Ferner giebt sie, indem sie am Zwölffingerdarme und dem Pankreas vorbeigeht, Ramos duodenales und pancreaticos, welche mit den Aesten der Arteria pancreatico-duodenalis Gemeinschaft hat.

1. **Dünndarmäste.** Aus der convexen Seite des gekrümmten Stammes entspringen die Arterien für den Dünndarm, aus der concaven Seite die für den Dickdarm. Jene sind weit zahlreicher, diese reduciren sich auf 2 oder 3 Stämme. Man kann 10 bis 16, und wenn man auch noch die letzten und kleinsten abgehenden Zweige zählt, sogar bis 20 Dünndarmäste, zählen, Arteriae jejunales und ileae für den Krummdarm (jejunum et ileum). Die oberen dieser Aeste am Anfange des Jejunum sind kürzer, die folgenden länger, die untersten am Ende des Ileum wieder kürzer. Sie gehen alle divergirend zwischen den beiden Platten des Gekröses, gegen den Dünndarm, und kommen (auch die oberste jejunalis mit der aus der coeliaca abstammenden pancreatico-duodenalis) in Bogen zusammen. Aus diesen Bogen entstehen wieder Aeste, welche ferner gegen den Darm fortgehen, und sich wieder in Bogen verbinden u. s. w., so daß Bogen der ersten, 2ten, theils auch der 3ten ꝛc. Ordnung entstehen, welche ihre convexe Seite dem Darme zuwenden. Je näher die Bogen dem Darme liegen, desto kleiner werden die Aeste, und desto enger die Zwischenräume der Bogen. Dem Mesenterium geben sie nur dünne Aestchen ab. Aus den letzten Bogen gehen die Aeste zum Darme selbst, so daß einige (anteriores) an der einen Seite des Darms, andere (posteriores) an der andern Seite des Darmes fortgehen, der auswendigen Haut und den Fleischfasern feine Aestchen geben, zwischen den Fleischfasern in das zwischen der Fleischhaut und der eigenthümlichen Haut gelegene Zellgewebe eindringen, und sich in dieser in dünnere und netzförmig verbundene Aeste zertheilen. Von diesen Aesten gehen ferner Aeste in das zwischen der eigenthümlichen und der inwendigen Haut befindliche Zellgewebe, und vertheilen sich auch hier, so, daß die feinsten Enden derselben einen Theil der Zotten ausmachen. Sie kommen an der Stelle des Darms, die

Digitized by Google

dem Mesenterium entgegengesetzt ist, von beiden Flächen des Darms in dem zwischen der eigenthümlichen und der Fleischhaut gelegenen Zellgewebe zusammen.

2) Dickdarmäste. Von der concaven Seite des Bogens kommen 2 oder 3 Aeste, welche dicker als die Arteriae jejunales und ileae sind.

a. Arteria colica media. Diese entspringt oben, indem die A. mesenterica superior hinter der Lamina inferior des Mesocolon transversum hervortritt, geht am Mesocolon transversum gegen das Colon transversum vorwärts, und theilt sich in 2 Aeste, von welchem sich der linke links in einem langen flachen Bogen nach dem Colon sinistrum hinkrümmt und sich mit dem aufsteigenden Aste der A. mesenterica inferior vereinigt; der rechte Zweig krümmt sich rechts und kommt in einem Bogen mit dem aufsteigenden Aste der Arteria colica dextra zusammen.

b. Arteria colica dextra. Diese entspringt tiefer, zuweilen nicht aus der A. mesenterica superior unmittelbar, sondern entweder aus der A. colica media, oder aus der A. ileo-colica. In manchen Fällen geben diese beiden Adern einen Ast her, so daß diese beiden Aeste die beiden Aeste der A. colica dextra ersetzen.

Sie geht am Mesocolon dextrum gegen das Colon dextrum, und theilt sich in 2 Aeste, von welchen der aufsteigende aufwärts geht und mit dem Ramus dexter der A. colica media in einem Bogen zusammenkommt, der absteigende Ast sich abwärts krümmt, und mit dem Ramus adscendens der A. ileo-colica in einem Bogen zusammenkommt.

c. Arteria ileo-colica. Diese entspringt unten. Sie geht am Mesocolon dextrum gegen den untersten Theil des Colon dextrum und theilt sich in 2 Aeste, von welchen der aufsteigende sich aufwärts krümmt, und mit dem Ramus descendens der A. colica dextra in einem Bogen zusammenkommt; der absteigende Ast sich abwärts krümmt, und mit der letzten Arteria ilea in einem Bogen zusammenkommt.

Bisweilen entspringt aus dem obersten Theile der A. mesenterica superior noch ein besonderer Ast, der Arteria colica sinistra superior heißen kann. Er geht gegen den ersten obersten Theil des Colon sinistrum, und giebt einen aufsteigenden Ast, der mit dem linken Aste der A. colica media, und einen absteigenden Ast, der mit dem Ramus adscendens der A. mesenterica inferior in einem Bogen zusammenkommt. Der letztgenannte Bogen ist dann viel kürzer, als wenn keine solche A. colica sinistra superior da ist.

Aus allen diesen Schlagaderästen entspringen nun Adern für die Därme. Aus denen der A. colica media für das Colon transversum, aus denen der A. colica dextra für den obern Theil des Colon dextrum, aus denen der A. ileo-colica für den untern Theil

des Colon dextrum, für das Intestinum coecum (rami coecales), den Appendix vermiformis (rami appendicales) und den letzten Theil des Ileum.

Die Vertheilung der Aeste, welche zum Colon gehen, ist im Allgemeinen eben so beschaffen, als die Vertheilung derer, welche zum Jejunum und Ileum gehen. Nur sind hier die Unterschiede: 1) daß da, wo das Mesocolon einfach ist, diese Adern nicht zwischen 2 Platten fortgehen, 2) daß die Bogen länger und flacher, auch der Bogenreihen weniger, und die Zwischenräume größer sind, 3) daß die Aeste an dem Darme selbst sich unter kleineren Winkeln vertheilen.

Bei sehr kleinen menschlichen Embryonen [1]) bis zum Ende des 3ten Monats, vorzüglich deutlich bei Thierembryonen, findet man bisweilen eine kleine Schlagader (arteria omphalo-mesenterica), welche aus einem der Aeste der A. mesenterica entspringt, die zum engen Darme, und durch den Nabel zum Nabelbläschen geht. Haller [2]) fand einmal eine solche Arterie bei einem Neugebornen, die sich am Nabel in 2 Aeste theilte, deren einer mit dem Urachus zur Blase ging, der andere durch den Nabel in den Nabelstrang zu gehen schien.

Arteria mesenterica inferior, die untere Gekrösschlagader [3]).

Die Arteria mesenterica inferior ist ein unpaarer Ast der Aorta, welcher dem linken Theile des Colon und dem Mastdarme bestimmt ist. Sie entspringt unweit des Endes der Aorta, also viel tiefer als die superior. Sie ist viel dünner als die A. mesenterica superior, auch dünner als die coeliaca.

Sie entspringt von der vordern Seite der Aorta, und geht schräg vorwärts, links und abwärts in die Höhle der Bauchhaut hinein. Ihr aufsteigender Ast oder die Arteria colica sinistra theilt sich in 2 Aeste, der eine krümmt sich im Mesocolon sinistrum aufwärts, kommt in einem großen Bogen (arcus mesentericus magnus) mit dem Ramus sinister der A. colica media, oder, wenn die A. mesenterica superior eine A. colica sinistra schickt, mit dieser zusammen, und giebt Aeste für das Colon sinistrum. Der absteigende Ast, oder die A. haemorrhoidalis interna, krümmt sich im Mesocolon sinistrum abwärts, giebt noch einige Aeste dem untersten Theile des Colon sinistrum, und geht dann zum Mastdarme hinab.

---

[1]) J. F. Meckel, Handbuch d. Anat. Th. 3. p. 222.

[2]) Haller, icon. anat. III. p. 49.

[3]) Oetsche, (syll. obs. anat. select. §. 76.) sah eine seltne Abweichung ihres Ursprunges an einem Präparate, wo die rechte Niere fehlte. Die Aorta nämlich, nachdem sie die rechte Nierenarterie abgegeben hatte, spaltete sich in 2 gleich große Aeste; vom linken entsprang die Mesent. infer., und unter dieser vereinigten sich die beiden Stämme wieder durch einen Querast.

Fleischmann (Leichenöffnungen, S. 239.) fand in einem Kinde keine untere, aus der Aorta entspringende Gekrösarterie, sondern der linke Grimmdarm und der Mastdarm erhielten ihre Gefäße aus der oberen Gekrösvulsader.

Digitized by Google

Die Vertheilung und Verbindung der zum Grimmdarme gehenden Aeste im Mesocolon, und ihre Vertheilung zum Darm ist so, wie es oben von den Aesten der Mesenterica superior zum Colon und ileum angegeben worden ist. Da die A. pancreatico-duodenalis am Zwölffingerdarme mit dem 1sten Aste der A. mesenterica superior, alle Aeste der A. mesenterica sup. aber unter einander, und die A. colica media derselben mit der Colica sinistra aus der A. mesenterica inferior, endlich alle Aeste der A. mesenterica inf. unter einander durch Bogen zusammenhängen, so giebt es längs der Gedärme eine Reihe von Bogen, die ununterbrochen unter einander zusammenhängen. Dieser Zusammenhang durch Bogen scheint hier den Zweck zu haben, daß allen Abschnitten des Darmcanals successiv von den benachbarten Stellen mehr Blut zugeführt werden kann.

Arteriae renales [1], die Nierenarterien [2].

Ihre Zahl, der Ort ihres Ursprungs aus der Aorta und ihre Vertheilung sind veränderlich. Gemeiniglich sind ihrer 2, eine rechte für

---

1) Sie heißen auch Arteriae emulgentes, von emulgere sc. urinam, nach einer irrigen Vorstellung.

2) Die Nierenpulsadern bieten rücksichtlich der Zahl, des Ursprunges und der Vertheilung so viele Verschiedenheiten dar, daß man beinahe häufiger in irgend einer Beziehung den abnormen, als in allen Beziehungen den normalen Zustand beobachtet. Fälle der Art findet man aufgezeichnet bei *Eustachius* (Tab. anat. Tab. III. fig. 1. 2. 3. Tab. XII. fig. 9. 10.), *Boehmer* (exerc. acad. praef. p. 11. resp. *Meuder* Diss. de urinae se- et excretione ob multitudinem arteriarum largiore. Halae 1763. 4.), *Haller* (Elem. physiol. VII. p. 260. Icon. anat. fasc. III p. 52.), *Meckel*, Handb. d. Anat. 3. 227. ff. Path. Anat. 2. Bd. 2. Abthl. S. 114. Icon. anat. path. Tab. X. fig. 4 und 5.), *Otto* (pathol. Anat. 1. Bd. S. 310.) u. s. w.

1) Die Zahl derselben ist sehr häufig größer. Den Uebergang zu dieser Anordnung macht die sehr frühe Theilung der einfachen Nierenpulsader in ihre Aeste, die oft auf der einen Seite Statt findet, während auf der anderen schon ein wirkliches Zerfallen beobachtet wird.

Was die Zahl der Arterien selbst anlangt, so variirt diese von 2 bis 6. Zwei findet man sehr oft.

Drei Arterien fand z. B. *Meckel* (path. Anat. l. c. p. 114.) häufig: so bei einem Weibe auf der linken Seite; auf der rechten war bloß eine, umgekehrt bei einem Knaben auf der rechten Seite 3, auf der linken nur eine.

Heister (obs. miscell. med. vid. *Halleri* coll. Diss. anat. VI. 725.) sah deren 4 auf der linken Seite in einem 3jährigen Knaben, und auch *Meckel* (l. c. d. path. Anat.) führt mehrere Fälle der Art an, ja in einem Falle, den *Otto* (selten Beob. I. 101.) sah, spalteten sie sich gleich nach ihrem Ursprunge aus der Aorta in viele Aeste.

Was nun die Stelle des Ursprungs und den Verlauf der vervielfachten Nierenarterien anlangt, so sind hierüber die Bemerkungen *Meckels* (pathol. Anat. l. c. p. 113 ff. Handb. d. menschl. Anat. B. III. p. 227. sq.) nachzusehen.

2) Den Ursprung der Nierenarterien anlangend, so entspringen sie nicht immer seitlich aus der Aorta, denn *Portal* z. B. (Cours d'anatom. médicale. Tom. III. p. 290.) sah sie mit einem gemeinschaftlichen Stamme aus der vorderen Fläche der Aorta in der Nähe der obern Gekrösarterie entstehen.

Häufig, auch namentlich bei angeborner abweichender Lage der Nieren, entspringen ihre Arterien unregelmäßig, z. B. tiefer unten aus der Aorta, aus der Iliaca commu

Digitized by Google

die rechte, eine linke für die linke Niere. In einigen Körpern sind jedoch an einer oder an beiden Seiten 2, seltener 3, noch seltener 4. Je mehr ihrer sind, desto dünner sind sie.

Sie entspringen zu beiden Seiten der Aorta, gemeiniglich in der Gegend der obern Bauchwirbel, wenig tiefer als die Arteria mesenterica superior, oder neben derselben. Selten entspringen sie viel tiefer, in der Gegend der untersten Bauchwirbel, oder gar eine aus der Arteria hypogastrica. Wenn 2 oder mehrere da sind, so entspringt die 2te tiefer als die erste.

Die linke geht zwar gemeiniglich ein wenig abwärts, indessen weichen doch beide unter einem Winkel ab, der wenig kleiner als ein rechter ist. Je tiefer aber eine Arteria renalis entspringt, desto weniger geht sie abwärts; wenn sie tiefer entspringt als der Hilus ihrer Niere, so geht sie aufwärts, und dann unter einem stumpfen Winkel von der Aorta ab.

Wegen der Lage der Aorta nach der linken Seite, ist die rechte Nierenarterie länger, die linke kürzer. Die rechte geht hinter der Vena cava inferior vorbei. Die Nierenarterien sind nach Verhältniß der Größe der Nieren von ansehnlicher Weite.

Jede Arteria renalis giebt, indem sie zu ihrer Niere fortgeht, einen oder den andern dünnen Ast (Arteria adiposa) zum Fette ihrer Niere, einen dünnen Ast (Arteria suprarenalis) zu der ihr benachbarten Nebenniere, in einigen Körpern auch einen dünnen Ast zur Pars lumbaris des Zwerchfells. Zuweilen kommt auch eine oder die andere Arteria spermatica aus der Arteria renalis, und die linke giebt bisweilen Aestchen zum Pankreas.

Jede Arteria renalis theilt sich näher an der Niere, oder entfernter von derselben, in 2, 3, oder mehrere Aeste, die dann durch den Hilus in die Niere hineintreten.

Arteriae spermaticae internae, die Samenarterien [1]).

Sie sind sehr dünn und zugleich von ansehnlicher Länge.

Sie entspringen meist aus der Aorta selbst, gemeiniglich in der Ge-

---

nis, der Hypogastrica und selbst der Sacralis media, wie Otto (path. Anat. I. 312. No. 7.) beobachtete, einmal auf der rechten und einmal auf der linken Seite. Auch sah er einmal für die linke tiefgelegene Niere eine Arterie aus der rechten gemeinschaftlichen Hüftarterie ihren Ursprung nehmen. Eben so variirt die Vertheilung derselben, indem die Aeste oft an andern Stellen als am Hilus renalis in die Niere eindringen.

[1]) Sie zeigen in Ursprung und Zahl häufige Abweichungen. Meist sind ihrer 2, die aus der Aorta kommen, oder eine, die sich bald theilt. Nicht selten entspringt eine höher als die andere, bald die linke, bald die rechte.

Oft kommt eine aus der Nierenarterie, oder Nebennierenpulsader (Haller, icon. anat. fasc. III. p. 60.), oder gar aus der Beckenpulsader (Mayer, Beschreibung d. Blutgef. 180.), die andre aus der Aorta.

Bisweilen sind sie auf einer oder der anderen Seite doppelt. (Haller, l. c. *Morgagni*, de sed. II. p. 348. Hunter, med. comment. p. 76. Pohl, obs. angiol. p. 12. Nicolai, de direct. vasor. §. 13. Huber, obs. anat. vid. Hall. anat. Diss. Vol. I. p. 307. Otto, seltne Beob. I. S. 101.)

Sie waren in 2 Fällen auf beiden Seiten doppelt. In einem Falle stieg die linke, die viel weiter unten aus der Aorta kam, in die Höhe, und lief zwischen den beiden Burzeln der Samen- und Nierenvene wie durch eine Schlinge herab. (Otto, seltne Beob. I. 101. ff.)

Digitized by Google

gend zwischen der Arteria mesenterica superior und inferior, höher oder tiefer, doch öfter höher, nicht weit von den renalibus, von der vordern Seite derselben, und gehen, indem sie schräg abwärts und auswärts gehen, von ihr unter einem spitzigen Winkel ab. Selten entspringt eine tiefer als die A. mesenterica inferior, oder gar eine aus der A. hypogastrica. Meistens entspringen sie nicht weit von einander, oft jedoch die eine etwas tiefer als die andere.

In manchen Fällen entspringen eine, oder beide, aus der Arteria renalis ihrer Seite; selten aus einer suprarenalis aortica.

Jede Arteria spermatica geht dicht an der auswendigen Fläche der Bauchhaut, vor dem Psoas und dem Ureter, unten vor den Vasis iliacis, geschlängelt hinab, und tritt mit der Vena spermatica vor dem Psoas in den Funiculus spermaticus zusammen. Unterwegs giebt sie kleine unbeständige Aeste zur Nebenniere, zum Nierenfette, zum Harngange, zur Bauchhaut; die rechte auch zur Leber. Aus jeder kommt gemeiniglich eine Arterie, welche unter der Niere auswärts geht, dann am äußern Rande der Niere sich aufwärts krümmt, so daß sie die Niere umzingelt, und sich in dem die Niere umgebenden Zellgewebe vertheilt.

Im männlichen Körper geht jede Arteria spermatica auswärts und vorwärts zum Bauchringe ihrer Seite hinab, tritt durch denselben in die Scheidenhaut des Samenstrangs, und geht in dieser zum Hodensacke hinab.

Im weiblichen Körper bleiben die Arteriae spermaticae in der Bauchhöhle; jede Arteria spermatica geht nämlich mit der Vena spermatica ꝛc. zum breiten Mutterbande ihrer Seite hinab, in demselben zum Ovarium, und vertheilt sich theils in diesem, theils in der Gebärmutter und der Trompete.

Bisweilen findet man an einer oder an beiden Seiten eine Arteria spermatica interna secundaria, die aus der Aorta selbst, oder der A. renalis, oder aus der A. suprarenalis entsteht. Der Fortgang derselben ist im Ganzen dem der A. primaria gleich.

Arteriae suprarenales, die Nebennierenarterien.

Zu den Nebennieren, welche aus den Arteriis phrenicis und aus den renalibus Aeste erhalten, kommen gemeiniglich auch dünne Schlagadern aus der Aorta selbst, die man zum Unterschiede von jenen, Arteriae suprarenales aorticae nennt.

Bisweilen erhalten auch die Harngänge, welche aus den Arteriis renalibus, spermaticis, hypogastricis Aeste erhalten, eine und die andere dünne Arteria ureterica aus der Aorta. Auch die Fascia renalis erhält in manchen Fällen dünne Aeste aus der Aorta selbst.

Ein Paar ältere Schriften über diese Gefäße sind:

Cromwell Mortimer, an account of some uncommon anastomoses of the spermatic vessels in a woman. In Philos. transact. Vol. XXXVI. 1729. p. 373.

George Martin, reflections and observations on the seminal blood-vessels. Med. essays and observ. by a Soc. in Edinb. Vol. III. Pt. I. p. 227.

Digitized by Google

Endzweige der Aorta.

Die Aorta endigt sich an der vordern Fläche des Körpers des vierten Bauchwirbels, indem sie sich in einen dünnen, in der Richtung, welche die Aorta hatte, fortlaufenden und in 2 dicke Aeste theilt, die von einander unter einem spitzigen Winkel abweichen und schräg vorwärts und auswärts herabgehen. Im weiblichen Körper ist der Winkel wegen des breiteren Beckens ein wenig größer als im männlichen Körper.

Arteria sacra media, die mittlere Kreuzbeinarterie.

Die Arteria sacra media ist ein unpaarer dünner Ast der Aorta, der letzte, welchen sie giebt, indem sie sich in die beiden Arterias iliacas theilt. Sie entspringt nämlich sehr nahe am Theilungswinkel der Aorta, oder im Theilungswinkel selbst, von der hintern Seite derselben vor dem vierten Bauchwirbel, und geht in der Mitte der vordern Fläche des heiligen Beines gerade herab, giebt zu beiden Seiten Ramos laterales, welche sich mit den A. sacris lateralibus verbinden, und endiget sich unten im Schließmuskel des Afters.

Arteriae iliacae, die Hüftschlagadern [1]).

Jede Arteria iliaca geht vor und neben dem Psoas ihrer Seite herab, gegen das Ligamentum Fallopii zu. Die linke legt sich alsbald an die äußere Seite der linken Vena iliaca; die rechte bedeckt von vorn den Anfang der Vena cava inferior, in welchem die beiden Venae iliacae zusammenkommen, und den obern Theil der linken Vena iliaca, und liegt dann anfangs an der innern Seite der rechten Vena iliaca. Ungefähr in der Mitte des Weges vom 4ten Bauchwirbel bis zum Ligamentum Fallopii theilt sie sich in ihre beiden Hauptäste. Bis hierher heißt sie A. iliaca communis, und giebt nur unbeträchtliche Aestchen zur Bauchhaut zum Harngange, und zum Psoas.

I) Arteria iliaca interna oder hypogastrica, die Beckenarterie, welche einwärts abweicht und dem Becken bestimmt ist.

II) Arteria iliaca externa oder cruralis s. femoralis, die Schen-

[1]) In einer Mißgeburt mit Sirenenbildung sah Otto (seltne Beob. 1. Hft. S. 100.) das untere Ende der Aorta die Wirbelsäule verlassen, nach vorn und vor der Gebärmutter und Harnblase herablaufen, und sich hier erst in die Iliacas theilen, die sich in der einzigen Unterextremität vertheilten. Kurz vor ihrem Ende entsprang aus der Aorta selbst die linke einzig vorhandene Nabelarterie.

Bisweilen theilt sie sich ungewöhnlich hoch in die beiden Hüftpulsadern, die, ehe sie selbst wieder in die 2 untergeordneten Hauptäste zerfallen, durch einen Queraft unter einander verbunden werden. (*Petsche*, syll. obs. anat. in *Halleri* Diss. anat. VI. p. 781.)

Digitized by Google

kelarterie, welche fast in der Richtung des Stammes weiter fortgeht, und größtentheils dem Beine ihrer Seite bestimmt ist.

Beide Aeste sind im Erwachsenen fast von gleicher Dicke, doch ist die cruralis etwas dicker. Im Embryo hingegen ist die hypogastrica dicker, weil dann die A. umbilicalis noch offen ist.

Arteria hypogastrica, die Beckenschlagader.

Die Arteria hypogastrica geht schräg einwärts rückwärts in die Beckenhöhle hinab, und zwar geht die linke, weil die linke A. iliaca communis an der äußern Seite der linken Vena iliaca liegt, über diese einwärts hinüber.

Sie vertheilt sich im Becken in folgende Aeste, die hinsichtlich ihres oft gemeinschaftlichen Ursprungs und der Ordnung, in welcher sie entstehen, viele Verschiedenheiten zeigen. Sie sind die:

1) Arteria iliolumbalis, 2) sacra lateralis, 3) obturatoria, 4) iliaca posterior, 5) ischiadica, 6) pudenda interna, 7) umbilicalis.

1. Arteria iliolumbalis oder iliaca anterior, die Hüftlendenarterie [1]).

Sie entspringt aus der A. hypogastrica unweit des Ursprungs derselben, selten aus der A. iliaca communis, oder aus der Cruralis, oder aus der Iliaca posterior.

Sie geht hinter dem Psoas, zwischen dem letzen Bauchwirbel und dem heiligen Beine auswärts, giebt einen Ramus adscendens zum Musculus quadratus lumborum, zum Psoas ꝛc., der mit den unterst Arteriis lumbaribus Gemeinschaft hat, und theilt sich dann in einen oberflächlichen und in einen tiefen Zweig.

Jener geht an der innern Fläche des Darmbeins, unweit der Crista, auf dem M. iliacus internus auswärts, und dann vorwärts, giebt unterwegs Aeste dem M. quadratus lumborum, dem Psoas, den M. M. transversis, den M. M. obliquis abdominis und dem iliacus internus. Sein Ende mit der A. circumflexa Ilii Gemeinschaft.

Dieser geht, bedeckt vom Musculus iliacus internus, auf die innere Fläche des Darmbeins, giebt Aeste dem Muskel, dem Darmbein Arterias nutritias, unter denen gemeinjglich eine durch ihre Dicke auszeichnet, welche in das große Foramen nutritium geht.

---

[1]) Zuweilen entspringt sie, wie Tiedemann (expl. Tab. art. p. 246.) anführt, der gemeinschaftlichen Hüftpulsader, oder aus der Schenkelarterie, oder aus der Gesäßpulsader; selten aus der 4ten Lenden- oder endlich aus der mittleren Kreuzbeinarterie. Oft sind 2 kleine Hüftlendenpulsadern vorhanden.

Digitized by Google

2. Arteria sacra lateralis [1]).

Sie entſpringt aus der A. hypogastrica, ſelten aus der Iliaca posterior oder der Iiolumbalis.

Sie geht an der vordern Fläche des heiligen Beins, parallel mit der A. sacra media und mit der Sacra lateralis der andern Seite, neben den Foraminibus sacralibus anterioribus herab, und giebt theils Zweige, welche ſich auf der vordern Fläche des heiligen Beins vertheilen, und mit den Seitenzweigen der A. sacra media anaſtomoſiren, dann Zweige zum Rückgrate, welche durch die Foramina sacralia anteriora in den Canal des heiligen Beins zur Cauda equina ꝛc. gehen, und endlich Rückenzweige, welche rückwärts durch die Foramina sacralia posteriora hinausgehen und ſich an der hintern Fläche des heiligen Beines vertheilen.

3. Arteria obturatoria [2]).

Sie entſpringt in der Regel aus der Arteria hypogastrica, oder aus einem Aſte derſelben, indeſſen, wie in der Note ausführlicher gezeigt wor-

---

[1]) Sehr oft ſind 2 zugegen, von denen die eine aus der Beckenpulsader, die andere aus der Geſäß-, Hüftlenden- oder Sitzbeinpulsader kommt. (Hildebrandt und Tiedemann, expl. tab. art. p. 248.)

Nicht ſelten entſpringt ſie aus der Hüftpulsader. (Tiedemann, expl. Tab. art. p. 296.)

[2]) Die Kenntniß der bei ihr vorkommenden Abweichungen iſt von großer Wichtigkeit bei den in der praxis ſo oft vorkommenden Bruchoperationen. Meiſt entſpringt ſie aus der Beckenpulsader, entweder unmittelbar aus dem vorderen oder hinteren Stamme, oder aus einem ihrer Aeſte, aus der Geſäß-, Hüftlenden-, Hüft- oder gemeinſchaftlichen Schaampulsader.

Sehr oft entſpringt ſie aus der Art. epigastrica, oder bildet mit derſelben ein gemeinſchaftliches Stämmchen. Die Länge deſſelben iſt 2 Linien bis 1½ Zoll. Haller (Icon. fasc. 4. p. 32 not. 9.) ſah dies 9mal, und wohl die meiſten neueren Anatomen.

J. Cloquet (l. c.) ſah ſie unter 250 Leichen 56mal zu beiden Seiten aus der Epigastrica entſpringen, 21 mal in Männern, 35 mal in Weibern. In 28 Körpern entſprang ſie auf der einen Seite aus der Beckenpulsader, und auf der andern aus der Epigastrica.

A. K. Heſſelbach (l. c. S. 26. und Bericht von der Königl. anatomiſchen Anſtalt zu Würzburg, Studienjahr 1818 bis 1819, 8.) ſah dieſen Urſprung unter 32 Leichen 9mal an der rechten, und 1mal an der linken Seite. Unter 157 Leichen, welche von ihm im Jahre 1819 in dieſer Hinſicht unterſucht wurden, kam der gefährliche Verlauf des Stammes der A. obturatoria oder eines ſie mit der A. epigastrica verbindenden Querzweigs an dem vorderen Rande der Lücke für die Schenkelgefäße 31mal vor.

In ſehr ſeltenen Fällen wird ſie durch die Vereinigung von einem Aſte der Hypogastrica und einem großen Aſte der Epigastrica gebildet. Dieſe Anordnung beſchreibt Portal (anat. méd. III. 322.), und Heſſelbach (l. c.) hat ſie dreimal beobachtet und abgebildet (Taf. 3.).

Bisweilen kommt ſie aber aus der äußeren Hüft- oder Schenkelſchlagader. Dieſen Urſprung ſah Tiedemann (expl. tab. art. p. 288.) an der linken Seite eines Mannes von 30 Jahren, während die rechte aus der unteren Bauchdeckenader entſprang. Er beobachtete denſelben Fall in einer Frau von 40 Jahren auf beiden Seiten, und in einem Knaben auf der rechten Seite. Otto (ſeltne Beob. I. 102.) ſah ſie auch aus

Digitized by Google

den, auch sehr oft (zugleich mit der A. epigastrica) aus der A. cruralis. Im ersteren Falle krümmt sie sich abwärts, vorwärts und einwärts zum obern äußern Winkel des Foramen ovale des Beckens, giebt gemeiniglich einen oder 2 Aeste zur Harnblase, Aeste zur Prostata, zum Levator ani, zum Obturatur internus, und einen Ast, der an der hintern Fläche des Schambeins einwärts gehend mit dem von der andern Seite zusammenkommt. Dann giebt sie dünne Aeste zur Membrana obturatrix, tritt durch den Ausschnitt des Foramen ovale heraus, und vertheilt ihre Aeste zum Obturatur externus, zum Schenkelgelenke, zum M. pectinaeus, zu den Adductoribus, indem sie mit der A. circumflexa interna femoris Gemeinschaft hat.

4. Arteria iliaca posterior s. glutaea superior, die Gesäßschlagader.

Sie ist der dickste Ast der Arteria hypogastrica, welcher bisweilen einen oder mehrere der Aeste giebt, die der Regel nach unmittelbar aus der A. hypogastrica entspringen.

Sie geht rückwärts, durch den obern Theil der Incisura ischiadica, unter dem M. glutaeus medius, über dem M. pyriformis, mit dem Nervus ischiadicus, von dessen beiden Wurzeln sie umfaßt wird, zum Becken hinaus.

Im Durchgange giebt sie dem untern Theile der innern Fläche des Darmbeins eine oder mehrere Arterias nutritias.

Wenn sie zwischen dem M. glutaeus medius und dem M. pyriformis hinten herauskommt, so giebt sie kleine Aeste einwärts an die hintere Fläche des heiligen Beins, kleine Aeste auswärts zu den unteren Enden der M. M. glutaeorum und zum hinteren Theile des Schenkelgelenkes, und theilt sich dann in 2 Aeste, von welchen sich der oberflächliche zu den M. M. glutaeis und dem pyriformis vertheilt, der tiefe aber einen Ast an die äußere Oberfläche des Darmbeins zum

---

der Cruralis entspringen, und unter dem Fallopischen Bande durch in die Beckenhöhle dringen; ein bei Operation des Schenkelbruches sehr gefährlicher Lauf.

Den ungewöhnlichen Ursprung aus der äußeren Hüft- oder Schenkelpulsader innerhalb des Beckens sahen *Lieutaud* (anat. méd. 496.), Sömmerring (Gefäßlehre 272.), Monro (morbid anatomy of the human gullet, stomach and intestines. Edinb. 1811. p. 430.), Burns (Herzkhtn. 355.).

J. Cloquet (rech. anat. sur les hernies de l'abdomen. Par. 1817.) sahe ihn unter 250 Leichen in 2 Männern und 4 Weibern wahr.

J. K. Hesselbach (über den Ursprung und Verlauf der unteren Bauchdeckenschlagader und der Hüftbeinlochschlagader mit 6. K. T. Bamb. 1819. 4.) sah ihn unter 32 Körpern in dreien.

Selten entspringt sie aus der Iliaca externa außerhalb des Beckens unter dem Poupartischen Bande. Dieser Abweichung erwähnt Monro (morbid anat. of the human gullet etc. p. 430.), ferner sahen sie Burns (Herzkrankh. 359.) und Otto (seltne Beobb. 1. Heft. 102.); Tiedemann (l. c. p. 288.) fand sie nur einmal in einem weiblichen Körper.

Digitized by Google

M. glutaeus medius und minimus, und einen andern in die Gegend des großen Trochanter schickt, wo er sich theils im M. glutaeus minimus vertheilt, theils die sogenannte Arteria profundissima ilii giebt, welche zwischen der äußeren Fläche des Darmbeins und dem M. glutaeus minimus vorwärts geht, und mit der A. circumflexa externa femoris Gemeinschaft hat.

5. Arteria ischiadica s. glutaea inferior, die Sitzbeinschlagader.

Sie ist einer der dicksten Aeste der A. hypogastrica, entspringt bald besonders, bald mit der A. iliaca posterior gemeinschaftlich.

Sie geht im hintern Theile des Beckens abwärts, giebt meist einen Ramus vesicalis zur Harnblase, kleine Aeste zum Mastdarme, und geht dann unter dem M. pyriformis, über dem Ligamentum spinoso-sacrum rückwärts zum Becken hinaus.

Sie giebt dann aufwärts Aeste zu den M. M. glutaeis, abwärts zu den M. M. geminis, dem Quadratus femoris, dem Obturator internus und dem Anfangstheile der Muskeln, die vom Tuber ossis Ischii zum Schenkel hinabgehn, z. B. zum Biceps, Semitendinosus und Semimembranosus. Am Steißbeine giebt sie einwärts die Arteria coccygea, welche einwärts zum Schließmuskel des Afters und zum anliegenden Zellgewebe geht.

6. Arteria pudenda interna s. pudenda communis, die innere Schampulsader [1]).

Diese und die beiden vorigen Aeste sind im Erwachsenen die dicksten Aeste der Arteria hypogastrica. Sie kommt sehr oft mit der A. ischiadica aus einem gemeinschaftlichen Stamme.

Die A. pudenda interna, oder der gemeinschaftliche Stamm derselben und der A. ischiadica, ist im Erwachsenen als die Fortsetzung und das Ende des Stammes der Arteria hypogastrica anzusehen. Noch innerhalb des Beckens entspringen oft von ihr eine oder 2 Blasenarterien, die A. haemorrhoidalis media und die Gebärmutter oder Scheidenarterie. Hierauf geht sie unter dem M. pyriformis durch die Incisura ischiadica major zum Becken hinten heraus, dann durch die Incisura ischiadica minor und zwischen dem Ligamentum spinoso-sacrum und tuberoso-sacrum zu derjenigen Abtheilung des kleinen

[1]) Zuweilen tritt ihr Hauptstamm nicht zwischen den untern Beckenbändern heraus, sondern verläuft längs der Harnblase und Vorsteherdrüse, oder selbst durch diese zum männlichen Gliede, und ist somit beim Steinschnitte äußerst gefährdet.

Es kommt aber diese Varietät so häufig vor, daß schon Vesal und andere ältere Anatomen sie für die Norm ansahen. Burns (Herzkrkh. S. 550.) machte zuerst auf die Gefahr ihrer Verletzung beim Steinschnitt der Männer aufmerksam, Tiedemann (tab. art. XXX. fig. 2.) bildet sie ab; Shaw verlor wegen dieser Anomalie einen am Stein Operirten durch Verblutung. (Magaz. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk. XI. S. 349.)

Beckens hin, welche unter dem Levator ani befindlich ist. Hier liegt sie an der innern Seite des Sitzbeins und des Schambeins, und giebt gemeiniglich die Arterias haemorrhoidales externas zum Ende des Mastdarms.

Die Arteria haemorrhoidalis media, die mittlere Mastdarmschlagader [1]) kommt zwar, wie gesagt, gemeiniglich aus der A. pudenda interna, indessen entsteht sie bisweilen auch aus dem gemeinschaftlichen Stamme der A. pudenda interna ischiadica, oder aus der Sacra lateralis, oder aus der umbilicalis.

Sie giebt ihre meisten Aeste dem Mastdarme, welche mit der A. haemorrhoidalis interna und externa Gemeinschaft haben; auch Ramos vesicales zum untern Theile der Harnblase; in Männern kleine Aeste zur Prostata, zum Samenbläschen; in Weibern Aeste zur Mutterscheide.

Die Arteria vesicalis infima entspringt in einigen Körpern aus der A. pudenda interna, in andern aus der obturatoria, oder aus der umbilicalis.

Sie giebt ihre Aeste dem untersten Theile der Harnblase, in Männern auch kleine Aeste den Samenbläschen, dem Samengange, der Prostata und der Harnröhre.

Im männlichen Körper theilt sich endlich die Arteria pudenda interna vor dem Schließmuskel des Afters bei dem M. transversus perinaei in 2 Aeste.

a) Arteria perinaei, Mittelfleischpulsader. Diese geht an der Haut des Perinaei vorwärts, parallel mit der von der andern Seite, giebt Aeste den M. M. transversis, dem Accelerator, dem Sustentator, der Haut des Perinaeum, und geht als Arteria scrotalis posterior zu dem hintern Theile des Hodensackes.

b) Arteria penis, Ruthenschlagader. Diese ist dicker; sie geht, bedeckt von den M. M. transversis, zwischen dem Accelerator und dem Sustentator, dann zwischen diesem und dem Corpus cavernosum penis gegen das männliche Glied vorwärts, und unter der Synchondrosis pubis durch, giebt kleine Aeste zu den M. M. transversis, zum Accelerator, zum Sustentator, zur Prostata, und einen ansehnlichen Ast, oder zwei, zum Corpus cavernosum urethrae. Sie theilt sich hierauf in 2 Aeste:

Die Arteria dorsalis penis [2]) geht auf dem Rücken des Gliedes neben der Vena dorsalis bis zur Eichel fort, giebt viele Aeste in das Fell des Gliedes, und endiget sich in der Eichel mit vielen Aesten. Beide Arteriae dorsales penis gehen parallel, so daß sie die Vene

---

[1]) Bisweilen kommt sie als ein besonderer Ast aus dem Stamme der Beckenpulsader oder aus der Sitzbeinpulsader (Tiedemann expl. tab. art. p. 248. 256.), oder aus der seitlichen Heiligbein-Schlagader.

[2]) Tiedemann (expl. tab. art. p. 314. sq.) sah sie aus der gemeinschaftlichen Schenkelpulsader an der rechten Seite eines 36jährigen Mannes entspringen. (Taf. 30. fig. 2.) Einen diesem ähnlichen Fall bildet er Taf. 33. fig. 1. ab.

Ein andermal entsprang sie aus der ersten äußeren Schampulsader in einem 40jährigen Manne und in einem Knaben (ebendas.).

Auch sah er in einem 18jährigen Mädchen die Kitzlerpulsader auf gleiche Weise aus dem Becken unter den Schambeinen hervortreten. Burns (Herzkhn. S. 350.) fand diesen Verlauf amal in Männern. Die älteren Anatomen, Vesal, Valverde, Sylvius, Bauhin, Vesling, Highmor, Winslow u. s. w. haben diese Anordnung als die Regel beschrieben.

Digitized by Google

zwiſchen ſich haben, und geſchlängelt, um bei der Erection nachgeben zu können.

Die Arteria profunda penis geht mitten in ihrem Corpus cavernosum geſchlängelt vorwärts bis zum Ende deſſelben, und giebt viele Seitenäſte zu den Zellen deſſelben.

Auch im weiblichen Körper theilt ſich die Arteria pudenda interna ebendaſelbſt in 2 Aeſte.

a) Arteria perinaei. Dieſe geht an der Haut des Perinaeum vorwärts, zum Labium vulvae ihrer Seite, vertheilt ſich zur Haut des Perinaeum, des Labium vulvae, der Nymphe, und zum Constrictor vulvae, bis zur Klitoris hin.

b) Arteria clitoridea. Dieſe geht am unteren Theile der Mutterſcheide vorwärts zur Klitoris, giebt Aeſte der Mutterſcheide, den Muskeln, der Klitoris, und vertheilt ſich dann mit einem Ramus dorsalis und einem Ramus profundus in der Klitoris eben ſo, wie die Arteria penis im männlichen Gliede. Sie iſt aber viel kleiner als dieſe, weil die Klitoris viel kleiner iſt als das männliche Glied.

In einigen Körpern geht die Arteria pudenda interna erſt als Arteria perinaei weiter vorwärts, und giebt dann die A. clitoridea.

7. Arteria umbilicalis, Nabelſchlagader [1]).

Sie kommt aus der Arteria hypogastrica, ehe ſie die ischiadica und die pudenda, bisweilen auch ehe ſie die iliaca posterior und die Obturatoria abgegeben hat. Sie krümmt ſich beim Embryo neben der Harnblaſe, bedeckt von der Bauchhaut hinauf, ſteigt dann hinten an der vorderen Wand des Bauchs einwärts zum Nabel in die Höhe, und convergirt mit der von der andern Seite ſo, daß endlich beide Arteriae umbilicales am Nabel dicht zuſammen liegen. Beim Embryo ſind beide Arteriae umbilicales offen, und gehen durch den Nabel im Nabelſtrange zum Mutterkuchen. Dieſe Arterien ſind die dickſten Aeſte der A. hypogastrica,

[1]) Nach Otto (ſeltne Beob. I. 102.) war ſie zweimal bei Erwachſenen, obgleich oberhalb der Blaſe verſchloſſen, dick und rund bis zum Nabel, und verlief nicht dicht an der Bauchwand, ſondern über ½ Zoll von ihr entfernt, nur durch eine breite Falte des Bauchfells mit ihr verbunden. Daſſelbe beobachtete auch Kelch (Beitr. z. path. Anat. S. 60. No. 47.).

Manchmal fehlt ſie, auch bei normalen Kindern, auf einer Seite ganz, wozu als Belege Otto (path. Anat. I. 312. No. 8.) eine große Zahl von Citaten anführt.

Zuweilen nimmt ſie aber auch einen regelwidrigen Urſprung, z. B. ſie entſteht aus der Iliaca (*Breschet*, in Répert. T. II. p. 471.), oder aus der Aorta (Hottinger misc. nat. cur. Dec. III. an. 9. obs. 233.). Andre Citate für dieſen Urſprung führt noch Otto (path. Anat. I. S. 312. No. 9.) an.

Oft bildet ſie einen gemeinſchaftlichen Stamm mit der Nabelpulsader oder mit der mittleren Maſtdarmſchlagader (Tiedem. expl. tab. art. p. 256.).

Digitized by Google

und als die Fortſetzung derſelben anzuſehen. Die anderen Aeſte der A. hypogastrica ſind beim Embryo um ſehr viel kleiner.

Nach der Geburt aber wird der Canal der A. A. umbilicalium zuerſt am Nabel, und dann allmählig ganz bis zu ihrem Anfangstheile geſchloſſen. Sie wachſen dann auch nach Verhältniß weniger in der Dicke, ſind daher im Erwachſenen nur Stränge, welche nicht mehr hohl, und viel dünner ſind als die Arteriae umbilicales im Embryo waren.

Nur der Anfangstheil jeder Arteria umbilicalis an dem Stamme der A. hypogastrica bleibt offen, und aus dieſem kommen Arteriae vesicales, einige Aeſte zum Maſtdarme, in Weibern auch oft die Arteria uterina, und eine vaginalis.

a. Arteriae vesicales, Blaſenſchlagadern [1]).

Die Arteriae vesicales, welche aus dem Anfangstheile der A. umbilicalis entſpringen, und deren 2 oder 3 ſind, gehen aufwärts an den Seitentheil der Harnblaſe, die eine meiſtens tiefer, oder 2 höher oben, und vertheilen ſich an derſelben.

Dieſe und die übrigen A. A. vesicales geben Aeſte in das erſte, und dann zwiſchen den Fleiſchfaſern in das zweite Zellgewebe der Harnblaſe, und verbinden ſich daſelbſt netzförmig mit einander und mit denen der anderen Seite. Eine Menge feiner Aeſtchen dringt in die eigentliche Haut und bis zur inwendigen Haut.

b. Arteria uterina, die Gebärmutterſchlagader.

Die Arteria uterina entſpringt aus dem Anfangstheile der Arteria umbilicalis, giebt der Harnblaſe noch einen oder 2 Aeſte, und tritt geſchlängelt an den unteren Theil ihrer Seite der Mutter hinauf. Sie giebt abſteigende Aeſte zum Mutterhalſe und zum oberen Theile der Scheide, und aufſteigende Aeſte, welche zwiſchen den Platten des breiten Mutterbandes zum Seitentheile des Körpers der Mutter hinaufſteigen, und ſowohl der vordern als der hinteren Wand der Mutter geſchlängelte Aeſte geben. Ihre Aeſte haben Gemeinſchaft mit den von der anderen Seite; die oberen auch mit den A. A. spermaticis, und gehen zum Theil nach der Trompete hin.

Eine beſondere Arteria vaginalis entſpringt in einigen weiblichen Körpern aus dem Anfangstheile der A. umbilicalis, in anderen aus der A. uterina, in anderen aus der A. haemorrhoidalis media.

---

[1]) Sehr oft kommt die unterſte aus dem vorderen Stamme der Beckenpulsader, oder aus der gemeinſchaftlichen Schampulsader, oder aus der Sitzbeinarterie, oder endlich aus der mittleren Maſtdarmpulsader. (Tiedem. expl. tab. art. p. 248.)

Digitized by Google

Arteria cruralis, die Schenkelarterie.

Die Arteria cruralis geht faſt in der Richtung des Stammes der Arteria iliaca ſchräg abwärts, vorwärts und auswärts, an der Flechſe des Psoas, gegen das Ligamentum Fallopii hin, dann unter dieſem Bande durch den Annulus cruralis aus der Bauchhöhle zum Schenkel hinaus.

Die linke liegt vom Anfange an der äußern Seite ihrer Vene; die rechte lenkt ſich von der innern Seite ihrer Vene, vor derſelben her, auf die äußere Seite derſelben, ſo daß ſie unter dem Ligamentum Fallopii auch auf der äußern Seite derſelben liegt.

Jede Arteria cruralis liegt alſo unter dieſem Bande an der innern Seite der Flechſe des Psoas, zwiſchen der Vena cruralis, die weiter nach innen, und dem Nervus cruralis, der weiter nach außen liegt.

Ehe die Arteria cruralis unter dem Ligamentum Fallopii durchgeht, giebt ſie dünne Aeſtchen der Bauchhaut, dem Psoas, und dann nahe an demſelben 2 dickere Aeſte: die Arteria epigastrica und circumflexa Iiii.

Nicht ſelten giebt ſie auch die Arteria obturatoria, und dieſe in einigen aus einem gemeinen Aſte mit der A. epigastrica.

Arteria epigastrica, die innere Bauchdeckenſchlagader [1]).

Sie entſpringt von der inneren Seite der Arteria cruralis, meiſtens ehe ſie unter dem Ligamentum Fallopii durchgeht, läuft unter dem Bauchringe einwärts, und krümmt ſich dann an der innern Seite derſelben und des Samenſtranges aufwärts, ſo daß ſie an die hintere Seite des M. rectus abdominis gelangt. Sie ſteigt hinter dem Theile des Ligamentum Fallopii in die Höhe, welches zwiſchen der hinteren und der vorderen Oeffnung des Canalis inguinalis liegt.

Am Bauchringe giebt ſie die Arteria spermatica externa, welche im männlichen Körper an den Samenſtrang tritt, und durch den Bauchring zum Hoden hinabgeht, im weiblichen in der Bauchhöhle an das runde Mutterband tritt, und aufwärts einwärts zur Mutter geht.

[1]) In dem Leichname eines Mannes von 34 Jahren entſprang die tiefe untere Bauchdecken- und Hüftbeinlochpulsader mit einem gemeinſchaftlichen Stamme, und die Kranzpulsader der Hüfte, die unterhalb des Fallopiſchen Bandes aus der gemeinſchaftlichen Schenkelpulsader entſprang, ſchickte einen ſtarken Aſt an die äußere Seite des Schenkels. (Tiedem. expl. tab. 33. f. 2. p. 318.)

In dem Körper eines Mannes von 24 Jahren entſprang ſie aus der tiefen Schenkelpulsader. (Tiedem. l. c. p. 320.) Einen ähnlichen Urſprung ſah Monro der jüngere, nach Barclays Zeugniß (ſ. Burns Heilkunde. S. 360.), und Heſſelbach ſah ihn dreimal.

Bisweilen iſt ſie ein Aſt der Obturatoria. Dieſer ſeltene Urſprung iſt von Monro (morb. anat. of gullet. 427.) beobachtet worden. Heſſelbach bildet denſelben (l. c. Taf. 2.) ab.

Digitized by Google

Hierauf geht dieſe Arterie an der innern oder hintern Fläche des M. rectus hinauf, giebt einwärts und auswärts Aeſte zu ihm und den breiten Seitenmuskeln des Bauchs, an ihrem untern Theile auch den M. pyramidalis, und endiget ſich am obern Theile des M. rectus mit Aeſten, die mit dem Ramus epigastricus der A. mammaria interna Gemeinſchaft haben.

An ihrem unteren Theile giebt ſie einen durchbohrenden Aſt, der einwärts zur Haut des Mons Veneris kommt, und andere durchbohrende Aeſte zur Haut des Bauchs. In manchen weiblichen Körpern iſt die Arteria spermatica externa ein Aſt dieſes durchbohrenden Aſtes, und geht dann durch den Bauchring am runden Mutterbande in die Bauchhöhle zur Mutter.

Arteria circumflexa Ilii, die Kranzſchlagader des Hüftbeins, oder die äußere Bauchdeckenſchlagader [1]).

Sie entſpringt von der äußeren Seite der A. cruralis, indem ſie unter dem Ligamentum Fallopii durchgeht, etwas tiefer als die A. epigastrica, und geht gekrümmt vorwärts, auf dem M. iliacus unweit der Crista des Darmbeines hinauf. Sie giebt Aeſte dieſem Muskel, auch dem transversus, dem obliquus internus und externus, und hat endlich Gemeinſchaft mit der Arteria iliolumbalis, auch an den Bauchmuskeln mit den A. A. lumbalibus.

Nun geht die Arteria cruralis unter dem Ligamentum Fallopii durch, und liegt an der innern Seite des obern Theiles des Schenkels, nach vorn her, zwiſchen dem M. pectinaeus und dem Psoas, wo ſie bloß von der Haut und der Fascia lata bedeckt wird.

Sie geht an der innern Seite des Schenkels in der Rinne, die ſich zwiſchen den Adductoren (pectinaeus, adductor longus) und den Streckmuskeln des Unterſchenkels (vastus internus, rectus etc.) befindet, hinab, und iſt 3 Zoll weit vom Schenkelbogen aus nur von der Fascia, von Fette, hier und da von Lymphdrüſen und von der Haut bedeckt, verbirgt ſich dann aber unter dem M. Sartorius, da, wo dieſer in jener erwähnten Rinne zu liegen kommt. Sie lenkt ſich auf dieſe Weiſe ein wenig rückwärts, und durchbohrt am Anfange des letzten Viertels des Oberſchenkelknochens die Sehne des Adductor magnus an der Linea aspera, geht an der hintern Seite des untern Endes des Schenkelknochens zwiſchen dem M. semitendinosus und biceps hinab, gelangt auf dieſe Weiſe in die Kniekehle, und erhält den Namen A. poplitaea. Die Schenkelarterie geht folglich von der Beugſeite des Oberſchenkelgelenks zur Beugſeite des Kniegelenks.

---

[1]) Der Zweig, der nach dem Nabel in ſchräger Richtung aufſteigt, iſt bisweilen ſehr klein; in anderen Fällen hat er aber eine ſolche Größe, daß der Zweig, der den Kamme des Hüftbeines folgen ſollte, faſt ganz gegen ihn verſchwindet. Dieſer erſt aufſteigende Zweig kann beim Bauchſtich leicht verletzt werden, und einen Fall, wo die ihn begleitende Vene durch den Troikar getroffen ward, erzählt Burns (Herzkrankheiten S. 87.).

Digitized by Google

Sobald ſie unter dem Bande durchgekommen iſt, giebt ſie bisweilen auch die Arteria epigastrica superficialis oder cutanea abdominalis, welche zwiſchen der Haut und dem M. obliquus externus hinaufgeht und zu den Bauchmuskeln und zur Haut des Bauchs in der Gegend des Bauchringes ſich vertheilt [1]), bisweilen auch die Arteria circumflexa Ilii externa, äußere Kranzſchlagader der Hüfte (A. abdominalis nach Haller), welche auswärts an der äußern Fläche des Darmbeins neben der Crista fortgeht, dem oberſten Theile des M. glutaeus und der Haut Aeſte giebt. Beide Aeſte aber ſind unbeſtändig, in einigen Körpern viel dünner und kürzer als in anderen.

Arteria pudenda externa, die äußere Schampulsader [2]).

Sie entſpringt von der innern Seite der A. cruralis, unweit des Ligamentum Fallopii, unter oder über der A. circumflexa interna, geht einwärts, giebt Aeſte den Glandulis inguinalibus, und dann im männlichen Körper dem vordern Theile des Hodenſackes (A. A. scrotales anteriores), dem obern Theile des männlichen Gliedes und dem Mons Veneris; im weiblichen dem vordern Theile der Schamlefzen und dem Mons Veneris. Der Aſt, welcher zum Mons Veneris geht, entſpringt ſehr oft aus der A. cruralis ſelbſt, und kann dann A. pudenda externa suprema heißen. Bisweilen iſt auch noch eine dünnere, tiefer entſpringende A. pudenda externa inferior da.

Einen oder zwei Zoll unter dem Schenkelbogen, Ligamentum Fallopii, ſelten tiefer, geht der dickſte Aſt der A. cruralis, die A. femoris profunda [2]), hinten und nach innen zu ab, und an der nämlichen Stelle oder ein wenig höher entſpringt die A. circumflexa femoris externa, und die A. circumflexa femoris interna [3]).

Dieſe 3 Aeſte, aus denen der größte Theil der Muskeln am Oberſchenkel (die Gefäßmuskeln ausgenommen) ſeine Aeſte erhält, ſind von anſehnlicher Dicke.

---

[1]) Zuweilen fand ſich eine 2te Arteria abdominalis interna, welche aus der A. cruralis kam, ehe ſie unter dem L. Fallopii durchgeht, und ſich an der inwendigen Fläche des M. transversus eben ſo vertheilte, als jene (externa) an der auswendigen Fläche des obliquus externus. (Hildebrandt.)

[2]) Einen merkwürdigen, und für die Bruchoperation höchſt wichtigen, Verlauf derſelben beobachtete Bonn (tab. anat. chir. doctrinam herniarum illustrantes editae a *Ger. Sandifort*. Lugd. Bat. 1828. Fol. p. 14. Tab. VI.). Nach ihrem Urſprunge aus der Iliaca theilte ſie ſich in mehrere Aeſte, die zum Theil nach den Bauchwänden aufſtiegen, theils aber herabſteigend ſich in der Tunica dartos veräſtelten, und zwar gingen ſie an der äußeren Seite des Bruches quer über denſelben herüber, ſo daß alſo eine Verletzung derſelben, wenn der Bruchſack der Länge nach eröffnet wurde, nicht zu vermeiden geweſen wäre.

[3]) Zuweilen entſpringen dieſe Adern auch unter dem Schenkelbogen, oder in ſeltenen Fällen ſogar über ihm. Wenn die A. femoris profunda hoch oben entſpringt, ſo iſt ſie ſehr dick und die A. circumflexa femoris externa und interna ſind Aeſte derſelben; zuweilen entſpringt ſogar die A. pudenda externa aus ihr. Die A. circumflexa femoris interna iſt in den meiſten Fällen ein Aſt der A. profunda, oft iſt es auch zugleich die A. circumflexa femoris externa.

Nach Tiedemann kommt die hohe Theilung häufiger bei Weibern als bei Männern vor, auch bei Menſchen von kleiner Statur häufiger als bei den von langer.

Digitized by Google

Arteria circumflexa femoris externa, die äußere Kranzschlagader des Schenkels [1]).

Die A. circumflexa externa entſpringt von der äußern Seite der A. cruralis, oder der A. profunda, geht, vom M. sartorius und dem rectus bedeckt, auswärts und dann vom Tensor fasciae bedeckt rückwärts, giebt Aeſte dieſen Muskeln und dem Schenkelgelenke.

Arteria circumflexa femoris interna, die innere Kranzſchlagader des Schenkels.

Die A. circumflexa interna entſpringt von der innern hintern Seite der A. cruralis, oder der A. profunda femoris, giebt Aeſte dem M. pectinaeus, dem gracilis, dem Adductor longus, und lenkt ſich dann, an der innern Seite des obern Theiles des Schenkelknochens, zwiſchen dem M. pectinaeus und der gemeinen Flechſe des M. iliacus internus und Psoas, rückwärts, giebt Aeſte dieſen Muskeln, den Adductoribus, dem Obturator externus, dem Schenkelgelenke und dem Quadratus femoris.

Arteria femoris profunda, die tiefe Schenkelſchlagader.

Die A. profunda femoris entſpringt von der hintern Seite der A. cruralis, geht vor dem M. pectinaeus und dem Adductor brevis abwärts einwärts, hinter dem Adductor longus, giebt Aeſte dieſen Muskeln, dem gracilis, dem vastus externus, und drei, vier oder mehrere Ramos perforantes, unter denen einer oder 2 durch ihre Dicke ſich auszeichnen. Dieſe durchbohren den Adductor magnus, nachdem ſie ihm Aeſte gegeben haben, und vertheilen ſich dann in den hintern Muskeln des Schenkels, dem semimembranosus, semitendinosus und biceps. In einigen Körpern geht ſelbſt der Stamm der A. profunda durch den Adductor magnus.

Meckel (path. Anat. 2. 1. S. 124.) ſah dieſe Anordnung einmal, doch nur in unbedeutendem Grade auf der linken Seite.

Portal (anat. méd. III. 239. p. 187.) ſah ſie einigemal, und Zagorsky (mém. de Pétersb. 1803—6. Gött. Anz. 1811. S. 1343.) ſah einen anſehnlichen Aſt längs der inneren Schenkelpulsader herabſteigen, der ſich in die innere Knöchelpulsader einſenkte.

Den Fall, wo ſie ſich innerhalb des Beckens theilt, fand Burns (Herzkht. S. 362.) in 3 Körpern, und Tiedemann (explic. tab. art. p. 322.) bei einem Weibe auf beiden Seiten.

Otto (ſeltene Beob. I. 102.) ſah ihn mehrmals. Einigemal war die A. femoris profunda nach ihm der Hauptſtamm, und beträchtlicher als die eigentliche Schenkelarterie.

[1]) Bei einer jungen Perſon entſprang ſie von der äußeren Hüftarterie oberhalb des Poupart'ſchen Bandes, ging dann durch das Schenkelloch zu den Muskeln am oberen Ende des Schenkels, und nahm ihren Weg längs der vorderen Seite der Scheide f. d. Lymphgefäße, ſo daß ſie, wäre hier eine Schenkelbruchoperation nöthig geweſen, ſehr wahrſcheinlich verletzt worden wäre. (Burns, Herzkht. S. 365.)

Burns (ibid.) beobachtete auch einen Fall, wo ſie ein wenig unterhalb des Cruralbogens aus der Schenkelarterie entſtand, und quer über die vordere Seite der gemeinſchaftlichen Scheide der Vene und der lymphatiſchen Gefäße wegging.

Digitized by Google

Der Schenkelknochen erhält aus der Arteria profunda 2 Arterias nutritias, eine obere und eine untere.

Uebrigens sind in der Vertheilung der Aeste dieser 3 Schlagadern mancherlei Verschiedenheiten. Z. B. Rami musculares descendentes, die zum M. cruralis und vastus externus hinabgehn, kommen in einigen aus der circumflexa externa, in andern aus der profunda.

Der fortgesetzte Stamm der Arteria cruralis giebt, ehe er den Adductor magnus durchbohrt hat, Muskeläste zum M. sartorius, vastus internus, cruralis, gracilis, den Adductoribus, auch dünne Ramos perforantes durch den Adductor magnus zu den hintern Muskeln des Schenkels; und wenn er denselben durchbohrt hat, zum M. semimembranosus, semitendinosus, und zum Caput breve bicipitis.

Arteria poplitaea, die Kniekehlenarterie.

Die Arteria poplitaea geht hinter dem untern Ende des Schenkelknochens, zwischen den Condylis desselben, ferner hinter dem Kniegelenke, hinter dem obern Ende des Schienbeins, zwischen den Condylis desselben, und zwischen den beiden M. gastrocnemiis hinter dem M. poplitaeus bis zum M. soleus hinab, der sie dann von hinten bedeckt. Sie wird in diesem Fortgange von der Vena poplitaea, und an ihrer äußeren Seite von dem Nervus tibialis begleitet, und ist in vielem Fette verborgen.

Sie giebt auf diesem Wege Aeste zum untern Theile des M. biceps, semitendinosus, semimembranosus, zu den obern Enden der M. gastrocnemiorum, zum M. poplitaeus, und vier dickere Gelenkarterien, Arterias articulares. Gemeiniglich erhält auch jeder M. gastrocnemius einen besonderen dickeren Ast.

1) Die Gelenkarterie, die über dem Knie nach innen gelegen ist, die Superior interna, entspringt von der innern Seite, geht über den Condylus internus des Schenkelbeins einwärts, und dann, bedeckt von der herabgehenden Flechse des Adductor magnus und vom M. vastus internus, vorwärts.

2) Die Gelenkarterie, die über dem Knie nach außen liegt, die Superior externa, entspringt von der äußern Seite, geht über dem Condylus externus des Schenkelbeins, bedeckt vom Caput breve des M. biceps, auswärts, und dann vorwärts.

3) Die Gelenkarterie, die unter dem Knie nach innen gelegen ist, die Inferior interna, entspringt von der innern Seite, tiefer als die Superior interna, geht unter dem Condylus internus des Schienbeins, bedeckt vom M. gastrocnemius internus, einwärts und dann vorwärts.

---

[1]) In einer männl. Leiche entsprang aus ihr ein ungewöhnlicher Ast etwa von der Dicke der Radialis, der in der Kniekehlhöhle bis zu ihrem oberen Winkel, und dann weiter hinauf bis zur Mitte des Oberschenkels verlief, sich mit mehreren Aesten in dem Semitend. und Semimembr. vertheilte, und so mit den Zweigen der durchbohrenden Arterien anastomosirte. (Otto, seltne Beob. II. 63.)

Digitized by Google

4) Die Gelenkarterie, die unter dem Knie nach außen gelegen ist, die Inferior externa, entspringt von der äußern Seite, tiefer als die Superior externa, geht am Condylus externus des Schienbeins, über dem obern Ende des Wadenbeins, bedeckt vom M. gastrocnemius externus und plantaris, auswärts, und dann vorwärts.

Alle diese Arteriae articulares vertheilen ihre Aeste am hintern, äußern, innern und vordern Theile des Kniegelenks, an der Kniescheibe, am untern Ende des Schenkelbeins, am obern Ende des Schienbeins und Wadenbeins, und an den Enden der Muskeln, die am Kniegelenke liegen.

Außer diesen 4 Gelenkarterien findet man zuweilen als besondere Stämme eine oberflächlich verlaufende und höher oben abgehende obere innere Gelenkarterie, und eine kleine zur Kniekehle laufende, nur einmal an jedem Fuße vorhandene Gelenkarterie. Diese Arterien sind aber sehr häufig Aeste der benachbarten Gelenkarterien.

Hinter dem obern Ende des Schienbeins, gemeiniglich etwas tiefer, als der M. poplitaeus liegt, theilt sich die Arteria poplitaea in 2 Aeste, deren einer, welcher zur Vorderseite des Unterschenkels geht, Arteria tibialis antica, der andere, welcher an der Hinterseite desselben bleibt, Arteria tibialis postica heißt.

1. Arteria tibialis antica, die vordere Schienbeinarterie.

Die Arteria tibialis antica geht durch eine kleine Oeffnung am obern Theile des Ligamentum interosseum zwischen dem Schienbeine und Wadenbeine hindurch, giebt einen Ramus recurrens, der den Anfang des M. tibialis anticus durchbohrt, und mit allen vier Kniekehlenarterien an der vordern Seite des Knies Gemeinschaft hat, steigt nun an der vordern Seite des Unterschenkels, vor dem Ligamentum interosseum, zwischen dem M. tibialis anticus und dem Extensor hallucis longus hinab, und schickt zu beiden Seiten viele dünne Aeste zum M. tibialis anticus, Extensor digitorum longus, Extensor hallucis longus, M. peronaeus longus und brevis, auch zur Haut. Einige dünne Aeste kommen an der vordern innern Fläche des Schienbeins einwärts nach hinten herum, und haben mit den Aesten der A. tibialis postica, andere an den M. M. peronaeis auswärts nach hinten herum, und haben mit den Aesten der A. peronaea Gemeinschaft.

Am untern Ende des Schienbeins geht sie unter dem Ligamentum transversum durch, lenkt sich auf die vordere Fläche des Schienbeins, und giebt 2 Aeste.

Der äußere Ast, die vordere äußere Knöchelschlagader, Arteria malleolaris anterior externa, geht etwas abwärts, giebt zu der Gegend des äußern Knöchels Zweige, die mit Aesten der A. peronaea Gemeinschaft haben, und vereiniget sich dann mit dem Ramus descendens der A. peronaea unter dem äußern Knöchel in einem Bogen, aus dem Aeste für den Extensor hallucis brevis, und den Extensor digitorum brevis entspringen.

Digitized by Google

Der innere Aſt, die vordere innere Knöchelſchlagader, Arteria malleolaris anterior interna, geht etwas abwärts, giebt Aeſte zu der Gegend des innern Knöchels, die mit den Aeſten der A. tibialis postica Gemeinſchaft haben. Die vordere äußere Knöchelpulsader, ſeltener die innere, iſt zuweilen ein Aſt eines die Knochenhaut unten durchbohrenden Zweiges der A. peronaea.

So gelangt die A. tibialis antica, unter dem Ligamentum cruciatum durchgehend, auf den Rücken des Fußes, und giebt am hintern Theile deſſelben einen Aſt, der einwärts, unter der Flechſe des M. tibialis anticus durch, dann als A. dorsalis tibialis hallucis vorwärts geht. Dann geht ſie unter dem Extensor hallucis brevis durch, und theilt ſich in 2 Aeſte:

Die kleinere Arteria tarsea externa, die äußere Fußrückenſchlagader, geht unter dem Extensor Digitorum brevis ſchief auswärts vorwärts gegen das hintere Ende des 5ten Mittelfußknochens, giebt Aeſte jenem Muskel und der Haut, und die Arteria dorsalis fibularis der 5ten Zehe, in einigen Körpern auch die 4te, oder auch die 3te Arteria interossea dorsalis.

Die Arteria tarsea interna, die innere Fußrückenſchlagader; dieſe geht unter dem Extensor digitorum brevis über dem 2ten, 3ten (und 4ten) Mittelfußknochen auswärts, und giebt, indem ſie zuweilen einen Bogen bildet, 4 Arterias interosseas dorsales. Jede A. interossea dorsalis geht zwiſchen 2 Mittelfußknochen hin (z. B. die 2te zwiſchen dem 2ten und 3ten Mittelfußknochen), giebt Aeſte zu den da gelegenen M. M. interrosseis, einen durchbohrenden Zweig, welcher zur Planta hinabgeht, und mit der A. interossea plantaris Gemeinſchaft hat, und theilt ſich dann, wenn ſie den Anfang ihrer beiden Zehen erreicht, in 2 Arterias digitales dorsales, eine für jede Zehe. (Die 2te theilt ſich z. B. in Arteria dorsalis fibularis der 2ten, und in die dorsalis tibialis der 3ten Zehe.)

Wenn die A. tarsea interna nicht ſo weit reicht, ſo kommt die 4te, oder auch die 3te A. interossea dorsalis aus der A. tarsea externa.

Die 1ſte Arteria metatarsea interna, die dickſte unter allen, und alſo die Fortſetzung des Stammes, geht dann zwiſchen dem Mittelfußknochen der 1ſten und der 2ten Zehe vorwärts, ſchickt ſogleich zwiſchen der Baſis des 1ſten und des 2ten os metatarsi einen ſehr ſtarken Verbindungszweig zur äußeren Fußſohlen-Arterie, A. plantaris externa, mit der ſie den Arcus plantaris zuſammenſetzt, und zuweilen auch zwiſchen dem Anfange der 1ſten und 2ten Zehe einen Verbindungszweig zur A. plantaris interna der großen Zehe; übrigens vertheilt ſie ſich wie die andern A. A. interosseae.

Digitized by Google

2. Arteria tibialis postica, die hintere Schienbeinarterie.

Die Arteria tibialis postica bleibt, als die Fortſetzung der A. poplitaea, vom M. soleus bedeckt, an der hintern Seite des Unterſchenkels, und theilt ſich am obern Ende des M. tibialis posticus in 2 Aeſte, in die A. peronaea und in die viel dickere Fortſetzung des Stamms.

a) Arteria peronaea, die Wadenbeinarterie [1]).

Die Arteria peronaea oder fibularis geht vor dem M. soleus ſchräg abwärts auswärts, und dann hinter dem Wadenbeine, neben dem Flexor longus hallucis, an der innern Seite deſſelben, hinter dem M. tibialis posticus hinab. Sie giebt Aeſte dieſen Muskeln, dem soleus, dem gastrocnemius externus, den peronaeis, und die Arteria nutritia fibulae.

In der unteren Gegend des Unterſchenkels giebt ſie einen Aſt, der das Ligamentum interosseum durchbohrt, oder unter demſelben durchgeht, auf dieſe Weiſe vor den Malleolus externus kommt, mit der A. malleolaris externa Gemeinſchaft hat, und dem Extensor digitorum longus, und wenn er groß iſt, dem äußern Theile des Fußgelenkes Aeſte giebt. Aus ihr kommen zuweilen Zehenarterien, die ſonſt aus der Tarsea externa, ſeltener auch die, die aus der Tarsea interna entſtehen. In der Gegend der Knöchel ſteht ſie häufig mit der neben ihr herablaufenden A. tibialis postica durch einen queren Aſt in Verbindung, ſteigt dann an der äußern Seite des Calcaneus herab, und ſtößt in dem dieſen Knochen umgebenden Netze mit Aeſten der A. tibialis postica zuſammen.

Selten iſt die A. peronaea ſo groß, daß ſie ſich ſo weit zur Fußſohle herab erſtreckt, daß ſogar Zehenarterien aus ihr entſpringen.

b) Die Fortſetzung der Arteria tibialis postica der hinteren Schienbeinarterie.

Die Fortſetzung der Arteria tibialis postica geht an der hinteren Seite des Unterſchenkels, vor dem M. soleus, hinter dem Ligamentum

[1]) Am linken Fuße einer männlichen Leiche verlief die Peronaea ganz gewöhnlich; oberhalb des Knöchels aber bog ſie ſich ſchnell nach innen, und ſenkte ſich ganz in den Stamm der Tibialis postica ein, ohne weitere Verbindungen mit den Knöchelarterien zu haben. (Otto, ſeltne Beob. II. Heft, S. 63.)

Am rechten Fuße entſprang die A. peronaea ſehr tief unten, und begab ſich zum äußeren Rande der kleinen Zehe. (Tiedem. Tab. art. XXXVI. Fig. 3.)

Am rechten Fuße war der Aſt der A. peronaea, welcher durch das Ligamentum interrosseum am unteren Theile des Unterſchenkels nach vorn dringt, ſo groß, daß die Arterien des Fußrückens von ihm entſprangen, und die A. tibialis antica nur einen viel ſchwächern Verbindungszweig gab. (Tiedemann, Tab. art. XXXVI. Fig. 2.)

Digitized by Google

interosseum, zwiſchen dem M. tibialis posticus und dem Flexor digitorum longus hinab, giebt Aeſte dieſen Muskeln, und an der obern Hälfte des Schienbeins die Arteria nutritia tibiae, die größte Knochenſchlagader im ganzen Körper.

Hinter dem Malleolus internus krümmt ſich die Arteria tibialis an der inneren Seite des Calcaneus vorwärts herab, ſchickt eine kleine A. malleolaris posterior interna, durch die ſie mit der A. malleolaris anterior interna Gemeinſchaft hat, geht, befeſtiget von der Scheide des Flexor longus hallucis, über dem Caput longum des Abductor hallucis in die Planta, und theilt ſich unter dem hintern Theile des Calcaneus in die größere Arteria plantaris externa und in die kleinere A. plantaris interna.

Arteriae plantares, die Fußſohlenarterien.

Arteria plantaris interna. Dieſe geht über dem Abductor hallucis gerade vorwärts, giebt ihm, dem Flexor brevis hallucis und der Haut in der Nähe des innern Randes des Fußes Aeſte, die mit den Aeſten der A. tibialis antica Gemeinſchaft haben. Unter dem Mittelfußknochen der großen Zehe giebt ſie die Arteria digitalis plantaris tibialis der großen Zehe, oder geht in ſie über, und hilft in dieſem Falle den Arcus plantaris bilden.

Arteria plantaris externa. Dieſe viel größere Arterie geht über der Aponeurosis plantaris und dem Flexor brevis digitorum an der untern Fläche des Calcaneus, zwiſchen der Caro quadrata und dem Flexor brevis digitorum ſchräg auswärts, und dann neben dem Abductor digiti minimi vorwärts, bis unter den Zwiſchenraum der Mittelfußknochen der 4ten und 5ten Zehe, giebt Aeſte dem Abductor digiti minimi und der Haut, die mit der A. tarsea externa Gemeinſchaft haben, krümmt ſich dann unter den Mittelfußknochen vor den hintern Enden derſelben über den Flechſen des Flexor brevis und longus wieder ſchräg einwärts und vorwärts, ſo daß ſie mit den durchbohrenden Aeſten der 4 Arteriae metatarseae des Fußrückens, und vorzüglich mit dem ſehr dicken 1ſten Aſte, der zwiſchen der Baſis des 1ſten und 2ten Mittelfußknochens in den hohlen Fuß gelangt, zuſammenkommt. Hierdurch wird der Arcus plantaris, zu deſſen Bildung auch zuweilen noch eine Verbindung der A. plantaris externa beiträgt.

Aus dieſem Bogen entſpringen die 4 Arteriae interosseae plantares. Jede geht zwiſchen 2 Mittelfußknochen vorwärts. Wenn ſie dann den Anfang der beiden Zehen erreicht, zwiſchen deren Mittelfußknochen ſie lag, ſo theilt ſich jede in 2 Art. digitales plantares (z. E.

Digitized by Google

die 2te in die A. digitalis plantaris fibularis der 2ten und die tibialis der 3ten Zehe.)

Die Arteria interossea plantaris prima, welche zwischen dem 1sten und dem 2ten Mittelfußknochen liegt, ist in einigen Körpern auch ein Ast des Arcus plantaris, in andern die Fortsetzung des Stammes der A. plantaris interna, und kommt in einigen Körpern zwischen den Anfängen der 1sten und der 2ten Zehe mit der A. tibialis antica zusammen.

Arteriae digitales plantares, Zehenarterien der Fußsohle.

Ihrer sind 10, 2 für jede Zehe, eine interna und eine externa.

Die Arteria tibialis hallucis und die Arteria fibularis digiti minimi entspringen einzeln, die übrigen je 2 aus einer A. interossea plantaris. Die A. tibialis hallucis ist bisweilen eine Fortsetzung der A. plantaris interna, bisweilen eine Fortsetzung des Arcus plantaris. Die A. fibularis digiti minimi ist ein Ast der A. plantaris externa. Die Zehenarterien unterscheiden sich aber von den Fingerarterien der Hohlhand dadurch, daß sie fast alle, oder doch größtentheils von einem Arterienbogen entspringen, der mit dem Arcus volaris profundus der Hohlhand verglichen werden muß. Diese Einrichtung hat den Nutzen, daß sie nicht so sehr dem Nachtheile, welchen der Druck beim Stehen und Gehen hervorbringen könnte, ausgesetzt sind.

Jede Arteria digitalis plantaris geht an der Seite ihrer Zehe parallel mit der andern A. digitalis plantaris derselben Zehe hinab und giebt der Haut und den übrigen Theilen der Zehe Aeste, sowohl nach dem Latus dorsale, wo sie mit den A. A. dorsalibus Gemeinschaft haben, als nach dem Latus plantare. An der Superficies plantaris des letzten Gliedes kommen beide A. A. digitales plantares, die tibialis und fibularis, in einem kurzen Bogen zusammen, aus welchem feine Aestchen zu der Spitze der Zehe gehn. Auch kommt am Anfang des Nagels jeder Zehe ein Ramus dorsalis der einen A. digitalis mit einem Ramus dorsalis der andern A. digitalis in einem Bogen zusammen, aus welchen feine Aestchen nach der Wurzel des Nagels gehen.

Arteriae digitales dorsales, Zehenarterien des Fußrückens [1]).

Dieser sind ebenfalls 10, 2 für jede Zehe, eine tibialis und eine fibularis.

---

[1]) Die Arterien des Fußrückens und der Fußsohle zeigen in der Hinsicht Abweichungen, daß die des Fußrückens zuweilen die stärkeren sind, und am Anfange der Zwischenräume der 5 Mittelfußknochen so große Aeste zur Fußsohle schicken, daß

Digitized by Google

Die A. tibialis hallucis und die Fibularis digiti minimi entspringen einzeln, jene aus der A. tibialis antica, diese aus dem Ramus tarseus derselben, die übrigen je 2 aus einer Arteria interossea dorsalis. Die Arteriae digitales dorsales sind aber viel dünner, als die Digitales plantares. Jede derselben geht an ihrer Seite ihrer Zehe fort, verliert sich in der Haut der Zehe, und hat mit der A. plantaris derselben Seite ihrer Zehe Gemeinschaft. Die zwischen dem Mittelfußknochen der großen und der 2ten Zehe verlaufende A. interossea hat an ihrer gabelförmigen Spaltung mit der A. interossea plantaris durch einen durchbohrenden Zweig Gemeinschaft.

Von den Venen des großen Kreislaufes.

Die zwei Hohlvenen, Venae cavae, und ihre Hauptzweige im Allgemeinen.

Nimmt man die der Substanz des Herzens angehörenden Venen aus, so vereinigen sich alle dunkelrothes Blut führende Körpervenen in 2 Hauptstämmen, in der oberen und in der unteren Hohlvene.

Die **obere** oder **herabsteigende Hohlvene**, vena cava superior oder descendens, führt das Blut von der oberen Hälfte des Körpers zum Herzen herab, die beträchtlich größere **untere** oder **aufsteigende Hohlvene**, vena cava inferior oder ascendens, führt es aus den unteren Theilen des Körpers zum Herzen hinauf. Beide Hohlvenen ergießen das Blut einander entgegenkommend in die vordere, oder rechte Vorkammer des Herzens. Weil indessen die herabsteigende, obere Hohlvene zugleich ein wenig ihre Richtung nach vorn nimmt, so machen die Richtungen beider Venen am Herzen mit einander einen stumpfen Winkel. Beide Hohlvenen liegen **rechts** neben der Körperarterie.

Die 3 Hauptzweige der **oberen Hohlader** sind theils die beiden venae jugulares communes, die gemeinschaftlichen Drosseladern, durch deren Vereinigung sie hinter dem Knorpel der ersten Rippe entsteht, und welche alles Blut zurückführen, das durch die aus dem Bogen der Aorta entspringenden Arterien im Kopfe, im Halse, in den Armen und an der

A. A. plantares digitales aus ihnen vorzuglich entspringen. Im entgegengesetzten, auch regelwidrigen Falle kommen die A. A. digitales dorsales aus jenen durchbohrenden Zweigen, die aus der Fußsohle zum Fußrucken übergehen.

Die Zehenarterien, vornehmlich die der großen Zehe und die an der Großzehenseite der 2ten Zehe, und die äußere an der kleinen Zehe sind sehr vielen, jedoch unerheblicheren Abweichungen unterworfen.

Digitized by Google

vordern Wand der Bruſt und des Bauches (an letzteren Orten durch die Arteria mammaria) vertheilt worden war, theils die Vena azygos, die unpaare Vene, welche in der Bruſthöhle rechts neben der abſteigenden Aorta liegt, auf eine ähnliche Weiſe ſich über den rechten Luftröhrenaſt herumkrümmt, als die Aorta über den linken, und alles das Blut zurückführt, welches die Aorta innerhalb der Bruſthöhle verbreitet. Die obere Hohlvene und ihr erſter Hauptzweig begleiten folglich die Aorta ſtets an der rechten Seite, und bilden wie ſie einen Bogen und einen herabſteigenden Theil. Der Bogen und der herabſteigende Theil der V. azygos iſt aber viel dünner als bei der Aorta, weil die Aorta außer dem Blute, das ſie an den Wänden der Bruſthöhle vertheilt, noch das führt, welches ſie zu dem Unterleibe und zu den Füßen bringt, während die Vena azygos dasjenige Blut hauptſächlich aufnimmt, welches von der Aorta zu den Wänden der Bruſthöhle geführt worden war. Es iſt alſo in der That das oberſte Stück der Vena cava superior, eine Vene, welche den in dem erſten Abſchnitte der Aorta zuſammenkommenden 2 Arteriis subclaviis und carotidibus entſpricht, und auf gleiche Weiſe entſpricht der Aorta descendens, ſo weit ſie Blut zuführendes Gefäß für die Wände der Bruſt iſt, die Vena azygos.

Die Hauptzweige der unteren Hohlvene ſind theils die 2 Hüftvenen, venae iliacae, durch deren Vereinigung die untere Hohlader zwiſchen dem 4ten und 5ten Lendenwirbel (etwas tiefer als wo die Aorta ſich theilt) entſteht, und die alles Blut, welches am Becken und in den Schenkeln durch die Arterien gleiches Namens vertheilt worden, zurückführt, theils die Nierenvenen und die Lebervenen, durch welche letztere das Blut in die untere Hohlader gebracht wird, welches 3 große Arterien der Unterleibsaorta, die A. coeliaca, mesenterica superior und die mesenterica inferior, zu den Chylus bereitenden Organen vertheilt haben. Denn dieſes Blut wird aus dem Magen, aus dem Darmcanale, aus dem Gekröſe, aus der Milz, aus dem Pancreas und zum Theil von der Leber (von der Gallenblaſe) durch die Vena portae zuſammengebracht, in die Leber geführt, und endlich von da durch die Lebervenen in die Vena cava inferior geleitet.

Venen an den Wänden des Rumpfs.

Aus dem Vorhergehenden haben wir geſehen, daß längs der hinteren Wand der Bruſt und des Bauchs, rechts neben der Aorta, der Länge nach große Venenſtämme, die Vena azygos und die Vena cava inferior liegen, welche viele querlaufende, zwiſchen den Rippen und am Bauche befindliche Venen, venae intercostales und lumbales, die den

Digitized by Google

Rumpf faſt ringförmig umgeben, aufnehmen und unter einander verbinden. An der vorderen Wand der Bruſt und des Bauchs liegen dünne, gleichfalls der Länge nach laufende Venen, die Venae mammariae internae, die zu der Vena cava superior und zu der Vena jugularis communis sinistra übergehen, und die Venae epigastricae, die zu den Schenkelvenen herabſteigen, und die Arterien gleiches Namens größtentheils doppelt begleiten. Ueber dem Nabel ſtoßen ſie unter einander zuſammen. Dieſe vorderen, der Länge nach laufenden Venen dienen dazu, die vorderen Enden jener den Rumpf quer umgebenden Venen aufzunehmen und unter einander zu verbinden.

Nun iſt aber die Wirbelſäule ihrer ganzen Länge nach hinten und auch in ihrem Canale mit Venennetzen bedeckt, die ununterbrochen vom Kopfe bis zum Ende des Kreuzbeins reichen, und in denen das Blut nicht der Länge nach, ſondern mehr der Quere nach zu fließen ſcheint, und in der Bruſt und am Bauche durch die Zwiſchenrippen und Lendenvenen in die V. azygos und cava kommt. Am Halſe und am Kreuzbeine aber, wohin ſich die Vena cava inferior und die Vena azygos nicht erſtreckt, liegen beſondere, der Länge nach laufende Venen, um aus dieſen Venennetzen den Abfluß des Bluts zu bewirken; am Halſe die Wirbelvenen, V. V. vertebrales, die es in die Vena jugularis communis führen, am Kreuzbeine die Vena sacra media und die Venae sacrae laterales, die es in die Venas iliacas und in ihren Aſt, die Hypogastrica, bringen.

Von den Aeſten der oberen Hohlvene [1]), vena cava superior [2]), im Einzelnen.

Vena azygos, azyga, Vena sine pari, der Stamm der Zwiſchenrippen-Venen [3]).

Dieſer Venenſtamm nimmt das Blut der meiſten, zuweilen aller Zwiſchenrippenvenen auf, und bringt die Vena cava inferior mit der

---

[1]) Ueber die Vena cava superior hat eine abgeſonderte Schrift geſchrieben: *Gust. Lauth*, Specilegium de vena cava superiore. Strasb. 1815. 4. Man betrachte auch die von Breſchet und die von Langenbeck gegebenen Abbildungen (Icones anatomicae; Angiologiae Fasc. I.).

[2]) Die Fälle von regelwidriger Bildung der Hohlvene findet man bei Otto am vollſtändigſten aufgezählt (pathol. Anat. 1830. S. 347.), z. B. die, wo bei unvollkommner Bildung des Herzens nur eine einzige für den ganzen Körper beſtimmte Vene mit dem Herzen in Verbindung ſtand, ſo daß keine beſondere Lungenvene vorhanden war, oder wo die Körper- und Lungenvenen mit einem und demſelben Vorhofe in Verbindung ſtanden, oder wo ſich beide Hohladern zu einem einzigen, in den rechten Vorhof gehenden, Venenſtamm vereinigten, oder wo, während die Arterien regelmäßig entſprangen, die Hohlvenen in den linken, die Lungenvenen in den rechten Vorhof übergingen, oder endlich wo, wie mehrmals beobachtet worden, und auch Otto (ſeltene Beob. Heft 2. S. 69.) in 2 Fällen geſehen hat, die linke Vena jugularis communis ſich, ohne ſich mit der rechten zu vereinigen, in das Herz begab, und zwar häufiger in den rech-

Digitized by Google

Vena cava superior in Verbindung. Die querlaufenden Lendenvenen nämlich ergießen ihr Blut in die Vena cava inferior, ſtehen aber noch unterwegs mit einem ſenkrecht emporſteigenden Strange netzförmig verflochtener Venen in Verbindung, welcher vor und hinter den Wurzeln der Querfortſätze der Lendenwirbel liegt, und in welchem ſich oft ein vor den

---

ten, ſeltener in den linken Vorhof ging, daß alſo 2 obere Hohlvenen vorhanden waren. Eine ſolche Abweichung beſchreibt ausführlich **Adolph Murray** (neue Abhandlung der ſchwediſchen Akademie. 2. Bd. Leipz. 1784. S. 283. ſq.): nachdem ſich bei einer 60jährigen Frau die Vena jugularis und subclavia sinistra oberhalb dem Schlüſſelbeine in ein Gefäß vereinigt hatten, ſtieg dieſes durch den Herzbeutel, links neben dem großen Bogen der Aorta, herunter, und ging zu dem linken Rande und zur vordern Fläche des hinteren Herzohres. Hier war es von den eignen Häuten des Herzens bedeckt, und mit dem Ohre ſo feſt verwachſen, daß nicht allein dieſes ein Continuum von ihm auszumachen ſchien, ſondern ſelbſt durch Fleiſchfibern mit demſelben verwachſen war. So ſtieg die Vena cava sinistra niederwärts, und ging quer über die Art. pulm. sinistra, dann über die Ven. pulm. weg. An der Wurzel des Herzohres und an dem untern Rande der Lungenblutader machte das Gefäß eine rinnliche Krümmung, ſo daß es auf einmal eine transverſale Stellung gegen das Herz erhielt; es ging nämlich um die Lungenblutader bis an die flache untere Fläche des Herzens, zwiſchen der Baſis deſſelben und dem linken Sinus, nach dem rechten Sinus hin, wo es an der untern Extremität des Septi auricularum ſich öffnete. Der Herzbeutel bedeckte ſowohl das Gefäß als den transverſalen Fortſatz deſſelben, und vereinte beide Theile mit dem linken Sinus und mit der Baſis des Herzens, ſo daß ſie nicht ohne Schwierigkeiten getrennt werden konnten.

Böhmer (Fasc. I. obs. anat. und Diss. de confluxu trium cavarum) fand auf ähnliche Weiſe, wie **Murray**, bei einem ausgewachſenen Menſchen die Vena cava sup. nicht allein doppelt, ſondern auch die eine Hälfte ſonderbar um das Herz gekrummt.

Aehnliche Beobachtungen findet man bei **Otto** angegeben (pathol. Anat. 1. Th. Berl. 1830. S. 347. Not. 13.) und 2 Fälle von ihm ſelbſt beobachtet. (Seltene Beob. 2. Heft p. 69.)

Will. Cheſelden (philos. transact. Vol. 23. n. 337.) ſah einmal die Vena cava superior rund um die Baſis des Herzens gehen, ſeitwärts der Aorta und der Lungenader hin, um zugleich mit der infer. in die rechte Vorkammer auf der hintern Seite einzutreten.

5) Ueber die Vena azygos haben beſondere Abhandlungen geſchrieben: *Barth. Eustachius*, Tractatus de vena, quae ἄζυγος Graecis dicitur et de humerariis venae propagine, quae in flexu brachii ex Galeni sententia venam communem profundam producit. In ej. opusc. anat. Lugd. Bat. 1707. 8. p. 289. — *Joh. Maria Lancisi*, de vena sine pari epistola, cum epistola de ganglii Patav. 1719. In opusc. Rom 1745. 4. Vid. *Morgagni*, Adversaria anat. I. p. 75. — *Laurentius Heister*, de singulari ac pulchra distributione venae azygos sive sine pari. Ephem. nat. cur. Cent. VII. et VIII p. 369. — *Le Cat*, observation sur la veine azygos bifurquée vers la base du coeur. Mem. de Paris 1738. hist. p. 45. — *Charles Guattani*, mém. sur une double veine azygos. Mém. de math. et de phys. Vol. III. p. 512. — *J. C. Wilde*, de azygos trunco duplici. In Commentar ac. Petrop. Vol. XII. 318. — *B. Albin*, Tabula vasis chyliferi cum vena azyga arteriisque intercostalibus. Lug. Bat. 1735. Fol. et in Annot. acad. Lib. IV. p. 41. — *Haller*, in Elemen. Phys. VIII. Sect. 1. §. 44 — 46. — *Henr. Aug. Wrisberg*, observationes anatomicae de vena azyga duplici, aliisque hujus venae varietatibus, c. tab. aen. Gotting. 1778. 4. et in nov. commentar. soc. reg. Gotting. Vol. VIII. 177 p. 14. et in Comment. med. phys. anat. etc. argumenti Vol. I. Gottin. 1800. 8. p. 127. sq. Eine ſehr ſchöne Abbildung und Abhandlung findet man bei *Breschet* (le système veineux, p. 2.), und eine ſehr inſtructive Abbildung der azygos in der von hinten eröffneten Bruſthöhle in *Langenbeck* Icones anatomicae. Angiologiae Fasc. I. Tab. 8.

Digitized by Google

Querfortſätzen liegender Venenſtamm, vena lumbalis ascendens, durch ſeine Größe auszeichnet, der unten mit dem Endaſte der Vena cava inferior (mit der Vena iliaca) in unmittelbarer Verbindung ſteht, oben aber am Querfortſatze des 1ſten Lendenwirbels meiſtens ununterbrochen in die auf der rechten Seite liegende Vena azygos und in die auf der linken liegende Vena hemi-azygos übergeht. An jenem Querfortſatze vereinigt ſich nämlich die Vena lumbalis ascendens unter einem faſt rechten Winkel mit der unter der 12ten Rippe verlaufenden letzten Intercoſtalvene, und ſetzt einen, faſt quer über den Körper des 12ten Bruſtwirbels hinübergehenden, dann plötzlich ſehr ſenkrecht zwiſchen dem äußeren und mittleren Zwerchfellſchenkel, oder auch durch den Hiatus aorticus neben der Aorta in die Bruſthöhle hinaufgehenden Stamm zuſammen, der auf der rechten Seite den Namen Vena azygos, auf der linken den der Vena hemi-azygos, führt.

Die Vena azygos geht dann in der Bruſthöhle rechts neben dem Ductus thoracicus und der Aorta vor den Körpern der Bruſtwirbel in die Höhe, nimmt in der Gegend des 9ten, 8ten, oder auch des 7ten Bruſtwirbels, ſeltener noch höher oben, die Vena hemi-azygos auf, bildet in der Gegend des 4ten Bruſtwirbels einen Bogen, der in gewiſſer Beziehung mit dem Bogen der Aorta verglichen werden kann, weil er auf eine ähnliche Weiſe über den rechten Luftröhrenaſt hinwegeht, als der Bogen der Aorta über den linken, und öffnet ſich an der hinteren Seite der Vena cava superior, ungefähr auf dem halben Wege derſelben vom Schlüſſelbeine zu dem rechten Vorhofe des Herzens, nahe über der Stelle, wo dieſelbe vom Herzbeutel umgeben zu werden anfängt, und iſt daſelbſt meiſtens mit einer Klappe verſehen.

Man ſieht aus dieſer Beſchreibung, daß, wenn man die zuweilen ziemlich ſtarke Vena lumbalis ascendens, die die nämliche Richtung als die Vena azygos und hemi-azygos hat, und mit ihnen unmittelbar verbunden iſt, als einen Theil der V. azygos und hemi-azygos anſieht, man die Vena azygos als eine der Länge nach durch die ganze Bauchhöhle und durch die Bruſthöhle gehende Vene anſehen kann, die unten mit der rechten und linken Vena iliaca und mit der Vena cava inferior unmittelbar in Verbindung ſteht, oben in der Bruſthöhle in die Vena cava superior übergeht, und meiſtens auch mit den 2 Aeſten derſelben, mit der rechten und linken Vena jugularis communis oder mit der Vena subclavia, in Communication ſteht. Zuweilen ſteht auch das untere Ende der Vena azygos und hemi-azygos dadurch mit der Vena cava inferior in Verbindung, daß es mit einer andern in die Vena cava inferior ſich öffnenden Vene unmittelbar, oder mittelbar durch einen Nebenaſt, communicirt, z. B. mit der 1ſten queren Lendenvene, mit der Nierenvene, oder mit der Nebennierenvene.

Die Vena azygos nimmt auf der rechten Seite, während ihres

Verlaufs durch die Brusthöhle, nach und nach die unteren und mittleren Zwischenrippenvenen (ungefähr 8, 9 oder 10 an der Zahl) und nicht selten auch die obersten Zwischenrippenvenen, nachdem sie sich in einen herabsteigenden Stamm vereinigt haben, auf. Indessen fließt auch nicht selten das Blut dieser obersten Intercostalvenen in die Vena subclavia oder in die Vena vertebralis. In diesem Falle pflegt indessen wenigstens die 1ste in die Vena azygos gehende Zwischenrippenvene mit der in die V. subclavia gehenden obersten Zwischenrippenvene verbunden zu sein.

Die Vena hemi-azygos [1]) nimmt, indem sie in der Brusthöhle links neben der Aorta an den Wirbelkörpern emporsteigt, die unteren Zwischenrippenvenen der linken Seite (meistens 3 oder 4 an der Zahl) auf, und empfängt in den meisten Fällen da, wo sie sich ungefähr am 8ten oder am 9ten Brustwirbel hinter der Aorta unter einem fast rechten Winkel quer hinüber zur Vena azygos beugt, um sich in dieselbe einzumünden, einen sehr beträchtlich dicken, zu ihr senkrecht herabsteigenden Stamm, in welchem sich die mittleren und zuweilen auch die

---

[1]) Die V. hemi-azygos ergießt ihr Blut zuweilen nicht in die Azygos, sondern in die Subclavia, d. h. die V. intercostalis superior nimmt die Stelle der V. hemi-azygos ein (siehe z. B. Fleischmann, Leichenöffnungen. Erlangen 1815. S. 228.), bisweilen steht sie mit den mittleren Zwischenrippenvenen in keiner Verbindung, weil mehrere Intercostalvenen der linken Seite sich selbst unmittelbar hinter der Aorta weggehend zur V. azygos begeben, oder weil mehrere derselben zu einem in die V. azygos herabsteigenden Stamm zusammentreten. Niemals aber gehen, wie Breschet behauptet, Venae intercostales einzeln in die V. cava superior. Heister (de singulari et pulchra distributione venae azygos sive sine pari. Ephem. nat. cur. Cent. VIII. p. 369. c. tab.) fand in einem, von der Mutter genommenen Kinde, daß die Vena azygos von der Vena cava sup. einfach entsprang, sich aber dann in 4 Aeste spaltete, von denen 2 nach oben und 2 nach unten gingen. Hierbei war außerdem noch das merkwürdig, daß alle Seitenäste doppelt waren, während sie sonst nur einfach sind. Aehnlich sind 2 Beobachtungen von Sandifort (obs. anat. pathol. L. II. p. 126.).

Bekanntlich kommen bei vielen Säugethieren 2 in die Vena cava sup. sich einzeln öffnende Venae azygos vor, z. B. bei den Affen, bei denen sie Galen beschrieben hat, beim Schweine und bei der Kuh. Ed. Sandifort, Ebeselden, Wrisberg, Lauth und Breschet haben einen solchen Verlauf derselben auch bei Menschen gesehen, und Wrisberg zwar in 3 Fällen, Lauth in 2 in der anatomischen Sammlung in Straßburg aufbewahrten Exemplaren. Breschet, bei dem man die literarischen Nachweisungen hierüber zusammengestellt findet, sagt hinzu, daß schon Vesal. Lancisi und Eustachi diesen Verlauf beobachtet hatten (sur le système veineux p. 9.). Ferner sahen Breschet und Otto auch einen Fall, in welchem sich die V. azygos nicht in die V. cava superior, sondern in die rechte V. subclavia begab, wobei also die rechte Vena intercostalis superior die Stelle der V. azygos vertrat. M. J. Weber beobachtete eine solche Einmündung der V. azygos in die linke V. subclavia.

In manchen Fällen mündet sich die Vena azygos in die Vena hemi-azygos ein. Sehr selten geht die untere Hohlader durch die Brusthöhle bis zur oberen, und vertritt dann zugleich die Stelle der V. azygos. In einem solchen Falle ging die V. hemi-azygos in die linke V. jugularis communis. Einen solchen Fall hat auch M. J. Weber beschrieben (in Meckels Arch. 1829. S. 8.). Aeußerst selten sind auch die Fälle, wo sich die V. azygos innerhalb des Herzbeutels, entweder in die V. cava superior, oder sogar in die V. cava inferior öffnet. Die hierher gehörenden Beobachtungen findet man vorzüglich vollständig in Otto's pathol. Anat. 1830. S. 347, 348 citirt. In einem von Sömmerring erwähnten Falle fehlte die V. hemi-azygos ganz.

Digitized by Google

oberſten Zwiſchenrippenvenen vereinigen. Dieſer Stamm iſt viel dicker als der, durch welchen die oberen Venae intercostales auf der rechten Seite in die Vena azygos übergehen. Wenn er die 2 oberſten V. intercostales nicht ſelbſt aufnimmt, ſondern dieſe ihr Blut durch ein in die V. subclavia oder V. vertebralis gehendes Stämmchen (vena intercostalis superior) nach oben ergießen, ſo ſteht er wenigſtens mit jenen Venen in Verbindung. Nicht ſelten begiebt ſich aber dieſer in die mittleren Zwiſchenrippenvenen ausgehende Stamm nicht in die V. hemi-azygos, ſondern unmittelbar in die V. azygos [1]).

Die Zwiſchenrippenvenen, venae intercostales, ſind kleine Venenſtämme, die zuerſt das aus dem Rückgratcanale und das vom Rücken aus in der Nähe der Wirbelſäule zuſammenfließende Blut aufnehmen.

Durch ein jedes Zwiſchenwirbelloch tritt eine Vene aus dem Canale der Wirbelſäule hervor, welche daſelbſt mit den in dieſem Canale befindlichen Venennetzen in Verbindung ſteht. An dem Zwiſchenwirbelloche nimmt ſie die ſeitwärts um den Wirbel herumkommenden Venennetze auf, und empfängt dadurch das Blut aus den Venennetzen, welche die hintere Oberfläche des Rückgrats bedecken.

In der Nähe jedes Zwiſchenwirbellochs kommt nun noch der im Zwiſchenrippenraume, zwiſchen dem M. intercostalis externus und internus liegende Aſt, ramus intercostalis, hinzu. Dieſer ſteht vorn meiſtens mittelſt 2 Zweigen mit der V. mammaria interna in Verbindung, und begleitet die Arteria intercostalis auf eine ſolche Weiſe, daß er näher am unteren Rande der Rippe hinläuft, als ſie, und daß er alſo, und der R. intercostalis, die A. intercostalis in die Mitte nehmen [2]).

Die Intercoſtaläſte der Intercoſtalvenen nehmen nicht unbeträchtliche Hautvenen auf, und hängen oft unter einander zuſammen.

Der aus dem meiſtens dickeren Rückenaſte und dem Intercoſtalaſte zuſammengeſetzte Stamm der Intercoſtalvene nimmt bei ſeinem Uebergange zur V. azygos oder hemi-azygos kleine Venenzweige von der vorderen Oberfläche der Wirbel auf, von welchen manche aus der ſchwammigen Subſtanz des Wirbelkörpers hervorkommen, die in derſel-

---

[1]) Lauth ſagt, daß er den Stamm der oberen Intercoſtalvenen der linken Seite in die V. jugularis communis sinistra, oder auch in die V. thyreoidea, und ſogar in die V. phrenica habe übergehen ſehen. Haller beſchreibt als Regel, daß die rechte und die linke obere Intercoſtalvene in die Vena subclavia übergehe, und zwar nach außen neben der V. mammaria; auf der rechten Seite ſollen nach ihm ſeltener Abweichungen von dieſem Verlaufe vorkommen, als auf der linken. Auf der linken Seite mundete ſie auch einmal gemeinſchaftlich mit der V. mammaria, und einmal trat ſie in die thyreoidea.

[2]) Wenn auch die Blutgefäße der Zwiſchenrippenräume nicht in der Nähe der Wirbelſäule in dieſer Lage ſind, ſo nehmen ſie doch dieſelbe jeder Zeit weiter vorn an.

Digitized by Google

ben mit den Venen in Verbindung stehen, welche aus dem Rückgratcanale in die Wirbel eindringen.

Außer den Zwischenrippenvenen, nehmen die Vena azygos und die V. hemi-azygos an unbestimmten Stellen an ihrer vorderen Seite die gleichfalls der Zahl und Größe nach sehr unbestimmten kleinen Speiseröhrenvenen, venae oesophageae, die kleinen Herzbeutelvenen, venae pericardiacae, und die Luftröhrenvenen, venae bronchiales, ferner Venen von den in der Nachbarschaft gelegenen Lymphdrüsen, und zuweilen sogar Venen vom Zwerchfelle auf, durch welche sie mit den in die Vena cava inferior sich mündenden Zwerchfellvenen in einige Verbindung kommen. Unter diesen kleinen Venen sind die Bronchialvenen hinsichtlich ihrer Zahl, Größe und Lage vorzüglich veränderlich, weil das Blut, das sie, nachdem es zur Ernährung der Lungen und zur Absonderung des Schleims und des Brustfellwassers gedient hat, aus den Lungen zurückführen sollen, nicht selten in andere, dunkelrothes Blut führende, und sogar in die hellrothes Blut führenden Venen geleitet wird.

Plexus venosi spinales [1]). Rückgratvenennetze.

Längs der ganzen Wirbelsäule, sowohl im Canale derselben, als außerhalb, liegen, wie kurz zuvor erwähnt worden, große Venennetze, welche sich vom Kopfe bis zum Ende der Wirbelsäule erstrecken, und seitwärts an den Zwischenwirbellöchern ihren Abzug nach vorn in Venen nehmen, die vorn an der Wirbelsäule, oder seitwärts neben ihr gelegen sind, und durch die ihr Blut in die obere und untere Hohlader gebracht wird. Diese der Länge der Wirbelsäule nach laufenden Venen, welche das Blut jener Netze aufnehmen, sind am Halse auf jeder Seite, die Vena vertebralis superficialis und profunda, in der Brust die Venae azygos und hemi-azygos, im Unterleibe die Vena lumbalis ascendens, im Becken die Vena sacra lateralis und sacra media. Sie bilden zu beiden Seiten der Wirbelsäule 2 Reihen von der Länge nach laufenden Venenstämmchen, von welchen immer das eine da anfängt, wo das andere aufhört, und welche die zahlreichen querlaufenden Venen unter einander verbinden.

Die erwähnten Venennetze liegen theils in der Wirbelsäule, an der Wand des Rückgratcanals angeheftet, theils äußerlich am Rückgrate, und vorzüglich an seiner hinteren Seite zwischen den Stachelfortsätzen und Querfortsätzen.

Die Venennetze des Rückgratcanals, plexus venosi spinales interni. Sie stehen oben mit den Sinubus des Schädels in Verbindung, und haben an den Zwischenwirbellöchern am Halse durch die Vena vertebralis profunda und superficialis, an den des Rückens durch die Venae intercostales, an den der Lenden durch die Vena

---

[1]) *Gilb. Breschet*, essai sur les veines du rachis: Im Concours pour la place de chef des travaux anatomiques vacante à la faculté de médecine de Paris. Paris 1819. 4. p. 1 — 18. und sein Hauptwerk: Le système veineux, auf 16 zahlreichen Tafeln.

Digitized by Google

lumbales, und am Kreuzbeine durch die Vena sacra lateralis ihren Abfluß.

Sie liegen theils (als venae spinales internae anteriores) an der vorderen von den Wirbelkörpern, theils (als venae spinales internae posteriores) an der von den Wirbelbogen gebildeten Wand des Rückgratcanals.

Die vorderen Venennetze des Rückgratcanals [1]) haben sehr viel Aehnlichkeit mit den an der Grundfläche des Hinterhaupt- und Keilbeins gelegenen sinubus durae matris, d. h. mit den Venen des fester angewachsenen Theiles der harten Hirnhaut, also mit dem später zu beschreibenden Sinus occipitalis anterior, Sinus cavernosus, weniger aber mit denjenigen Sinubus, welche in den vorspringenden Falten der harten Hirnhaut befindlich sind.

Sie liegen nämlich unbeweglich an dem sehnigen Ueberzuge derjenigen Oberfläche des Rückgratcanals, welche die Wirbelkörper demselben zukehren, und den man theils Ligamentum longitudinale anterius, theils, wo er dünner ist, Knochenhaut der Wirbelsäule nennt, und befinden sich folglich nicht dicht an der Dura mater des Rückgrats, denn diese ist als ein langer cylindrischer Schlauch in dem Rückgratcanale ziemlich frei aufgehangen.

Weil sie aber daselbst von einer Lage von Sehnenfasern bedeckt werden, so kann man sagen, daß sie wie jene Sinus der harten Hirnhaut in dem sehnigen Ueberzuge selbst befindlich sind. Sie haben daher auch die Eigenthümlichkeit, welche alle Venen auszeichnet, die unbeweglich und zwischen wenig nachgebenden Theilen eingeschlossen liegen. Sie haben keine einzelne unterscheidbare äußere Haut, sondern bestehen fast nur aus der durchsichtigen glatten inneren Haut, welche hier die von diesen Venen eingenommenen Zwischenräume unmittelbar zu überziehen scheint.

Was ihre Gestalt und Zahl anlangt, so sind es 2 der Länge nach durch den Wirbelcanal herabgehende Stränge von netzförmig verflochtenen Venen, die an der Mitte jedes Wirbels unter einander communiciren, und also selbst eine Kette von großen Venenkränzen darstellen, von welchen jeder von der Mitte des einen Wirbelkörpers zur Mitte des nächsten reicht. Die Venen, welche jeden dieser Stränge bilden, sind so verflochten, daß sie, wenn sie durch eingespritzte Flüssigkeiten ausgedehnt werden, nur sehr enge Zwischenräume zwischen sich lassen, die zum Theil enger sind, als die Venen selbst, eine Einrichtung, welche ihnen ein ganz eigenthümliches Ansehen verschafft. An den Halswirbeln ist dieses Ansehn am auffallendsten, in den Kreuzwirbeln dagegen haben diese Venen noch am meisten das Ansehn anderer Venen. In Kindern sind diese Netze dichter als in Erwachsenen. Wenn sie in den Halswirbeln dicker als anderswo sind, so darf man deswegen nicht glauben, daß das Blut dahin seinen Abfluß nehme, sondern vielmehr, daß von dort her mehr Blut abzuführen ist. Ueberhaupt fließt das Blut in diesen der Länge des Rückens nach laufenden Strängen nicht hauptsächlich der Länge nach, sondern diese Netze haben vorzüglich ihren Abzug mittels der querlaufenden, durch die Intervertebrallöcher gehenden Venen. An jedem Zwischenwirbelloche stehen diese Netze mit den sogleich zu beschreibenden hinteren Venennetzen des Rückgratcanals in Verbindung, und öffnen sich daselbst in die Wirbelvenen, Intercostalvenen, Lendenvenen und Kreuzbeinvenen. An der Mitte jedes Wirbelkörpers nehmen sie dagegen die aus dem schwammigen Gewebe der Wirbelkörper herausgehenden, ziemlich großen Knochenvenen (veines basi-vertebrales nach Breschet) auf, die sich im Wirbel horizontal ausbreiten, oft eine Art von Bogen bilden, und durch einige im Rückgratcanale an der Mitte jedes Wirbelkörpers sehr sichtbare große Oeffnungen aus der schwammigen Substanz jedes Wirbelkörpers in den Rückgratcanal gelangen. Manche von den in dem Wirbel zertheilten Venen dringen auch an der vorderen Seite der Wirbelkörper hervor, und setzen dadurch die im Wirbelcanale befindlichen Venennetze in einige Ver-

[1]) Plexus veineux rachidiens longitudinaux antérieurs, oder grandes veines rachidiennes longitudinales anterieures (Venae longitudinales anticae thecae vertebralis) nach Breschet in seiner Schrift: Le système veineux, p. 13.

Digitized by Google

bindung mit den vor der Wirbelsäule gelegenen Venen. Im Innern der Knochen fehlt diesen Venen die äußere Haut.

Die hinteren Venennetze des Rückgratcanals, venae spinales internae posteriores [1]). Ein Netz von Venen, welches an der harten Rückenmarkhaut und vor den Ligamentis intercruralibus, also hinter dem in seiner harten Haut eingehüllten Rückenmarke liegt, erstreckt sich vom Kopfe bis zum Ende der Wirbelsäule. An den Brustwirbeln besteht es deutlich aus 2 der Länge nach neben einander herablaufenden Venen, die an oder neben jedem Wirbelbogen durch quere, zuweilen ziemlich einfache, oft netzförmig verflochtene Venen unter einander verbunden sind und dadurch eine Kette senkrecht liegender Venenkränze bilden. An den Halswirbeln, Lendenwirbeln und Kreuzwirbeln sind diese Venenkränze nicht so einfach als an den Rückenwirbeln, sondern jeder Kranz besteht aus durch dichte Anastomosen sehr verflochtenen Venen.

In diese Venen gehen zwischen den Querfortsätzen und seitwärts neben den Ligamentis flavis zahlreiche communicirende Zweige von den außerhalb des Wirbelcanals hinten am Rückgrate befindlichen, nun sogleich zu beschreibenden Venennetzen. Außerdem empfangen diese Venengeflechte zahlreiche kleine Venen von der weichen und der harten Rückenmarkhaut. Auch stehen sie mit den vorderen Venennetzen des Rückgratcanals in vielfacher Verbindung, und ergießen ihr Blut in die aus dem Rückgratcanale durch die Intervertebrallöcher austretenden Venen, die die daselbst austretenden Nerven umgeben.

Venae spinales externae posteriores, venae dorsi spinales, nach Breschet [2]), äußere Venennetze an der hinteren Seite der Wirbelsäule. An den Stachelfortsätzen der Wirbelsäule und an den Querfortsätzen der Bogen befinden sich 2 Venennetze, welche die ganze Länge der Wirbelsäule einnehmen und am Halse (plexus venosus colli posterior [3]) dichter und verwickelter, an den Brustwirbeln aber zuweilen hier und da unterbrochen und kleiner sind, die die tiefen Venen des Rückens aufnehmen, mit den Venennetzen in dem Wirbelcanale vielfach anastomosiren, und ihren Abzug durch die neben den Zwischenwirbellöchern vorbeigehenden Venenäste haben. Da sie von Wirbel zu Wirbel unter einander zusammenhängen, so hat es an manchen Stellen das Ansehen, als verliefen einige Venenstämme dieses Netzes der Länge nach hinter den Querfortsätzen und neben den Stachelfortsätzen. Indessen scheint das Blut mehr quer als der Länge nach zu laufen, und diese der Länge nach liegenden Venen sind nur als zusammengesetzt aus einer Reihe anastomosirender Zweige zu betrachten.

Venae spinales externae anteriores. Vorzüglich am Halse und am Kreuzbeine ist die vordere Oberfläche der Wirbelsäule mit Venennetzen bedeckt, die am Halse ihren Abzug in die Vena vertebralis, am Kreuzbeine in die Vena sacra lateralis und sacra media haben. Am Halse nannte sie Sömmerring Plexus venosi colli anteriores. Die letzteren führen das Blut der an der vorderen Seite des Halses gelegenen Muskeln zurück, stehen an den Zwischenwirbellöchern mit den andern Venennetzen der Wirbelsäule und zuweilen auch mit den Venen des Pharynx in Verbindung.

Oberer Theil der oberen Hohlvene.

Der obere Theil der Vena cava superior, welcher über der Stelle

---

[1]) Plexus rachidiens postérieurs, oder retia venosa postica thecae vertebralis, verbunden mit den veines longitudinales rachidiens postérieures oder venae longitudinales posteriores thecae vertebralis des *Breschet* (Système veineux. S. 26 und S. 27.)

[2]) *Breschet*, le système veineux. p. 28.

[3]) Nach Sömmerring Gefäßlehre. S. 461.

Digitized by Google

liegt, an welcher ſich die Vena azygos von hinten her begiebt, führt, wie ſchon oben bemerkt worden iſt, alles Blut zurück, welches durch die nach oben gehenden 3 großen Aeſte des Aortenbogens zum Kopfe, Halſe, zu den Armen, zu der vorderen Wand des Rumpfs und zu einigen in der Bruſthöhle gelegenen Theilen vertheilt worden iſt. Der Stamm der Vena cava superior entſteht im oberſten Theile der Bruſthöhle hinter dem Knorpel der oberſten rechten Rippe, indem daſelbſt die rechte gemeinſchaftliche Droſſelvene, vena jugularis communis dextra, mit der linken zuſammenkommt. Weil jede dieſer beiden Venen auf ihrer Seite das Blut von den nämlichen Theilen aufnimmt, zu welchen es die A. anonyma der rechten Seite vertheilt, ſo nennen manche Anatomen dieſe Venen auch Venae anonymae oder innominatae, oder andere nennen die ganze Vene von dem oberſten Theile der Achſelhöhle bis zur Vena cava superior, Schlüſſelbeinvene, vena subclavia, nicht bloß, wie hier geſchieht, den Theil, welcher vom oberſten Theile der Achſelhöhle bis zur Stelle reicht, wo die Vena jugularis interna aufgenommen wird.

Die rechte und linke gemeinſchaftliche Droſſelader, vena jugularis communis dextra und sinistra.

Dieſe beiden Venen ſind ihrer Länge und Richtung nach ſehr verſchieden. Die linke iſt nämlich mehr als noch einmal ſo lang als die rechte, und geht von der Stelle über dem vorderen Theile der erſten linken Rippe faſt quer und nur ſehr wenig ſchief nach der Gegend des Knorpels der 2ten rechten Rippe in der Nähe des Herzbeutels hinab, und liegt auf dieſem Wege über dem Aortenbogen, vor den aus dem Aortenbogen hervorgehenden 3 großen Arterienſtämmen und vor der zwiſchen dieſen Arterienſtämmen gelegenen Luftröhre und hinter dem oberen Rande des Bruſtbeins. Die rechte gemeinſchaftliche Droſſelader geht faſt ſenkrecht ein wenig vorwärts vor der Stelle über dem Knorpel der 1ſten rechten Rippe zu dem nämlichen Orte herab, und vereinigt ſich mit der linken, und bildet dadurch die obere Hohlvene. Jede V. jugularis communis wird durch den M. scalenus anterior von der hinter dieſem Muskel liegenden A. subclavia geſchieden, und nimmt 3 am Halſe emporſteigende Venenſtämme, die Wirbelvene, V. vertebralis, die innere Droſſelader, V. jugularis interna, und die äußere Droſſelader, V. jugularis externa, auf, und ſetzt ſich dann in die zu der Achſelhöhle übergehende Schlüſſelbeinvene, V. subclavia, fort. Es iſt aber ſchon erwähnt worden, daß viele Anatomen dieſe und die V. jugularis communis zuſammengenommen Schlüſſelbeinvene nennen.

Digitized by Google

Kleine Venen, die zuweilen in die Vena cava oder in die Vena jugularis communis gehen.

Das Blut, welches von der vorderen Wand des Rumpfs und von einigen Theilen in der Bruſthöhle zurückgeführt wird, fließt theils in den oberſten Theil des Stammes der Vena cava superior, theils in ie Vena jugularis communis, oder auch in die Aeſte derſelben.

Die Vena intercostalis superior dextra ergießt ſich entweder in die V. subclavia dextra, oder in die V. azygos; die V. intercostalis superior sinistra ergießt ſich meiſtentheils in die Vena subclavia sinistra, bisweilen in die Vena hemi-azygos.

Die Venae bronchiales, die bei der Ernährung der Lungen mitwirkenden Venen, führen das Blut von den Lungen und Luftröhren zurück, welches die A. A. bronchiales hingeführt haben. Auch nehmen ſie Ramos oesophageos auf. Ihre Größe, Zahl und Endigung iſt ſehr unbeſtimmt. Die dextra ergießt ſich oft in den oberſten Theil der V. azygos, die dextra inferior, wenn ſie da iſt, in dieſelbe, oder in die cava superior; die sinistra in die V. intercostalis superior sinistra, ſeltener in die azygos, oder in die thyreoidea inferior. Zuweilen fehlt eine oder die andere dieſer Venen, weil ſich ihre Zweige frühzeitig mit einer von den Venis pulmonalibus vereinigen.

Venae oesophageae.

Die superiores dextrae gehen oft zur V. thyreoidea inferior, zur V. cava, zur azygos, oder zur bronchialis dextra; die sinistrae zur subclavia sinistra, zur hemi-azyga, zur bronchialis sinistra.

Die Venae mammariae internae haben mit den Schlagadern deſſelben Namens einerlei Gang und Vertheilung.

Die dextra ergießt ſich in die V. cava sup., oder die jugularis communis dextra; die sinistra in die V. jugularis communis sinistra.

Venae thymicae, Venen der Thymus. Die dextra ergießt ſich in die V. cava, oder in die V. jugularis sinistra, oder in die mammaria dextra; die sinistra in die jugularis sinistra, oder mammaria sinistra ꝛc.

Venae mediastinae, kleine Venenäſte, die am mittlern Theile der Bruſthaut vertheilt ſind, gehen zur Vena cava, oder zur jugularis communis sinistra, oder zu den mammariis internis, oder zur azygos und hemi-azygos, oder zu den pericardiaco-phrenicis, oder zu den thymicis, oesophageis, bronchialibus ꝛc.

Venae pericardiacae ergießen ſich in die Ramos pericardiacophrenicos und phrenico-pericardiacos der V. V. mammarium internarum, oder in die phrenicas, oesophageas, bronchiales, mediastinas, oder in die jugularis communis sinistra und azygos.

Digitized by Google

Venae phrenicae superiores von der obern Fläche des Zwerchfelles gehen zu den Ramis pericardiaco-phrenicis, phrenico-pericardiacis, und musculo-phrenicis der V. V. mammariarum internarum.

Venen des Halses und des Kopfs [1]).

I. Die an jeder Seite der Wirbelsäule des Halses liegende **Wirbelvene**, Vena vertebralis, die der A. vertebralis entspricht, ist die am tiefsten und am meisten verborgen liegende Vene des Halses. Sie ist in der Regel eine doppelte: eine Vena vertebralis superficialis, die **oberflächliche Wirbelvene**, welche dicker ist und außerhalb der Löcher der Querfortsätze und hinter ihnen liegt, oft die Hinterhauptblutader, V. occipitalis, aufnimmt und immer mit den oben erwähnten hinteren Venennetzen am Rückgrate des Halses in Verbindung steht, und die Vena vertebralis profunda, **die tiefe Wirbelvene**, welche durch die Löcher der Querfortsätze der Halswirbel hindurchgeht, neben der A. vertebralis vom großen Hinterhauptloche herabsteigt, und oben mit den Sinubus der Schädelhöhle am großen Hinterhauptloche in Verbindung steht. Zuweilen öffnen sich diese beide Vertebralvenen einzeln in die V. jugularis communis, zuweilen öffnen sie sich aber auch, nachdem sie sich zuvor vereinigt haben. Sie nehmen das Blut aus den dem Hinterhauptloche näheren Venen der harten Hirnhaut aus der Schädelhöhle, ferner aus den Netzen des Wirbelcanals, und aus den an der hinteren und vorderen Seite der Wirbelsäule gelegenen Venennetzen auf.

II. Die an jeder Seite des Halses liegende Vena jugularis interna, **innere Drosselvene**, wird vom M. sternocleidomastoideus und omohyoideus bedeckt, entspricht der A. carotis, neben welcher sie etwas mehr nach außen liegt. Sie ist mit ihr und mit dem Nervus vagus, der zwischen der A. carotis und dieser Vene liegt, durch Zellgewebe zu einem Fascikel verbunden, so daß man diese 3 Theile sehr leicht gemeinschaftlich aufheben kann, und liegt weder so tief, wie die V. vertebralis, noch so oberflächlich, wie die V. jugularis externa, und ist also die mittlere Vene des Halses. Während indessen die A. carotis communis, mit welcher sie verglichen werden muß, außer den 2 Hauptzweigen, in welche sie sich theilt, gar keine Zweige hat, nimmt die V. jugularis interna meistens unten **die mittlere Schilddrüsenvene**, V. thyreoidea media, und oben die obere Schilddrüsenvene, V. thyreoidea superior, auf, mit welcher sich sehr häufig die vom Pharynx kommende V. pharyngea, und zuweilen auch die aus dem Kehlkopfe kommende Vene, Vena laryngea, verbindet. Oben in der Nähe der Stelle, wo sich die A. carotis communis spaltet, vereinigen sich auch 2 Hauptzweige der V. jugularis interna mit einander.

---

[1]) *Joh. Gottl. Walther*, de venis capitis et colli. In ej. obss. anat. Berolini 1775. p. 57.

Digitized by Google

1. Der obere und hintere große Zweig derselben, welcher das Blut durch das Drosseladerloch, foramen jugulare, aus der Schädelhöhle abführt, und deswegen Gehirnvene, vena cerebralis, heißen kann, kann in aller Rücksicht mit der A. carotis interna oder cerebralis verglichen werden.

2. Der andere, mehr vorn liegende große Zweig derselben, die Antlitzvene, vena facialis communis, liegt unter dem Winkel des Unterkiefers in der Gegend der Theilung der A. carotis communis. Sie hat einen sehr kurzen Stamm, der zuweilen sogar fehlt, denn ihre beiden großen Zweige treten erst nahe an der Stelle, wo sie sich in die V. jugularis begiebt, zusammen. Sie würde dasselbe Blut zurückführen, welches die A. carotis externa oder facialis vertheilt, und ihr also entsprechen, ginge nicht meistens die obere Schilddrüsenvene in den Stamm der V. jugularis interna, wäre ferner nicht die Stelle, wo sich die Vena lingualis, die Zungenvene, und die Schlundkopfvene, vena pharyngea, öffnen, sehr veränderlich, und hätten endlich nicht die Hinterhauptvenen ihren Abzug durch die Vena jugularis externa und durch die Vertebralis superficialis. Denn vermöge dieser Einrichtungen fließt nicht alles das Blut durch die Vena facialis communis zurück, welches durch die A. carotis facialis zu den Theilen hingeflossen ist.

In der That ergießen die Vena pharyngea, die Schlundkopfvene, und die Zungenvene, vena lingualis, ihr Blut bald gemeinschaftlich mit der V. thyreoidea, oder neben ihr in die V. jugularis interna, bald mit der V. submentalis in die Vena facialis anterior oder communis, bald allein in die V. facialis posterior, und nach Meckel sollen sie sich sogar in den aus dem Foramen jugulare herabsteigenden Zweig der V. jugularis interna münden.

Die beiden Hauptzweige der V. facialis communis, die vordere und hintere Antlitzvene, sind in ihrer Größe sehr veränderlich. Dieses rührt daher, weil sie auch mit der V. jugularis ext. durch dicke Verbindungszweige in Communication stehen. Durch diese Verbindungszweige nimmt zuweilen das Blut seinen Abfluß in die V. jugularis externa. Daher erscheint die hintere Antlitzvene sehr oft als ein Ast der V. jugularis externa, und dasselbe findet bisweilen, wiewohl seltener, bei der vorderen Antlitzvene Statt. In diesem Falle stehen jedoch beide Venen immer mit der V. facialis communis auch in Verbindung. Auch scheint es zuweilen an getrockneten, künstlich angefüllten Adern nur so, als ginge eine von diesen Antlitzvenen in die V. jugularis externa über, ohne daß es wirklich der Fall ist, dann nämlich, wenn die eingespritzte Flüssigkeit zufälliger Weise diese Nebenwege stärker als die Hauptwege ausgefüllt hat.

Digitized by Google

A. Die vordere Antlitzvene, vena facialis anterior, entſpricht ziemlich der A. maxillaris externa, und läuft hinter ihr vom innern Augenwinkel an unter dem M. zygomaticus hinweg bis zu dem Aſte des Unterkiefers. Ueber der Naſe hängt ſie mit der der andern Seite zuſammen, und vorzüglich an 2 Stellen verbindet ſie ſich mit den Venen der Augen- und Schädelhöhle.

Erſtlich am inneren Augenwinkel mit der an der Decke und an der inneren Wand der Augenhöhle liegenden Hirnaugenvene, vena ophthalmica cerebralis, welche hinten durch die Fissura supraorbitalis mit den Venen der harten Hirnhaut im Schädel, namentlich mit dem Sinus cavernosus ununterbrochen zuſammenhängt, ſo daß wahrſcheinlich (was in manchen Krankheitsfällen wichtig zu ſein ſcheint) durch Entziehung von Blut aus den in der Nähe des inneren Augenwinkels gelegenen Venen, z. B. aus den Stirnvenen, unmittelbarer als an vielen anderen Stellen des Kopfs ein Abzug von Blut aus dem Gehirne bewirkt werden kann.

Zweitens, durch einen unter dem Wangenbeine an der Fissura orbitalis inferior zur vorderen Geſichtsvene kommenden tiefliegenden Venenzweig, ramus profundus, mit der in der Augenhöhle an der unteren und äußeren Wand liegenden Geſichts-Augenvene, vena ophthalmica facialis. Dieſer tiefe, beträchtlich große Venenzweig iſt mit den ſehr kleinen Communicationszweigen der A. maxillaris externa zu vergleichen, welche unter dem Jochbeine hinweg zu den Aeſten und Netzen der A. maxillaris interna gehen. Er nimmt auch die Vena infraorbitalis, die Vena sphenopalatina und die Vena alveolaris superior auf, und ſteht immer mit dem Plexus venosus pterygoideus in Verbindung. Daher iſt es zuweilen ſchwer zu ſagen, in welche von dieſen Venen ſich die in der Nähe der Fissura orbitalis inferior gelegenen Venenäſte öffnen.

Da die an der unteren Seite der Augenhöhle gelegene vena ophthalmica facialis, wie ſpäter gezeigt werden wird, viele Venen des Auges aufnimmt, und durch die Fissura orbitalis superior mit dem Sinus cavernosus der Schädelhöhle verbunden iſt, ſo entſteht durch dieſen Venenaſt eine Communication der Gehirnvenen, der Venen des Auges und der des Geſichts.

Auf dem beſchriebenen Wege vom inneren Augenwinkel bis zum Aſte der Kinnlade treten außerdem in die vordere Antlitzvene, vena facialis anterior, nach Walter, die Stirnvenen, venae frontales, welche ſelbſt wieder mit der durch das Foramen supraorbitale hervorkommenden Vena supraorbitalis zuſammenhängen, die obere und untere Naſenrückenvene, Vena nasalis superior und inferior, die innere Unteraugenliedvene, vena palpebralis inferior interna, die Naſenflügelvenen, venae alares nasi, die auch mit den Venen der Naſenſchleimhaut zuſammenhängen, die äußere Unteraugenliedvene, vena palpebralis inferior, externa, die Oberlippenvenen, venae labiales superior.

res, welche nicht nur von den Lippen, ſondern auch von den Backen- und Wangenmuskeln und von der Haut des Mundes Blut aufnehmen, und von welchen die Kranzzweige, venae coronariae, in der Mitte der Lippe von beiden Seiten her mit einander communiciren, endlich beſondere kleine Venen von dieſen Geſichtsmuskeln; die Unterlippenvenen, venae labii inferioris, welche zugleich vom Zahnfleiſche und von den in der Nähe gelegenen Geſichtsmuskeln Blut fortführen, und von welchen die Kranzzweige, venae coronariae, gleichfalls in der Mitte von beiden Seiten her mit einander communiciren; die Backenvenen, venae buccales, welche auch von der Ohrſpeicheldrüſe, von in der Nähe gelegenen Lymphdrüſen und vom M. masseter Blut aufnehmen; die Kiefermuskelvenen, venae massetericae; die Unterkinnvene, v. submentalis, die mit der Zungenvene unter der Unterkinnlade anaſtomoſirt und der A. submentalis entſpricht, endlich die Kieferſpeicheldrüſenvenen, venae glandulae submaxillaris. Bisweilen nimmt ſie auch die obere Schilddrüſenvene, die Zungenvene und die Schlundkopfvene auf.

B. Die hintere Antlitzvene, vena facialis posterior, welche vor dem Ohre und durch die Ohrſpeicheldrüſe und hinter dem Winkel des Unterkiefers herabſteigt, dicker als die vordere Antlitzvene iſt, und dem ebendaſelbſt emporſteigenden Ende des Stammes der Carotis externa ziemlich entſpricht, iſt dicker als die vordere Antlitzvene, kommt in den Zwiſchenraume zwiſchen dem Ohre und dem Aſte des Unterkiefers herab und liegt in der Subſtanz der Ohrſpeicheldrüſe, glandula parotis, verborgen.

a. In einiger Entfernung vom Aſte des Unterkiefers empfängt ſie den tieferen Aſt, ramus profundus, welcher der A. maxillaris interna zu vergleichen iſt, indeſſen nicht alles das Blut zurückführt, was dieſe Arterie vertheilt hat, weil die hinter dem Jochbogen und in der Nähe der Fissura spheno-maxillaris gelegenen Venen, welche das von den Aeſten der A. maxillaris interna vertheilte Blut zurückführen, noch durch eine 2te Vene einen Abzug haben, nämlich durch den tiefen Aſt, ramus profundus, der Vena facialis anterior. Der tiefe Aſt der Vena facialis posterior kommt von der unteren Augenhöhlenſpalte her, und geht hinter dem Jochbeine und dem Aſte der unteren Kinnlade zur hinteren Geſichtsvene. Er gleicht mehr einem Geflechte von Venen, als einer einfachen Vene. In dieſes Geflecht, plexus pterygoideus, gehen die mittlere Hirnhautvene, vena meningea media, welche die Aeſte der A. meningea media, nach Breſchet, mit doppelten Zweigen begleitet, ſich jedoch nicht ſelten in einen Sinus der harten Hirnhaut ergießt, nicht immer derſelbe iſt [1]), mehrere tiefe Schläfenvenen, venae temporales profundae, die aus dem Zahncanale hervortretende Unterkiefervene, vena alveolaris s. maxillaris inferior, welche bisweilen doppelt iſt und manchmal auch in einem eignen Canale unter dem für die Arterien beſtimmten Canale läuft, und andere Venen, die den Aeſten der A. maxillaris interna entſprechen. Mit dieſem Geflechte ſteht aber auch der tiefe Aſt, ramus profundus, der vorderen Geſichtsvene in Verbindung.

b. Der oberflächliche Aſt der hinteren Antlitzvene, ramus superficialis, oder der Stamm der Schlafblutadern ſteigt vor dem Ohr

[1]) *Vicq d'Azyr*, Planche XXXV. 19. 20. Walter, von den Krankheiten des Bluts und vom Schlagfluß. Berlin 1785. Tab. I. et II. *Breschet*, Le système veineux. Pl. V. XI. XV.

über der Wurzel des Jochbogens und hinter dem Aſte des Unterkiefers herab, nimmt die mehr vom vorderen Theile des Kopfs kommende tiefe Schlafvene, vena temporalis profunda, und die mehr vom hinteren Theile deſſelben kommende oberflächliche Schlafvene, v. temporalis superficialis, nahe an der Wurzel des Jochbogens auf.

Die tiefe Schlafvene, vena temporalis profunda, nimmt mehrere ſehr oberflächlich in der Haut der Stirn und der Augenlieder verlaufende Venen auf, ihr Stamm liegt aber unter der Aponeurosis des M. temporalis, und ſteht daſelbſt mit den tiefen Schlafvenen des tiefen Aſtes der hinteren Geſichtsvene in Verbindung.

Namentlich ergießen ſich in die tiefe Schlafvene folgende oberflächliche Aeſte: die äußere Augenliedvene, vena palpebralis superior externa, und mehrere Stirnvenen, v.v. frontales, von welchen eine über dem Rande der Augenhöhle ſehr in querer Richtung läuft.

Die oberflächliche Schlafvene, vena temporalis superficialis, liegt in ihrem ganzen Verlaufe in der Haut. Sie entſteht durch das Zuſammenkommen eines hinteren Zweiges, der am Hinterhaupte mit den zur v. jugularis externa und zur v. vertebralis superficialis gehörenden Hinterhauptvenen zuſammenhängt, und dann zwiſchen dem Ohre und der Hirnſchale hingeht, und eines vorderen Zweiges, der mehr ſenkrecht vom Scheitel herunterſteigt. Alle an der Haut des Kopfs ſich verbreitende Venen hängen untereinander vielfach zuſammen.

Außer dieſen Endzweigen gehen in den oberflächlichen Aſt der hinteren Antlitzvene, oder auch zuweilen in ihren Stamm mehrere vordere oberflächliche Ohrvenen, v.v. auriculares anteriores, eine vom Gehörgange kommende tiefe Ohrvene, v. auricularis profunda, eine vordere und hintere Gelenkvene, v. articularis anterior und posterior, vom Untergelenk und den benachbarten Theilen, die hintere Ohrvene, v. auricularis posterior, vom Ohre und der Ohrſpeicheldrüſe, endlich die quere Antlitzvene, vena transversa faciei, und mehrere unbenannte Zweige aus der Parotis und der benachbarten Gegend.

III. Die oberflächliche Droſſelader, vena jugularis externa, iſt die größte Hautvene des Halſes und des Kopfs. Sie iſt in der Regel weit kleiner als die Vena jugularis interna, und ihr Stamm, in welchem ihre Hauptzweige zuſammenkommen, iſt ſo kurz, daß er zuweilen ganz zu fehlen ſcheint und ihre Zweige ſich an einem Punkte in die V. jugularis communis einmünden, oder mehrere derſelben ſich auch einzeln öffnen. So wie aber die meiſten großen Hautvenen mit den tiefer liegenden Stämmen, ſo communicirt auch ſie an gewiſſen Stellen mit den beſchriebenen tiefer liegenden Venen, und zwar vorzüglich mit den oberflächlicheren Aeſten derſelben. Unter Umſtänden, welche nicht ſelten eintreten, geſchieht es nun, daß das Blut oder die Flüſſigkeit, durch welche die Adern nach dem Tode angefüllt werden, ihren Weg durch dieſe communicirenden Aeſte in die Vena jugularis externa nehmen, und dadurch vielen Venen, welche als Aeſte der Vena jugularis

Digitized by Google

interna betrachtet werden, das Ansehn geben, als wären sie Aeste der Vena jugularis externa. Die Zweige, welche in dem meistens äußerst kurzen Stamme derselben nahe am Schlüsselbeine zusammenkommen, sind vordere, mittlere und hintere.

1. Die vorzüglichsten vorderen Zweige der rechten und der linken Vena jugularis externa liegen vorn neben der Mittellinie des Halses, und steigen von dem Raume unter dem Kinne bis zum oberen Rande des Brustbeins ziemlich senkrecht herab (vena mediana colli, nach Breschet), stehen auf diesem Wege und vorzüglich auch unten am Halse mit einander durch einen Communicationszweig in Verbindung, und gehen dann in querer Richtung dicht über dem Schlüsselbeine bis zu dem sehr kurzen Stamme der Vena jugularis externa hin, oder öffnen sich auch besonders in die Vena jugularis interna oder in die communis. Zuweilen stehen sie auch in der Mittellinie des Halses mit der V. jugularis communis sinistra oder mit der aus der V. jugularis communis entspringenden V. thyreoidea inferior in Verbindung. Bisweilen ergießen sich in sie unten auch Venen von der Oberfläche des Brustbeins. Mehrere andere unbestimmtere, ein Netz bildende Hautvenen am vorderen Theile des Halses vereinigen sich mit den beschriebenen Aesten, oder öffnen sich besonders in die Vena jugularis externa. Am Kinne stehen die vorderen Aeste mit den Aesten der V. facialis anterior oder mit dem Stamme der V. facialis communis in Verbindung, an der Schilddrüse und an dem Kehlkopfe vereinigen sie sich oft mit Aesten der V. jugularis interna und communis. Die ganze vordere Oberfläche des Halses ist von ihnen mit einem, weite Zwischenräume habenden Venennetze bedeckt.

2. Der vorzüglichste mittlere Zweig der Vena jugularis externa kommt von dem hinter dem Ohre gelegenen Theile des Hinterhaupts herab, liegt dann auf dem M. sternocleido-mastoideus, steht vorn in der Nähe des Winkels der Kinnlade durch einen Communicationszweig mit der Vena facialis anterior, und durch einen andern mit der V. facialis posterior, zuweilen auch mit der Vena facialis communis in Verbindung, so daß es zuweilen den Anschein hat, als ob diese Venen ihr Blut hauptsächlich in die V. jugularis externa ergießen. Dann geht er nicht weit vom hinteren Rande des M. sternocleido-mastoideus zu dem sehr kurzen Stamme der V. jugularis externa herab.

Die hinteren Aeste der V. jugularis externa gehen als Hautvenen hinten am Halse herab, und kommen zuweilen sogar vom Hinterhaupte. Bisweilen gehen die Venen, welche die A. cervicalis superficialis

Digitized by Google

cialis transversa colli und transversa scapulae begleiten, gleichfalls in die V. jugularis externa.

Venen einiger Theile des Kopfs, welche mit mehreren der beschriebenen Venenstämme in Verbindung stehen.

Venen in der Schädelhöhle.

Die Venenstämme, in welche das Blut aus dem Gehirne, aus der harten Hirnhaut und aus den Hirnschalenknochen zusammenfließt, haben eine ganz andere Lage als die großen Arterien, welche dem Gehirne das Blut zuführen. Diese liegen innerhalb der harten Hirnhaut und an der Grundfläche des Gehirns, jene liegen zwischen den Platten der harten Hirnhaut und im ganzen Umfange des Gehirns. Aber nicht nur die großen Venen begleiten die ihnen entsprechenden Arterien nicht, sondern dasselbe gilt auch von den meisten kleinen Venen. Indessen werden doch die Arteria fossae Sylvii und die Arteria corporis callosi auf einem Theile ihres Weges von entsprechenden Venen begleitet. Die Venenstämme im Schädel liegen entweder in den in seiner Höhle vorspringenden Falten der harten Hirnhaut, oder in dem an den Knochen geheften Theile dieser Haut, und werden Sinus durae matris genannt.

Die in den Falten gelegenen Sinus haben keinen vollkommen kreisförmigen, sondern einen etwas dreieckigen Querschnitt, und sind meistens einfache, nicht in Zweige getheilte, oft sehr dicke Canäle.

Die unter dem angewachsenen Theile der harten Hirnhaut befindlichen Sinus sind kleinere, oft Geflechte bildende Canäle, die mit dem Plexus venosus anterior des Rückgratcanals Aehnlichkeit haben, und auf der Grundfläche des Schädels liegen. Alle Sinus sind unter der harten Hirnhaut oder zwischen ihren Platten befindliche Zwischenräume, welche von der innersten sehr dünnen Haut der Venen ausgekleidet werden. Die harte Hirnhaut sichert hier die Canäle der Venen vor übermäßiger Ausdehnung, und es bedurfte daher dazu der äußeren Venenhaut nicht.

Die Sinus [1]) der Schädelhöhle hängen untereinander auf jeder Seite und von beiden Seiten her zusammen, und haben ihren Abzug vorzüg-

[1]) Abbildungen über die Sinus der harten Hirnhaut findet man bei Vicq d'Azyr, verbunden mit einer sehr vollständigen Literatur, bei Haller (Iconum anat. Fasc. I.) bei Rosenmüller (chirurgisch-anatomische Kupfertafeln), und ganz vorzüglich schön bei Breschet (le système veineux). Haller hat zugleich das gesammelt, was bis auf seine Zeit über diese Venen beobachtet worden war.

Digitized by Google

lich durch die 2 Foramina jugularia in die Vena jugularis, durch das Foramen magnum ossis occipitis in die Vena vertebralis profunda, durch die Fissura orbitalis superior in die V. ophthalmica cerebralis und facialis der Augenhöhle, endlich durch eine Menge nicht immer vorhandener Löcher, emissaria Santorini, namentlich durch die Foramina condyloidea posteriora, mastoidea, parietalia, ovalia, in die benachbarten Venen am Umfange des Kopfs, so daß also einer Hemmung des Rückflusses des Venenbluts aus dem Kopfe sehr vorgebeugt ist.

Drei Sinus, von denen jeder nur einmal vorhanden ist, liegen in der mittleren Ebene, die den Schädel in 2 gleiche Hälften theilt, nämlich:

Der obere Längenblutleiter oder Sichelblutleiter, sinus longitudinalis superior, der größte unter ihnen, welcher da liegt, wo der Processus falciformis am Schädel angewachsen ist. Vorn ist er klein, hinten nimmt er an Größe zu, vorn steht er bei Kindern durch das Foramen coecum mit kleinen Venen der Nase, oben mit Hautvenen des Kopfs mittels kleiner Zweige, die durch die Foramina parietalia gehen, in Verbindung. Hinten im Tentorium cerebelli setzt er sich in den Sinus transversus, vorzüglich der rechten Seite, fort. Er nimmt die Venen von der Oberfläche der beiden Hirnhälften auf, die als viele kleine Venen großentheils schief von hinten nach vorn laufend, und also nicht in der Richtung des Blutstroms gehend, seltener quer, noch seltener schief nach hinten gehend in den Sinus eintreten [1]).

Der untere Längenblutleiter oder Sichelblutleiter, sinus longitudinalis inferior, ist viel kleiner als der obere, gleicht mehr einer gewöhnlichen Vene, läuft im unteren Rande des Processus falciformis von vorn nach hinten, nimmt einige Venen von der inneren Oberfläche der Hemisphären des Hirns auf, und endigt sich in den Zeltblutleiter, sinus quartus. Bisweilen soll er gefehlt haben.

Der Zeltblutleiter, sinus quartus, liegt an der Stelle, wo der sichelförmige Fortsatz mit dem Tentorium cerebelli zusammenstößt, und geht also in der Mittellinie des Zeltes von vorn nach hinten, nimmt vorn nicht nur den Sinus longitudinalis inferior, sondern auch die größte und die tiefste Vene des Gehirns, die Vena magna Galeni, auf. Diese nur einmal vorhandene sehr große Vene wird an dem Eingange in die Ventrikel des großen Gehirns zwischen dem hinteren Rand des Corpus callosum und der auf den Vierhügeln ruhenden Glandula pinealis aus 2 großen Zweigen zusammengesetzt.

Diese 2 großen Zweige laufen nämlich dicht neben einander an der untere

---

[1]) Vicq d'Azyr beobachtete einmal, daß dieser Sinus eine Insel bildete. Bisweilen (der Sinus longitudinalis, wie Sömmerring (Gefäßlehre, S. 441.) erwähnt, hat eine Scheidewand in 2 Sinus getheilt und fast doppelt. Bisweilen ist er inwendig durch kleine quere Vorsprunge in einige Fächer getheilt.

Digitized by Google

Seite des Fornix von vorn nach hinten, und vereinigen sich dann. Jeder derselben gehört einer Hemisphäre des Gehirns an, und wird hinter dem vorderen Schenkel des Fornix zusammengesetzt, theils aus Venen, die an der Seite des Septum pellucidum liegen und aus der Gehirnsubstanz hervorgetreten sind, theils aus Venen, welche den Plexus choroideus des Seitenventrikels begleitet haben und mit ihm durch die Monroische Oeffnung getreten sind. An vielen Stellen der Wände des Seitenventrikels im vorderen, hinteren und im unteren Horn liegen Venenstämmchen, die aus der Substanz des Gehirns hervorkommen, z. B. zwischen dem gestreiften Körper und dem Sehhügel. Manche von ihnen begleiten dann sehr geschlängelt den Plexus choroideus. An der unteren Seite des Hirnschenkels hängen diese im Plexus choroideus des unteren Horns gelegenen Venen mit den Venen an der Grundfläche des Gehirns und mit den die A. corporis callosi begleitenden Venen zusammen. Auf dem Sehhügel treten mehrere Venen aus dem Plexus choroideus unter dem Fornix zu den vorhin beschriebenen 2 Venenstämmen, auch aus dem Sehhügel, dem Corpus striatum und aus dem Balken kommen Aeste hinzu. In den hintersten Theil jener 2 Venen, oder in den Hauptstamm, den sie zusammensetzen, ergießen noch eine Anzahl Venen ihr Blut, welche theils um die Vierhügel herum aus dem hinteren und unteren Horne, theils um den Hirnschenkel und die Brücke herum von der Grundfläche des großen und des kleinen Gehirns, theils mit den processibus cerebelli ad corpora quadrigemina aus der Substanz des kleinen Gehirns, theils endlich von der oberen Oberfläche des kleinen Gehirns kommen. Rosenthal [1]) fand sogar, daß 2 um die Hirnschenkel herumgeschlagene Zweige auf der Grundfläche des Gehirns zwischen den 2 Hirnschenkeln und vor dem chiasma nervorum opticorum unter einander von beiden Seiten her communicirten, und mit der V. corporis callosi, der V. fossae Sylvii und unter einander in Verbindung standen. Breschet hat aber den Verlauf dieser Venen nicht so angegeben. Der Stamm der Vena magna Galeni steigt nun zu dem Sinus quartus empor. In der vorderen Spitze des unteren Horns des Seitenventrikels hängen, nach Breschet [2]), die Aeste der Vena magna Galeni, welche dem Plexus choroideus folgen, mit der Vena corporis callosi und mit der Vena fossae Sylvii zusammen, welche die ihnen entsprechenden Arterien ein Stück begleiten und sich zu den nämlichen Stellen des Gehirns verbreiten, als diese Arterien.

Der Sinus quartus ist daher sehr dick, nimmt zuweilen den Hirnhauptblutleiter, sinus occipitalis, auf, und endigt sich in dem linken oder in dem rechten Querblutleiter, oder an der Stelle, wo beide zusammenstoßen.

Die 2 Hinterhauptblutleiter, sinus occipitales posteriores, laufen wie ein Kranz um das große Hinterhauptloch, und dann an der Sichel des kleinen Gehirns herauf. Unten hängen sie mit den Plexibus venosis der Rückgrathöhle und mit den vorderen Hinterhauptblutadern zusammen, und haben da das Ansehen eines Venengeflechts, oben ergießen sie sich in den Querblutleiter, sinus transversus. In sie öffnen sich vorzüglich Venen des kleinen Gehirns.

Drei unter einander zusammenhängende Sinus, der Sinus transversus, der Sinus petrosus superior und der Sinus petrosus inferior, haben auf jeder Seite eine mehr quere und horizontale Lage und liegen am Hinterhauptbeine, am oberen Winkel und am hinteren Winkel des Felsenbeins. Der Sinus transversus und der Sinus petrosus superior liegen am angewachsenen Rande der großen horizonta-

---

[1]) *F. Rosenthal*, de intimis cerebri venis seu de venae magnae Galeni ramis; cum 2 iconibus. Nova acta physico-medica acad. *Caes. Leopold. Carol.* naturae curios. Tom. XII. pars I. p. 301.

[2]) *Breschet*, le système veineux. Pl. 48. Fig. 2. V.

Digitized by Google

len Falte der harten Hirnhaut, die man Tentorium cerebelli nennt.

Der Querblutleiter, sinus transversus, ist der größte Blutleiter und eine der größten Venen, welche quer über die Mittellinie des Körpers hinweggehen. Er liegt in dem an den Schädelknochen angewachsenen Rande des Tentorium, und erstreckt sich quer über das Hinterhauptbein und über den Angulus mastoideus des Seitenscheitelbeins bis an das Felsenbein, hier verläßt er das Tentorium cerebelli und läuft in der bekannten Rinne der Pars mastoidea des Schlafbeins bis zum Foramen jugulare. Er ist ein Mittelpunkt, in welchem die meisten Sinus unter einander zusammenhängen. Denn an der Protuberantia occipitalis interna nimmt er nicht nur den Sinus longitudinalis superior und inferior, den Sinus quartus und occipitalis posterior auf, sondern an der Stelle, wo das Tentorium an das Felsenbein befestigt zu werden anfängt, ergießt sich auch der Sinus petrosus superior, und vor dem Foramen jugulare der Sinus petrosus inferior in ihn, die selbst wieder mit andern Sinus in Verbindung stehen. Weil nun die rechte und die linke Hälfte desselben sich in einander fortsetzen, so kann auch das Blut von der rechten Seite des Gehirns unter manchen Umständen seinen Abfluß durch die linke V. jugularis haben.

Häufig ist der rechte Querblutleiter weiter als der linke (nach Vicq d'Azyrs, Sömmerrings und Rudolphi's Vermuthung, weil die meisten Menschen auf dieser Seite schlafen, und also das Blut des Sinus longitudinalis während des Schlafs mehr auf diese Seite abfließt). Selten ist der linke weiter. Bisweilen liegen auf einer Seite 2 parallele Querblutleiter unter einander, die sich durch 2 Oeffnungen in den der andern Seite münden. Nach Lieutaud soll der Querblutleiter sogar einmal auf der einen Seite gefehlt haben.

Der rechte und linke obere Felsenblutleiter, sinus petrosus superior, ist doppelt vorhanden, nimmt den ganzen Rand des Tentorium ein, der am oberen Winkel von der Spitze des Felsenbeins bis zu seiner Basis angewachsen ist, und öffnet sich in den Sinus transversus, zuweilen auch in den Sinus petrosus inferior. Er nimmt außer einigen Venen der harten Hirnhaut, Venen vom vorderen und hinteren Lappen des großen Gehirns, vom kleinen Gehirne und von der Brücke auf.

Der rechte und linke untere Felsenblutleiter, sinus petrosus inferior, ist weiter als der obere, liegt in der Furche zwischen dem unteren Winkel des Felsenbeins und dem Grundbeine. Beide stehen hinter dem Sattel mit einander durch eine quere Fortsetzung in Verbindung. Auf jeder Seite ist auch dieser Sinus mit dem Sinus petrosus superior, cavernosus und mit dem Sinus occipitalis anterior in Communication, außerdem gehen Venen der harten Hirnhaut und des vorderen Theils des kleinen Gehirns in ihn hinein.

Der rechte und linke Grundbeinblutleiter, sinus occipitalis anterior (sinus fossae basilaris, nach Breschet) bestehen aus 2 in der Rinne des Grundbeins herabsteigenden Venensträngen, die unter einander an einigen Stellen durch quere Stränge in Verbindung gesetzt

Digitized by Google

sind. Da jeder von diesen Strängen aus geflechtartig getheilten Venen besteht, so haben diese Sinus sehr viel Aehnlichkeit mit den vorderen Venengeflechten im Rückgratcanale, deren Fortsetzung sie sind. Sie nehmen unter andern die aus dem Meatus auditorius internus kommenden Venen des Labyrinthes des Ohrs auf [1]), stehen oben mit dem Sinus petrosus inferior, circularis und cavernosus, unten mit der Wirbelvene in Verbindung.

Der kranzförmige oder elliptische Blutleiter, sinus circularis, liegt an der oberen Seite des Hirnanhangs auf dem Türkensattel, umgiebt wie eine weitere Ellipse die Stelle, wo sich der Trichter in den Hirnanhang einfügt, steht mit dem Sinus cavernosus, mit den Grundbeinblutleitern und mit den oberen Felsenblutleitern in Verbindung. Er nimmt Venen vom Hirnanhange auf. Zuweilen fehlt er ganz, öfter fehlt die vordere oder die hintere Hälfte desselben. Bisweilen ist auch eine von diesen beiden Hälften sehr dünn [2]). Bisweilen dagegen soll er doppelt gewesen sein.

Der rechte und linke zellige Blutleiter, sinus cavernosus, liegt an der Seite des Türkensattels zwischen den Blättern der harten Hirnhaut, und ist durch viele unregelmäßige, querlaufende Fädchen in Zellen getheilt. Durch ihn scheinen die Carotis und der 6te Hirnnerv hindurch zu gehen, nach Breschets Darstellung liegen sie aber nur an ihm an. Beide zellige Blutleiter stehen, nach Beobachtungen, welche Winslow und neuerlich Breschet gemacht haben, durch einen queren, unter der Glandula pituitaria weggehenden Strang unter einander, und durch die obersten Stränge der Grundbeinblutleiter auch mit diesen in Verbindung. Auch mit dem Kranzblutleiter communiciren sie und vertreten zuweilen dessen Stelle. Sie nehmen die Venen vom vorderen Lappen und vom Anfange des hinteren Lappens des großen Gehirns, so wie auch Venen der harten Hirnhaut auf. Das Blut derselben hat nach vorn vorzüglich durch die Vena ophthalmica cerebralis der rechten und der linken einen Ausweg in die Augenhöhle, und von da in die vordere Antlitzvene, nach hinten zu durch die Sinus occipitales anteriores in die Wirbelvene, und durch die Petrosos in die Vena jugularis. Nach Santorini [3]) soll der Zellblutleiter einmal gefehlt haben.

Der rechte und der linke Kleinflügelblutleiter, sinus alae parvae (den Breschet zuerst beschrieben und sinus spheno-parietalis genannt hat) liegt in der Falte der harten Hirnhaut, welche eine Fortsetzung des Tentorium cerebelli ist, an dem hinteren freien scharfen Rande des kleinen Flügels hervorragt und in die Querfurche zwischen dem vorderen und hinteren Lappen des großen Gehirns eingreift. Breschet hat gezeigt, daß eine der größten Gehirnvenen, die Vena fossae Sylvii, welche etwas vor der A. fossae Sylvii liegt, sich in diesem Si-

[1]) Sömmerring, Gefäßlehre, S. 447.
[2]) Sömmerring, a. a. O. S. 446.
[3]) Observationes anatomicae. p. 72.

nus öffnet, und daß er eine Menge Knochenvenen und zuweilen die Vena meningea media, die die Arterie gleiches Namens begleitet, aufnimmt. Man bemerkt daher oft an der unteren Seite des kleinen Flügels eine Furche, die sich in eine am Seitenscheitelbeine neben den vorderen Aesten der A. meningea media in die Höhe gehende Furche fortsetzt, an welcher man eine Menge in die Diploë führende Löcherchen sieht [1]).

Emissaria *Santorini* [2]).

Die Bluthöhlen der Hirnschale haben durch dünne Venen (emissaria *Santorini*), welche durch Löcher der Hirnschale gehen, mit den äußern Venen des Kopfes Gemeinschaft. Diese sind namentlich diejenigen, welche

durch die Foramina mastoidea aus den Sinubus transversis zu den Venis occipitalibus: durch die Foramina parietalia aus dem

---

[1]) *Breschet*, le système veineux. Pl. 34 et 36. B. 45. A. explication, p. 62.

Auch die Blutleiter des Gehirnes sind zuweilen Abänderungen unterworfen. Es soll einmal ein Sinus transversus gefehlt haben (*Lieutaud*, essai anat. p. 385), und ein Sinus cavernosus (*Santorinus*, obs. anat. p. 72.). Häufiger wurden die kleinen fehlend, auch doppelt gesehen, selbst den Sinus falciformis major sahe man zum Theil doppelt. (*Haller*, Elem. physiol. IV. p. 147.) Einen sonderbaren Blutleiter auf jeder Seite, vom Sinus transversus über die Felsenbeine und durch die mittlere Schädelgrube zur Augenhöhle verlaufend, sah Kelch (Beitr. z. pathol. Anat. Berl. 1813. S. 80.).

In dem Schädel eines alten Mannes, in welchem die Eindrücke der Arterien der harten Hirnhaut sehr tief waren, fand Otto auf der linken Seite 2 sonderbare Canäle, anomale Blutgefäße, die eine Verbindung der Hirnvenen mit den äußeren Venen am Kopfe bildeten. Das linke Foram. mast. führte nämlich nicht gerade durch in die Schädelhöhle, sondern vertief zwischen der äußern und innern Knochentafel weit und groß, erst horizontal, $^1/_2$" lang nach vorn, dann immer weiter werdend, bedeutend schräg abwärts und vorwärts, fast bis zum untern Ende des proc. mast. herab, öffnete sich dann zwar innerlich durch ein großes rundes Loch in den untern Theil der Fossa sigmoidea, setzte sich aber als Canal im Schlafbeine weiter fort, und spaltete sich dann in feinere Canäle für die Diploe des Knochens und in einen Verbindungscanal mit einer zweiten anomalen Vene.

Es fand sich nämlich in der Wurzel des Proc. zygom. des linken Schlafbeins, etwa 1''' vor und über dem äußeren Ende der Fissura Glaseri, in der sonst sehr festen Knochenmasse, ein rundes, glattes, wohl $1^1/_2$''' im Durchmesser haltendes Loch, welches zu einem Knochencanale führte, der gerade einwärts bis in die Schädelhöhle drang, sich dann knieförmig rückwärts beugte, als tiefer, etwa $^3/_4$" langer, im Leben von der harten Hirnhaut vervollständigter Halbcanal an der Grenze der vordern Fläche des Felsenbeines und der Schuppe des Schläfenbeines verlief, dann wieder innerlich durch eine dünne Knochentafel bedeckt wurde, weit, und mannigfaltig gewunden in der Diploe des Schläfbeins sich fortsetzte, mit den feinsten Aesten des vorigen venösen Canals zusammenhing, und endlich mit einer bedeutend großen Oeffnung in der Furche des linken Querblutleiters, da, wo er vom Hinterhauptbein zum Schlafbein geht und sich abwärts krümmt, endigte. (Otto, neue seltne Beob. Berl. 1824. 8. p. 70.)

[2]) *Joh. Theoph. Walter*, de emissariis *Santorini*. Vrcf. ad V. 1757. 4. Wegen dieser Verbindung der äußeren und inneren Venen des Kopfs darf man hoffen, daß Blutegel an die Stirn in der Nähe der Nasenwurzel und hinter den Processus mastoideus gesetzt, leichter als anderwärts eine Entleerung der Venen des Gehirns bewirken.

Digitized by Google

Longitudinalis superior zu denſelben; durch die Foramina condyloidea anteriora aus den Transversis zu den Vertebralibus; durch die Foramina spinosa, ovalia und rotunda, aus den Sinubus cavernosis zu den Plexubus pterygoideis; durch Löcher der Siebplatte des Siebbeins in die Venen der Naſe gehen ꝛc.

Dieſe Venen ſind jedoch unbeſtändig: man findet z. E. bald eins oder beide Foramina parietalia verwachſen; bald nur ein Foramen mastoideum, bald mehrere ꝛc. Auch durch das Foramen coecum vor dem Hahnenkamme des Siebbeins gehen bei Kindern dünne Venen aus dem Sinus longitudinalis superior zu den Venen der Naſe.

Die Venae ophthalmicae, da ſie hinten aus dem Sinus cavernosus hervortreten, vorn aber in die Vena facialis anterior übergehen, bringen den Sinus cavernosus mit den Geſichtsvenen in Verbindung.

Venae diploicae, Venen der Schädelknochen [1]).

Im regelmäßigſten Falle fand Breſchet 8 Venenſtämme, welche ſich in der Diploë des Schädels baumförmig zertheilten und unter einander mittels ihrer Zweige zuſammenhingen. Zwei hintere Venae diploicae occipitales, welche unter einander durch einen communicirenden Zweig in Verbindung ſtehen und am Hinterhaupte gegen den Scheitel zu in die Höhe ſteigen, 4 an der Seite des Schädels gelegene, 2 auf der rechten und 2 auf der linken Seite gelegene Venae diploicae, temporales posteriores und Venae diploicae temporales anteriores, endlich 2 ſolche Venen an der Stirn, Venae diploicae frontales. Indeſſen ſind dieſe Venen, nach Breſchet, ihrer Zahl, ihrer Endigung und ihrer Verbreitung nach ſehr veränderlich. So bildet Breſchet die Furchen derſelben an einem Schädel ab, wo nur die Vena diploica temporalis anterior vorhanden war, und die Stelle der posterior vertrat. Die Oeffnungen, durch welche dieſe Venen entweder an der inneren Oberfläche des Schädels mit den Venen der harten Hirnhaut und mit den Sinubus in Verbindung ſtehen, oder an der äußeren Oberfläche deſſelben mit andern Venen in Verbindung ſtehen, ſind enger als die Canäle ſelbſt. Die Canäle, in welchen die Venen liegen, ſind von einer dichteren Knochenlamelle umgeben und von der benachbarten ſchwammigen Subſtanz geſchieden. Dieſe Canäle werden von der über alle Begriffe dünnen und durchſichtigen innerſten Haut der Venen ausgekleidet, ohne daß man etwas von einer äußeren Haut der-

[1]) Breſchet, über neu entdeckte Theile des Venenſyſtems (Nova acta physico-medica Acad. *Caes. Leop. Carol.* Nat. curios. Tom. XIII. Bonnae 1826. und in ſeinem Meiſterwerke: Le système veineux, auf ſehr vielen Platten.

Digitized by Google

ſelben zu bemerken im Stande iſt [1]). Die Vena diploica temporalis anterior öffnet ſich in den Sinus alae parvae. Die Venen der Diploë haben keine Arterien zu Begleitern.

Venen des Auges und der Augenhöhle, Venae ophthalmicae.

Jedes Auge hat 2 Venas ophthalmicas, eine cebralis, welche dicker, und eine facialis, welche dünner iſt.

1. Vena ophthalmica cerebralis, Hirnaugenvene. Ihr vorderes Ende öffnet ſich am innern Augenwinkel in das obere Ende der Vena facialis anterior. Von hier geht ſie in der Augenhöhle an der innern Seite des Augapfels unter der Rolle des M. trochlearis rückwärts, krümmt ſich dann über den Sehnerven hinter dem Augapfel hinüber, gelangt ſo an die äußere Seite des Sehnerven, ſteigt hier rückwärts hinauf über den Anfang des M. rectus externus, und ergießt ſich durch den innern Theil der Fissura orbitalis superior in den Sinus cavernosus: ſelten in den circularis. Auf dieſem Wege ſteht ſie durch mehrere [nach Walter [2]) durch 3] Communicationszweige mit der Vena ophthalmica facialis in Verbindung.

Die Vena ophthalmica cerebralis nimmt, wenn man vorzüglich Walters Unterſuchungen berückſichtigt, von vorn nach hinten nach und nach folgende, in vieler Hinſicht ſehr veränderliche Venen auf. Eine Vene, vena sacci lacrymalis, vom Thränenſacke und von den anliegenden Theilen am innern Augenwinkel. Die vordere Naſenvene, vena ethmoidea anterior, aus dem vordern Foramen ethmoideum, welche dünner iſt als die posterior, und bisweilen fehlt. Die Thränendrüſenvene, vena lacrymalis, welche die obere Wirbelvene der Aderhaut, vena vorticosa superior, aufnimmt. Die hintere Naſenvene, vena ethmoidea posterior, aus dem hinteren Foramen ethmoideum; Venen von den Augenmuskeln, venae musculares, die ſich an verſchiedenen Orten in die Vena ophthalmica cerebralis, theils auch in die lacrymalis, und in die ethmoidea posterior ergießen; Venae ciliares, ergießen ſich an verſchiedenen Orten, theils auch in Venas musculares ꝛc. Die Vena centralis des Sehnerven, ergießt ſich in den hintern Theil der Vena opht. cerebralis, und in einigen Körpern in den Sinus cavernosus.

---

[1]) Bei der Trepanation werden bisweilen durch Verletzung der Hauptſtämme derſelben heftige, ſchwer zu ſtillende Blutungen erregt. Siehe Th. I. S. 324.

[2]) *Walter*, epistola ad *Will. Hunterum*: de venis oculi (zugleich deutſch). Berolini 1778. 4.

Digitized by Google

2. Vena ophthalmica facialis. Ihr oberes Ende kommt aus dem Sinus cavernosus, unter der V. ophthalmica cerebralis. Von diesem geht sie durch den innern Theil der Fissura orbitalis superior in den hintern Theil der Augenhöhle, in diesem bis zur Fissura orbitalis inferior, und ferner in die Fissura spheno-maxillaris hinab, wo sie die Vena infraorbitalis aufnimmt, die aus der hintern Oeffnung des Canalis infraorbitalis zu ihr kommt und 2 Wirbelvenen der Aderhaut, venae vorticosae, empfängt. Dann verbindet sich mit der Vena ophthalmica facialis die vom Foramen spheno-palatinum kommende Vena spheno-palatina, und so entsteht dann der tiefe Ast der Vena facialis anterior, der unter dem Jochbeine in's Gesicht geht.

Aeste der Vena ophthalmica cerebralis und facialis, welche aus dem Augapfel hervorkommen.

Diese schon zum Theil gelegentlich erwähnten Venen sind die Venae ciliares und die Vena centralis retinae. Venae ciliares heißen diejenigen Venen, welche die Sklerotika durchbohren, in der Aderhaut, im Corpus ciliare und in der Iris vertheilt sind. Nachdem sie die Sklerotika durchbohrt haben, empfangen sie feine Aestchen an der auswendigen Fläche derselben. Sie endigen sich theils mit dickeren, theils mit dünneren Stämmen in der Vena ophthalmica cerebralis, in der V. ophthalmica facialis, in der V. communicans prima, oder auch in Ramis muscularibus, in der V. lacrymalis, in der Centralis.

Einige Venae ciliares posticae, meistens 4, seltener 5, heißen Vasa vorticosa, werden in der vorderen Hälfte der auswendigen Fläche der Aderhaut aus büschelförmig sich vereinigenden Aesten zusammengesetzt, deren einige vorwärts zum vordersten Theile dieser Fläche der Aderhaut und zur Iris, andere seitswärts, andere noch mehr gekrümmt erst seitwärts, dann wieder rückwärts zum hintern Theile der Aderhaut zwischen den Arteriis ciliaribus posticis fortgehen.

Die übrigen Venae ciliares posticae liegen zwischen den Vasis vorticosis am vordern und hintern Theile der Aderhaut, und bilden ein Netz.

Die Venae ciliares longae, deren gemeiniglich 2 (an jeder Seite des Auges eine) da sind, durchbohren die Sklerotika an ihrem hintern Theile schief, jede in Begleitung eines Nervus ciliaris. Sie kommen von der Iris, gehen durch den Orbiculus ciliaris, und laufen jede an einer Seite zwischen der Sklerotika und der Aderhaut rückwärts, und vertheilen sich also fast eben so, als die Arteriae longae sich zur Iris vertheilen.

Digitized by Google

Die Venae ciliares anticae endigen sich in die Muskelvenen, welche die M. M. rectos begleiten, kommen von dem vordern Theile der auswendigen Fläche der Sklerotika, wo sie unter einander verbunden sind und Aeste, welche die Sklerotika zwischen den Flechsen der M. M. rectorum und dem Rande der Hornhaut durchbohren, und unter dem Orbiculus ciliaris aus der Iris hervorkommen, aufnehmen.

Die Vena centralis ist eine dünne Vene, die sich im Sinus cavernosus, seltener in dem hintern Theile der Vena ophthalmica cerebralis endigt. Sie entsteht am Ende des Sehnerven, auf der inwendigen Fläche der Nervenhaut, aus vielen netzförmig verbundenen Aestchen, die die Nervenhaut inwendig bedecken und an der vordern Gränze der Nervenhaut mit den Venen des Corpus ciliare, des Glaskörpers und der Krystallinse Gemeinschaft haben. Sie liegt nahe am Augapfel, in der Mitte des Sehnerven, und tritt weiter hinten aus der Mitte desselben unter seine Scheide, geht in derselben an der Oberfläche des Nerven eine Strecke vorwärts fort, und gelangt endlich durch die Fissura orbitalis superior zu dem Sinus cavernosus.

Venen der unpaaren Theile am Halse, Venae thyreoideae, Vena lingualis und pharyngea.

Die Venae thyreoidea nehmen von der Schilddrüse, dem Kehlkopfe, theils auch vom Schlunde ꝛc. Aeste in sich auf.

Die Superior geht an jeder Seite der Schilddrüse vom obern Theile derselben auswärts in die V. jugularis interna, oder in die V. facialis.

Die Media geht an jeder Seite vom mittlern Theile derselben auswärts in die V. jugularis interna.

Die Inferior geht an jeder Seite vom untern Theile derselben abwärts in die Vena jugularis communis sinistra, und die rechte in einigen Körpern in den Winkel, in welchem die Vena jugularis communis dextra und sinistra zusammenkommen. Oft ist noch eine Inferior impar da, welche vom mittlern untern Theile der Schilddrüse abwärts in die Vena jugularis communis sinistra oder in den Winkel geht, in welchem die Vena jugularis communis dextra und sinistra zusammenkommen.

Vena lingualis, die Zungenvene. Von jeder Seite des hintern Theiles der Zunge kommt eine Vena lingualis zur Vena jugularis interna, oder zur Vena facialis communis, oder zur posterior. Sie nimmt vom Rücken unter der Zunge und am Zungenbeine Aeste auf. Der größte Zweig ist die Vena profunda oder ranina. Die Vena lingualis läuft im Munde ziemlich oberflächlich an der unteren Seite

Digitized by Google

der Zunge neben dem Zungenbändchen zwischen dem M. genioglossus und mylohyoideus, und geht dann über dem M. hyoglossus quer hinweg.

Venae pharyngeae, die Schlundkopfvenen, öffnen sich in die V. jugularis interna, oder in die Facialis communis, oder in die Facialis posterior. Häufig vereinigen sie sich mit der V. lingualis oder mit der V. thyreoidea superior. Breschet sah auch, daß sich Venen des Pharynx in die V. vertebralis ergossen. Sie stoßen an der hinteren Wand des Pharynx von beiden Seiten her zusammen.

Venen des Arms [1]).

Schlüsselbeinvenen, Venae subclaviae.

An jeder Seite des Halses liegt eine Vena subclavia, eine dicke Vene, welche die Fortsetzung der Vena axillaris ist, und als solche quer einwärts vor dem M. scalenus anticus hergeht, und mit der Vena jugularis interna sich vereinigend, sich in die V. jugularis communis ergießt. Sie ist, weil sie vor dem M. scalenus dicht hinter dem Schlüsselbeine, und nicht, wie die A. subclavia, zwischen dem M. scalenus anticus und medius hingeht, viel kürzer als die Arterie gleiches Namens, und nimmt daher auch viele Venen, die den Aesten der A. subclavia entsprechen, z. B. die V. mammaria interna, thyreoidea inferior, cervicalis superficialis und meistens auch die V. vertebralis nicht auf. Oft ergießen sich indessen in dieselbe die Vena intercostalis superior, die Vena transversa scapulae und colli, welche letzteren Venen aber auch bisweilen mit der Vena jugularis externa in Verbindung stehen. Da wo die Vena subclavia unter dem Schlüsselbeine in die Achselhöhle hervortritt, liegt sie nach innen und unten neben der A. subclavia, welche von ihr und dem höher

[1]) Hinsichtlich der Venen des Armes hat Otto folgende Abweichungen gesammelt. Man sah die Vena subclavia einmal doppelt. (*Morgagni* epist. 69. 2.) Die Vena cephalica fehlt zuweilen ganz, oder endigt sich am untern Ende des Deltamuskels. (Otto, path. Anat. 1. Bd. p. 348. No. 27.)

Die Vena mediana fehlt nicht nur oft, sondern ist auch häufig doppelt, und wird auf die mannigfaltigste Art von der Cephalica und Basilica zusammengesetzt. Zuweilen läuft von der Mediana ein großer Venenstamm zwischen der Cephal. und Basil. etwa in der Mitte bis zur Schulter hinauf, in eine oder die andere von diesen oder in beide sich einmündend. (Otto a. a. O.)

Petr. Camper, demonstrationes anatomico-pathologicae. Lib. I. Amst. 1760. Fol.

oben liegenden Plexus nervorum brachialium in die Mitte genommen wird.

Vena axillaris.

Die Vena axillaris, die Fortsetzung der vorigen, kommt mit der A. axillaris aus der Achselgrube, und geht einwärts in die Vena subclavia über. Sie nimmt meistentheils folgende, mit den eben so benannten Arterien übereinkommende Venen auf: die Vena scapularis inferior, die Venae mammariae externae, und außerdem einige Hautvenen des Arms, die Vena cephalica, die Vena basilica und endlich die Vena brachialis.

Hautvenen des Arms, Venae cutaneae brachii.

Venennetze der Hohlhand, rete volare manus.

Zwischen der Aponeurosis palmaris und der Haut der Hohlhand liegt ein Rete venosum volare, mit welchem die Venae digitales volares Gemeinschaft haben; die obersten Venen desselben gehen in das Rete venosum an der Beugeseite des Unterarms über.

Venennetze des Handrückens, Rete dorsale manus.

Auf dem Handrücken liegen, zwischen der Haut und den Flechsen der Ausstreckmuskeln, mehrere dicke Venen, welche das sogenannte Rete dorsale ausmachen, welches aber bei verschiedenen Menschen sehr verschieden gestaltet ist. Dieses Rete nimmt die Venas digitales dorsales auf.

Eine Vene dieses Netzes, welche in der Gegend zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und dem des Zeigefingers liegt, wird Vena cephalica pollicis, eine andere, in der Gegend zwischen dem Mittelhandknochen des kleinen und des vierten Fingers, Vena Salvatella genannt.

Vena cephalica, basilica, mediana.

So nennt man die dicken Venas subcutaneas des Arms, welche im Panniculus adiposus desselben, nur von der Haut bedeckt, liegen.

Die Vena cephalica kommt aus dem Rete dorsale, geht in der Gegend des Radius, so daß sie allmählig vom Latus extensorium des Unterarms sich auf das Latus flexorium desselben lenkt, bis zur Pars radialis des Ellenbogengelenks, dann ferner am äußern Rande des M. biceps, und oben zwischen dem vordern Rande des M. deltoides und dem M. pectoralis major hinauf, und ergießt sich endlich in die Vena axillaris, oder in die Vena subclavia, oder in die Vena jugularis externa. Sie ist die Hautvene, welche nahe an dem Rande

Digitized by Google

des Vorderarms und an der Seite des Oberarms hinläuft, wo unten an der Hand der Daumen liegt.

Sie hat zuweilen mit der Vena subclavia oder der jugularis externa durch die Vena cephalica parva, welche zwischen dem M. pectoralis major und dem Scalenus hinaufsteigt, Gemeinschaft.

Bisweilen ist sie eine Fortsetzung der Vena cephalica pollicis, in andern einer andern Vene des Rete dorsale. Meistens geht die größere Menge des Bluts, das sie führt, am Ellenbogen durch die V. mediana in die Basilica hinüber. Daher ist ihr zwischen dem M. deltoideus und M. pectoralis major gelegenes Stück meistens dünner. In der Nähe des Schlüsselbeins nimmt sie die Vena acromialis bisweilen auf.

Die *Vena basilica* kommt auch aus dem Rete dorsale, geht in der Gegend der Ulna, so daß sie allmählig vom Latus extensorium des Unterarms sich auf das Latus flexorium desselben lenkt, bis zur Pars ulnaris des Ellenbogengelenks, ferner am innern Rande des M. biceps nach der Achselgrube, und ergießt sich daselbst in die Vena axillaris. Nahe bei ihrer Endigung in die Axillaris nimmt sie die V. circumflexa auf, welche von hinten sich zur Achselgrube herumschlägt.

Sie läuft daher näher an dem Rande des Vorderarms und an der Seite des Oberarms hin, wo unten an der Hand der kleine Finger liegt.

Die *Vena mediana*, welche gemeiniglich dicker ist, als die basilica und cephalica sind, ist gemeiniglich eine Vena communicans dieser beiden. Sie geht nämlich in einigen Körpern aus der Vena cephalica höher oder tiefer am Unterarme aus, steigt am Latus flexorium schräg gegen die Vena basilica hinauf, legt sich am Ellenbogengelenke auf die Aponeurosis M. bicipitis, so daß sie daselbst auch auf der Flechse dieses Muskels und auf der von jener Aponeurosis bedeckten Arteria brachialis liegt, und geht dann, ferner schräg aufsteigend, in die Vena basilica.

Bisweilen ist die Vena mediana eine Fortsetzung der V. cephalica pollicis, und hat dann mit der V. cephalica, die eine Fortsetzung einer andern Vene des Rete dorsale ist, nur mittelbare Gemeinschaft. Bisweilen ist sie nur kurz, indem sie aus der cephalica hoch entspringt.

Diese Venen wählen gemeiniglich die Wundärzte beim Aderlassen, meist ihrer vorzüglichen Dicke wegen. Aber die Eröffnung derselben erfordert, wie man sieht, viele Vorsicht, weil die am Ellenbogen unter ihr liegenden Theile leicht verletzt werden können.

Gemeiniglich ist noch eine Vena communicans, dünner, als die mediana, da, welche unterhalb des Ellenbogengelenks aus der media-

Digitized by Google

na kommt, schräg aufwärts gegen die cephalica geht, und in der Gegend des Ellenbogengelenks, oder über demselben, sich in die cephalica ergießt. Man nennt sie Vena mediana cephalica.

Uebrigens liegen am Latus flexorium des Unterarms mehrere dünnere Venae subcutaneae, welche sich meist in die Vena mediana, theils in die basilica und cephalica ergießen, und unter einander Gemeinschaft haben. Bisweilen sind eine oder 2 größere Nebenvenen, die mit der Vena basilica meist parallel hinaufgehn, und sich in die Vena mediana ergießen, vorhanden.

Auch am Latus extensorium des Unterarms sind mehrere dünnere Venae subcutaneae, welche mit der Vena basilica und cephalica und unter einander Gemeinschaft haben, befindlich.

Tiefliegende Venen des Arms.

Venae radiales, ulnares, interosseae. Vena brachialis.

Diese Venen, welche mit den Schlagadern in der Tiefe zwischen den Muskeln liegen, sind viel dünner, als die subcutaneae. Gemeiniglich werden die Arteria radialis, ulnaris, interossea, jede von 2 Venen begleitet, welche dicht neben ihr liegen. Sie haben durch Venas communicantes Gemeinschaft mit den Venis subcutaneis und unter einander, und wie ihre Schlagadern aus der Arteria brachialis, gemeiniglich am Ellenbogengelenke, entspringen, so ergießen sich ebendaselbst gemeiniglich diese Venen in die Vena brachialis.

Die Vena brachialis begleitet die Arteria brachialis, nimmt die Vena profunda brachii, die Venas collaterales auf, welche mit den gleichnamigen Schlagadern gleichen Gang und Vertheilung haben. Gemeiniglich ist sie anfangs doppelt, wird aber nachher einfach, und ergießt sich endlich in die Vena axillaris.

Die Aeste der untern Hohlvene, Vena cava inferior [1].

Die Vena cava inferior führt das Blut der Beine und des Unterleibes zum Herzen zurück, indem sie sich von unten her in die vordere oder rechte Nebenkammer desselben ergießt. Immer ist sie dicker als die V. cava superior.

---

[1] Petsche (Sylloge obs. anat. Diss. Haller. VI. 776.) fand, daß sie sich oberhalb der Vena renalis in 2 gleich große Aeste theilte, welche auf der Aorta lagen, durch einen Queraft communicirten, und dann weiter ins Becken herabstiegen.

J. E. Wilde sah eine doppelte aufsteigende Hohlader, zwischen denen die Aorta lag. (Comm. petrop. XII. 1750. p. 312.)

J. E. Pohl (observat. angiolog. de venis, Progr. 1733. p. 8.) sah eine

Sie entsteht im untern hintern mittlern Theile der Bauchhöhle, an der vordern Fläche des 5ten Bauchwirbels (oder vor dem Knorpelzwischen

doppelte Hohlader, wovon jeder Stamm auf seiner Seite der Aorta lag. Doch erstreckte sich die Theilung nicht über die Vena renalis hinaus.

Ein ähnlicher Fall wird von Lobstein (de nervo spinali ad par vag. access. Argent. 1760.). erzählt.

Einen interessanten Verlauf der unteren Hohlvene beschreibt und bildet ab J. D. Herholdt (Beschr. sechs menschl. Mißgeburten. Kopenhagen 1830. 4. mit 1 Kpft.). Sie stieg wie im normalen Zustande durch den Bauch in die Höhe, und bildete in der Gegend des obersten Brustwirbels einen Bogen nach der linken Seite, um sich von hinten über den linken Bronchus zu schlingen, vereinigte sich dann mit der obern Hohlvene, wie gewöhnlich die Azygos, und ging in einem gemeinschaftlichen Stamme zum rechten Atrium. Von der linken Nierenvene zog sich ein Zweig von beträchtlicher Größe aufwärts, in derselben Richtung, wie gewöhnlich die Hemi-azygos, durch das Zwerchfell und die Brust, nahm die Vena intercost. der linken Seite auf und ging hinter der Aorta in die untere Hohlvene, neben dem 9ten Rückenwirbel.

Sehr merkwürdig ist folgende Abweichung. (*Gurlt*, Diss. de venarum deformitatibus, ad nexovitii rarioris venae cavae infer. exempl. Vratisl. 1819. 4. Otto neue seltne Beob. Berl. 1824. 4. S. 68. sq.

Die untere Hohlvene stieg nicht, wie gewöhnlich, rechts neben der Aorta zur Leber auf, sondern nahm mehr den Lauf der Vena hemi-azygos und azygos, und endigte sich so in die obere Hohlader. Die Venae iliacae communes vereinten sich nicht, wie gewöhnlich, vor dem 4ten oder 5ten Lendenwirbel zum Stamme der unteren Hohlader, sondern erst nach Empfang der Nierenvenen, und zwar vor dem 2ten Lendenwirbel. Der so gebildete Stamm der Vena cava infer. wendete sich dann auf dem ersten Lendenwirbel hinter der Aorta weg nach links, so daß er an der linken Seite der Aorta und hinter dieser durch den Hiat. aort. des Zwerchfells in die Brusthöhle trat, hier vor dem Rückgratsende der 5 untern linken Rippen in die Höhe stieg, sich dann vor dem 9ten und 8ten Rückenwirbel hinter der Aorta und dem Duct. thor. wieder zur rechten Seite der Wirbelsäule lenkte, und nun im Laufe der Vena azygos fortging, und endlich, wie diese, dicht oberhalb des Herzbeutels von rechts und hinten her sich in die Vena cava superior einsenkte. Sie empfing auf diesem Wege alle Venen, die sonst die Vena cava infer., die Hemi-azygos und die Azygos aufnehmen. Die Lebervenen vereinigten sich zu einem etwa fingerdicken Stamme, der das Zwerchfell durchbohrte, und sich in dem rechten Vorhofe, da, wo sonst die Cava infer. sich einmündet, endigte.

Einen ganz ähnlichen Fall sah Otto (ebendas. S. 69.) in der Sammlung des Prof. Jaffry in Glasgow, nur mit dem Unterschiede, daß die Vena cava an ihrem unteren Ende nicht so früh gespalten war, und daß noch eine eigne große Vena hemi-azygos vorhanden war, die sich in die linke Vena jug. thorac. nahe vor deren Theilung einmündete.

Auch ist dem von Weber (Rust's Magaz. f. d. ges. Heilk. B. XIV. S. 536. Meck. Arch. 1829. S. 8.) beschriebenen Falle verlief die Cava infer. wie die Azyga, und mündete in die Cava sup. ein. Die Hepaticae sammelten sich zu einem eignen Stamme, der durch das Loch der Vena cava im Zwerchfelle trat und in den rechten Vorhof einmündete, wie sonst die untere Hohlvene.

In einem andern von Otto (neue seltne Beob. S. 70.) beschriebenen Falle spaltete sie sich schon beim Abgange der Nierenvenen auf dem 2ten Lendenwirbel in die beiden Iliacae communes. Die rechte lief ohne Abgabe größerer Aeste auf der rechten Seite der Aorta gerade herab, legte sich zwischen die Art. hypog. und Iliaca comm. und spaltete sich neben dem Promont. in die Becken- und Schenkelvene. Die linke V. il. comm. lief gleich über den Stamm der Aorta weg nach links, gab die linke Nebenniereu- und Nierenvene ab, kam an der äußeren Seite der linken Art. iliaca comm. zu liegen, und spaltete sich ebenfalls neben dem promont. in ihre beiden Aeste.

In einigen Fällen sah man sie aus dem linken Vorhofe entspringen (*Ring*, in med. and phys. journ. Vol. XIII. p. 120., *Lemaire'* in Bullet. des sc. méd. Tom. V. 1810.)

Fälle, wo sie die Lebervenen nicht aufnahm, so daß diese als ein eigner Gefäß-

Digitized by Google

dem 4ten und 5ten Bauchwirbel), hinter der Arteria iliaca dextra (also um ein Wirbelbein tiefer, als die Theilung der Aorta), und weiter nach rechts, dadurch daß die Vena iliaca dextra und sinistra zusammenkommen; geht dann, außerhalb und hinter dem Sacke der Bauchhaut, an der vordern Fläche der Bauchwirbel, neben der Aorta, weiter rechts liegend als diese, gerade hinauf, lenkt sich unter der Leber vorwärts und etwas rechts, geht durch die Rinne oder den Canal am hintern Rande derselben, dann sofort durch das Foramen quadrilaterum des Zwerchfelles in die Brusthöhle, in den Herzbeutel, und so zur vordern Nebenkammer des Herzens, indem sie der Vena cava superior entgegenkommt, welche jedoch eine solche Richtung nach abwärts und vorwärts hat, daß sie einen stumpfen Winkel mit der V. cava inferior macht. Da der Herzbeutel dicht auf der oberen Fläche des Zwerchfelles aufliegt, so ist sie, so wie sie durch das Zwerchfell in die Brusthöhle gekommen ist, sogleich im Herzbeutel, und da das Herz mit seiner platten Fläche auf der oberen Fläche des Zwerchfelles ruhet, so erreicht sie auch alsbald den Ort ihrer Endigung am untern Theile der vordern Nebenkammer, so daß also kaum noch ein Theil derselben in der Brusthöhle liegt.

Auf ihrem Wege bis zur Leber nimmt sie nur die Venas lumbares, die Venas renales, die Vena spermatica dextra (die sinistra geht in die V. renalis), die Vena suprarenalis dextra (die sinistra geht in die Vena renalis) auf.

Erst indem die Vena cava inferior durch die Leber geht, so ergießen sich in dieselbe die Venae hepaticae, und durch diese erhält sie mittelbar das Blut der Viscerum chylopoëticorum. An der untern Fläche der Leber nimmt sie im Embryo den Ductus venosus auf. Im Durchgange durch das Zwerchfell empfängt sie die Venas phrenicas inferiores.

Aber sie empfängt daselbst keine Venen, die der A. mesenterica inferior, der Mesenterica superior und der Coeliaca entsprächen, denn die Vena portae, welche unten beschrieben werden wird, führt das Blut aus allen diesen Eingeweiden, zu welchen sich diese Arterien verbreiten, in die Leber.

Venae phrenicae.

Ihrer sind 2, 3 oder 4. Sie entstehen aus Aesten an der concaven Fläche des Zwerchfelles, welche meist die Aeste der Zwerchfellarterien begleiten, und ergießen sich in die Vena cava inferior dicht unter dem Zwerchfelle; bisweilen eine oder die andere zwischen den Lagen der Fasern, und sogar über der converen Fläche desselben. Die letzteren, welche sich auf der gewölbten Seite des Zwerchfelles bisweilen ausbreiten, nennt

stamm sich in das Herz einsenkten, auch wo sie doppelt oder ungemein hoch getheilt, so wie ihrer Lage nach verkehrt gefunden wurde, sehe man bei Otto (a. a. O. 349.)

Breſchet Venae phrenicae superiores. Die Venen, die der rechten und linken Hälfte des Zwerchfells angehören, ſtehen in der Mitte unter einander in Verbindung.

Die Lebervenen, venae hepaticae.

Indem die Vena cava inferior durch die Leber geht, nimmt ſie am oberen Rande 2 oder 3 größere, und ſchon vorher in der Fossa venae cavae viele kleinere Venas hepaticas auf, welche das Blut aus der Leber zurückführen. Selten geht eine Vena hepatica durch das Zwerchfell und oberhalb deſſelben in die Vena cava inferior.

Die Nierenvenen, venae renales [1])

Die 2 Venae renales ſind dicke Aeſte der Vena cava inferior, welche das Blut von beiden Nieren zurückführen. Sie ergießen ſich von beiden Seiten in die Vena cava inferior, in der Gegend der Arteriarum renalium, und unter einem beinahe rechten Winkel, ſo daß ſie gegen die Aorta hin ein wenig aufwärts ſteigen. Die linke geht gemeiniglich vor der Aorta vorbei.

Wegen der Lage der Vena cava nach der rechten Seite iſt die rechte kürzer, die linke länger. Die rechte ergießt ſich gemeiniglich tiefer.

Jede Vena renalis empfängt aus dem Hilus ihrer Niere die Nierenäſte; die linke nimmt zugleich von unten die Vena spermatica, von oben die Vena suprarenalis ihrer Seite auf, und iſt daher dicker, als die rechte.

Im Verhältniß gegen die Arterias renales iſt ihre Haut ungemein dünn, und ihre Höhle ungemein weit.

---

[1]) Albin (annot. acad. lib. VII. cap. 2. p. 34.) ſah in einem Erwachſenen die linke Nierenvene nicht, wie gewöhnlich, vor der Aorta, ſondern hinter derſelben laufen. Anfangs lag ſie auch hinter der Nierenarterie, dann aber trat ſie nach vorn, und verlief vor derſelben zur Niere. Sie ward von der Aorta ſo an die Wirbelſäule angedrückt, daß der Blutlauf von der Niere nach der Hohlader hin nur ſehr unvollſtändig ſein konnte.

Zwei ähnliche Fälle berichtet Sandifort (obs. anat. path. Lib. I. Lgd. Bat. 1777. p. 81.). Im erſten Falle entſprang die linke Nierenvene weit tiefer als gewöhnlich aus der Hohlvene, lief hinter der Aorta weg, und ſtieg ſchief nach oben zur Niere ihrer Seite. Im zweiten Falle war dieſelbe ſo zuſammengedrückt, daß man ſie kaum finden konnte. Sie entſprang aus der Hohlvene nahe an ihrer Spaltung in die beiden Iliac. und ſtieg in ſehr ſchiefer Richtung aufwärts nach ihrer Niere hin.

Einiger anderer Fälle dieſer Art erwähnt auch Haller (Elem. phys. VII. p. 267). Mancherlei Varietäten der Nierenvene, namentlich das Mehrfachwerden, hat *Sandifort*, observat. anat. path. Lib. IV. p. 98. sq. Mehrere der wichtigſten bildet J. F. Meckel in ſ. Tab. anat. path. ab. Fleiſchmann (Leichenöffnungen. Erlangen 1815. S. 225.) erzählt eine ſehr ſeltſame Abweichung derſelben.

Digitized by Google

Die inneren Samenvenen, venae spermaticae internae [1].

Die beiden Venae spermaticae internae kommen im männlichen Körper von den Hoden, im weiblichen von den Eierstöcken, den Muttertrompeten und der Gebärmutter. Sie sind eng und von ansehnlicher Länge, doch viel weiter als ihre Schlagadern.

Im männlichen Körper kommt jede Vena spermatica von ihrem Hoden, aus der Scheidenhaut desselben, in der Scheidenhaut des Samenstranges bis zum Bauchringe hinauf. Sie geht dann durch denselben in die Bauchhöhle, ferner vor den Vasis iliacis, dem Ureter und dem Psoas, dicht an der auswendigen Fläche der Bauchhaut, zum hintern Theile der Bauchhöhle hinauf. Vom Hoden bis zum Bauchringe ist sie in viele Aeste getheilt, welche netzförmig mit einander verbunden sind, und ein Adergeflechte, plexus pampiniformis, ausmachen, das die Schlagader, und am untern Theile des Samenstranges die Aeste derselben umgiebt. Weiter oben ergießen sich diese Aeste in einen Venenstamm.

Im weiblichen Körper kommt jede Vena spermatica interna größtentheils von ihrem Eierstocke, theils von der Trompete, theils von dem Uterus, geht dicht an der auswendigen Fläche der Bauchhaut, vor den Vasis iliacis und dem Psoas, hinauf. Der untere Theil dieser Vene bildet auch hier einen Plexus pampiniformis, der die Schlagader und deren Aeste umgiebt. Der obere Theil ist ein einfacher Venenstamm.

Sowohl im weiblichen als im männlichen Körper nimmt jede Vena spermatica kleine unbeständige Aeste von der Bauchhaut, vom Harngange ꝛc., und gemeiniglich oben auch eine Vena subrenalis auf, welche die Niere umzingelt, und so vom obern zum untern Ende der Niere herumkommt, indem sie aus dem umgebenden Zellgewebe und Fette Aeste aufnimmt.

Endlich ergießt sich im weiblichen und im männlichen Körper fast beständig die rechte Vena spermatica in die Vena cava inferior, die linke in die renalis, jene gemeiniglich in die Vorderseite der Vena cava, diese in die untere Seite der Vena renalis. Die, welche sich in die V. cava ergießt, geht unter einem spitzigen Winkel in dieselbe über.

Bisweilen findet man an einer oder an beiden Seiten auch eine Vena spermatica interna secundaria, welche sich in die Vena suprarenalis ergießt.

---

[1] *A. Monro*, Diss. de semine et testibus. Edinburgi 1755. Tab. I. fig. 2. bildet sie ab, und zeigt, daß die des männlichen Körpers Klappen besitzen, daß diese denen des weiblichen Geschlechts, welche dem äußeren Drucke nicht so sehr ausgesetzt sind, fehlen. Die Venen des Hoden siehe bei *Albin*, Annot. acad. Lib. II. Tab. VII. fig. 1. 2. 3. schön abgebildet.

Digitized by Google

Die Nebennierenvenen, venae suprarenales.

Gemeiniglich kommt von jeder Nebenniere eine dünne Vene, welche in der inwendigen braunen Masse derselben entspringt, in derselben nach und nach Seitenäste aufnimmt, und dann in der Furche der vordern Fläche fortgeht. Die rechte ergießt sich in die Vena cava inferior, die linke in die linke Vena renalis.

Die Lendenvenen, venae lumbares.

Die Venae lumbares sind 3 bis 4 dünne Aeste der Vena cava inferior, welche in ihrem Gange und ihrer Vertheilung sich fast wie die Venae intercostales und wie die gleichnamigen Schlagadern verhalten, und sich von beiden Seiten in dieselbe ergießen. Sie stehen auf jeder Seite durch die senkrecht emporsteigende Vena lumbaris ascendens unter einander und mit der V. azygos und hemi-azygos in Verbindung.

Die Hüftvenen, venae iliacae.

Die Vena cava inferior entsteht, wie gesagt, an der vordern Fläche des fünften Bauchwirbelbeins aus 2 Venen, welche Venae iliacae heißen.

Diese Venen haben im Ganzen denselben Gang und dieselbe Vertheilung, welche die beiden Schlagadern haben, zu denen sie gehören. Sie kommen in einem spitzigen Winkel zusammen, indem jede derselben schräg aufwärts rückwärts einwärts geht. Im weiblichen Körper ist, wegen des breiteren Beckens, dieser Winkel größer.

Jede Vena iliaca liegt neben ihrer Schlagader. Die rechte Vena iliaca an der äußern Seite ihrer Schlagader, die linke aber an der innern der ihrigen.

Jede Vena iliaca wird aus 2 Venen zusammengesetzt.

I) Vena iliaca interna oder hypogastrica, welche aus dem Becken von innen nach außen zu ihrem Stamme hinaufgeht, und hinter der Arterie gleiches Namens liegt.

II) Vena iliaca externa oder cruralis, welche vom Ligamentum Fallopii, also von außen nach innen, zu ihrem Stamme hinaufgeht, und meist in gleicher Richtung mit ihm ist.

I. Vena hypogastrica.

Die Vena hypogastrica liegt neben und hinter der Arteria hypogastrica, und nimmt folgende, die eben so benannten Arterien begleitenden Venen auf: Vena iliolumbalis, die Vena sacra lateralis, die Vena obturatoria, die Vena iliaca posterior, die Vena ischia-

Digitized by Google

dica. Andere Zweige der Vena hypogastrica, die Vena pudenda interna, die Venae haemorrhoidales, die Venae vesicales, ferner im weiblichen Körper noch die Vena uterina [1]) und Venae vaginales bilden große Venennetze, plexus venosi. Ueber alle Erwartung groß sind diese Venengeflechte am schwangeren Uterus, wo sie Walter sehr schön dargestellt hat. Dieses Venengeflecht des Uterus ist aus mehreren, zwischen den Lagen des Uterus concentrisch liegenden Venengeflechten zusammengesetzt. Die verschiedenen genannten Plexus anastomosiren mit einander.

Es ist nur eine Vena dorsalis penis und Clitoridis da, welche mitten auf dem Rücken dieser Theile, zwischen den beiden Arteriis dorsalibus hin, unter der Synchondrose des Schambeins durchgeht, und dann in 2 Aeste sich spaltet, deren je einer in die Vena pudenda interna seiner Seite übergeht.

Eine Vena umbilicalis, als Ast der V. hypogastrica, giebt es nicht, denn die Vena umbilicalis geht zur Leber.

Die Venen, welche der A. sacra lateralis und der A. sacra media zu vergleichen sind, bilden auf der vorderen Oberfläche des Kreuzbeins ein Netz. Die Vena sacra media geht meistentheils in die längere Vena iliaca sinistra, und also nicht genau in den Vereinigungswinkel der V. V. iliacae. Die V. ileolumbalis steht mit den V. V. lumbaribus in genauer Verbindung. Durch die V. lumbalis ascendens steht die V. iliaca mit der V. azygos und hemi-azygos in Communication.

II. Vena cruralis.

Die Vena cruralis geht neben der A. cruralis, vom Schenkel unter dem Ligamentum Fallopii in die Bauchhöhle hinauf.

Als Hauptstamm der Venen des Beins liegt sie an der innern Seite des obern Theiles des Schenkels, nach vorn her zwischen dem M. pectinaeus und dem Psoas, neben der A. cruralis, an der innern Seite derselben, wo sie bloß von der Haut und der Fascia lata bedeckt wird.

Unter dem Ligamentum Fallopii liegt sie nach innen neben der A. cruralis; die rechte lenkt sich im Aufsteigen unter der A. cruralis durch nach rechts, und gelangt an die äußere Seite derselben, indem sie in die Vena iliaca übergeht. Die linke steigt durchgehends an der innern Seite der linken A. cruralis hinauf.

---

[1]) *W. Hunter*, Anatome uteri gravidi, und Walter, von den Krankheiten des Bauchflusses und dem Schlagflusse; Berlin 1783, haben Abbildungen des Venengeflechtes des schwangern Uterus gegeben.

Digitized by Google

Nahe am Ligamentum Fallopii nimmt sie in der Bauchhöhle 2 Aeste auf: 1) Vena epigastrica, 2) Vena circumflexa ilei. Diese beiden Venen haben denselben Fortgang und dieselbe Vertheilung, welche die Schlagadern desselben Namens haben. Die Vena epigastrica liegt weiter nach innen, als die A. epigastrica.

Außerhalb der Bauchhöhle am obern Theile des Schenkels empfängt sie die Vena abdominalis, die Venas pudendas externas und die Vena saphena magna.

Venae cruris, die Hautvenen des Fußes [1].

Venae plantares.

Die beiden Arteriae plantares werden nicht nur von Venis plantaribus begleitet, welche die Venas digitales plantares aufnehmen, und sich in die Venas tibiales posticas ergießen, sondern zwischen der Haut und der Aponeurosis plantaris liegen auch Venae superficiales plantares, welche netzförmig mit einander anastomosirend das Rete venosum plantare ausmachen, mit dem die Venae digitales plantares Gemeinschaft haben. An beiden Rändern des Fußes haben sie mit dem Rete dorsale Gemeinschaft.

Venae dorsales.

Auf der Superficies dorsalis des Fußes liegen zwischen der Haut und den Extensoribus digitorum mehrere, ziemlich dicke, Venen, welche unter einander dergestalt Gemeinschaft haben, daß sie zusammengenommen das sogenannte Rete venosum dorsale ausmachen, welches, eben wie das Rete dorsale der Hand, bei verschiedenen Menschen sehr verschieden gestaltet ist. Dieses Rete nimmt die Venas digitales dorsales auf.

Vena saphena magna.

Die Vena saphena magna ist die Vena subcutanea der innern Seite des ganzen Beins und von ansehnlicher Dicke.

Sie entspringt als ein Theil des Rete venosum dorsale an der

---

[1] Ueber die Abweichungen an den Venen der Füße sagt Otto: die tiefen Venen der untern Extremitäten sind ziemlich beständig, doch spaltet sich die Schenkelvene, wie die Arterie, bald höher, bald tiefer, und die Venen des Unterschenkels sind oft eben so abweichend wie die Arterien.

Die oberflächlichen Venen variiren desto häufiger, indem z. B. die Saphena major auf sehr verschiedenen Stellen die Schenkelbinde durchbohrt, in manchen Fällen sich gleich in Netze auflöst, ohne einen Stamm zu bilden, in andern deutlich zwei ziemlich parallele Stämme darstellt, auch die Vena saphena minor vertritt, wenn diese in seltenen Fällen keinen eignen in der Kniekehle sich einsenkenden Stamm bildet.

Die Venen des Fußes sind ebenfalls den mannichfaltigsten Verschiedenheiten unterworfen.

Digitized by Google

innern Seite des Rückens des Fußes, steigt vor dem innern Knöchel, dann an der innern Seite des Unterschenkels, vor dem M. gastrocnemius internus, ferner an der innern Seite des Kniegelenks, an der innern Seite des Oberschenkels hinauf, und ergießt sich nahe am Ligamentum Fallopii in die Vena cruralis.

Auf dem ganzen Wege nimmt sie von vorn und von hinten viele Venas subcutaneas auf, hat an der vordern und hintern Seite des Unterschenkels durch Venas communicantes mit der Vena saphena parva Gemeinschaft, die sich endlich selbst in sie ergießt. Nahe am Ligamentum Fallopii nimmt sie eine Vena pudenda externa auf.

In einigen Körpern geht eine 2te ansehnliche Vena subcutanea nahe bei der Saphena magna an der innern Seite des Schenkels hinauf, welche sich endlich in diese ergießt.

Vena saphena parva.

Die Vena saphena parva ist die Vena subcutanea der äußern Seite des Unterschenkels, und dünner als die magna. Sie kommt von der äußern Seite des Rückens des Fußes, aus dem Rete dorsale, steigt am äußern Knöchel, ferner an der äußern Seite des Unterschenkels hinauf, nimmt von vorn und hinten Venas subcutaneas auf, die mit der Saphena magna Gemeinschaft haben, lenkt sich hinter dem Kopfe des M. gastrocnemius externus nach hinten, und ergießt sich in der Gegend des Kniegelenks in die V. saphena magna, oder bisweilen in die Kniekehlenvene.

Tiefe Venen des Fußes.

Venae tibiales anticae, tibiales posticae, peroneae. Diese Venen, welche mit den Schlagadern in der Tiefe zwischen den Muskeln liegen, sind dünner als die Saphenae. Gemeiniglich werden die Arteria tibialis antica, tibialis postica, peronea, jede von 2 Venen begleitet, welche dicht neben ihnen liegen. Sie haben durch Venas communicantes Gemeinschaft mit den Venis saphenis und unter einander, und so wie ihre Schlagadern aus der A. poplitea entspringen, ergießen sie sich in die Vena poplitea.

Vena poplitea, diese liegt nach hinten und etwas nach außen neben der A. poplitea in der Kniekehle, tritt durch die Flechse des Adductor magnus, an der innern Seite des Schenkelknochens vorwärts, und heißt nun Vena cruralis.

Vena cruralis. Die Vena cruralis geht bei der A. cruralis zwischen dem M. triceps und dem Vastus internus hinauf, nimmt die Venas profundas und circumflexas femoris auf, steigt zum Ligamentum Fallopii hinauf ꝛc., wie es oben angegeben worden.

Digitized by Google

Die Pfortader, Vena portarum.

Die schon oben erwähnte Pfortader macht mit ihren Aesten ein besonderes System aus, das mit dem Systeme der Vena cava inferior nur mittelbaren Zusammenhang hat[1]).

Sie wird als rückführendes Gefäß aus allen Venen der Verdauungswerkzeuge zusammengesetzt, und vertheilt sich dann wieder, als zuführendes Gefäß, in der Leber. Sie ist indessen, nach Ph. F. Meckel, nur selten dickhäutiger als die V. cava inferior. Es kommt also alles Blut der Verdauungswerkzeuge in die Pfortader, aus dieser in die Leber, und (nachdem die Galle daraus abgesondert worden) durch die Venas hepaticas in die Vena cava inferior.

Ihre beiden Hauptäste sind die Vena mesenterica und die Vena lienalis.

Die Gekrsvene, vena mesenterica.

Der Stamm der Vena mesenterica liegt neben der Arteria mesenterica superior. Sie wird aus folgenden Venen zusammengesetzt:

1) Venae ileae et jejunales, 2) Vena gastro-epiploica dextra, 3) Vena colica dextra, welche bei den letzteren Venen in nicht seltenen Fällen in einen Venenstamm zusammenkommen, den man Vena gastro-colica nennt, und der sich dann in die Vena mesenterica

---

[1]) Indessen höre ich, daß Schlemm beobachtet hat, daß die Aeste der V. mesenterica minor mit denen der Aeste der Vena cava inferior am After (V. pudenda) in offener Verbindung stehen. Dasselbe hat Breschet wahrgenommen, der die V. mesenterica minor durch die Aeste der V. cava inferior anfüllte. Schlemm macht mit Recht darauf aufmerksam, daß wegen dieses Zusammenhangs der Venen am After mit den Aesten der V. portae, Blutegel an den After gesetzt, vortheilhafter wirken können, um auf die Stockungen des Bluts im Unterleibe zu wirken, als wenn sie an andere Stellen der Haut gesetzt werden.

Regelwidrige Anastomosen der V. portae mit den Aesten der Vena cava inferior hat *Menière* (Archiv. gén. de Méd. Avril 1826. 381.) beobachtet bei einem Manne von 45 Jahren, der keine Beschwerden des Blutlaufs hatte. An der V. iliac. dextra (beider Seiten?) ging ein Venenstamm so dick wie der Zeigefinger am Schaambeine ab, und lief auf dessen oberem Rande zur Lin. alba an dem Nabel vorbei durch das zackige Band der Leber in den Sinus der ausgedehnten V. portae.

Dieser Canal hatte Klappen. Vom Nabel bis zur Leber hatte er keine Klappen, war enger und fester. Die andre Vene und das Herz waren regelmäßig. Einen ähnlichen Fall bewahrt Manee, Prosector am Hospital de pitié. Auch Menière untersuchte ihn.

Bei einem 60jähr. Manne gab die rechte V. iliaca ext. am Schenkelringe 2 Aeste von der Dicke einer Schreibfeder, die sich sogleich vereinigten und durch ihre Schlinge die Art. obturat. gehen ließen, welche die Epigast. gab. Der Stamm, der sehr dünne Häute hatte und sehr weit war, ging geschlängelt zum Nabel, auf seinem Wege von da zur Leber, bildete er unter der Haut der Lin. alba eine Geschwulst von der Größe einer Nuß, und ging sich erweiternd durch die zackige Falte der Bauchhaut zum Sinus der V. port. hep. Die V. umbilic. war obliteriert da. Der Canal hatte zwischen Nabel und V. portae, und vorzüglich an der Geschwulst, dicke faserige Wände. Die Bauchvenen waren außerdem normal.

Digitized by Google

ergießt. 4) Vena colica media, 5) Vena colica sinistra mit der haemorrhoidalis interna, welche auch V. mesenterica minor genannt wird. 6) Einige Venae duodenales und pancreaticae. 7) In einigen Körpern auch die Vena coronaria ventriculi dextra.

Alle dieſe Venen haben denſelben Verlauf, wie die Arterien gleiches Namens; nur die V. mesenterica minor iſt viel länger als die A. mesenterica inferior, der ſie entſpricht und die ſie begleitet, denn ſie ſteigt bis hinter das Duodenum in die Höhe, um zur V. portae zu kommen. Bisweilen vereinigt ſie ſich indeſſen ſchon frühzeitig mit dem Stamme der V. mesenterica major.

Die Milzvene, vena lienalis oder splenica.

Der Stamm der Vena lienalis iſt etwas dünner als der Stamm der mesenterica, liegt neben und unter der Arteria lienalis, geht aber weniger geſchlängelt.

Sie nimmt folgende Venen auf: 1) Rami lienales, 2) Venae breves ventriculi, 3) Vena gastro-epiploica sinistra, 4) Vena coronaria ventriculi sinistra, 5) Venae pancreaticae, 6) Vena colica sinistra ergießt ſich in einigen Körpern in die splenica. Die Vena mesenterica geht ſchräg aufwärts rechts, ſo daß der Stamm der Vena portarum als ihre Fortſetzung anzuſehen iſt; die Vena lienalis geht quer von links nach rechts. So kommen beide hinter dem obern Stücke des Zwölffingerdarms in dem Stamme der Vena portarum zuſammen.

In den Stamm der Vena portarum ergießen ſich gemeiniglich noch die Vena coronaria ventriculi dextra und die Vena duodenalis superior, indem dieſelben erſt in die Vena gastro-duodenalis zuſammenkommen.

Der dicke Stamm der Vena portarum [1]) geht, weiter rechts und weiter hinten liegend als die Arteria hepatica, hinter dem Zwölffingerdarme ſchräg rechts hinauf, tritt an die Pforte der Leber, und dann in den rechten Theil der Fossa transversa. Hier theilt ſie ſich in einen rechten und linken Aſt.

Der rechte Aſt iſt ſehr kurz, und tritt alsbald in das rechte Ende der Fossa transversa. Vor ſeinem Eintritte in dieſelbe nimmt er die Vena cystica auf, die ſich in einigen Körpern in den Stamm ſelbſt ergießt.

Die linke iſt viel länger, geht längs der Fossa transversa hin, bis zum linken Ende derſelben, und tritt in dieſes hinein. Beide Aeſte vertheilen ihr Blut in das Haargefäßnetz, welches die ganze Leber durchdringt. Im Embryo vereiniget ſich der linke Zweig mit dem

[1]) Die Vena portarum iſt viel dicker als die Arteria hepatica, aber dünner als die Vena cava inferior.

Digitized by Google

rechten Aſte der Vena umbilicalis, der ihm entgegenkommt, und von dieſer Vereinigungsſtelle geht ein Gang, ductus venosus, zur V. cava inferior. Dadurch fließt ein Theil des Bluts, ohne in das Haargefäßnetz der Leber zu kommen, in die V. cava inferior. Eine denſelben Zweck habende Einrichtung ſcheint auch bei dem Erwachſenen Statt zu finden. Denn nach **Bertin** und **F. A. Walter** [1]) vereinigen ſich bei ihm in der Subſtanz der Leber mehrere zum Theil nicht unanſehnliche, ſogar 1 Linie weite Aeſte mit Aeſten der Lebervenen, und aus dieſem Grunde gehen auch eingeſpritzte Flüſſigkeiten leicht aus den Lebervenen in die Pfortader, und umgekehrt aus der Pfortader in die Lebervenen über.

Die Vena portarum iſt nebſt den Gallengängen und der Arteria hepatica mit einem feſten Zellgewebe (capsula Glissonii) umgeben; auch iſt ihre eigene Haut ſtärker als die Haut anderer Venen.

Klappen ſind in ihr und ihren Aeſten nicht vorhanden [2]).

Die Nabelvene, Vena umbilicalis [3]).

Die Nabelvene, vena umbilicalis, des Kindes im Mutterleibe nimmt in dem Haargefäßnetze des Mutterkuchens ihren Anfang, läuft

[1]) *Bertin*, in Mém. de l'ac. roy. des sc. de Paris. 1765. *F. A. Walter*, De structura hepatis et vesiculae felleae; in Annot. acad. Berol. 1786. 4. S. 94 sq. Meckel, Hdb. d. Anat. IV. S. 342.

[2]) Bei anderen Säugethieren findet man Klappen im Syſteme der Pfortader, wo Aeſte in Stämme übergehen.

[3]) Man ſehe **Sömmerrings** Gefäßlehre, S. 484 sq., und deſſen Icones embryonum humanorum. Francof. 1790. Fol. Tab. 2. Die Abhandlungen, welche **Sömmerring** daſelbſt anführt, ſind *Albin*, Tabulae septem uteri gravidi. Leidae. — *Roderer*, icones uteri humani. Goettingae 1759. Fol. Tab. III. — *Hunter*, Tabulae uteri gravidi. — *Sandifort*, Observationum anatomico-pathologicorum. Lib. II. Tab. VII. — *Wrisberg*, de structura ovi et secundinarum humanarum. Goettingae 1783. 4. Eine ſchöne Abbildung der Nabelvene findet man auch in **Tiedemanns** Werken über die Arterien auf der letzten Tafel.

Die Nabelvene iſt bisweilen 2-, 3- und mehrfach vorhanden (*Haller*, Elem. phys. VIII. p. 221.), oder ſie tritt auf ungewöhnlichen Stellen in die Leber. So ſah ſie z. B. **Otto** (path. Anat. neue Ausg. p. 350.) mehrmals bei Kindern mit Bauchſpalte am Rande, und ſelbſt auf der obern Fläche der Leber ſich einſenken, und letztern Fall beobachtete auch *Breschet* (medico-chirurg. transact. Vol. IX. 1818. p. 483.)

Roſenthal (Abhdl. a. d. Geb. d. Anat., Phyſ. ꝛc. Berl. 1824. S. 150.) ſah ſie bei einem Fötus mit Nabelbruch in die untere Hohlader gehen. — *Littre* (mém. de l'ac. d. sc. 1709. p. 10.) ſah ſie größtentheils die untere Hohlader bilden. Sie durchbohrte abgeſondert von den Lebervenen das Zwerchfell, und mündete ſich in die obere Hohlader ein; — **Werſe** (de cordis ectopia, Berol. 1819. p. 22.) ſah einen Aſt von ihr in die Leber, den andern in die obere Hohlader gehen. — **Kerkring** (spic. obs. p. 80.) ſah ſie mit einem Aſte in die Leber, mit dem andern in die Gekrösvene, und **Fingerhuth** (bei einem Kalbe, **Meckels** Arch. 1826. p. 111.) ſah ſie in die Miltzvene gehen. In dem Leichname eines etwa 50 Jahre alten, an Bauchwaſſerſucht geſtorbenen, Mannes fand **Otto** (neue ſeltne Beob. Berl. 1824. 4. S. 71) die Nabelvene noch offen, in der Dicke einer Schwanenfeder, und fingerdick werdend, ſich in den linken Aſt der ungewöhnlich dicken Pfortader ein-

Digitized by Google

geschlängelt (wiewohl nicht so sehr, als die sie begleitenden Arterien) mit vielem gallertartigen Zellstoffe (Sulze) umgeben durch den ganzen Nabelstrang, dringt durch den Nabel, umbilicus, in den Unterleib, läuft im unteren Rande des Ligamentum suspensorium der Leber in die Fossa venae umbilicalis an der untern Seite der Leber, die sie wegen der beträchtlichen Größe der Leber sehr schnell erreicht. In dieser Fossa geht sie aufwärts, giebt nach Art der Arterien mehrere, nach Sömmerring bis 20, ansehnliche Aeste links in die Leber, bis sie sich mit dem einen großen Aste in den linken Ast der Pfortader, mit dem andern kleineren, in einer Furche der Leber laufenden ductus venosus in die Hohlvene ergießt. Bisweilen senkt sich ein Theil von ihr in die Gekrösvene. Im Kinde übertrifft die Nabelvene bei weitem die Pfortader an Größe. Nirgends finden sich in ihr Klappen. Der venöse Gang macht mit der Hohlvene aufwärts einen spitzen, unterwärts einen stumpfen Winkel. Er soll bisweilen gefehlt haben. Nach der Geburt schließt sich die Nabelvene gänzlich, so daß sie zuletzt einen rundlichen Strang, das runde Leberband, ligamentum teres, bildet. Gemeiniglich verwächst sie gegen das Ende des 1sten Monats nach der Geburt.

---

mündend. In dieser ganzen Länge war sie mit flüssigem dunkeln, aus der Pfortader kommenden, Blute strotzend angefüllt.

Einige ähnliche Fälle stehen bei Kerkring (spic. obs. p. 21.), Haller (Elem. phys. VI. p. 483.), Hoffmann (Ephem. N. C. cent. 9. et 10. p. 443.). Ueber die Leber hinweg, unmittelbar zum rechten Herzohr gehen sah sie Mende (Nov. act. acad. N. C. Tom. 13. P. II. 1821. S. 869.).

Einmal verband sich mit ihr ein sonderbarer, aus der rechten Vena iliaca entspringender Ast. (*Serres*, in Arch. génér. de méd. Déc. 1823.) Sehr merkwürdig ist aber ein von Herholdt (Beschreib. 6 menschlicher Mißgeburten. Kopenh. 1830. p. 28) beobachteter Fall aus einer Mißgeburt, wo sie den gemeinschaftlichen Hauptstamm für alle Körpervenen ausmachte.

Georg. Ern. Stahl, resp. *Joach. Petr. Jaetke*, Diss. de vena portae, porta malorum, hypochondriaco-splenico-suffocativo-hysterico-haemorrhoidariorum. Halae 1698. 4. In Halleri coll. Diss. anat. Vol. III. p. 131.

Chr. Trawn, Diss. de vena portae. Lgd. Bat. 1715. 4.

Joh. Saltzmann, resp. *Joh. Matth. Fuchs*, theses anatom. phys. de vena portae. Argentor. 1717. 4. *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. III. *p.* 181.

Aug. Fr. Walther, Pr. de vena portae exercitationes anat. P. I. Lips. 1739. P. II. ibid. 1740. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. III. p. 207 et 217.

J. Juncker, Diss. de vena portae, porta salutis. Halae 1742. 4.

Petr. Imman. Hartmann, resp. *Petr. Imman. Frid. Holtzhauer*, de vena portae porta bonorum. Traj. ad Viadr. 1736. 4.

Adlph. Murray, resp. *Sam Froelich*, delineatio sciagraphica venae portae. Upsal. 1796. 4.

Jo. Maur. Hofmann (Prof. Altdorf), de vena portae. Altd. 1687. 4.

Joh. Conrad. a Brunn, anatome peripneumonia cum hemitritaeo defuncti, cum observatione circa venas mesaraicas. Ephemer. nat. cur. Cent. V. et VI. p. 181.

Kr. Hönlein, descriptio anatomica systematis venae portarum in homine et in quibusdam brutis. Mainz 1808. Fol. Vienn. 1810. Fol. c. tabb. aen. — (Ejusd. descriptio venae portarum. Frcf. a. M. 1809.)

Digitized by Google

Von den Saugadern insbesondere.

Ductus thoracicus.

Der Hauptstamm des Systems der lymphatischen Gefäße ist der Ductus thoracicus, der auch bei Einigen Ductus chyliferus, im Deutschen Bruströhre, Milchbrustgang, Milchsaftgang, Speisesaftröhre ꝛc. heißt.

Der Anfangstheil desselben, nämlich der unterste Theil, mit welchem er in der Bauchhöhle anfängt, heißt Receptaculum chyli. Dieser Theil ist in andern Thieren beträchtlich dicker und weiter als seine Fortsetzung, die unter dem Namen des Ductus thoracicus von ihm unterschieden wird, und heißt daher bei ihnen Cisterna chyli, oder Ampulla chyli. Im Menschen ist er vom Ductus thoracicus selbst kaum unterschieden.

Das Receptaculum chyli, d. i. der Anfang des Ductus thoracicus, liegt im hintern mittlern Theile der Bauchhöhle, vom 2ten, 3ten Lendenwirbel bis zum untersten Brustwirbel hinauf, hinter der Arteria renalis dextra, zwischen der Aorta und dem rechten Schenkel des Zwerchfelles, und nimmt die Plexus lumbares, die Vasa chylifera und die übrigen Saugadern des Unterleibes auf [1]).

Der Ductus thoracicus, die unmittelbare Fortsetzung desselben, tritt rechts neben der Aorta durch den Hiatus aorticus des Zwerchfelles in die Brusthöhle, gelangt so in das Cavum Mediastini posticum, steigt vor den Brustwirbeln, zwischen der Aorta und der Vena azygos, im Ganzen gerade und parallel mit beiden, flach geschlängelt hinauf. In der Gegend des 6ten Brustwirbels, oder höher, lenkt er sich im Aufsteigen hinter der Speiseröhre und hinter der Aorta allmälig nach links, kommt hinter dem Bogen der Aorta bis zum 7ten Halswirbel hinter und über die linke Vena jugularis, beugt sich in einem kleinen Bogen vorwärts und abwärts, und ergießt sich in die linke [2]) Vena subclavia, so daß seine Endigung entweder da, wo diese Vene mit der linken V. jugularis interna in die linke V. jugularis communis übergeht, oder weiter nach außen liegt. In einigen Fällen ergießt er sich, etwas höher, in die Vena jugularis interna.

Auf diesem ganzen Wege nimmt er noch Saugadern der Brust und des Halses auf.

---

[1]) Bisweilen sind zwei, selten drei neben einander liegende Receptacula da.

[2]) Sehr selten in die rechte.

Digitized by Google

In manchen Körpern theilt er sich und vereinigt sich wieder, einmal oder mehreremale, so daß er eine oder mehrere Inseln bildet [1]). An solchen Stellen ist er gemeiniglich mehr geschlängelt.

Er ist die dickste und weiteste Saugader. Doch auch er ist in Vergleichung gegen die größern Blutgefäße ein sehr dünnes Gefäß, indem er in Erwachsenen, im mäßig ausgedehnten Zustande, etwa eine Linie im Durchmesser hat.

Seine Gestalt ist im Ganzen die einer cylindrischen Röhre, wie die der andern lymphatischen Gefäße.

Seine häutige Masse ist beschaffen wie die der andern lymphatischen Gefäße.

Die Anzahl und Lage seiner Klappen ist unbestimmt. Seine Mündung aber an seiner Ergießung in die Blutvene hat beständig eine Klappe, welche den Eintritt des Blutes in den Ductus thoracicus abhält [2]).

Die andern Hauptstämme.

Außer dem Ductus thoracicus sind noch einige andere Hauptstämme der Saugadern da, welche sich unmittelbar in Blutvenen ergießen. 1) Truncus subclavius dexter, der Hauptstamm der Saugadern des rechten Arms und der rechten Seite der Brust, welcher von den rechten Achseldrüsen kommt. Dieser ergießt sich in den Winkel, in welchem die Vena subclavia dextra mit der Vena jugularis interna dextra zusammenkommt. 2) Truncus jugularis dexter, der Hauptstamm der Saugadern der rechten Seite des Halses. Dieser ergießt sich in die Vena jugularis interna, meist in den Winkel, in welchem die Vena jugularis externa mit ihr zusammenkommt.

Bisweilen verbinden sich beide Stämme in Einen Stamm (truncus dexter), der dann sehr kurz ist, und sich in die Vena subclavia dextra ergießt. 3) Bisweilen ergießt sich auch noch ein Truncus axillaris sinister, der von den linken Achseldrüsen kommt, in die Vena subclavia sinistra, unweit der Ergießung des Ductus thoracicus.

Saugadergeflechte der Lendengegend, Plexus lumbares et iliaci.

An dem Theile der vordern Fläche des Rückgrats, der aus den Bauchwirbeln besteht, steigt vor, neben und hinter der Aorta und Vena cava

---

[1]) Bisweilen theilt er sich an einer Stelle in drei Aeste, die sich dann wieder vereinigen, so daß er an einer und derselben Stelle 2 Inseln bildet. Sehr selten ist er ganz doppelt; auch ergießt er sich selten nur mit 2 Mündungen.

[2]) *Jo. Adolph Wedel*, (Prof. Jen. †) de valvula venae subclaviae ductui thoracico imposita. Jen. 1714. 4.

Digitized by Google

eine Menge mit einander anaſtomoſirender Saugadern (plexus lumbares) hinauf, die ſich endlich oben in das Receptaculum chyli endigen. Einige Vasa lumbaria gehen auch mit der Aorta durch den Hiatus aorticus in das Cavum Mediastini posticum hinauf, und ergießen ſich in den Ductus thoracicus.

An den Vasis iliacis kommen von beiden Seiten 2 Stränge zahlreicher Saugadern (plexus iliaci) herauf, die vor den unterſten Bauchwirbeln in den Plexus lumbaris übergehn. Jeder Plexus iliacus wird, wie die Vena iliaca, aus einem Plexus iliacus internus s. hypogastricus und einem externus s. cruralis zuſammengeſetzt, welche neben den Blutgefäßen gleiches Namens liegen.

Auch im Zellgewebe an der vordern Fläche des heiligen Beins liegen Saugadern, vasa lymphatica sacralia, welche mit denen des Maſtdarms Gemeinſchaft haben, und nach oben in die Plexus lumbares, theils auch in die Iliacos internos übergehn.

Alle dieſe Saugadern haben ihre Drüſen (glandulae lumbares, iliacae, sacrales —). Die Lumbares ſind vorzüglich zahlreich.

Saugadern des Dünndarms.

Aus dem engen Darme entſpringt eine Menge von Saugadern, welche, weil ſie zur Zeit der Verdauung den Speiſeſaft oder Milchſaft (chylus) einſaugen, Speiſeſaftgefäße oder Milchſaftgefäße (vasa chylifera s. lactea) heißen.

Jedes dieſer Gefäße entſpringt in der inwendigen Haut (tunica villosa) des Darms von den Zotten und überhaupt von der Schleimhaut des Darmcanals, geht ſchräg durch die eigne Haut deſſelben und zwiſchen den Fleiſchfaſern durch in das 1ſte Zellgewebe, wo es von der auswendigen Haut bedeckt wird, ſo daß es in dieſem allmähligen Durchgange durch die Häute des Darms zugleich am Darme gegen den Rand deſſelben fortgeht, an welchem das Gekröſe ſitzt. Unterweges nehmen dieſe Gefäße Aeſtchen aus den Häuten des Darms ſelbſt in ſich auf.

So kommen nun 2 Reihen dieſer Gefäße, eine vordere und eine hintere, eine von jeder Seite des Darms, nach dem Gekröſe hin einander entgegen, und gehen dann, im Gekröſe zwiſchen den beiden Platten deſſelben, theils neben den Blutgefäßen, theils allein, gegen den Anfang des Gekröſes am Rückgrate hin. Das ganze Gekröſe enthält eine große Menge ſolcher in ihm fortgehender Gefäße, welche, nach der Weiſe der Venen, aus kleineren Aeſten in größere Aeſte ſich vereinigen, auch theils ſich wieder theilen, und ſich unter einander netzförmig verbinden.

Endlich kommen am Anfange des Gekröſes alle Saugadern deſſelben

Digitized by Google

in einige wenige Stämme zusammen, welche sich mit den Plexibus lumbaribus in das Receptaculum chyli ergießen.

Auf dem Wege durch das Gekröse gehen diese Gefäße durch eine Menge Saugaderdrüsen (glandulae mesentericae), von denen in Rücksicht ihres Baues und des Durchganges der Speisesaftsgefäße alles das gilt, was oben von diesen Drüsen überhaupt gesagt ist. Sie liegen in verschiedener Entfernung von den Därmen, einige derselben den Därmen näher, andere dem Anfange des Gekröses näher: jene sind kleiner, diese größer.

Die Speisesaftgefäße gehen auf die angegebene Weise durch die Drüsen; die meisten durch 2 oder 3, einige nur durch eine. Bei manchen Drüsen sieht man eins oder das andere Gefäß nur neben ihr oder an ihr vorbeigehen, ohne in sie hineinzutreten. Doch kommt keines dieser Gefäße zum Receptaculum chyli, das nicht wenigstens durch eine solche Drüse gegangen wäre. Da gewissermaßen die Vasa efferentia jeder Drüse von den Inferentibus derselben unterschieden sind, so unterscheidet man Vasa chylifera primi ordinis, welche vom Darme zu den nächsten Drüsen gehen; Vasa secundi ordinis, welche von diesen Drüsen zu den 2ten gehen u. s. w.

Die Beschaffenheit der Speisesaftgefäße ist dieselbe als die der übrigen Saugadern. Sie haben zahlreiche, paarweis liegende Klappen, auch schon am Darme im ersten Zellgewebe. Die offene Seite dieser Klappen ist dem Receptaculum chyli zugewandt, so daß sie den Fortgang des Speisesaftes zu demselben gestatten, den Rückgang desselben hindern.

Die meisten Speisesaftgefäße entspringen vom Jejunum, viel wenigere vom Ileum; auch vom Duodenum nur wenige, und diese gehen nicht auf die besagte Art im Gekröse, indem dieser Darm keine Gekröse hat, sondern vom Darme im Zellgewebe rückwärts zum Plexus lumbaris.

Diese Gefäße dienen, den Speisesaft aus dem dünnen Darme einzusaugen; außer der Zeit der Verdauung nehmen sie nur Darmsaft in sich. Die aus den Häuten des Darmes entspringenden Aeste saugen Serum von diesem ein.

Wenn der Durchgang des Speisesafts durch die Speisesaftgefäße und die Drüsen derselben anhaltend gehindert ist, so entsteht vom Mangel der Ernährung eine gewisse Art der Auszehrung (tabes mesenterica). (S. Sömmerring bei Baillie Anatomie des krankh. Baues. Deutsche Uebers. S. 116.)

Saugadern des Dickdarms.

Auch vom weiten Darme entspringen Saugadern, wiewohl in geringerer Menge. Es gilt von ihnen alles, was von den Speisesaftgefäßen gesagt ist.

Digitized by Google

Sie gehen vom dicken Darme am Mesocolon fort, und da, wo dieses 2 an einander liegende Platten hat, zwischen diesen Platten. So gelangen sie theils zum Receptaculum chyli, theils zum Plexus lumbaris.

Saugaderdrüsen (glandulae mesocolicae) sind im Mesocolon auch, aber viel wenigere und kleinere, als im Mesenterium. Auch haben sie näher am Darme ihren Sitz, als das im Mesenterium der Fall ist.

Diese Gefäße saugen aus dem weiten Darme Darmsaft und flüssige Theile des Koths ein.

Daher verhärtet der Koth desto mehr, je länger er im Darmkanale verweilt.

Saugadern des Magens.

Die vielen Saugadern des Magens, welche im ersten Zellgewebe desselben verbreitet sind, und aus den tiefer liegenden Häuten desselben Aestchen in sich nehmen, versammeln sich in 2 Stränge, deren einer längs dem kleinen Bogen desselben (plexus gastricus superior), der andere längs dem großen liegt (plexus gastricus inferior s. gastro-epiploïcus). Beide Stränge haben Saugaderdrüsen, und gehen theils an der Cardia, theils am Pylorus zum Ductus thoracicus über.

Saugadern des Netzes.

Im großen Netze findet man Saugadern, welche in den Plexus gastro-epiploïcus übergehen.

Wahrscheinlich sind auch im kleinen Netze Saugadern vorhanden.

Saugadern der Milz.

Die Saugadern der Milz sind theils superficiales, welche zwischen der äußern und der eignen Haut derselben verbreitet sind, theils profundae, welche in dem Parenchyma derselben liegen. Sie versammeln sich am Hilus der Milz in einen Strang (plexus lienalis), welcher die Vena und Arteria lienalis begleitet, und sich in den Ductus thoracicus ergießt. Auch dieser Strang hat Saugaderdrüsen.

Saugadern des Pankreas.

An der hintern Seite des Pankreas kommen Saugadern aus demselben hervor, und verbinden sich mit dem Plexus lienalis.

Saugadern der Leber und der Gallenblase.

Die Leber hat vorzüglich viele Saugadern. Sie sind theils oberflächliche, superficiales, auf der Oberfläche der Leber, von der äußern Haut derselben bedeckt und netzförmig verbreitet, theils profundae, im Parenchyma liegend.

Digitized by Google

Die auf der obern Fläche sammeln sich großentheils in einen oder einige Stämme, welche durch die Lücke des Zwerchfelles zwischen dem schwertförmigen Fortsatze des Brustbeins und der 7ten Rippe zum Cavum Mediastini anticum hinaufsteigen, und sich hier mit den Saugadern verbinden; theils gehen sie auch rückwärts zum Ductus thoracicus, theils verbinden sie sich an den Bändern der Leber mit den Saugadern des Zwerchfells, durchbohren auch theils das Zwerchfell, und kommen so zur obern Fläche desselben.

Die auf der untern Fläche und die Profundae sammeln sich meist in den Plexus portarum, der von der Fossa transversa, und dann ferner hinter dem Pylorus zum Receptaculum chyli hingeht. In diesem Plexus portarum sind auch Saugaderdrüsen.

Von der Oberfläche der Gallenblase kommen Saugadern gegen den Blasengang hin, welche sich zum Plexus portarum gesellen ꝛc.

Saugadern der Nieren und der Nebennieren.

Jede Niere hat Saugadern, theils superficiales, die unter ihrer äußern Haut netzförmig verbreitet sind, theils profundas, in ihrem Parenchyma. Sie gehen gegen den Hilus der Niere zu, und vereinigen sich zahlreich in einen Strang (plexus renalis), der in der Gegend der Arteria und Vena renalis einwärts und etwas aufwärts, theils zum Plexus lumbaris, theils zum Receptaculum chyli geht. Auch vom Nierenbecken und vom Harngange gehen Saugadern zum Plexus renalis und zum Plexus lumbaris. Von jeder Nebenniere gehen Saugadern zum Plexus renalis.

Saugadern der Harnblase.

Die blutführenden Venen der Harnblase werden von Saugadern begleitet, welche mit den Obturatoriis, denen der Zeugungstheile und des Mastdarms Gemeinschaft haben, und in den Plexus hypogastricus übergehen.

Auch Saugaderdrüsen findet man an diesen Saugadern.

Saugadern des Mastdarms.

Der Mastdarm ist mit vielen Saugadern, auch mit Saugaderdrüsen umgeben. Diese haben nach hinten mit den Sacralibus, nach vorn mit denen der Harnblase in Männern, mit denen der Mutterscheide in Weibern, Gemeinschaft, und gehen theils in die letzten Vasa lymphatica coli, theils zu beiden Seiten in die Plexus hypogastricos über.

Digitized by Google

Saugadern der männlichen Geschlechtstheile.

Saugadern der Hoden.

Von jedem **Hoden** kommen Saugadern, die aus dem Rete vasculosum, der Tunica albuginea und dem Nebenhoden entspringen. Mit ihnen verbinden sich Saugadern der Scheidenhäute, und so entsteht ein Strang (plexus spermaticus), welcher im Zellgewebe des Samenstranges durch den Bauchring hinaufsteigt, und so mit den Blutgefäßen des Samenstranges zur Regio lumbaris gelangt, wo er sich mit dem Plexus lumbaris, theils auch mit dem Renalis seiner Seite verbindet.

Saugadern des Hodensackes.

Die Saugadern des **Hodensackes** gehen von jeder Hälfte desselben zu den Glandulis inguinalibus ihrer Seite, theils hinten zu denen des Mittelfleisches.

Saugadern des Gliedes.

Das **männliche Glied** hat Venas lymphaticas subcutaneas, welche zwischen der Haut und den Corporibus cavernosis von der Eichel gegen den Anfang des Gliedes hin, und dann von jeder Hälfte in die Glandulas inguinales übergehen; und profundas, welche neben der Harnröhre von der Eichel nach der Synchondrosis pubis fortgehen, unter dieser durch in das Becken treten, und so zum Plexus hypogastricus gelangen.

Saugadern der Samenbläschen.

Von jedem **Samenbläschen** gehen Saugadern aus, welche mit denen der Harnblase, des männlichen Gliedes, des Mastdarms sich verbinden, und sich in den Plexus hypogastricus ergießen.

Saugadern der weiblichen Geschlechtstheile.

Saugadern des Uterus und der Eierstöcke.

Von der **Gebärmutter** gehen theils Saugadern an jeder Seite in einen Strang (plexus spermaticus) über, der mit der Vena spermatica aufsteigt, und in den Plexus lumbaris übergeht.

Mit diesem Plexus spermaticus verbinden sich die Saugadern des Eierstockes und der Trompete jeder Seite.

Theils gehen Saugadern von jeder Seite der Gebärmutter im runden Bande zu den Vasis lymphaticis epigastricis.

Der größte Theil der Saugadern der Mutter geht an jeder Seite in einen Strang (plexus uterinus) über, welcher sich in den Plexus hypogastricus ergießt.

Digitized by Google

Die Aeste dieser Saugadern liegen zahlreich an der auswendigen Fläche der Mutter, von der auswendigen Haut derselben bedeckt, und nehmen einsaugende Aeste aus dem Parenchyma derselben auf.

Saugadern der Scheide und der weiblichen Schaam.

In dem Zellengewebe, das die Mutterscheide umgiebt, findet man viele Saugadern, welche theils in die Plexus uterinos, theils in die Plexus hypogastricos übergehen. Von jeder Seite der weiblichen Schaam gehen Saugadern zu den Glandulis inguinalibus ihrer Seite.

Von der Clitoris gehen sie wahrscheinlich eben so, wie am männlichen Gliede.

Saugadern an der Wand des Unterleibes.

In der Cellulosa subcutanea des Bauchs und zwischen den Bauchmuskeln liegen Saugadern, welche theils nach der Regio inguinalis in die Glandulas inguinales, theils am Rückgrate durchbohrend in den Plexus lumbaris übergehen.

Ein besonderer Strang (plexus epigastricus) kommt mit der Vena epigastrica an jeder Seite zum Annulus herab, und geht in die Glandulas inguinales über.

An der inwendigen Fläche des Bauchs liegen die oben genannten Plexus lumbares und iliaci, und in diese gehen die Saugadern der inwendigen Bauchmuskeln, auch des M. iliacus internus, des Psoas, und theils die der Bauchhaut über.

An der Arteria iliolumbalis liegt ein Strang von Saugadern (plexus iliolumbalis), der in den Plexus iliacus oder lumbaris übergeht.

Saugadern der Bauchhaut.

Das Zellgewebe an der Bauchhaut ist mit vielen Saugadern durchzogen, welche in die Plexus lumbares, iliacos, iliolumbales, epigastricos ꝛc. übergehen.

Saugadern der Bauchglieder.

Die Saugadern des Beins sind theils oberflächliche, superficiales, theils tiefliegende, profundae.

Die superficiales liegen in der Cellulosa subcutanea, und fangen in derselben schon von den Zehen an. Die Stämme derselben liegen in Strängen. Ein Strang (plexus saphenus externus) kommt vom äußern Theile des Fußes, am äußern Knöchel und ferner an der äußern Seite des Unterschenkels, längs der Vena saphena parva her-

Digitized by Google

auf, und geht dann theils hinter dem Kniegelenke in den Plexus saphenus internus über, theils an der äußern Seite des Oberschenkels weiter hinauf. Der andere Strang (plexus saphenus internus) kommt vom innern Theile des Fußes, am innern Knöchel, und ferner an der innern Seite des Unterschenkels und des Oberschenkels, längs der Vena saphena magna herauf.

Der Plexus saphenus internus und die übrigen Vasa lymphatica subcutanea des Oberschenkels gehen größtentheils in die Glandulas inguinales über.

Die Vasa lymphatica profunda des Beins liegen zwischen den Muskeln desselben. Die Stämme derselben gehen längs den Schlagaderstämmen und tiefliegenden Blutvenen hinauf: bei jedem Schlagaderstamme mehrere.

Eben so liegen die Vasa lymphatica tibialia postica, peronea, tibialia antica, bei den gleichnamigen Schlagadern. Diese vereinigen sich in den Plexus cruralis, der in der Kniekehle, wo er noch Plexus popliteus heißt, neben der Arteria poplitea hinaufgeht, ferner diese Schlagader bis zum Ligamentum Fallopii begleitet, die Vasa lymphatica profunda femoris aufnimmt, und unter dem Ligamentum Fallopii durch in den Plexus iliacus externus übergeht.

Nahe an diesem Bande haben diese Gefäße einige Saugaderdrüsen (glandulae femorales s. inguinales profundae).

Auch in der Kniekehle findet man eine oder einige kleine lymphatische Drüsen (glandulae popliteae); unterhalb der Kniekehle am Schienbeine sind diese Drüsen wenigstens selten [1]).

Die Arteria obturatoria wird auch von Saugadern (plexus obturatorius) begleitet, welche aus den Adductoribus, dem M. pectinaeus, gracilis ꝛc. Aeste aufnehmen, durch den Einschnitt des eiförmigen Loches in das Becken treten, und dem Plexus iliacus sich zugesellen.

In der Cellulosa subcutanea des Gesäßes liegen Vasa lymphatica superficialia, welche theils nach außen mit den superficialibus externis des Oberschenkels sich verbinden, und in die Glandulas inguinales übergehen, theils nach oben den abdominalibus posterioribus sich zugesellen.

Zwischen den Muskeln des Gesäßes liegen Saugadern, die in den Plexus iliacus posterior und den Plexus ischiadicus übergehen,

[1]) Haller (El. phys. I. p. 191.) „In poplite fere desinunt, quum in tibia, fibula, pedeque nullae mihi unquam occurrerint.“ Cruikshank fand unter der Kniekehle niemals Saugaderdrüsen (Einsaug. Gef. S. 117.). Auch Hildebrandt hat hier nie lymphatische Drüsen gesehen. Mascagni giebt eine Glandula tibialis an, die er bisweilen auf dem oberen Theile des Schienbeins angetroffen hat.

welche die gleichnamigen Schlagadern begleiten, und durch die Incisura ischiadica, jener über, dieser unter dem M. pyramidalis in den Plexus iliacus internus sich ergießen.

Die Leistendrüsen, glandulae inguinales [1]), liegen theils in der Regio inguinalis des Bauchs, am Ligamentum Fallopii, dicht unter der Haut, theils am obersten Theile des Oberschenkels, in der innern und vordern Gegend desselben, auf der Fascia lata, dicht unter der Haut.

In diese Drüsen ergießen sich die Vasa lymphatica superficialia des Oberschenkels, auch die des Bauchs und der äußern Zeugungstheile; und von ihnen gehen wieder Vasa lymphatica, durch die Fascia lata, unter dem Ligamentum Fallopii durch, in die Bauchhöhle hinein, zum Plexus cruralis.

Saugadern des Zwerchfells.

Auf beiden Flächen des Zwerchfells findet man Saugadern.

Die an der concaven Fläche sind mit dem Theile der Bauchhaut bedeckt, der diese Fläche des Zwerchfells überzieht. Ueber der Leber sind sie theils mit denen der Leber verbunden. Sie gehen theils am Hiatus aorticus in den Ductus thoracicus, theils durch die vordern Lücken des Zwerchfells in die Vasa lymphatica mammaria interna.

Die an der converen Fläche sind mit dem Theile der Brusthaut und des Herzbeutels bedeckt, der diese Fläche überzieht. Sie sind ansehnlicher als jene; auch gehen durchbohrende Saugadern von der concaven Fläche zur converen. Sie gehen theils nach vorn in die Vasa lymphatica mammaria interna, theils nach hinten in den Ductus thoracicus, theils auch in die intercostalia über.

Saugadern der Brust.

In der Cellulosa subcutanea der Brust und zwischen den Brustmuskeln liegen Saugadern, welche an jeder Seite in die Glandulas axillares übergehen.

Auf der inwendigen Fläche der Rippenknorpel an jeder Seite des Brustbeins steigen neben den Blutgefäßen, die man mammaria interna nennt, Stränge von Saugadern (plexus mammarii interni), mit Drüsen, welche nach oben sich rückwärts lenken, sich mit den Mediastinis verbinden, und in die Plexus subclavios übergehen, in die Höhe.

Uebrigens liegen im Mediastinum, zwischen beiden Säcken der Brusthaut, viele Saugadern (vasa lymphatica mediastina) mit

[1]) Diese Drüsen sind es, welche oft in der venerischen Krankheit sich entzünden und anschwellen (bubones venerei).

Digitized by Google

Drüsen, welche theils höher, theils tiefer in den Ductus thoracicus, theils auch in den Truncus dexter übergehen.

Die Blutgefäße zwischen den Rippen werden auch von Saugadern (vasa lymphatica intercostalia) begleitet, in jedem Zwischenraume der Rippen. Diese ergießen sich nach vorn in die V. l. mammaria interna, nach hinten in den Ductus thoracicus.

Saugadern der Brusthaut und des Herzbeutels.

Das Zellgewebe der **Brusthaut** ist mit vielen Saugadern durchzogen, welche in die Vasa lymphatica mammaria interna, mediastina, intercostalia übergehen. Der **Herzbeutel** ist mit vielen Saugadern überzogen; auch liegen an seiner auswendigen Fläche, sowohl vorn als hinten, lymphatische Drüsen, in welche Stämme dieser Venen übergehen.

Saugadern des Herzens.

Die Saugadern des **Herzens** versammeln sich in Stämme, welche neben den Stämmen der Vasorum cardiacorum auf der Oberfläche des Herzens gehen, dann vom Herzen an der Aorta und Vena cava superior aufsteigen, mit denen des Herzbeutels, ferner mit denen der Lungen und des Mediastinum sich verbinden, und so zu Drüsen kommen, welche im Mediastinum hinter und über dem Bogen der Aorta, und hinter der Arteria pulmonalis liegen.

Saugadern der Lungen.

Die **Lungen** haben eine Menge Saugadern. Die oberflächlichen sind netzförmig auf der Oberfläche der Lungen verbreitet, von der äußern Haut derselben bedeckt, die tiefliegenden liegen in der Tiefe neben den Aesten der Blutgefäße.

Die Stämme, in welche sich die Gefäße versammeln, gehen von jeder Lunge neben dem Luftröhrenaste und der Luftröhre selbst, von der rechten theils neben der Vena cava superior und der Vena azygos hinauf; und die linken gehen in den Ductus thoracicus, die rechten in den Truncus dexter, oder Subclavius dexter.

Mit den Saugadern der **Lungen** sind Drüsen derselben (glandulae bronchiales) verbunden, welche theils am Mediastinum, theils zwischen den Läppchen der Lungen, meist da liegen, wo die Luftröhrenäste sich theilen. Die oberste größte derselben liegt da, wo die Luftröhre selbst sich in ihre beiden Aeste theilt; die übrigen an den kleineren Aesten sind kleiner.

Saugadern der Speiseröhre.

Die **Speiseröhre** ist mit Saugadern umgeben, die auch theils

Digitized by Google

Drüſen haben, welche mit den Vasis lymphaticis mediastinis in Verbindung ſind, und nach oben in den Ductus thoracicus gehen.

Saugadern der Thymusdrüſe.

Aus der Thymus gehen Saugadern zu den Drüſen, die am vordern Theile des Mediastinum liegen, und verbinden ſich mit den Venis mammariis internis.

Saugadern der Milchdrüſen.

Die Saugadern der Mamma verſammeln ſich theils an dem äußern Theile derſelben in Stränge, die nach den Glandulis axillaribus hingehen; theils an dem innern Theile in durchbohrende Aeſte, welche durch den M. pectoralis und die Zwiſchenräume der ſechs obern Rippen zu den Vasis lymphaticis mammariis internis gehen.

Saugadern der Bruſtglieder.

Die Saugadern des Arms ſind theils oberflächliche, theils tiefliegende.

Die Vasa superficialia liegen in der Cellulosa subcutanea, und fangen in derſelben ſchon von den Fingern an. Die Stämme derſelben liegen in Strängen. Ein Strang (plexus cephalicus) kommt von der Daumenſeite der Hand, am Latus radiale des Arms, längs der Vena cephalica, ein anderer (plexus basilicus) von der Seite des kleinen Fingers der Hand, am Latus ulnare des Arms herauf. Beide Stränge gehen an der innern Seite des Oberarms bis zur Achſelgrube in die Glandulas axillares, der cephalicus aber theils an der vordern Seite der Schulter zum Plexus subclavius.

Die Vasa profunda liegen zwiſchen den Muskeln. Ihre Stämme begleiten die Schlagadern, und können daher benannt werden: Vasa lymphatica radialia, ulnaria, interossea externa et interna, brachialia profunda. Alle dieſe verſammeln ſich dann in Einen Strang (plexus brachialis), der mit der Vena brachialis zur Achſelhöhle hinaufkommt, zu den Glandulis axillaribus, und ferner in den Plexus subclavius übergeht.

Die Achſeldrüſen, glandulae axillares, liegen in der Achſelgrube zwiſchen der Flechſe des M. latissimus dorsi und der des M. pectoralis major, theils näher am Arme, theils an den Rippen, dicht unter der Haut.

In dieſe ergießen ſich die Vasa lymphatica superficialia und profunda des Arms, auch die von der innern Fläche des Schulterblatts, von der auswendigen Fläche der Bruſt und von der Mamma,

Digitized by Google

und von ihnen gehen wieder Vasa lymphatica zum Plexus subclavius.

Auch an den Saugadern des Oberarms findet man hie und da Saugaderdrüſen, ſowohl an den superficialibus als an den profundis: ſeltner an denen des Unterarms. Eine liegt gemeiniglich an der innern Seite des Condylus internus des Oberarms.

Der Plexus subclavius liegt hinter dem Schlüſſelbeine, an der Vena subclavia. Er nimmt die Vasa lymphatica cephalica, die aus den Glandulis axillaribus, die Mammaria interna, auch Subcutanea colli ꝛc. auf.

Nahe an der Ergießung gehen die Gefäße, welche dieſen Plexus ausmachen, in einen Truncus subclavius über. Der linke ergießt ſich in den Ductus thoracicus, der rechte beſonders in die Vena jugularis dextra.

Saugadern des Kopfs und des Halſes.

An jeder Seite des Halſes begleitet ein herabſteigender Strang von Saugadern (plexus jugularis) die Vena jugularis interna, welcher ſich endlich in einen oder zwei Stämme vereiniget, und ſich auf der linken Seite in den Ductus thoracicus, nahe bei deſſen Endigung, auf der rechten beſonders, als Truncus jugularis dexter, in die Vena jugularis interna ergießt. An dieſem Plexus ſind Saugaderdrüſen (glandulae jugulares profundae).

Am vordern Theile des Halſes liegen Saugadern (subcutaneae colli) in der Cellulosa subcutanea, mit ihren Drüſen (glandulae jugulares superficiales). Dieſe Drüſen ſind, wenn ſie anſchwellen, viel verſchiebbarer, und ihre Eiterung iſt mit weniger bedenklichen Zufällen verbunden, als die derjenigen Drüſen, welche unter dem M. platysma myoides liegen. Ein Strang begleitet an jeder Seite die Vena jugularis anterior, und geht in den Truncus jugularis über.

Auch die Vena jugularis posterior wird von einem Strange Saugadern begleitet, mit denen ſich die Venae lymphaticae cervicales verbinden, welche viele Drüſen (glandulae cervicales) haben. Dieſer Strang geht zum Truncus jugularis und subclavius herab.

In der Cellulosa subcutanea des Geſichts liegen Saugadern, deren Stämme theils mit der Vena mentalis, theils mit der Vena facialis anterior über den Rand der obern Kinnbacke zum Halſe herabgehen.

Von der Schläfengegend ſammeln ſich Saugadern in einen Strang, der hinter der Parotis herabgeht (plexus temporalis).

Vom Hinterhaupte kommen Saugadern zu den Glandulis cervicalibus herab.

Digitized by Google

Saugaderdrüsen liegen an der Seite des Angesichts, unter dem Processus jugalis des Schläfenbeins, auf der Parotis (glandulae parotideae); die Geschwulst dieser letztern Drüsen kann leicht mit der der Parotis verwechselt werden; an der untern Seite der untern Kinnbacke, bei der Glandula salivalis submaxillaris (glandulae submaxillares); auch am untern Theile des Hinterkopfs (glandulae occipitales).

Saugadern der Augen.

Im Glaskörper, der Krystallinse, der Hornhaut, der Sklerotika, sind ohne Zweifel lymphatische Venen sowohl, als lymphatische Schlagadern. Ob sie aber Aeste der rothen Venen des Auges sind, oder wie in andern Theilen sich in besondere Stämme ergießen, das ist noch nicht bekannt [1]). Wenigstens sind Stämme lymphatischer Venen der Augenhöhle so wenig, als lymphatische Drüsen in derselben erwiesen.

Saugadern des Gehirns.

Auch im Gehirne sind Saugadern, sowohl auf der Oberfläche, als in den Plexubus choroideis [2]), nicht aber in der Substanz des Gehirns, sondern nur an den Häuten desselben beobachtet worden. In dem Rückenmarke sind sie jedoch noch nicht zuverlässig bekannt.

---

[1]) *Ruysch*, thes. anat. II. ass. 1. n. 10.

[2]) *Steno*, in *Barthol.* anat. p. 475. *Nuck*, de invent. nov. p. 152. Cruikshank's Beschreibung der Saugadern, S. 175, und Ludwig's Note ebendaselbst. B. N. Schreger fand in einem Ochsenhirne Saugadern, die in den gestreiften Hügel gingen, wo sie ein gewöhnliches Netz bildeten, das deutlich von den Blutgefäßen unterschieden werden konnte. *Schreger*, de vasis lymphaticis in plexu choroideo et corpore striato cerebri inventis. In dessf. fragm. anat. et physiol. Lips. 1791. fasc. I. Vorzüglich sind aber die letzten Tafeln des großen Mascagnischen Werks: Vasorum lymph. hist. et ichnographia, wegen der Saugadern in der Schädelhöhle zu betrachten.

Fünftes Buch.

Von dem Nervensyſtem.

Digitized by Google

Digitized by Google

Literatur über das Nervenſyſtem.

Die Schriften, welche die Literatur über das Nervenſyſtem ausmachen, ſollen nach folgendem Plane angeführt werden:

I. Schriften über den Begriff und die Geſchichte des Nervenſyſtems. S. 319.
II. Ueber den Bau der zum Nervenſyſteme gehörenden Theile. S. 319.
III. Ueber die Regeneration der zum Nervenſyſteme gehörenden Theile. S. 320.
IV. Beſchreibung des geſammten Nervenſyſtems. S. 321.
V. Vermiſchte Abhandlungen über die Nerven. S. 322.
VI. Ueber die Gehirnhäute. S. 323.
VII. Ueber das Gehirn und das Rückenmark. S. 324—329.
VIII. Ueber einzelne Theile des Gehirns. S. 329.
IX. Ueber die Entwickelung des Nervenſyſtems. S. 331.
X. Ueber einzelne Nervenpaare. S. 331.

I. Schriften über den Begriff und die Geſchichte des Nervenſyſtems.

1551. ° *Jo. Fr. Car. Stegmann*, praes. *Phil. Fr. Meckel*, Diss. de usu et dignitate nevrologiae. Halae 1794. 8.

1552. ° *Jo. Chr. Fr. Harles*, comment. anat. hist. nevrologiae primordia. Erlangae 1795. 8.

1553. ° *Ejusd.*, Pr. historiae nevrologiae veterum speciminis secundi sectio. I. Erlang. 1796. 8

1554. ° Deſſ. Verſuch einer vollſtändigen Geſchichte der Hirn- und Nervenlehre im Alterthume. Erſter Theil. 1801. 8.

1555. ° *Jo. Dan. Metzger*, animadversiones anatomico-physiologicae in doctrinam nervorum. Regiom. 1783. 4. Recus. in ej. opusc. anat. et phys. Gothae et Amst. 1790. p. 117 sq.

II. Schriften über den Bau der zum Nervenſyſteme gehörenden Theile.

1556. ° *Dan. Nebel*, de nervorum et tendinum fibris cincinnatis. Miscell. acad. nat. cur. Dec. 3. Ann. 5 et 6. 1697 et 1698. p. 218.

1557. *Guichard Jos. Duverney*, observat. sur une grénouille, qui prouveraient que les nerfs ne sont que des tuyaux. Mém. de Par. 1700. p. 40.

1558. *Christ. Vater*, de fibris cerebri in hydrocephalo nato evidentius observatis. Miscell. acad. nat. cur. Dec. 3. an. 9 et 10. 1701—05. p. 294.

1559. *Andr. Ottomar Goelicke*, de nervorum structura et usu. Frcf. ad Viadr. 1732. 4.

1560. *Joh. Steph. Guettard* et *J. Le Theullier*, ergo nervi canales. Paris 1743. 4.

1561. ° *Jean Godofr. Zinn*, de l'enveloppe des nerfs. Mém. de Berlin 1753. p. 130.

1562. *Wedale*, the construction of the nerves and causes of nervous disorders. Lond. 1758. 8.

1563. *Lorenzo Massimi*, esperienze anatomiche intorno i nervi. in Roma. 1766. 4.

1564. ° *Georg Prochaska*, de structura nervorum tractatus anatomicus, tabulis aeneis illustratus. Vindobon. 1779. 8. Recus. in ejusd. oper. min. Vol. I. p. 273 sq.

Digitized by Google

1565. ° *Felix Vicq d'Azyr*, Mém. 1 — 3. recherches sur la structure du cerveau, du cervelet, de la moelle allongée, de la moelle épinière; et sur l'origine des nerfs de l'homme et des animaux. Mém. de Paris 1781. hist. p. 8. mém. p. 495, 543, 566.

1566. ° *Joh. Pfeffinger* (praes. *Jo. Fr. Lobstein*), Diss. de structura nervorum. Sectio. I. Argentor. 1782. Sect. II. ibid. 1783. 4. (continet. Sect. II. etiam succinctam nervorum encephali descriptionem.) Recus. in *Ludwig*. script. nevrol. min. Vol. I. p. 1 — 60.

1567. *Felix Fontana*, Traité sur le venin de la vipère. Florence, Tome II. 1781. 4. p. 194.

1568. ° *Alex. Monro*, observations on the structure and functions of the nervous system, illustrated with (47) tables. Edinburgh 1783. Fol. Deutſch: Bemerkungen über die Structur und Verrichtungen des Nervenſyſtems. Aus d. Engl. überſetzt nebſt einigen Anmerk. und Zuſätzen (v. S. Th. Sömmerring). Mit 13 Kpfr. Leipz. 1787. 4. — microscopical inquiries into the nerves and the brain, with fig. Edinb. 1780. Fol.

1569. ° *Jo. Chr. Reil*, exercitationes anatomicae. Fasc. I. de structura nervorum; cum trib. tabb. aen. Halae 1796. Fol.

1570. ° *Everard Home*, the croonian lectures. Experiments and observations upon the structure of nerves. Philos. trans. 1799. Vol. 89. P. I. p. 1.

1571. *Villars*, recherches microscopiques sur la structure des nerfs. *Greperon*, Bulletin des scienc. méd. Vol. II. p. 187.

1572. *George Cuvier*, extrait d'un mémoire sur la structure des nerfs, par *Villars*. Annalen der Wetterauiſchen Geſellſch. Bd. 2. S. 242.

1573. *A. Barba*, osservazioni microscopiche sul cervello e sue parti adjacenti. Napoli 1807. 8. ed. 2. ibid. 1819. 8. — ° mikroskopiſche Beobachtungen über das Gehirn und die Nerven. Auszugsweiſe aus dem Ital. überſetzt v. Reich, in Reils Arch. X. 459. — ° Daſſelbe a. d. Ital. überſetzt und mit einer Biographie des Verfaſſers verſehen von J. J. Albrecht v. Schönberg. Mit 1 Steintafel. Würzburg 1829. 4.

1574. ° *Everard Home*, Microscopical observations on the brain and nerves; showing that the materials of which they are composed exist in the blood. On discovery of valves in the branche of the vas breve, lying between the villous and muscular coats of the stomach. On the structure of the spleen. Phil. trans. 1821. P. I. p. 25.

1575. ° *Idem.* On the nerves, which associate the muscles of the chest, in the actions of breathing, speaking, and expression. Being a continuation of the paper on the structure and functions of the nerves. Phil. trans. 1822. P. II. p. 284.

1576. *Prevost* et *Dumas*, in *Magendie* Journal de Physiol. expér. Tom. III. p. 320.

1577. ° *Ever. Home*, on the internal structure of the human brain; when examined in the microscope, as compared with that of fishes, insects and worms. Philos. trans, 1824. P. I. p. 1.

1578. ° *J. A. Bogros*, note sur des canaux découverts dans les nerfs. Mém. lu à l'acad. des scienc. le 2. Mai 1825. — Mémoire sur la structure des nerfs. Répert. génér. d'anat. et de phys. path. Vol. IV. 1827. p. 113. Ueber die Structur der Nerven. Heuſingers Zeitſchr. f. d. org. Phyſ. 2 Bd. S. 217.

1579. ° *Breschet* et *Raspail*, Anatomie microscopique des nerfs, pour démontrer leur structure intime, et absence de canaux contenant un fluide et pouvant après la mort être facilement injectés. In Répert. génér. d'anat. et de phys. path. Vol. IV. 1827. p. 185. — Mikroskopiſche Anatomie der Nerven. Auszug in Heuſingers Zeitſchr. f. d. org. Phyſik. Bd. II. S. 309.

III. Schriften über die Regeneration der zum Nervenſyſteme gehörenden Theile.

1580. *Giuseppe Baronio*, ricerche intorno alcune riproduzione che si operano negli animali cosi detti a sangue caldo e nell' uomo. Art. I — 4 della regenerazione dei nervi. Memor. della soc. Italiana. Vol. IV. p. 480.

Digitized by Google

1581. °Fr. Michaelis, über die Regeneration der Nerven, ein Brief an Peter Camper. Cassel 1785. 8. Auch in Richters chir. Bibl. VIII. S. 122.

1582. °Just. Arnemann, Versuche über die Regeneration an lebenden Thieren. Erster Band, über die Regeneration der Nerven. Götting. 1786. 8. Zweiter Band, über das Gehirn und Rückenmark. Götting. 1787. 8. m. Kpf.

1583. °Derselbe, ein Paar Worte über die Wiedererzeugung der Nerven. Reils Archiv III. 100.

1584. °*Will. Cruikshank*, experiments on the nerves, particularly on their reproduction, and on the spinal marrow of living animals, in phil. transact. of the royal soc. of London. 1795. P. I. p. 177. Deutsch: Versuche über die Nerven, besonders über ihre Wiedererzeugung und über das Rückenmark lebendiger Thiere. In Reils Archiv II. S. 57.

1585. °*Joh. Haighton*, an experimental inquiry, concerning the reproduction of nerves. In phil. transact. 1795. P. I. p. 190. Deutsch: Versuche über die Reproduction der Nerven. In Reils Archiv II. 71.

1586. °J. C. H. Meyer, über die Wiedererzeugung der Nerven. In Reils Archiv II. S. 449.

1587. °Zimmermann, über Reproduction im Allgemeinen, und über Reproductionsfähigkeit einzelner Organe, besonders der Nerven und Muskeln. In Reils Arch. XI. 131 — 155.

1588. *Flourens*, siehe Bemerkungen, angeführt, in *Cuvier* Analyse des travaux de l'acad. roy des sc. pendant 1824.

1589. *Joh. Swan*, a dissertation on the treatement of morbid local affections of nerves, to which the Jacksonian prize was adjudged by the roy. College of Surgeons 1820, und Observations on some points relating to the anatomy, physiology and pathology of the nervous system. London 1822. Übers. v. Franke unter dem Titel: °Gekrönte Preisschrift über die Behandlung der Localkrankheiten der Nerven, nebst dessen anatomisch-physiologisch-pathologischen Beobachtungen über das Nervensystem. Leipzig 1824. 8.

1590. °*P. J. Descot*, Dissertation sur les affections des nerfs, à Paris 1825. 8. Ueber die örtlichen Krankheiten der Nerven, übers. v. J. Radius. Leipzig 1826. 8.

1591. *Prévost*, Annales des sciences naturelles, Tom. X. 1827. p. 168. Ueber die Regeneration des Nervengewebes. Heusingers Zeitschr. 2. Bd. S. 318.

1592. *Larrey*, Annales des sciences naturelles. X. 1827. p. 439. Ueber Regeneration der Nerven in Amputationsstumpfen. Heusingers Zeitschr. 2. Bd S. 320.

IV. Beschreibung des gesammten Nervensystems.

1593. °*Thob. Mostelius*, synopsis exortus, et distributionis omnium nervorum in corpore humano, quemadmodum describuntur ab anatomicorum principe *Vesalio*, ut sine negocio adpareat, a qua syzygia unaquaelibet corporis pars suos accipiat nervos. Witeberg. 1558. 12.

1594. °*Raym. Vieussens*, nevrographia universalis, h. e. omnium corporis humani nervorum, simul et cerebri medullaeque spinalis descriptio anatomica, eaque integra et accurata, variis iconibus fideliter et ad vivum deductis, aereque incisis illustrata, cum ipsorum actione et usu physico dissensu explicatis. Editio nova Lugduni 1684. Fol. Lugduni 1716. Fol. — Editio in germania prima, ob causas in nova praefatione allegatas adornata, et adjecto rerum indice aucta. Fref. 1690. 8.

1595. °*D. Bayne*, alias *Kinneir*, a new essay on the nerves, and the doctrine of the animal spirits etc. London 1738. 8.

1596. °Aug. Schaarschmidt, Nevrologische Tabellen. Berlin 1750. 8.

1597. °*Alex. Monro* (pater), nervorum anatome contracta latine reddita, cui subjecta sunt ejusdem explicatio motus reciproci cordis et ductus thoracici descriptio. Franequerae 1754. 8.

1598. °*Ejusd.* tractatus tres de nervis eorumque distributione et motu cordis et ductu thoracico. Latine redditi a *G. Coopmans*. ed. 2da. Franequerae 1762. 8. (Harlingae 1763. 8.?)

1599. °*Roland Martin*, tal om nervers allmaenna Egenskaper i Maennisikans kropp; Haellet foer kongl. veteuskaps academien, vid praesidii ned

laeggande den 26. Jan. 1763. Och jaemte bifogat utkast til nervernes saerskilda anatomiska beskrifning. Stockholm 1763. 8. — institutiones nevrologicae s. de nervis corp. hum. tractatio, praemissa est oratio de proprietatibus nervorum generalibus. Holmiae et Lipsiae 1781. 8.

1600. ° *Just. Chr. Loder*, primae lineae nevrologiae corporis humani. Comm. I. Jenae 1778. 4.

1601. ° *Joh. Gottl. Haase*, cerebri nervorumque corporis humani anatome repetita, c. II. tabb. Lips. 1781. 8.

1602. ° *D. E. Günther*, Cerebri et nervorum distributionis expositio. Duisburg 1786. 8. Kurzer Entwurf der anatomiſchen Nervenlehre. Ueberſ. und mit Zuſ. d. Vf. herausg. v. H. W. Pottgießer. Düſſeldorf 1789. 8.

1603. ° Sam. Thom. Sömmerring, Hirn- und Nervenlehre. Frkf. a. M. 1791. 8. 1800. 8.

1604. *Vincenz Malacarne*, neuro-encefalotomia. Pavia 1791. 8.

1605. ° *Georg. Coopmans*, nevrologia et observatio de calculo ex urethra sponte elapso, post exsiccationem uncias V. et 3ijβ pendente. Edit. altera emend. locupl. tabulis illustrata. Franequerae 1795. 8.

1606. *Thom. Barthol. Fabricius*, Nevrologia. Brunsvic. 1806. 8.

1607. *Charl. Bell*, a series of engravings explaining the course of nerves, with an address to young physicians on the study of the nerves. Second edit. Lond. 1816. 8. (9 Kpft.) Deutſch von Heinr. Robbi, mit Vorrede von Joh. Chr. Roſenmüller. Leipz. 1820. 8.

1608. — an exposition of the natural system of the nerves of the human body. London 1824. 8.

1609. ° *Conradi Joannis Martini Langenbeck* Icones anatomicae. Neurologia. Fasc. I. cum Tab. XXXIV. Fasc. II. cum Tab. IX. Fasc. III. cum Tab. XXIX. (vgl. d. Literat. im 1. Bd. S. 17 No. 93.)

1610. The Anatomy and Physiology of the nervous System by *Valent. Flood*. Dublin 1828. 12.

V. Vermiſchte Abhandlungen über die Nerven.

1611. ° *Alb. Haller*, resp. *Matth. Lud. Rud. Berckelmann*, Diss. de nervorum in arterias imperio. Gotting. 1744. 4.

1612. ° *Zinn*, de l'enveloppe des nerfs, trad. du latin. Hist. de l'acad. roy. de Berl. 1753. p. 131.

1613. ° *Jac. Fr. Isenflamm.* resp. *Jo. Fr. Doerffler*, Diss. de vasis nervorum. Erlangae 1768. 4. recus. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. III. p. 164.

1614. ° *Jo. Chrph. Pohl*, Progr. quaedam de nervis observationes. Lipsiae 1774. 4.

1615. ° *Henr. Aug. Wrisberg*, de nervis arterias venasque comitantibus. In ej. comment. Vol. I. p. 363. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. III. p. 24. et in commentat. soc. reg. Gotting. Vol. VII. 1784 — 1785. p. 95.

1616. ° *Sam. Chr. Lucae*, quaedam observationes anatomicae circa nervos arterias adeuntes et comitantes. c. fig. annexae sunt annotationes circa telam cellulosam. Frcf. a. M. 1810. 4.

1617. *Charl Bell*, on the nerves; giving an account of some experiments on their structure and functions, which lead to a new arangement of the system. Philos. trans. 1821. P. II. p. 398.

1618. ° *Ejusd.* recherches anatomiques et physiologiques sur le système nerveux. *Magendie* Journ. de physiol. expér. Vol. I. p. 384 — 391. Vol. II. p. 66 — 76. nouvelles recherches, ibid. Vol. II. p. 363. — Verſuche über den Bau und die Functionen des Nervenſyſtems, die zu einer neuen Anſicht deſſelben führen. A. d. philos. transact. 1821. p. 398, in Meckels Arch. VIII. 391.

1619. *Ejusd.* on the nerves which associate the muscles of the chest in the actions of breathing, speaking and expression. Phil. Trans. 1822. p. 284.

1620. *Ejusd.* sur les nerfs de la face, traduit par *Defermon*, in *Magendie* Journ. de physiologie exp. Tome X. à Paris 1830. p. 1.

1621. *Ejusd.* exposition du système naturel des nerfs du corps humain, trad. de l'anglais par *T. Genest.* Paris 1825. 8.

Digitized by Google

1622. *Ejusd.* on the nervous circle which connects the voluntary muscles with the brain. Phil. transact. 1826. P. II. p. 163.

1623. *Ejusd.* lectures on the nervous system. The London medical Gazette. Vol. I. 1828. No. 19. April, p. 553. No. 21. April, p. 617. No. 23. May, p. 681. No. 25. p. 747.

VI. Schriften über die Gehirnhäute im Allgemeinen.

1624. *M. E. Ettmüller,* Diss. de cerebri membranis. Lips. 1721. 4.

1625. ° *Jo. Guil. Chr. Baumer,* Diss. de meningibus. Giessae 1775. 4.

Dura mater.

1626. ° *Jo. Hadr. Slevogt* resp. *Car. Chr. Xylander,* Diss. de dura matre. Jenae 1690. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 809 sq.

1627. ° *Mich. Heiland,* de cohaerentia crassae meningis cum cranio ejusque suturis nulla. Miscell. acad. nat. cur. Dec. 3. 1699 et 1700. p. 279.

1628. ° *Joh. Jacob. v. Döbeln,* dubitatio de pericranii origine, et continuatione cum matre dura, ex observatione anatomica, qua dicta mater a calvariae suturis et superficie interna omnino separata fuit deprehensa. Acta acad. nat. cur. Vol. V. p. 514.

1629. *Ant. Pacchioni,* epist. ad *Lud. Testi* de novis circa solidorum ac fluidorum vim in viventibus ad durae meningis structuram et usum observationibus. In actis Erud. Lips. 1701.

1630. ° *Ejusd.* de durae meningis fabrica et usu disquisitiones anatomicae. Romae 1701. 8. Recus. in ej. opp. Rom. 1741. 4.

1631. ° *Ejusd.* Diss. epistolaris (ad *Lucam Schroeckhium*) de glandulis conglobatis durae meningis humanae, indeque ortis lymphaticis ad piam meningem productis. Romae 1705. 8. (in act. nat. cur. Dec. III. adpend).

1632. ° *Ejusd.* Dissertationes physico-anatomicae de dura meninge humana novis experimentis et lucubrationibus auctae et illustratae. Romae 1721. 8.

1633. *Ejusd.* Dissertationes duae ad *Fantonum* datae illustrandis durae meningis ejusque glandularum structurae atque usibus concinnatae. Romae 1713. 8.

1634. *J. Fantoni,* animadversiones in opuscula *Pacchioni* de structura et motu durae matris. Genev. 1718. (8?)

1635. ° — *Ejusd.* epistolae tres de lymphae durae meningis veris scaturiginibus, contra motum ejus membranae. In coll. Diss. *Pacchioni.* Rom. 1721. 8.

1636. *Ejusd.* Diss. de structura et motu durae membranae cerebri, de glandulis ejus et vasis lymphaticis piae meningis. (In opusc. med. et physiol. Genev. 1738. 4.)

1637. ° *Alex. Littre,* grains glanduleux dans la dure mère et leur usage. Mém. de Paris 1704. 4. hist. p. 32. éd. in-8. hist. p. 39.

1638. ° *Jean Mery,* observation qui prouve que la dure mère est exactement collée à toute la superficie intérieure du crâne. Mém. de Paris 1705. hist. p. 50 éd. in-8 hist. p. 64.

1639. *Joh. Ant. Stancari,* de dura meninge; utrum sit musculus, et quo modo? Commentarii Bononienses. Tom. I. C. p. 133. O. p. 334.

1640. *Humphrey Ridley,* experimentum anatomicum ad veram durae matris motus causam detegendam institutum. Phil. trans. 1703. p. 1480.

1641. *Ann. Charl. Lorry,* sur les mouvemens du cerveau et de la dure mère. Mém. de math. et de Phys. Vol. III. p. 277. 344.

1642. ° *Mich. Ern. Ettmüller,* Progr. de durae matris officio. Lips. 1721. 4.

1643. *Joach. J. Costar* et *Lud. Petr. Lehoc,* Diss. non ergo dura mater habet motum per se. Paris 1728. 4.

1644. *Herm. Fr. Teichmeyer,* Diss. de musculosa durae matris substantia. Jenae 1729. 4.

1645. ° *Aug. Fr. Walther,* Pr. de pulsu sanguinis in durae menyngis sinu. Lips. 1737. 4. Recus. in *Hall.* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 775.

1646. *J. L'Admiral,* icon durae matris in convexa superficie visa. Amstel. 1738. 4.

Digitized by Google

1647. *J. L'Admiral*, icon durae matris in concava superficie visa. Amstl 1738. 4.

1648. *J. Fr. Fleischmann*, Diss. de dura matre. Altorf. 1739. 4.

1649. *Laghi*, sulla insensitivita ed irritabilita Halleriana, opuscoli di var autori da *Giac. Bartol. Fabri*. Bologna 1757. 4. P. II. p. 113 et 333 cum iconibus, quibus originem et decursum filorum nerveorum, per duram matrem decurrentium, delineare curavit. Tab. II. N. O. et Fig. II. p. 344.

1650. *Le Cat*, Diss. sur la sensibilité de la dure mère. In Traité de l'exist. de la nature et des propriétés de fluide des nerfs. Berl. 1765. 8. p. 176

1651. ° *Phil. Jac. Beyckert*, praes. *Jo. Fr. Lobstein*, Diss. de nervis durae matris. Argentor. 1772. 4. Recus. in *Ludwig*. script. nevrol. min. Vol. I p. 89. sq.

1652. *Jo. Gottfr. Leonhardi*, Pr. quatenus dura cerebri meninx matris mereatur nomen? Lips. 1778. 4.

1653. *Henr. Aug. Wrisberg*, de nervis, qui ex eodem (quinto) pare duram matrem ingredi falso dicuntur. Gotting. 1777. 4. In ej. comm. Gott 1800. p. 98.

1654. ° *Fr. Arnold*, Ueber die Nerven die zur harten Hirnhaut gehen, in *Tiedemann* und *Treviranus* Zeitschr. für Physiologie. B. II. p. 164. B. III p. 151.

Arachnoidea.

1655. *Andr. Ottomar Goelicke*, Diss. I. II. de meninge arachnoidea Frcf. ad Viadr. 1736. 1737. 4.

1656. ° *Xav. Bichat*, traité des membranes. Traité de la membrane arachnoide, p. 186—226. Daraus faſt wörtlich in deſſ. Anat. descr. Vol. II p. 29—59. (Hierher gehört auch deſſ. allgemeine Anatomie.)

1657. ° *C. Van den Broecke*, commentatio de membrana arachnoidea c fig. Gandaviae 1823. in Annales academiae Gandaviensis. Gandavi 1823. 4 p. 19.

1658. *Martin Saint-Ange*, Recherches anatomiques et physiologiques d cerveau et de la moëlle épinière et sur le liquide cérébro-spinal, im Journal hebdomadaire de Méd. Jan. 1830. p. 87.

Pia mater.

1659. ° *Jo. Henr. Graetz*, epist. anat. ad *Fred. Ruysch*, de pia mate ejusque processibus. Acc. *Ruysch.* responsio. Amst. 1696. 4.

1660. ° *Car. Aug. a Bergen*, Progr. de structura piae matris; inter ali novam nec hactenus visam tradit observationem. Frcf. ad Viadr. 1736. Recus. in *Halleri* Coll. Diss. anat. Vol. II. p. 833.

1661. ° *Andr. Ottomar Goelicke*, epist. anat. ad *Fred. Ruyschium*, d cursu arteriarum per piam matrem cerebrum involventem, de tertia cereb meninge, de arteriis membranarum cavitates ossis frontis supra narium radic et eas sub sella equina investientium, nec non de vasis arteriosis novis h patis et diaphragmatis. Acc. *Ruyschii* responsio. Amstel. 1679. 4.

1662. ° *B. S. Albin*, de sinuosis cerebri flexibus. De pia matre, ejusq itemque corticis et medullae cerebri vasis. Deque ipso cortice et medul In ej. annot. acad. Lib. I. c. 12. p. 39.

VII. Ueber das Gehirn und das Rückenmark.

Gehirn.

1663. *Andr. Planeri*, Diss. de capite et cerebro hominis ejusque tegumento. Tubing. 1580 (1586). 4.

1664. *Jac. Coci*, resp. *Z. Sommer*, Diss. de cerebro, arce Palladis munitissima sic nobilissima. Viteberg. 1595. 4.

1665. *Jo. Nic. Stupani*, theses de rara et genuina cerebri structura. Ba 1594. 4.

1666. *Ejusd.* Diss. de cerebro et partibus illius functioni inservientib Basil. 1601. (4?)

1667. *Adr. Romani*, resp. *J. C. Burckhard*, de cerebri anatome ejus administrandi ratione. Wirceburg. 1601. 4.

Digitized by Google

1668. *Casp. Hoffmann,* resp. *Dietrich,* Diss. de cerebro, medulla spinali et nervis cum biga problematum de motu et usu cerebri. Altdorf. 1622. 4.

1669. *Gottfr. Welsch,* anatome cerebri humani. Lips. 1639. (1674.) 4.

1670. °*Jo. Arn. Friderici,* resp. *Chstph. Relovio,* Diss. de cerebro, cerebello et horum medulla oblongata. Jenae 1661. 4.

1671. *Mich. Sennerti,* resp. *G. G. Schramm,* Diss. de cerebro. Viteberg. 1662. 4.

1672. °*Marcell. Malpighii,* exercitatio epistolica de cerebro, clar. *Carolo Fracassato.* In ej. opp. 1664. in *Mangeti* Bibl. anat. II. 294. et epistola responsoria de cerebro *Car. Fracassati.* ibid p. 301 sq.

1673. °An account of some discoveries concerning the brain, optik nerves and the tongue, made by *Sig. Malpighi.* Phil. transact. 1667. Vol. II. p. 491.

1674. °*Thom. Willis,* cerebri anatome, cui accessit nervorum descriptio et usus c. 13 tabb. aen. Lond. 1664. 4. (Amstel. 1664. 12. 1667. 12. Lond. 1670. 4. Genev. 1676. 4. Amstel. 1673. 12. Genev. 1694. 4. Recus. in ej. opp. Amst. 1682. 4. et in *Mangeti* Bibl. anat. II. p. 241—294 et p. 598—632.

1675. *Nic. Stenonis,* discours sur l'anatomie du cerveau. à Paris 1669. 12. °Diss. de cerebri anatome, e gallico exemplari, Parisiis edito an. 1669 latinitate donata, opera et studio *Guidonis* Fancisii. Lugd. Bat. 1671. 12. (Recus. in *Winslow.* expos. anat. et in *Mangeti* Bibl. anat. Vol. II. p. 326.)

1676. °*Franc. Jos. Burrhi,* epistolae II. 1) de cerebri ortu et usu medico, 2) de artificio oculorum, humores restituendi, ad *Thom. Bartholinum.* Hafniae 1669. 4.

1677. *Jo. Jac. Ritter,* singulares quaedam anatomicae observationes in cerebro, in thorace, in abdomine. Nov. act. acad. n. cur. Vol. III. p. 533.

1678. °*Joh. Henr. Glaseri* tractatus posthumus de cerebro, in quo hujus non fabricae tantum, sed actiones omnes principes, sensus ac motus ex veterum et recentiorum placitis et observationibus perspicue et methodice explicantur. Nunc primum luci publicae expositus opera *Joh. Jac. Staehelini.* Basil. et Frcf. 1680. 8.

1679. °*Ant. Leeuwenhoek,* letter, concerning the observations by him made of the carneous fibres of a muscle, and the cortical and medullar part of the brain. Phil. trans. 1677. p. 899.

1680. °*Ejusd.* an abstract of a letter, concerning the parts of the brain of several animals. Philos. trans. 1684. p. 883.

1681. *Fr. Schrader,* resp. *B. D. Behrens,* Diss. de cerebro et cerebello. In ej. additamentis ad *Veslingii* syntagma anat. Helmstad. 1689. 4.

1682. °*Just. Vesti* Pr. de cerebro minus cognito. Erford. 1689. 4.

1683. °*Henr. Ridley,* the anatomy of the brain containing its mechanism and physiology, together with some new discoveries and corrections of ancient and modern authors upon that subject. To which is annexed a particular account of animal functions and muscular motion. London 1695. 8. — Anatomia cerebri, mechanicam ejus atque physiologiam comprehendens, una cum novis inventis atque veterum et modernorum authorum circa idem subjectum emendationibus, vert. *M. E. Ettmüller.* Miscell. Acad. nat. cur. Dec. III. an. 9. 10. 1701—1705. Append. p. 76. (Lugd. Bat. 1725. 8. 1750. 8.) et in *Mangeti* Bibl. anat.

1684. *J. Jac. Harderi* Diss. de cerebri humani structura naturali. Basil. 1710. 4.

1685. *Urb. Sohan,* Diss. de cerebro. Traj. ad Rhen. 1712. 4.

1686. *Jo. Dom. Santorini,* de cerebro. In ej. obss. anat. Venet. 1724. 4. p. 48.

1687. °*A. Fr. Walther,* Progr. de cerebro, nervis et gangliis. Lips. 1727. 4.

1688. °*Jo. Ern. Hebenstreit,* Pr. de methodo cerebrum incidendi. Lips. 1739. 4.

1689. °Otto Just Wreden, kurtze und gründliche Demonstration des Gehirns und derer Theile, welche solches umgeben, denen Chirurgis und Anatomicis zum Besten nach der Lage und Structur entworfen. Leipz. u. Zelle 1741. 8.

1690. °*Sauveur Morand,* observations anatomiques sur quelques parties du cerveau. Mém. de Paris 1744. hist. p. 5. mém. p. 312. éd. in-8. hist. p. 5. mém. p. 430.

Digitized by Google

1691. *J(ean) B(onhomme)*, traité de la cephalotomie, ou description anatomique des parties que la tête renferme. à Avignon 1748. 4.

1692. *Arnauld Eloy Gautier d'Agoti*, (siehe Anat. Liter. im 1. Bd. S. 16. No. 73.)

1693. ° *Petr. Tarin*, adversaria anatomica prima de omnibus cerebri, nervorum et organorum functionibus animalibus inservientium descriptionibus et iconismis. Paris 1750. 4.

1694. *Jo. Grg. Roederer*, observationes de cerebro. Gotting. 1758. 4.

1695. ° *Just. Godofr. Günz*, Progr. I. II. observationes anatomicae de cerebro cont. Lips. 1750. 4.

1696. ° *Jo. Wilh. Baumer*, resp. *Jo. Fr. Richter*, Diss. de encephalo. Erford. 1764. 4.

1697. *Raph. Bienvenu Sabatier*, mémoire sur quelques particularités de la structure du cerveau et de ses enveloppes. Mém. de math. et de phys. 1773. Vol. VII. p. 593.

1698. ° Joh. Christph. Andr. Mayer, anatomisch-physiologische Abhandlung vom Gehirn, Rückenmark und Ursprung der Nerven. Mit Kpf. Berlin und Leipzig 1779. 4.

1699. ° *Vincenzo Malacarne*, nuova esposizione della vera struttura del cervelletto umano. Torino 1776. 8.

1700. *Ejusd.* Encefalotomia nuova universale, ossia nuovo dimostrazione anatomica di tutte le parti contenute nel cranio umano, e d'altri animali, con la descrizione delle varietá state nelle medesime osservate. Torino 1780. 8.

1701. *Laur. Nihell*, Diss. de cerebro. Edinb. 1780. recus. in *Smellie* thes. med. Edinensi. Vol. IV.

1702. ° *Franc. Gennari*, de peculiari structura cerebri, nonnullisque ejus morbis. Parmae 1782. 8.

1703. ° *Felix Vicq d'Azyr*, traité d'anatomie et de physiologie, avec des planches coloriées, représentant au naturel les diverses organes de l'homme et des animaux: Planches anatomiques avec des explications très-détaillées. Prem. part. Organes contenues dans la boëte osseuse du crâne. Cerveau de l'homme. Cinq Cahiers. à Par. 1786—1790. (*Oeuvres de Vicq d'Azyr.* Vol. VI.)

1704. *Ejusd.* Mém. 1) recherches sur la structure du cerveau, du cervelet, de la moëlle allongée, de la moëlle épinière et sur l'origine des nerfs de l'homme et des animaux. Mém. 2) observations sur plusieurs regions de cerveau disséqué par sa base et sur l'origine des nerfs. Mém. 3) sur la structure du cervelet, de la moëlle allongée, et de la moëlle épinière; et sur l'origine de plusieurs nerfs. Mém. 4) sur la structure du cerveau comparé avec celui de l'homme. Mém. de Par. 1781. mém. p. 405, 543, 566. 1783. mém. p. 468.

1705. ° Sam. Thom. Sömmerring, vom Hirn- und Rückenmark. Mainz 1788. 8.

1706. ° *Ejusd.* de basi encephali et originibus nervorum cranio egredientium libri V. cum IV. tabb. aen. Gotting. 1778. 4. Recus. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. II. p. 1—112.

1707. ° *Ejusd.* tabula baseos encephali. Frcf. ad M. 1799. Kl. Fol.

1708. ° Derselbe, über das Organ der Seele. Mit Kpf. Königsberg 1796. 4.

1709. ° *Ejusd.* Academicae annotationes de cerebri administrationibus anatomicis vasorumque ejus habitu. Denkschr. der Münchner Akad. 1808. S. 58.

1710. ° *Ejusd.* quatuor hominis adulti encephalum describentes tabulas commentario illustravit *E. d'Alton.* Berol. 1830. 4.

1711. *Alex. Monro* (fil.) three treatises on the brain, the eye and the ear. Edinb. 1797. 8.

1712. ... *Rossi*, sur la structure du cerveau. Mém. de l'acad. de Turin 1805—1808. Vol. IX. p. 89.

1713. ° Jos. und Karl Wenzel, Prodromus eines Werkes über das Hirn der Menschen und der Säugthiere. Tübingen 1806. 4.

1714. ° *Ejusd.* de penitiori structura cerebri hominis et brutorum. Cum XV. tabb. aen. et totid. linear. Tubing. 1812. Fol.

1715. ° *Fr. Benj. Osiander*, vera cerebri humani circa basin incisi imago, cum observationibus de cerebro et medulla spinali, novaque nervos aeque ac plantarum vasa hydrargyro implendi methodo. Comment. soc. reg. Gotting. Vol. XVI. 1804—1807. p. 77—106.

Digitized by Google

1716. °Karl Fr. Burdach, Beiträge zur nähern Kenntniß des Gehirns in Hinsicht auf Physiologie, Medicin und Chirurgie, 1r u. 2r Thl. Leipz. 1806. 8.

1717. *Chaussier*, exposition sommaire de la structure et des différentes parties de l'encephale ou cerveau. Avec planch. à Par. 1807. 8.

1718. °Jo. Chr. Reil, über die Bildung des kleinen Gehirns im Menschen. Reils Archiv VIII. 1. Erste Fortsetz. der Untersuchungen über den Bau des kleinen Gehirns. Ebendas. VIII. S. 273. Zweite Forts. über die Organisation der Lappen und Läppchen, oder der Stämme, Aeste, Zweige und Blättchen des kleinen Gehirnes, die auf dem Kern desselben aufsitzen. Ebendas. VIII. 385. — Dritte Forts. Nachtrag zur Anatomie des kleinen Gehirns. Ebendas. IX. S. 129. Vierte Fortsetz. Untersuchungen über den Bau des großen Gehirns im Menschen. Ebendas. IX. S. 136. — Das Balkensystem oder die Balkenorganisation im großen Gehirn. Ebendas. IX. 172. — Die Sylvische Grube, oder das Thal, das gestreifte große Hirnganglium, dessen Kapsel und die Seitentheile des großen Gehirns. Ebendas. IX. S. 195. — Fünfte Fortsetz. Das verlängerte Rückenmark, die hinteren, seitlichen und vorderen Schenkel des kleinen Gehirns und die theils strangförmig, theils als Ganglienkette in der Are des Rückenmarkes und des Gehirns fortlaufende graue Substanz. Ebendas. IX. S. 485. — Sechste Fortsetz. Die vordere Commissur im großen Gehirn. Ebendas. XI. S. 89. — Siebente Fortsetz. Die Scheidewand, ihre Höhle, die Zwillingsbinde und die Höhlen im Gehirn. Ebendas. XI. S. 101. Achte Fortsetz. Nachträge zur Anatomie des großen und kleinen Gehirns. Ebendas. XI. S. 345. — Mangel des mittlern und freien Theiles des Balken im Menschengehirn. Ebendas. XI. S. 341.

1719. *Charl Bell*, the anatomy of the brain; explained in a series of engravings, beautifully coloured, with a dissertation on the communication between the ventricles of the brain. London 1809. 4.

1720. *G. Cuvier*, rapport fait à l'institut national sur un mémoire de *M. Gall* et *Spurzheim* rélatif à l'anatomie du cerveau. à Par. 1808. 4.

1721. *Fr. Jos. Gall* et *G. Spurzheim*, recherches sur le système nerveux en général, et sur celui du cerveau en particulier. av. fig. à Par. 1809. 4. — — Untersuchungen über die Anatomie des Nervensystems im Allgemeinen und des Gehirns insbesondre; ein dem Franz. Institute überreichtes Memoire, nebst dem Berichte der H. Commissarien des Inst. mit den Bemerk. des Verf. über diesen Bericht. 2 Thle. Paris und Straßb. 1810—1812.

1722. *Rolando*, saggio sulla vera struttura del cervello dell' uomo e degli animali, e sopra le funzioni del systema nervoso. Sassari. 1809.

1723. °*Sam. Chr. Lucae*, de cerebri in homine vasis et motu. Heidelberg. 1812. 4.

1724. *J. A. H. Reimari*, de cerebro et nervis commentariolus. Denkschr. d. Akad. d. Wiss zu München auf d. Jahre 1811 und 1812. S. 167.

1725. °Crl. Gust. Carus, Versuch einer Darstellung des Nervensystems und insbesondere des Gehirns, nach ihrer Bedeutung, Entwickelung und Vollendung im thierischen Organismus. Mit 6 Kpft. Leipz. 1814. 4.

1726. °Fr. Rosenthal, ein Beitrag zur Encephalotomie. Nebst 2 Kpft. Weimar 1815. 8.

1727. *John Gordon*, observations on the structure of the brain, comprising an estimate of the claims of Dr. *Gall* and *Spurzheim* to discovery in the anatomy of that organ. Edinb. 1817.

1728. °*F. Lauth*, sur la structure du cerveau et de ses annexes. Journal compl. d. dict. des sc. méd. Vol. III. 1819, p. 97. Vol. IV. 113 et 303.

1729. °Krl. Fr. Burdach, vom Baue und Leben des Gehirnes, 1 — 3 Bd. mit Kpf. Leipz. 1819—26. 4.

1730. °Gottfried Reinhold Treviranus, Untersuchungen über den Bau und die Functionen des Gehirns, der Nerven und der Sinneswerkzeuge in den verschiedenen Klassen und Familien des Thierreichs. Bremen 1820. 4. (Bildet auch den 3ten Bd. der vermischten Schriften anat. und physiol. Inhalts.)

(Die Werke von Serres, Desmoulin und Laurencet sind bereits Th. I. S. 48 No. 676. 677. 678. aufgeführt. — Zu den Werken, welche den Bau des Gehirns auch durch Abbildungen erläutern, gehören ganz besonders noch die öfter citirten Icones anatomicae von Langenbeck, Fasc. I

Digitized by Google

1731. ° Aug. Erl. Bock, Darstellung des Gehirns, des Rückenmarkes und der Sinneswerkzeuge, so wie auch des menschlichen Körpers überhaupt, nach seinem äußeren Umfange. Mit 15 Kpf. Leipz. 1824. 8.

1732. The anatomy of the brain, adapted for the use of students, compri directions with regard to the method to be pursued in its dissection, conformable to the mode practised by most anatomists. London 1824. 12.

1733. ° *Henr. Fr. Ohrt*, Diss. diatribes, quae de cerebro nonnulla continet, fragmenta quaedam. Kiliae 1826. 4.

1734. ° *P. J. Manec*, anatomie analytique. Tableau représentant l'axe cerebro-spinal chez l'homme avec l'origine et les premières divisions des nerfs qui en partent. Par. 1828. (eine lith. Tafel in gr. Fol. mit Text an der Seite.)

1735. A Series of Engravings intended to illustrate the structure of the Brain and Spinal Chord in Man, by *Herbert Mayo*. London 1827. S. London med. and phys. J. July 1727. p. 63 recensirt.

1736. *Luigi Rolando*, della struttura degli emisferi cerebrali. Torino 1830. 4. (10 Kpft.) Auszug in Biblioteca italiana, Marzo 1831. p. 299.

Kleines Gehirn.

1737. ° *Laurent. Heister*, de admiranda cerebelli structura. Ephem. acad. nat. cur. Cent. 5 et 6. p. 157.

1738. *Leopoldo Caldani*, esperienze ed osservazioni dirette a determinare qual sia il luogo principale del cervello, in cui, piu che altrove, le fibre midollari dello stesso viscere s'incrocicchiano. Saggi di Padova. Vol. 1. p. 1.

1739. *Vincenzo Malacarne*, questioni anatomiche, fisiologiche e chirurgiche dilucidate. Quest. 4. Posto l'esistenza di tutte quella parti del cervelletto, che in alcuni libri moderni si veggono mentovate, quali sono i lobi, i lobetti, i foglietti, le linguette laminose, le code, i fiocchi, le tonsille, l'ugola, il tuberculo anch'esso laminoso, la piramide, le commessure e la numerosissima famiglia delle lamine, e i noccioli midollari, e i molteplici alberi della vita, che in quella picciola porzion del cerebro degli uomini e di quadrupedi, si dicono compresi e visibili, quale mai e egli la maniera piu speditiva di vederne quelle tante cose e di numerarne per fin le lamine, come si pretende essere strato fatto? Memor. della soc. Italiana. Vol. VIII. P. I. p. 219.

1740. *Serres*, recherches physiologiques et pathologiques sur le cervelet de l'homme et des animaux. Paris 1823. 8. avec fig.

(Vergl. auch hier Reil No. 1718.)

Rückenmark.

1741. ° *Gerard Blasii* anatome medullae spinalis et nervorum inde provenientium. Amstel. 1666. 12. cum fig.

1742. ° *Guichard Joseph Duverney*, de la structure et du sentiment de la moëlle. Mém. de Paris éd. in — 4. 1700. hist. p. 14. mém. p. 196. éd. in — 8. hist. p. 18. mém. p. 252.

1743. ° *Jo. Jac. Huber*, Pr. de medulla spinali. Gotting. 1739. 4.

1744. ° *Idem*, de medulla spinali, speciatim de nervis ab ea provenientibus commentatio, c. iconib. Gott. 1741. 4.

1745. ° *Antoine Portal*, observation sur une spina bifida, et sur le canal de la moëlle épinière. Mém. de Paris 1770. hist. p. 40. mém. p. 238.

1746. ° *Raph. Bienvenu Sabatier*, mémoire sur quelques particularités de la structure de la moëlle de l'épine et de ses enveloppes. Mém. de Par. 1783. mém. p. 67.

1747. ° *Grg. Christ. Frotscher*, descriptio medullae spinalis ejusque nervorum iconibus illustrata. Erlangae 1788. Fol. Recus. in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. IV. p. 70.

1748. ° *G. G. Th. Keuffel*, Diss. de medulla spinali. Halae 1810. 8. Deutsch: über das Rückenmark, in Reils Arch. X. 123—203.

1749. ° *Vincenzo Racchetti*, della struttura, delle funzione e delle malattie della midolla spinale. Milano 1816. 8.

1750. ° Karl Fr. Burdach, Berichte über die kön. anat. Anstalt zu Königsberg. Erster Bericht, mit einer Beschreibung des unteren Endes des Rückenmarkes. Leipzig 1819. 8.

Digitized by Google

1751. ° *L. Rolando*, recherches anatomiques sur la moëlle allongée. Lues à l'academie de Turin dans la séance du 29. Déc. 1822. 4. c. fig. *Magendie*, Journ. de physiol. expérim. Vol. IV. 1825. p. 317. et Bullet. d. sc. méd. 1825. Vol. IV. p. 309.

1752. ° *Idem*, ricerche anatomiche sulla struttura del midolle spinale. Con figure. Torino 1824. 8.

1753. ° *Car. Franc. Bellingeri*, de medulla spinali nervisque ex ea prodeuntibus annotationes anatomico-physiologicae. Augustae Taurinor. 1823. 4. c. tabb. aen.

1754. ° *C. P. Ollivier*, traité de la moëlle épinière et de ses maladies, contenant l'histoire anatomique, physiologique et pathologique de ce centre nerveux chez l'homme. (Paris 1824. 8.) Seconde édit. revue, corrigée et augm. 2 Voll. avec 3 pl. à Paris 1827. 8. — Deutſch: über das Rückenmark und ſeine Krankheiten. Mit Zuſätzen vermehrt von Juſt. Radius. Mit 2 Steintafeln. Leipz. 1824. 8.

1755. ° O. G. L. Girgenſohn, das Rückenmarksſyſtem, eine anatomiſche Abhandlung als Einleitung zur Phyſiologie und Pathologie dieſes Syſtemes. Riga 1828. 8. m. Kpf.

VIII. Schriften über einzelne Theile des Gehirns.

Sinus der harten Hirnhaut.

1756. ° *Renate Jacq. Crescens Garengeot*, observation anatomique sur le sinus du cerveau. Mém. de Paris, 1728. hist. p. 21. éd. in — 8. hist. p. 27.

1757. ° *Jo. Grg. Ducernoy*, de sinibus cerebri. Comm. petrop. Vol. IV. 1735. p. 130 sq.

1758. ° *Just. Godofr. Günz*, Pr. de sanguinis motu per durioris cerebri membranae sinus observationes quaedam. Lips. s. a. 4.

Verſchiedene Subſtanzen.

1759. ° *Marcelli Malpighi* de cerebri cortice. In operibus et in Mangeti Bibl. anat. II. 321.

1760. ° *G. Lud. Teissier*, de substantia corticosa ac medullosa cerebri. Lgd. B. 1710. 4.

1761. ° *Mich. Ern. Ettmüller*, epist. anat. ad *Fr. Ruyschium* de cerebri corticali substantia. In *Ruyschii* operibus. Amstel. 1721. 4. acc. *Ruyschii* responsio.

1762. ° *Jo. Christph. Bohlii* Diss. epist. ad *Fr. Ruyschium*, de usu novarum cavae propaginum in systemate chylopoeo, ut et de corticis cerebri textura. In *Ruysch.* operib. Amst. 1727. 4. — *Ruyschii* responsio. Ibid. c. tab. aen.

1763. ° *Meckel*, sur la diversité de couleur dans la substance médullaire du cerveau des Nègres. Hist. de l'acad. roy. d. sc. et bell. lettr. de Berlin 1753. p. 97.

1764. ° *Ch. Fr. Ludwig*, Diss. de cinerea cerebri substantia. Lips. 1779. 4. et in ej. exerc. acad. Fasc. I.

Glandula pinealis.

1765. *Jo. Jac. Waldschmidt*, resp. *Jo. Wilh. Beutler*, Diss. de glandulae pinealis statu naturali et praeternaturali. Marpurgi 1680. 4.

1766. *J. Eberh. Schweling*, resp. *W. Penon*, Diss. de glandula pineali sede mentium humanarum. Bremae 1688. 4.

1767. *J. Filing*, resp. *W. Zurckes*, Diss. de glandula pineali. Bremae 1695. (4?)

1768. *J. Salzmann*, Diss. de glandula pineali lapidefacta. Argentor. 1733. 4.

1769. *J. G. Günz*, Progr. quod lapillos glandulae pinealis in quinque mente alienatis proponit. Lips. 1753. 4.

Digitized by Google

1770. °*Jo. Fr. Meckel*, observationes anatomicae de glandula pineali, septo lucido, et origine paris septimi nervorum cerebri. In *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. IV. p. 9.

1771. °*Idem*, observations anatomiques sur la glande pinéale, sur la cloison transparente, et sur l'origine du nerf de la septième paire. Mém. de Berlin 1765. p. 91.

1772. °*Hieron. Laub*, arenulae in glandula pineali repertae. Ephem. nat. cur. Cent. 9 et 10, p. 149.

1773. *Jac. Fr. Isenflamm*, de acervulo cerebri. Nov. act. acad. nat. cur. Vol. VIII. p. 162.

1774. °C. H. Pfaff, über den Hirnsand. Meck. Arch. III. 769.

1775. °*Sam. Thom. Soemmerring*, resp. *Nic. Lisignolo*, Diss. de lapillis vel prope vel intra glandulam pinealem sitis, sive de acervulo cerebri. Moguntiae 1785. 8. Recus. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. III. p. 322.

1776. *Gisb. Jac. Wolff*, Diss. sist. quaestiones varii argumenti (de conario et acervulo cerebri.) Harderov. 1791. 4.

Glandula pituitaria.

1777. °*Joh. Conr. Brunner*, resp. *Franc. Sebast. Vorster*, Diss. de glandula pituitaria. Heidelberg. 1688. 4. (Frcf. 1715. 8.)

1778. *Alex. Littre*, observation sur la glande pituitaire d'un homme. Mém. de Paris 1707. hist. p. 16. mém. p. 125. éd. in-8. hist. p. 19. mém. p. 162.

1779. °J. Wenzel, Beobachtungen über den Hirnanhang fallsüchtiger Personen. Nach seinem Tode herausgegeben v. C. Wenzel, nebst einer kurzen Lebensgeschichte des Verfassers, von Dr. S. Ch. Lucä, mit 9 Kpft. Mainz 1810. 8.

1780. °Karl Vogel, von der Bedeutung der Hirnanhänge, Inauguralabhandlung. Würzburg 1828. 8.

Ventriculi.

1781. *Joach. Oelhafen*, Diss. de usu ventriculorum cerebri. Gedan. 1616. 4.

1782. *Alex. Littre*, observation sur l'eau, qui est dans les ventricules du cerveau. Mém. de Paris 1711. hist. p. 29 éd. in — 8. hist. p. 37.

1783. *Herm. Fr. Teichmeyer*, Progr. I—III. de lympha cerebri. Jenae 1728. 4.

1784. °*Car. Aug. a Bergen*, exercitatio splanchnologico-anatomica, qua ventriculorum cerebralium lateralium novam sistit tabulam. Frcf. a. Viadr. 1734. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 841.

1785. *Vincenzo Malacarne*, questioni anatomiche, fisiologiche e chirurgiche dilucidate. Quest. I. Se nel cerebro umano altre cavita non s'incontrino costantemente, degne d'entrar nel numero de ventricoli, eccetto le quattro universalmente conosciute. Quest. 2, quale si e l'ampiezza della cavita de' cinque ventricoli novelli? Quest. 3. qual e la maniera piu speditiva di scuoprirgli? Memor. della soc Italiana. Vol. VIII. P. I. p. 219.

1786. °*Jo. Gottl. Haase*, de ventriculis cerebri tricornibus lucubrationes anatomicae. Lips. 1789. 4.

1787. °*Car. Asm. Rudolphi*, commentatio de ventriculis cerebri. Gryphiae 1796. 4.

1788. °Derselbe, über die Gehirnhöhlen. In s. anat. phys. Abhandl. Berlin 1802. 8. S. 149—189.

Infundibulum.

1789. °*Jon. Sidrén*, resp. *Adolph Murray*, observationes anatomicae circa infundibulum cerebri; ossium capitis in foetu structuram alienam; partemque nervi intercostalis cervicalem. Upsal. 1772. 4. Recus. in *Ludwig* script. nevrol. min. Vol. II. p. 242.

Verschiedene andere Theile.

1790. °*Alb. a Haller*, resp. *Joh. Gottfr. Zinn*, Diss. sist. experimenta quaedam circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem, in vivis ani-

Digitized by Google

malibus instituta. Gotting. 1749. 4 recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. VII. p. 421. et in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. IV.

1791. ° *Joh. Conrad Peyer*, de rete mirabili cerebri ejusque descriptione accuratiori et usu. Miscell. acad. nat. cur. Dec. 2. an. 5. 1686. p. 355.

1792. ° *Herm. Fr. Teichmeyer*, Pr. de magna cerebri valvula. P. I. II. Jenae 1728. 4.

1793. ° *Idem.* Progr. de septo pellucido, animae domicilio. Jenae 1729. 4.

IX. Schriften über die Entwickelung des Nervensystems, namentlich des Gehirns.

1794. ° *Jac. Fidel. Ackermann*, de nervi systematis primordiis commentatio. Accedit de naturae humanae dignitate oratio academica. Mannhem. et Heidelb. 1813. 8.

1795. ° J. F. Meckel, Versuch einer Entwickelungsgeschichte der Centraltheile des Nervensystems in den Säugthieren. In: Meckels Arch. I. 1 — 108. Fortsetzung, ibid. I. 334 — 422.

1796. ° Ignaz Döllinger, Beiträge zur Entwickelungsgeschichte des menschlichen Gehirns. Mit 2 Kpft. Frkf. a. M. 1814. Fol.

1797. L. Schönlein, von der Hirnmetamorphose. Würzburg 1816. 8.

1798. ° Friedrich Tiedemann, Anatomie und Bildungsgeschichte des Gehirns im Fötus des Menschen, nebst einer vergleichenden Darstellung des Hirnbaues in den Thieren. Mit 7 Kpft. Nürnberg 1816. 4. Französisch: anatomie du cerveau, contenant l'histoire de son développement dans le foetus, avec une exposition comparative de la structure dans les animaux. Trad. de l'Allemand, avec un discours préliminaire sur l'étude de la physiologie en général, et sur celle de l'action du cerveau en particulier par *A. J. L. Jourdan.* à Paris 1823. 8. avec 14 planch. Englisch: the anatomy of the foetal brain, with a comparative exposition of its structure in animals. Translated from the french of *A. J. L. Jourdan* by *Will. Bennett.* To which are added, some late observations on the influence of the sanguineous system over the developpement of the nervous system in general. Illustr. by 14 plates. Edinb. and London 1825. 8.

1799. ° *Desmoulins*, exposition succincte du développement et des fonctions du système cerebro-spinale. Vid. Arch. génér. de méd. Juin. 1823.

1800. *Nichol*, on cerebral structure occurring in infants. London 1822. 12.

1801. ° *Paul. Balogh de F. Almás*, Diss. de evolutione et vita encephali. Pestini 1823. 8.

1802. ° Girgensohn, Bemerkungen über die Deutung einiger Theile des Fötusgehirns. Meckels Arch. Jahrg. 1827. p. 358.

1803. ° *Ejusd.* nouvelles observations sur quelques parties de l'encephale du Fétus humain. Répert. génér. d'anat. et de phys. path. Vol. V 1828. p. 180.

X. Schriften über mehrere Nervenpaare zugleich.

1804. ° *Meckel*, Diss. anatomique sur les nerfs de la face. Hist. de l'ac. roy. des sc. et bell. lettr. de Berlin 1751. p. 19.

1805. ° *Car. Sam. Anderschii* fragmentum descriptionis nervorum cardiacorum (vel potius nervorum prope cor) dextri lateris jam ante aliquot decennia typis impressum, nunc demum ao. 1791. subjuncta autoris tabula notulisque adjectis editum a *S. Th. Soemmerring.* Recus. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. II. p. 113.

1806. ° *Ejusd.* tractatio anatomico-physiologica de nervis humani corporis aliquibus, quam edidit *Ernst. Phil. Andersch.* P. I. II. Regiom. 1797. 8. c. tabb. aen.

1807. ° Scriptores nevrologici minores selecti, s. opera minora ad anatomiam, physiologiam et pathologiam nervorum spectantia. Edidit, notulis nonnullis illustravit, praefatus est, indicibus auxit *Christ. Frid. Ludwig.* Vol. I — IV. c. tabb. aen. Lips. 1791 — 1795. 4.

1808. ° *Nicol. Ulric. Stieck*, Diss. de quinque prioribus encephali nervis. Gotting. 1791. 8.

Digitized by Google

1809. ° *Ant. Scarpa*, tabulae nevrologicae ad illustrandam historiam anatomicam cardiacorum nervorum noni nervorum cerebri, glossopharyngaei et pharyngaei ex octavo cerebri. Ticini 1794. Fol.

1810 ° *Adph. Murray*, sciagraphica nervorum capitis descriptio, et quidem paris 1. 2. 3. 4. 5. Upsal. 1793. 4. resp. *Jac. Ackermann.* — 2) resp. *Jo. Noraeus* 6 — 11. Upsal. 1798. — resp. *Olavus Noraeus* — cervicalium cum plexu brachiali. Ups. 1794. resp. *Jo. Jac. Ekman.* intercostalis s. sympathetici. Ibid 1796. resp. *Gust. Henr. Ahlstedt*, dorsalium atq. lumbalium. Upsal. 1796. 4. resp. *Laurent. Zenius*, sacralium cum plexu ischiadico. Upsal. 1797. 4.

1811. ° *Chr. Jac. Baur*, tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani, thoracis imprimis abdominisque. Tubing. 1818. 4.

Hirnnerven. Erstes Paar.

1812. ° *Jo. Hadr. Slevogt*, resp. *Jo. Otto Horstius*, Diss. qua processus cerebri mammillares ex nervorum olfactoriorum numero exemtos disquisitioni submittit. Jenae 1715. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 849 sq. (Siehe auch Stieck No. 1808. und Murray No. 1810.)

1813. ° *Dieder. Wilh. Andreae*, Diss. de processibus mamillaribus. Lgd. Bat. 1715. 4.

1814. ° *Jo. Ern. Neubauer*, de processuum cerebri mammillarium cum naribus connexione. Nov. acta acad. nat. cur. Vol. VI. p. 293.

1815. *Jos. Weitbrecht*, de vera significatione processuum mamillarium cerebri. Comm. petrop. XIV. 1751. p. 276.

1816. *Guichard. Jos. Duverney*, comparaison des nerfs olfactifs dans l'homme et dans les animaux. Mém. de Par. Tom. I. p. 366.

1817. *Aimé Matthieu*, tentamen physiologico-anatomicum de nervis in genere, accedente primi, secundi, tertii et quarti nervorum paris descriptione. Lgd. Bat. 1758. 4.

1818. ° *Joh. Dan. Metzger*, primi paris nervorum historia. Argentinae 1766. 4. In ejusd. opusculis. Gothae 1790. p. 1 sq. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. I. p. 108 et in *Sandifort* thes. Diss. III. 457.

1819. ° *Jo. Gttl. Haase*, Pr. de nervis narium internis. Lips. 1791. 4.

1820. ° *M. F. Magendie*, le nerf olfactif est-il l'organe de l'odorat? expériences sur cette question. In ej. Journ. de physiol. expér. Vol. IV. 1825. p. 169.

Zweites Paar.

1821. ° *Constantii Varolii* de nervis opticis, nonnullisque aliis praeter communem opinionem in humano capite observatis ad *Hyeronimum Mercurialem*. Frcf. 1591. 8.

1822. ° *Leeuwenhoek*, microscopical observations, concerning the optic nerve. Phil. transact. 1675. p. 378.

1823. ° *Dan. Bernoulli*, experimentum circa nervum opticum. Comment. acad. sc. Petrop. Tom. 1. 1728. p. 314. sq.

1824. ° *Jo. Ant. Heyn*, disquis. inaug. exhibens animadversiones anat. juxta nervum opticum atque amphiblestroidem tunicam. Kilonii s. a. 4.

1825. *J. Fr. Henckel*, epist. gratulatoria ad *Jo. Kesselring*, de nonnullis singularibus circa nervos opticos. Halae 1738. 4. recus. in commerc. litt. Norico 1739. p. 71 sq.

1826. ° *Jo. Juncker*, resp. *Jo. Henr. Moeller*, Diss. exhibens nonnullas observationes circa tunicam retinam et nervum opticum. Halae 1749. 4. Hall. coll. VII. 2. p. 187.

1827. ° Phil. Michaelis, über die Durchkreuzung der Sehnerven. Mit einigen Anm. v. Sömmerring. Halle 1790. 8.

1828. ° *Sam. Thom. Soemmerring*, resp. *Fr. Nic. Noethig*, Diss. de decussatione nervorum opticorum. Moguntinae 1786. 8. Recus. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. I. p. 127.

1829. ° Weber, anat. phhsiol. Erklärung der Sinnesverrichtung des Gesichts. In Reils Arch. VI. 282. (handelt v. S. 286 — 292. v. d. Durchkreuzung.)

Digitized by Google

1830. ° *William Hyde Wollaston*, on semidecussation of the optic nerves. Phil. trans. 1824. P. I. p. 222.
(Vgl. auch Stieck No. 1808. und Murray No. 1810.)

Fünftes Paar.

1831. ° *Jo. Casp. Frank*, Diss. sist. delineationem anatomicam et physiologico-pathol. consensus nervi trigemini. Jenae 1799. 8.

1832. ° *Jo. Frid. Meckel*, Diss. de quinto pare nervorum cerebri. Gottingae 1748. 4. tabb. Recus. in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. I. p. 145.

1833. ° *Jo. Fr. Meckel*, observation anatomique sur un noeud ou ganglion du second rameau de la cinquième paire des nerfs du cerveau nouvellement découvert, avec l'examen physiologique du véritable usage des noeuds ou ganglions des nerfs. Voyez Mém. de Berlin 1749. p. 84 — 103.

1834. ° *Jo. Fr. Meckel*, de ganglio secundi rami quinti paris nervorum cerebri nuper detecto, deque vera gangliorum nervosorum utilitate. Berol. 1749. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. IV. p. 7.

1835. ° *Anton Balthasar Raymund Hirsch*, Diss. paris quinti nervorum encephali disquisitio anatomica in quantum ad ganglion sibi proprium semilunare et ad originem nervi intercostalis pertinet. Viennae 1765. 4. Recus. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. I. p. 244. et in *Sandifort* thes. Diss. III. 477.

1836. ° *Henr. Aug. Wrisberg*, observationes anatomicae de quinto pare nervorum encephali, et de nervis, qui ex eodem duram matrem ingredi falso dicuntur. Gottingae 1776. 4. c. tab. aen. Novi commentar. soc. Gottingens. Tom. 7. 1776. Phys. p. 41. in ejusd. commentationum. Vol. I. p. 98 sq. et in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. I. p. 265.

1837. ° ☞ *B. Palletta*, de nervis crotaphitico et buccinatorio. Mediolani 1784. 4. Recus. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. III. p. 63.

1838. ° *Ant. Scarpa*, anat. annot. Lib. II. de organo olfactus praecipuo, deque nervis nasalibus inferioribus e pari quinto nervorum cerebri. Ticini 1785. 4.

1839. ° *Jo. Gtl. Haase*, Progr. de nervo maxillari superiore s. secundo ramo quinti paris nervorum cerebri. Lips. 1793. 4.

1840. ° *Idem*, Progr. de nervis narium internis (quinti paris). Lips. 1791. 4. Recus. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. IV. p. 11.

1841. ° John Hunters Beschreibung einiger Zweige des fünften Nervenpaares. In Bemerk. über d. thier. Oekon. Braunschw. 1802. S. 364 ff.

1842. ° *Aug. Frid. Ludw. Fitzau*, Diss. de tertio ramo paris quinti nervorum cerebri s. nervo maxillari inferiore. Lipsiae 1811. 4.

1843. ° *Guil. Herm. Niemeyer*, de origine paris quinti nervorum cerebri monographia. Halae 1812. 8. Deutsch: über den Ursprung des fünften Nervenpaares des Gehirns. In Reils Arch. XI. 1 — 88.

1844. ° Aug. Erl. Bock, Beschreibung des fünften Nervenpaares und seiner Verbindung mit andern Nerven, vorzüglich mit dem Gangliensysteme. Mit Kpft. Meißen 1817. Fol. — Dessen Nachtrag zu der Beschreib. u. s. w. Meißen 1821. Fol.

1845. Intorno la scoperta di due nervi dell' occhio umano ragguaglio del Dr. *Gius. Trasmondi*. Estratto dell giornale arcadico. Vol. XIX. P. I. Roma 1823. 8. (1 Kpf.)

1846. Osservazioni storico-anatomiche intorno alla pretesa scoperta di un musculo e di due nervi nel occhio umano. Roma 1823. 8.

1847. Riposta del Dr. *Gius. Trasmondi* al Sign. *G. Flajani* intorno la scoperta del musculo *d'Horner* e de' nuovi due nervi dell' occhio umano. Roma 1823. 8.

(Hierher gehören auch einige der unter No. 1617 — 1623 aufgeführten Abhandlungen von Bell.)

1848. ° *Dan. Fred. Eschricht*, de functionibus septimi et quinti paris nervorum in facie propriis. In *Magendie* Journ. de physiol. exper. Vol. VI. 1826. p. 228.

1849. ° *Idem*, de functionibus primi et quinti paris nervorum in olfactorio organo propriis. Ibid. Vol. VI. p. 339.

Digitized by Google

Siebentes Paar.

1850. °*Jo. Fr. Meckel*, observation anatomique sur la glande pinéale, sur la cloison transparente, et sur l'origine du nerf de la septième paire. Mém. de Berlin 1765. p. 91.

Achtes Paar.

1851. *Peter Paul Molinelli*, de ligatis sectisque nervi octavi paris. Commentar. Bononienses. Vol. III. C. p. 67. O. p. 280.

1852. *Charles Louis Dumas*, exposé de quelques expériences propres à déterminer quelle est l'influence des nerfs de la huitième paire sur la coloration du sang. *Sedillot* rec. périod. de la soc. de médec. de Paris. Vol. XXX. p. 353.

1853. *Ducrotay de Blainville*, expériences sur l'influence de la huitième paire des nerfs dans la respiration. Nouv. Bulletin de la soc. philom. Vol. I. p. 226.

1854. *Legallois*, mémoire sur la section de nerfs de la huitième paire. Nouv. Bulletin de la soc. philom. Vol. II. ann. 3. (1810) p. 101.

(Siehe auch Scarpa No. 1809.)

1855. °W. Krimer, über das Verhältniß der Form und Miſchung des Gehörnervens zu ſeiner Verrichtung. In ſ. phyſ. Unterſuch. Leipz. 1820. p. 229.

Neuntes Paar.

1856. °*Jo. Franc. Guil. Boehmer*, Diss. de nono pare nervorum cerebri. Gotting. 1777. 4. Recus. in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. I. p. 279.

1857. °*Car. Sam. Andersch*, de nono nervo capitis s. nervo sensorio linguae. In ej. tract. de nervis c. h. aliquibus. P. I. p. 1 sq.

1858. °*C. L. Jacobson*, (Acta regiae societ. Hafniens. Vol. V. p. 292.) Deutſch: Beiträge zur Otoiatrie. Erſter Beitrag: Ueber eine neue, im Ohre entdeckte Nervenverbindung. In Meck. Arch. V. 252.

1859. *Ejusd.* description anatomique d'une anastomose entre le nerf pharyngo-glossien, le trifacial et le trisplanchnique. Répert. génér. d'anat. et de physiol. path. et de cliniq. chir. Tom. II. Paris 1826. 4. p. 197—204. Notes additionnelles à ce mémoire par *G. Breschet*. Ibid. p. 204—215.

1860. °Hermann Friedr. Kilian, anatomiſche Unterſuchungen über das neunte Hirnnervenpaar oder den Nervus glossopharyngeus. Nebſt angehängten Bemerkungen über das anatomiſche Muſeum der Univerſität zu Straßburg. Nebſt 2 Kpft. Peſth 1822. 4.

(Vgl. auch Scarpa No. 1809.)

Zehntes Paar.

1861. *Raphael Bienvenu Sabatier*, mémoire sur les nerfs de la dixième paire. Mém. de mathem. et de phys. 1773. Vol. VII. p. 553.

1862. °*Car. Sam. Andersch*, de decimo nervo capitis sive nervo harmonico magno capitis. In ej. tract. anat. de nervis c. h. aliquib. P. I. p. 19.

1863. *George Martin*, the experiment of culling the recurrent nerves, carried on further them has hitherto been done. Med. essays and observations by a Soc. in Edinburgh. Vol. II. p. 114.

1864. *John Haigthon*, experiments made on the laryngial and recurrent branches of the eigth pair of nerves, with a view to determine the effects of the division of those nerves on the voice. Mem. of the med. soc. of London. Vol. III. p. 422.

Elftes Paar.

1865. °*Jo. Frid. Lobstein*, Diss. de nervo spinali ad par vagum accessorio. Argentor. 1760. 4. recus. in *Sandifort* Thes. diss. Tom. I. p. 325 et in *Ludwigii* script. nevr. min. Vol. II. p. 219.

1866. °*Car. Sam. Andersch*, de undecimo nervo capitis sive nervo motorio linguae. In ej. tract. anat. de nervis c. h. aliquib. P. I. p. 52. — de nervo descendente interno colli s. nervo musculos colli movente interno, et nervo descendente externo colli s. nervo musculos colli movente externo. Ibid. p. 91.

Digitized by Google

1867. *Jo. Bapt. Morgagni*, epistola de iis, quae in Academia Bononiensi ab *Antonio Maria Valsalva* recitata sunt: Diss. 1. P. 3. tertio loco ea proposuit, quibus trahebatur ad suspicandum, nervos, quos ceteri credunt et vocant a spinali medulla ad par vagum accessorios esse, et vocari oportere a pari vago ad medullam spinalem recurrentes. Commentar. Bononiens. Vol. I. p. 377.

1868. *Ant. Scarpa*, de nervo spinali ad octavum cerebri accessorio commentarius. Acta acad. med. chir. Vindobon. Tom. I. 1788. p. 337. Ueber den zum achten Paare der Gehirnnerven hinlaufenden Beinerven der Rückgrates. Abhandl. der med. chir. Acad. zu Wien. Bd. 1. S. 385.

Rückenmarksnerven im Allgemeinen.

1869. Aug. Car. Bock, die Rückenmarksnerven nach ihrem ganzen Verlaufe, Vertheilungen und Verzweigungen, nebst 1 Bd. Kpf. (in Fol.), enthaltend die Abbildungen derselben auf 7 Kpft. Leipz. 1827. 8. Latein.: accurata nervorum spinalium descriptio. Latine vertit *Alb. Fried. Haenel*. Lips. 1828. 8.

Einzelne Rückenmarksnerven.

1870. *Jani Bang*, nervorum cervicalium anatome. Hafniae s. a. 8. Recus. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. I. p. 343.

1871. *Georg. Thom. Asch*, Diss. de primo pare nervorum medullae spinalis. Goetting. 1750. 4. Recus. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. I. p. 310.

1872. *Felix Vicq d'Azyr*, mémoire sur la description des nerfs de la seconde et troisième paire cervicale. Mém. de Paris 1777. hist. p. 11. mém. p. 21.

1873. *Goswini Friderici Peipers*, tertii et quarti nervorum cervicalium descriptio, cui accedit succincta eorundem nervorum quinti; nervi phrenici praesertim ratione originis; nervi accessorii Willisii; nervi duri ejusque praecipue rami inferioris; nervi hypoglossi et occipitalis maximi a secundo cervicalium nervo adumbratio. Halae 1793. Recus. in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. IV. p. 18.

1874. *Ephraim Krüger*, Diss. de nervo phrenico. Lips. 1758. 4. in *Sandifort* thes. Diss. III. 503.

1875. *Henr. Aug. Wrisberg*, Pr. de respiratione prima, de nervo phrenico et calore animali quaedam animadversiones. Gottingae 1763. Recus. in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. IV. p. 16. et in *Sandifort* thes. II. 255.

1876. *Car. Sam. Andersch*, de parvo nervo corporis sive parvo nervo harmonico corporis (phrenicus). In ej. tract. anat. de nervis c. h. aliquibus. P. II. p. 110.

1877. *Jo. Gtll. Haase*, Pr. de nervo phrenico dextri lateris duplici, parisque vagi per collum decursu. Lipsiae 1790. 4. Recus. in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. III. p. 112.

1878. *Jac. Jo. Klint*, Diss. de nervis brachii. Gottingae 1784. 4. Recus. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. III. p. 122.

1879. *Jo. Adam Schmidt*, commentarius de nervis lumbalibus eorumque plexu anatomico-pathologicus. C. IV. tabb. aen. Vindobonae 1794. 4.

1880. *Jo. Henr. Joerdens*, descriptio nervi ischiadici iconibus illustrata. Erlang. 1788. Fol.

1881. *Jo. Leonh. Fischer*, descriptio anatomica nervorum lumbalium, sacralium et extremitatum inferiorum. Cum IV tabb. linear. et IV. adumbratis. Lips. 1791. Fol. max.

1882. *Martin. Ern. Styx*, descriptio anatomica nervi cruralis et obturatorii icone illustrata. Jenae 1782. 4.

1883. *Jo. Chr. Rosenmüller*, Pr. nervi obturatorii monographia. Lips. 1814. 4.

Sympathetischer Nerv.

1884. *François Pourfour du Petit*, mémoire dans lequel est démontré que les nerfs intercostaux fournissent des rameaux, qui portent des esprits dans les yeux. Mém. de Paris 1727. 4. hist. p. 7. mém. p. 1. éd. in-8. hist. p. 9. mém. p. 1.

Digitized by Google

1885. *Antoine Portal*, description du nerf intercostal dans l'homme. Mém. de l'institut Nat. Vol. IV. mém. p. 151.

1886. ✪ *Car. Aug. a Bergen*, Diss. de nervo intercostali. Frcf. ad Viadr. 1731. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 871. sq.

1887. ✪ *Aug. Frid. Walther*, Pr. I. II. quo paris intercostalis et vagi corporis humani nervorum et ab utroque ejus latere obviorum anatomen exhibet, postquam expositionem *Cl. Winslow* nuperrime cum cadavere contulit. Lips. 1733. 1735. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 909 et 927.

1888. *Franc. Jos. Hunauld*, observation sur un rameau des nerfs assez considérable, partant du plexus gangliforme sémilunaire, qui remonte du bas ventre à la poitrine, et va se perdre à l'oreillette droite et à la base du coeur, où il se distribue. Mém. de Par. 1734. hist. p. 44. éd. in — 8. hist. p. 60.

1889. ✪ *Alb. Haller*, resp. *Hardov. Wilh. Ludw. Taube*, de vera nervi intercostalis origine. Gotting. 1743. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol II. p. 939. et in ejusd. Oper. minor. Tom. I. p. 503. (enthält die Geschichte der Entdeckungen über den sympathischen Nerven bis auf Haller. Diese Geschichte ist fortgeführt in der später erwähnten Abhandlung von Hirzel bis auf die neueste Zeit.)

1890. ✪ *J. J. Huber*, Epist. anat. ad D. D. *Wolrath Wigand*, de nervo intercostali, de nervis octavi et noni paris, deque accessorio nonnulla tradens. Gotting. 1744. 4.

1891. ✪ *Casimiri Chrstph. Schmidelii* epistola anatomica, qua de controversa nervi intercostalis origine quaedam disseruntur, ad *Joh. Wilh. Wernerum*. C. tab. aen. Erlangae 1747. 4.

1892. ✪ *Idem.* resp. *Jo. Gerold*, Diss. qua quaedam de nervo intercostali notantur. Erlang. 1754. 4. c. tab. aen.

1893. ✪ *Demetrius Iwanoff*, Diss. de origine nervorum intercostalium. Argentorati 1780. 4. Recus. in *Ludwigii* script. nevr. min. Vol. III. p. 89.

1894. ✪ Bemerkungen über den Ursprung des Symp. giebt: Kav. Felix Fontana in Kühn und Weigels ital. Bibl. Bd. 2. Heft 2. S. 90.

1895. ✪ *Car. Sam. Andersch*, de magno nervo corporis sive magno nervo harmonico corporis. In ejusd. tract. anat. de nervis c. h. aliquib. p. 102.

1896. ✪ *M. Girurdi* de nervo intercostali. Florentiae 1791. Recus. in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. III. p. 78.

1897. *J. Munniks*, observatio, qua, ad illustrandam artem medicam, ostenditur origo nervi intercostalis, ejusque commercium cum aliis nervis, ab ejus origine usque ad exitum e calvaria, cum autopsia tum observatis medicis confirmata. c. tabb. aen. II. In ejusd. obss. variis. Groningae 1805.

1898. ✪ A. F. Emmert, einige Bemerkungen über den sympathischen Nerven bei Säugthieren und Vögeln. In Reils Arch. XI. 117.

1899. ✪ *Joh. Frid. Lobstein*, de nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis, commentatio anatomico-physiologico-pathologica, tabulis aeneis et lithographicis illustrata. Paris 1823. gr. 4.

Bau der Ganglien.

1900. ✪ *Jo. Maria Lancisius*, Diss. de structura usnque gangliorum ad *Jo. Bapt. Morgagnium*. In *Morgagni* advers. anat. V. p. 101 sq. edit. Lugd. Bat. 1741. 4.

1901. *Jean Theodor Eller*, exposition anatomique de l'origine et de la formation du ganglion. Mém. de Berlin 1746. p. 108.

1902. ✪ *Jam Johnstone*, essay on the use of the ganglions of the nerves. Philos. trans. Vol. 54. 1764. p. 177.

1903. — history of a foetus born with a very imperfect brain: to which is subjoined a supplement of the essay on the use of the ganglions. Philos. transact. Vol. 57. 1767. p. 118 ff.

1904. — Experiments in support of the uses ascribed to ganglions of the nerves, in Phil. trans. Vol. 54 and 57. — Phil. trans. Vol. 60. 1770. p. 30.

1905. ✪ Jam Johnstone, Versuch über den Nutzen der Nervenknoten. A. d. Engl. Stettin 1787. 8.

1906. *Jo. Gttl. Haase*, Diss. de gangliis nervorum. Lipsiae 1772. 4. Recus. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. I. p. 61 sq.

Digitized by Google

1907. ° *Ant. Scarpa*, de nervorum gangliis et plexibus. In ej. anat. annot. Lib. I. Mutinae 1779. 4.

1908. ° *Car. Guil. Wutzer*, de corporis humani gangliorum fabrica atque usu, monographia c. tab. aen. Berol. 1817. 4.

1909. ° *Jo. Mich. Leupoldt*, Diss. de systematis gangliaris natura. Erlangae 1818. 4.

Einzelne Theile des sympathischen Nerven.

1910. ° *Jo. Ern. Neubauer*, descriptio anatomica nervorum cardiacorum. Sectio prima: de nervo intercostali cervicali dextri imprimis lateris. Adj. sunt icones nervor. a dextro corporis latere ad cor tendentium. Frcf. et Lipsiae 1772. 4. Recus. in ej. opera anat. collecta cur. *Hinderer*. Frcf. et Lips. 1786. p. 59 sq.

1911. ° *Car. Sam. Andersch*, de nervis cardiacis lateris dextri sive nervis musculos cordis lateris dextri moventibus. In ejusd. tract. anat. de nerv. c. h. aliquib. P. I. p. 148. — de nervis cardiacis lateris sinistri sive nervis musculos cordis lateris sinistri moventibus. Ibid. P. II. p. 1. — de nervo cardiaco superficiali sive nervo musculum lateris superficialis movente. Ibid. II. p. 85.

1912. ° *Chr. Theoph. Ludwig*, Pr. de plexibus nervorum abdominalium atque nervo intercostali duplici observationes nonnullae. Lipsiae 1772. 4. Recus. in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. III. p. 105.

1913. ° *Henr. Aug. Wrisberg*, observationum de nervis viscer. abdom. Pt. I. observ. anat. nevrologicae de ganglio plexuque semilunari in abdomine, et nervis illum formantibus. Gott. 1780. In commentationib. soc. reg. scientiar. Gotting. Vol. II. 1779. p. 79. in auctoris Commentationum med. phys. anat. etc. arg. Vol. I. Gotting. 1802. p. 240. et in *Ludwig*. script. nevrol. min. Vol. IV. p. 50.

1914. ° *Ejusd.* observationum anatomico-neurologicarum de nervis viscerum abdominalium. Part. II. de nervis systematis coeliaci. Sect. I. de nervis gastricis, quae est observationum de ganglio plexuque semilunari continuatio Ima. — Commentat. soc. Gotting. Vol. XV. 1800 — 1803. Phys. p. 3. et in auctoris Comment. Vol. I. p. 551. — Continuatio secunda de nervis hepaticis et splenicis. Comment. soc. Gotting. Vol. XVI. 1804 — 1807. Phys. p. 15.

1915. ° *Alb. de Haller*, ad figuram nervorum cordis lateris sinistri Cl. Juvenis *Anderschii* discipuli sui divinatio. Nov. comment. soc. Gotting. Tom. II. P. I. p. 1.

1916. *Jo. Bern. Jac. Behrends*, Diss. qua demonstratur cor nervis carere; addita disquisitione de vi nervorum arterias cingentium. Moguntiae 1792. 4. Recus. in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. III. p. 1.

1917. ° *Ad. Theoph. Nicolaus Zerener*, Diss. an cor nervis careat et is carere possit. Erfordiae 1794. Recus. in *Ludwig*. script. nevrol. min. Vol. IV. p. 1.

(Vgl. hierbei Scarpa No. 1809.)

1918. ° *Jo. Gttl. Walter*, tabulae nervorum thoracis atque abdominis Berol. 1783. Fol. max. — Description des nerfs du thorax et de l'abdomen. Trad. du Latin. Nouv. mém. de l'acad. roy. d. sc. et bell. lett. de Berlin 1780. p. 81. (Englisch: plates of the thoracic and abdominal nerves, reduced from the original, as published by order of the royal Academy of sciences at Berlin, accompanied by coloured explanations, and a description of the par vagum, great sympathetic and phrenic nerves. London 1783? 4.)

1919. ° *Jo. Gttl. Haase*, de plexibus oesophageis nervosis, parisque vagi per pectus decursu. Lipsiae 1791. 4. Recus. in *Ludwig*. script. nevrol. min. Vol. III. p. 117.

1920. *Munniks*, Observationes variae Obs. I. qua indagatur, num cordis substantiam muscularem revera nervi occupent. Groningae 1805.

1921. ° Jo. Chr. Reil, über die Eigenschaften des Ganglien-Systems und sein Verhältniß zum Cerebral-System. In Reils Arch. VII. S. 189.

1922. ° K. A. Rudolphi, einige Bemerkungen über den sympathischen Nerven. In Abhdl. d. Königl. Akad. d. Wiss. in Berlin in d. J. 1814 — 1815. S. 161 ff.

Digitized by Google

1923. °Cayre, über die stärkste Entwickelung des Ganglionnerven bei Blödsinnigen (N. J. de méd. Tom. IV. p. 40). Meck. Arch. VI. 464.

1924. °*Fr. Tiedemann*, Tabulae nervorum uteri. Heidelbergae 1822. Fol.

1925. °*Leonhard Hirzel*, Diss. sist. nexus nervi sympathetici cum nervis cerebralibus. Heidelbergae 1824. 4. Deutsch: Untersuchungen über die Verbindungen des sympathischen Nerven mit den Hirnnerven. In Tiedemann und Trevir. Zeitschr. für Physiol. Bd. 1. S. 197 sq. Recherches sur les anastomoses du nerf grand sympathique avec les nerfs cérébraux. Journ. compl. du Dict. des sc. méd. XXII. p. 305.

1926. °*Sebastianus Goetz*, Neurologiae partium genitalium masculinarum prodromus. Erlangae 1823. 4.

1927. °*Frid. Arnold*, Diss. sist. observationes nonnullas neurologicas de parte cephalica nervi sympathici in homine, c. tab. aen. Heidelberg. 1826. 4 — Deutsch: Einige Beobachtungen über den Kopftheil des sympathischen Nerven beim Menschen. In Tied. und Trev. Zeitschr. f. Phys. Bd. 2. S. 147 und B. III. Observations sur la portion céphalique du nerf grand sympathique. Journ. compl. du Dict. des sc. méd. XXIV. 337.

1928. *Fouilhoux*, remarques anatomiques et physiologiques sur le système nerveux ganglionaire. (Nouv. Bibl. méd. avril 1824. p. 409.) — nouvelles remarques anatomiques et physiologiques sur les ganglions du grand sympathique. (Ibid. p. 42.)

1929. °Fr. Arnold, über den Ohrknoten, eine anatomisch-physiologische Abhandlung. Heidelberg 1828. 4. (m. Abbild.)

1930. °*P. J. Manec*, anatomie analytique. Nerf grand sympathique. (Eine lith. Tafel in Fol. mit Text an der Seite.) à Par. 1828.

1931. °Note sur la véritable origine du nerf propre au muscle tenseur de la membrane du tympan, ou muscle interne du marteau. In répert. génér. d'anat. et de phys. path. et de clinique chirurg. rédigé par *M. G. Breschet*. Vol. VI. à Par. 1828. p. 92 — 95.

1932. °Rud. Wagner, über einige der neueren Entdeckungen in der Anatomie (Arnolds Ohrknoten). In Heusingers Zeitschr. für die organ. Physik Bd. III. Hft. 3. Sept. 1828. S. 359.

1933. °Fr. Arnold, der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen, in anatomischer und physiologischer Hinsicht bearbeitet. Mit 10 Kpft. u. 10 Lineartaf. Heidelberg 1830. 4.

1934. °*Jo. Bapt. Servais*, Diss. anat. phys. de parte nervi sympathici cephalica in homine. Leodii 1830. 4.

Digitized by Google

Ueber das Nervensystem im Allgemeinen.

Eintheilung des Nervensystems in die Centraltheile und in die Nerven.

Das Nervensystem besteht aus dem Centraltheile, oder dem Gehirne und Rückenmarke, und den Nerven. Alle diese Theile hängen ununterbrochen mit einander zusammen.

In dem Gehirne und Rückenmarke ist die dem Nervensysteme eigenthümliche weiche Substanz, deren Eigenschaften schon Th. I. S. 254 erörtert worden sind, in großer Menge angehäuft, ohne daß die Fasern und Blättchen, aus denen die größeren und kleineren Abtheilungen großentheils bestehen, in häutigen Röhren eingeschlossen sind. Vielmehr berühren sie sich unmittelbar, und haben oft eine grauröthliche, nicht aus Fasern bestehende Nervensubstanz zwischen sich. Die einzelnen Fasern des Gehirns und Rückenmarks sind auch nicht in einem lockeren nachgiebigen Zellgewebe aufgehangen und dadurch von einander so geschieden, daß jede für sich in merklichem Grade verschiebbar und beweglich wäre, vielmehr liegen sie so neben einander, daß man schließen muß, daß, wenn ja in diesen Fasern während des Lebens bei ihrer Verrichtung eine Bewegung stattfindet, sie ohne eine merkliche Verschiebung der Nervenfasern geschehen müsse.

Weil nun die kleinsten Theile des Gehirns und Rückenmarks so weich und weder in häutigen Röhren eingeschlossen, noch durch sichtbares lockeres Zellgewebe von einander abgesondert sind, so sind sie weicher und der Zerdrückung mehr als irgend ein anderer Theil des Körpers ausgesetzt.

Die größeren Theile sind aber in den Behältern der Hirnschale und des Canales des Rückgrats geschützt, und daselbst mittels mehrfacher, locker in einander eingeschlossener häutiger Schläuche oder Säcke sehr zweckmäßig aufgehangen; denn zwischen die Hauptabtheilungen derselben greifen ausgespannte horizontale und senkrechte Falten jener an dem Schädel und an der Wirbelsäule befestigten häutigen Säcke ein. An den senkrechten Falten hangen viele Theile des Gehirn- und Rückenmarks, indem die das Gehirn und Rückenmark überziehenden Häute daran in sehr vielen Punkten angewachsen sind; auf den horizontalen Falten ruhen mehrere Theile des Gehirns und des Rückenmarks, und werden zugleich von den benachbarten Theilen abgesondert und dadurch

Digitized by Google

in einer Lage erhalten, in welcher sie nicht auf dieselben drücken und sich nicht verschieben können. Zugleich wird hierdurch bewirkt, daß sie nirgends auf den knöchernen Behältern mit ihrem ganzen Gewichte ruhen und an sie angedrückt werden, und daß ihnen also nicht so leicht heftige Erschütterungen durch die Knochen mitgetheilt werden.

Allen diesen später im Einzelnen zu beschreibenden Einrichtungen verdankt es der Mensch, daß er laufen und springen kann, ohne daß die große, weiche und so fein organisirte Masse des Gehirns und Rückenmarks durch die Stöße leidet.

Anders verhält sichs bei den Nerven. Die meisten von ihnen liegen zwischen weichen Theilen in Polstern von lockerem Zellgewebe und Fett, zugleich aber nicht selten in gewissem Grade dem Drucke der Muskeln oder einem äußeren Drucke ausgesetzt. Die eigenthümliche Substanz ist aber bei ihnen in feine Fäden zertheilt, und diese sind in sehr engen, häutigen Röhrchen eingeschlossen, die durch Zellgewebe und durch größere häutige Scheiden zu größeren Bündeln zusammengefaßt sind. Es ist schon Th. I. S. 281. erwähnt worden, daß diese Nervenfäden so klein sind, daß nach Prevost's und Dumas's Messung und Berechnung 16000 in einem Nerven beisammen liegen können, der ½ P. Linie im Durchmesser hat. Die Nerven gelangen nun auf oft sehr langen Wegen zu fast allen Theilen des Körpers, und sind überall, wo sie durch große Bewegungen gedehnt und gezerrt werden können, geschlängelt. Die kleinsten Fädchen derselben aber sind überall wellenförmig gebogen. Nur die größeren Nerven liegen hinter den Knochen der Rippen und der Gliedmaßen und in den Zwischenräumen der Muskeln einigermaßen geschützt.

Weil nun das Gehirn dem Kopfe, das Rückenmark dem Rückgrate, beide also ihren knöchernen Kapseln in gewissem Grade ähnlich sehen, die größeren Stränge der Rückenmarknerven aber unter den Knochen der Rippen und der Gliedmaßen liegen, so haben die größeren Theile des Nervensystems, isolirt betrachtet, einige Aehnlichkeit in ihrer gegenseitigen Lage mit dem Gerüste der Knochen. Das Nervensystem ist fast so vollkommen symmetrisch, als das Skelet. Anstatt aber daß die beiden Seitenhälften des Skelettes in der mittleren zwischen ihnen liegenden Ebene hinten und vorn fest vereinigt sind, ist das Centrum des Nervensystems durch 2 sehr tiefe, in der mittleren Ebene desselben befindliche Einschnitte seiner ganzen Länge nach in 2 von einander fast abgesonderte Hälften getheilt, die nur durch mittlere Theile von sehr geringem Umfange unter einander vereinigt werden. Vorn vereinigen sich die beiden Seitenhälften der Nervenverbreitungen, wenn man den Nervus vagus und sympathicus ausnimmt, nirgends auf eine sichtbare Weise. Dieses ist sogar bei vielen nur einmal vorhandenen Theilen des Körpers der Fall, z. B. bei den Lippen, bei der Zunge, bei dem Gaumenvorhange und bei dem Kehlkopfe. Alle diese Theile erhalten auf jeder Seite ihre Nerven, welche sich in der Mittellinie

Digitized by Google

nicht auf eine sichtbare Weise unter einander verbinden. Nach Langenbecks Abbildungen scheinen die Nerven auf dem Rücken des Penis eine Ausnahme zu machen. Indessen hat Bock auch hier keine sichtbare Verbindung der Nerven der rechten und der linken Seite finden können.

Von dem geringen Zusammenhange der beiden Seitenhälften des Gehirns, oder des Rückenmarkes, oder der Nerven durch einmal vorhandene mittlere Theile, muß man wohl die dem Nervensysteme eigenthümliche Erscheinung ableiten, daß ein großer Theil der einen Hälfte des Nervensystems in seiner Verrichtung, Empfindung oder Bewegung zu vermitteln, gestört sein kann, ohne daß es die andere Hälfte ist, daß sich aber diese einseitige Lähmung nicht zugleich auf das Herz, auf den Magen, Darmcanal und auf andere Theile erstrecke, deren Nerven in der mittleren Ebene von beiden Seiten her zusammenkommen.

Lage der grauen und der weißen Substanz im Nervensysteme [1]).

Die 2 Substanzen [2]), welche man im Nervensysteme unterscheidet, die graurötliche sehr gefäßreiche, nicht faserige, und die weiße nicht sehr gefäßreiche, meistentheils faserige, liegen theils in größeren Lagen neben einander, im Gehirne nämlich so, daß die weiße Lage das Innere bildet, und die graurötliche Substanz die äußere und manche Stellen der den Hirnhöhlen zugekehrten inneren Oberfläche überzieht, im Rückenmarke so, daß die graue Substanz das Innere bildet und von einer Lage weißer Substanz überzogen wird, theils füllt die graue Substanz die Zwischenräume zwischen den Fasern und Blättchen der weißen Substanz aus, die dadurch auf ihrer Durchschnittfläche ein gestreiftes Ansehn bekommt.

An den Nerven kann man eine Mengung von grauen und weißen Lagen nicht wahrnehmen, das einzige erste Gehirnnervenpaar, den Geruchsnerven ausgenommen, wohl aber scheint die Substanz der Gehirn- und Rückenmarknerven im Allgemeinen weißer, als die des Nervus sympathicus, welche für die dem Willen nicht unterworfenen Organe vorzugsweise bestimmt ist, durchsichtiger und röthlicher zu sein.

---

[1]) Der Unterschied der Farbe des Marks und der grauen Masse ist desto deutlicher, je frischer man das Gehirn untersucht. Meckel fand in einem jungen Mohren von 12 Jahren die markige Masse blauschwärzlich (Mém. de l'acad. de Berlin, 1753.), in einem erwachsenen Mohren schwarzbraun (ebend. 1757.). Prof. Walter, der Vater, fand in einem Mohren die ganze markige Masse etwas dunkler (de venis oculi p. 21.). Camper fand in vier Mohren die Farbe, sowohl der grauen Masse als des Marks, bläßer (kl. Schriften, I. S. 32.); auch S. Th. Sömmerring fand es nicht tiefer gefärbt; vielmehr schien es ihm bläßer (Versch. des Negers. §. 55.).

[2]) Walter, der Vater, fand das Gehirn fester und zäher bei Mohren (a. a. O. S. 20.). Ebenderselbe sagt (ebend.): es pflege bei Wahnsinnigen härter zu sein. Auch Haller sagt: „durior in stultis" (pr. lin. phys. §. 374.). Man findet aber bisweilen auch Gehirne von Wahnsinnigen, die weicher sind. Chambon (obss. clinicae. Par. 1789. Obs. 29.) fand in Leichen solcher Menschen, die an bösartigen Fiebern gestorben waren, die Gehirnmasse oft fester.

Digitized by Google

Endigung, Richtung und Verflechtung der Fasern der weißen Substanz.

Da die Fasern des Gehirns und des Rückenmarks in mannichfaltigen Richtungen durch einander durchgehen und unter einander verflochten sind, auch außerdem zwischen ihnen die Nervenfäden hervorkommen, so ist eine vorzüglich wichtige Frage die, in welchem Zusammenhange diese verschiedenen Fasern unter einander stehen, d. h. wie und wo die dem Gehirne und Rückenmarke selbst angehörenden Fasern anfangen und endigen, in welchem Verhältnisse sie zur grauröthlichen Substanz stehen, wie sie unter einander verbunden sind, ob die Fasern der Nerven Fortsetzungen der Fasern des Gehirns und Rückenmarkes sind, oder nicht, welche Theile des Gehirns und des Körpers durch bestimmte Fäden mit einander in Verbindung stehen, ob auch Theile des Gehirns und des Rückenmarkes unter einander durch Nervenfäden verbunden sind, welche zu andern Nerven übergehen und in den Scheiden derselben zu dem Gehirne und dem Rückenmarke zurücklaufen, ob es eine Verbindung der Nerven gebe, welche nicht nur darin besteht, daß die in ihrer häutigen Röhre eingeschlossenen kleinen Nervenfäden sich unter einander verflechten und in einer andern Ordnung von neuem in Bündel zusammengefaßt werden, sondern daß sie in ihrem Nervenmarke zusammenstoßen, so daß es Vereinigungspunkte der Nerven gebe, von welchen aus auf Nerven, die zu verschiedenen Theilen gehen, gewirkt werden könne, ob es durch ihre innere Einrichtung specifisch verschiedene Nerven gebe, namentlich solche, welche die Bewegung der Muskeln, oder die Entstehung der Empfindungen, oder gewisse chemische Processe bei der Ernährung und Absonderung vermitteln helfen, ob die verschiedenen Sinnesnerven eine specifische Einrichtung haben, oder ob ihre verschiedene Verrichtung nur auf der Weise beruht, wie sie sich in gewissen Organen endigen und daselbst den auf sie wirkenden Eindrücken ausgesetzt sind.

Man muß offen gestehen, daß die feinere Anatomie des Nervensystems bis jetzt so wenig ausgebildet ist, daß sich auf die meisten von diesen Fragen nicht genügend antworten läßt.

Doppelt vorhandene und einmal vorhandene Theile des Centrums des Nervensystems.

In dem Centrum des Nervensystems unterscheidet man doppelt vorhandene, und folglich neben der mittleren Ebene rechts und links, und mittlere, in der mittleren Ebene des Körpers selbst gelegene Theile, durch welche die Seitentheile untereinander verbunden werden. Da die Erfahrung lehrt, daß Sinneseindrücke, die uns durch das rechte und linke

Digitized by Google

Ohr oder Auge zugeführt worden, oft nur einfach empfunden werden, und daß eine einfache Anstrengung des Willens Muskelfasern der Zunge, der Lippen, des Kehlkopfs und anderer Theile auf beiden Seiten zugleich in eine gemeinschaftliche Bewegung versetzen könne, da man überhaupt durch mehrere Umstände zu dem Gedanken geleitet wird, es müsse im Nervensysteme gewisse Mittelpunkte geben, von welchen aus auf beide Seitenhälften, und auf welche von beiden Seitenhälften aus gleichzeitig gewirkt werden könne, so verdienen die wenigen und kleinen Theile des Gehirns und Rückenmarkes sowohl, als auch die wenigen Nerven, welche in der mittleren Ebene eine Vereinigung der beiden Seitenhälften des Nervensystems hervorbringen, eine besonders genaue Untersuchung.

Die Verbindung der beiden Seitenhälften des Gehirns und des Rückenmarks geschieht aber theils durch grauröthliche, nicht deutlich faserige, theils durch weiße faserige Substanz. Durch die grauröthliche oder durch die weiße Substanz werden meistens Theile, die aus derselben Substanz bestehen, unter einander vereinigt; indessen kommt doch zuweilen auch der Fall vor, wo der Zwischenraum zwischen doppelt vorhandenen weißen faserigen Theilen durch grauröthliche Substanz ausgefüllt wird, z. B. der Zwischenraum zwischen den Schenkeln des Gehirns.

Die einmal vorhandenen weißen faserigen Theile, welche die Seitentheile des Gehirns unter einander vereinigen, haben meistens eine quere Lage, oder wenigstens eine Lage, vermöge welcher sie mehr der Quere als der Länge nach laufen, und durch sie scheinen die weißen Seitentheile mit einander in Verbindung gebracht zu werden.

Die Seitentheile selbst enthalten aber außer diesen ziemlich querlaufenden Fasern auch Fasern, welche mehr der Länge nach laufen, und folglich mit jenen queren durchflochten sind. Sie setzen sich vom Rückenmarke bis zu den verschiedenen Theilen der Seitenhälften des Gehirns fort, und nur an einer Stelle, da wo das Rückenmark mit dem Gehirne zusammenstößt, an den Pyramiden, scheinen manche ihrer Fasern von einer Seite über die Mittellinie hinweg auf die andere Seite zu gehen und eine theilweise Durchkreuzung hervorzubringen, was indessen noch jetzt von mehreren Anatomen in Zweifel gezogen wird.

Weil die mittleren faserigen Theile nur Fasern enthalten, die ziemlich nach einer Richtung gehen, so sind sie einfacher als die Seitentheile, in welchen oft Längenfasern mit Querfasern durchflochten sind, auch läßt sich in ihnen deswegen die Faserung leichter zeigen, denn da wo Längenfasern mit Querfasern durchflochten sind, muß eine Classe von Fasern zerrissen werden, wenn die andere sichtbar gemacht werden soll, was bei der Weichheit der Fasern schwer gelingt.

Digitized by Google

Methode, die Richtung der Faſern ſichtbar zu machen.

Um die Faſerung der verſchiedenen Theile des Nervenſyſtems zu unterſuchen, ſtehen uns 3 Mittel zu Gebote: das von Gall angewendete, wo man an den aus Faſern beſtehenden Stellen möglichſt friſcher Gehirne Theile loszureißen ſucht, entweder indem man anſtoßende Gehirntheile faßt und loszieht, oder indem man die Oberfläche in einer gewiſſen Richtung, bei welcher die Faſerung deutlich wird, mit der Meſſerſchärfe ſchabt.

Ein 2tes Mittel beſteht darin, daß man ſich darauf beſchränkt, die an ſich freiliegenden Oberflächen der faſerigen Gehirntheile recht genau zu betrachten; denn an dieſen kann man die Faſern in der allernatürlichſten Lage ohne alle Vorbereitung ſehen. Dieſe Methode verdient an den Theilen, an welchen ſie anwendbar iſt, den Vorzug vor allen andern Methoden, und in der That iſt ſie auf mehr Hirntheile anwendbar, als man auf den erſten Anblick glauben ſollte, wenn man nämlich nicht nur Gehirne erwachſener Menſchen, ſondern auch die von Embryonen und die von verſchiedenen Thieren aus allen Bildungsſtufen friſch zergliedert. Denn bei Embryonen ſind die querlaufenden Faſern zu einer gewiſſen Zeit ſehr wenig entwickelt, während die Längenfaſern ſchon weit mehr ausgebildet ſind, und man kann dann die Längenfaſern in einer viel größeren Ausdehnung unbedeckt ſehen, als bei dem erwachſenen Menſchen. Etwas ähnliches findet bei manchen Thieren Statt, bei welchen die Ventrikel des Gehirns im Verhältniſſe zum Gehirne ſehr groß und die Faſern ſehr deutlich ſind, und bei welchen daher die Oberfläche, wo ſich Faſern beobachten laſſen, ſehr beträchtlich groß iſt. Carus, Döllinger, J. F. Meckel, F. Tiedemann, Serres, Desmoulin, Breſchet und Lauvencet haben bei Embryonen des Menſchen und der Thiere; Gall, Carus, Treviranus und mehrere der ſo eben erwähnten Anatomen, unter den älteren Anatomen aber der berühmte Malpighi, der zuerſt die Faſerung des Gehirns beſchrieben hat, haben an den Gehirnen verſchiedener Thiere dieſe Unterſuchung begonnen.

Endlich beſteht ein 3tes Mittel darin, daß man den Centraltheilen des Nervenſyſtems eine größere Feſtigkeit und Härte giebt, indem man ſie längere Zeit in concentrirten Weingeiſt, in concentrirte Auflöſungen von Sublimat oder von ſalzſaurem Kalk bringt, eine Methode, welche Reil, Burdach und Andere mit gutem Erfolge angewendet haben, um die von ihnen bekannt gemachten Hirnzergliederungen auszuführen. Gegen dieſe Methode hat man zwar eingewendet, daß ſie trüglich ſei, weil die vielleicht ſichtbar werdenden Faſern und Blättchen bei dem Proceſſe der Erhärtung und Gerinnung erſt entſtünden, denn auch geronnenes Eiweiß zeige ſich aus Blättern zuſammengeſetzt, die durch Gerinnung entſtanden wären. Allein dieſer Einwurf iſt leicht zu beſeitigen. Denn während man die erhärteten Faſern an der Oberfläche abzieht, bemerkt man deutlich, daß es die nämlichen Faſern ſind, die man ſchon vor der Anwendung des Weingeiſtes erkannte, theils ſtimmen die Reſultate der von Reil angewendeten Methode mit der von Gall benutzten im Weſentlichen überein; endlich iſt die

Digitized by Google

Behauptung unrichtig, daß die concentrischen Lagen oder Blätter, aus welchen das Eiweiß besteht, erst in Folge der Gerinnung entständen. Vielmehr besteht das Eiweiß wirklich aus unzähligen verschiedenen Lagen von Eiweiß, die sich vermöge der Art der Vergrößerung lagenweise ansetzen. Denn indem es im Eierleiter fortrückt, setzt die innere Oberfläche des das Ei umfassenden Eierleiters neue Lagen von Eiweiß auf die Oberfläche der alten ab, diese Lagen werden dann bei dem Gerinnen des Eies sichtbar.

Anhäufungen grauer Substanz, in welcher sich die Bündel der Hirnfasern zertheilen und wieder vereinigen, oder Ganglien des Gehirns, nach Gall.

Die graue Substanz kommt, wie schon oben erwähnt worden ist, an manchen Stellen so vor, daß sie eine ziemlich gleichförmige Masse bildet, z. B. an der Oberfläche der Windungen des Gehirns und im Centro des Rückenmarks; an andern wechselt sie mit Lagen weißer Fasern ab, und erfüllt die Zwischenräume zwischen den auseinandertretenden und sich zum Theil durchkreuzenden Fasern und Blättern. Es hat an manchen Stellen den Anschein, als ob die Zahl der weißen Fasern auf der einen Seite einer solchen grauen Anschwellung viel größer als auf der andern wäre, und als ob also die Fasern, welche man die in die graue Anschwellung eintretenden nennt, während ihres Durchgangs durch dieselbe an Zahl und Größe zunehmen. Weil man nun Anschwellungen an dem Gehirne und Rückenmarke der Insecten und vieler andern Thiere Knoten, Ganglien, ganglia, nennt, und weil man vermuthet, daß diese Knoten, deren innern Bau man wegen ihrer Kleinheit noch nicht genug kennt, wohl eine ähnliche Beschaffenheit hätten, als jene Anschwellungen im Gehirne des Menschen; so hat Gall für diese Anschwellungen gleichfalls diesen Namen angewendet. Weil indessen der Name Ganglien im menschlichen Körper schon für gewisse an den Nerven befindliche Anschwellungen gewöhnlich ist, die ihrem Baue nach sehr von jenen Anschwellungen des Gehirns verschieden sind, und also der Anfänger leicht zu einer falschen Idee verführt werden könnte; so ist es vorzuziehen, den Namen Ganglien nicht für die erwähnten Anschwellungen im Gehirne zu gebrauchen.

Anfang der Nervenfäden.

Die Stellen am Gehirne und Rückenmarke, wo die Fasern der Nerven zwischen den Fasern des Gehirns hervordringen, nennt man die Ursprungsstellen der Nerven, und diese Fasern, die daselbst noch gar nicht oder erst kurz zuvor in häutige Röhrchen aufgenommen worden sind, ihre Wurzeln, radices nervorum, ohne jedoch damit die Vorstellung zu verbinden, als ob die Nerven aus dem Gehirne und Rückenmarke wie die Pflanze aus dem Samen hervorwüchsen. Man weiß nicht einmal, ob diese Fasern der Wurzeln der Nerven unmittelbare Fortsetzungen

Digitized by Google

der Fasern des Gehirns und Rückenmarks sind, oder ob sie, wie Gall glaubt, mit ihren Enden in der grauen Substanz aufhören.

Die meisten Anatomen sind jetzt allerdings der Meinung, daß die Bildung der centralen Theile des Nervensystems der Entstehung der Nerven und der Organe, in welchen sich die Nerven endigen, vorausgehe. Bei gewissen Organen, welche spät entstehen, wie bei den Armen und Beinen, ist das offenbar der Fall. Ob aber in den Häuten, welche gleichzeitig mit dem Rückenmarke und Gehirne gebildet werden, nicht auch gleichzeitig feine, uns nicht sichtbare Nerven entstehen, ist eine Frage, welche durch Beobachtungen nicht entschieden werden kann. Serres hat durch Schlüsse, die er aus von ihm beobachteten Mißbildungen zog, zu beweisen gesucht, daß die Bildung der Nerven von den Organen aus ihren Anfang nehme, in welchen sie sich verbreiten. Allein seine Beweise reichen nicht hin. Bei dem Mangel eines Nerven fehlt, wie Tiedemann zeigt, auch häufig zugleich der Nervenursprung und das Organ, in welchem er sich endigt. Dieses ist auch nicht zu verwundern, weil die bildende Kraft keine Theile ausbildet, welche keinen Nutzen haben. Tritt nun zuweilen der Fall ein, wo ein Organ nebst seinen Nerven vorhanden ist, und doch der Nerv sich nicht bis zum Centrum des Nervensystems fortsetzt, und wo also der Nervenursprung fehlt, so darf man daraus nicht schließen, daß der Nerv von jenem Organe aus sich gebildet habe, denn es ist sehr wohl möglich, daß früher der ganze Nerv vorhanden war, und daß nur sein Ursprung durch eine Krankheit zerstört wurde. Dieselbe Erklärung gilt auch für die Fälle, wo der Nervenursprung vorhanden ist, aber das Organ fehlt, in welchem er sich endigen sollte.

Am Rückenmarke sieht man sehr deutlich, daß an den Stellen, an welchen sehr dicke Nerven ihren Anfang nehmen, das Rückenmark selbst dicker ist und in seiner Mitte mehr graue Substanz einschließt, als an den Stellen, wo dünne Nerven entspringen, und daß es also z. B. am Halse, wo die dicken Armnerven, und in der Gegend des obersten Lendenwirbels, wo die dicken Schenkelnerven entspringen, vorzüglich dick ist.

Giebt es specifisch verschiedene Nerven?

Ob die meisten Nerven eine eigenthümliche innere Einrichtung besitzen, vermöge deren sie zu der besonderen Function geschickt sind, die sie haben, oder ob sie nur deswegen zu einer bestimmten Verrichtung tauglich sind, weil sie an ihrem Anfange mit bestimmten Theilen des Centrums des Nervensystems, und an ihren Enden mit bestimmten Organen in Verbindung stehen, die gewisse Eindrücke ihnen zuführen, oder von ihnen empfangen können, ist noch nicht entschieden. Daß manche Nerven, wie der Geruchnerv und der Hörnerv, sehr weich sind, beweiset nichts, denn dieses rührt daher, daß die Markfäden dieser Nerven nicht in so viele Scheiden gehüllt sind als die der meisten andern Nerven. Auch bedurfte der Geruchnerv bis an die Siebplatte, und der Hörnerv, der keinem nachtheiligen äußeren Drucke ausgesetzt ist, dieser Scheiden nicht so sehr, als andere Nerven.

Der Geruchnerv zeichnet sich aber allerdings dadurch sehr wesentlich vor allen andern Nerven aus, daß er deutlich unterscheidbare Lagen von grauer und weißer Substanz enthält.

Es ist schon Theil I. S. 275 bis 281 von der eigenthümlichen

Digitized by Google

Einrichtung der Nerven gehandelt worden, vermöge welcher ſie ſich nicht nur in kleinere Zweige theilen, ſondern ſich auch zuweilen wieder unter einander vereinigen. Man nennt dieſe Vereinigung einzelner Nervenzweige Nervencommunicationen, oder Anaſtomoſen der Nerven, communicatio, anastomosis nervorum. Wo ſich dieſe Zertheilung und Vereinigung einzeln unterſcheidbarer Nervenzweige mehrmals wiederholt, oder wo ſich viele Nervenzweige wechſelſeitig vereinigen, nennt man die Vereinigung ein Nervengeflecht, plexus nervorum. Es iſt auch ſchon daſelbſt gezeigt worden, daß eine ſolche Verflechtung der Nervenbündel nicht ſelten auf eine vorborgene Weiſe zwiſchen den, in einer gemeinſchaftlichen Scheide eingeſchloſſenen Nervenbündeln geſchehe, daß es ſich aber nirgends beweiſen laſſe, daß bei dieſen und anderen Nervenanaſtomoſen ein Zuſammenſtoßen und eine Vereinigung der Nerven vermöge ihres Nervenmarkes ſtattfinde, ſondern daß wahrſcheinlich dabei nur ein Austauſch von Nervenbündeln geſchehe, welche die Scheide des einen Nerven verlaſſen, und in die des andern aufgenommen werden, und dabei ſelbſt durch ihren häutigen Ueberzug von den benachbarten Nervenbündeln abgeſondert ſind.

Die Nervenknoten, ganglia nervorum, ſind nun aber eine Anſtalt zur Vereinigung von Nerven, die weit mehr in's Feine geht und vielleicht ſogar eine Vereinigung der Nerven mittels ihres Nervenmarkes bewirkt. Nervenknoten nennt man nämlich röthliche, dicke, von einer aus Zellgewebe beſtehenden Haut überzogene Stellen, welche ſich entweder an einzelnen Nerven (ganglia simplicia nach Scarpa), oder an Orten, wo mehrere Nerven unter einander zuſammenſtoßen (ganglia composita nach Scarpa) befinden. Es iſt zwar keinem Zweifel unterworfen, daß die mit einem Nervenknoten zuſammenhängenden Nervenbündel ſich im Innern deſſelben in kleinere Bündel und Fäden zertheilen, daß dieſe Bündel und Fäden, wo ſie groß genug ſind, um einzeln betrachtet zu werden, mit einer häutigen Hülle umgeben ſind, von welcher die Feſtigkeit herrührt, durch welche ſie ſich von Markfäden des Gehirns unterſcheiden, daß die Zwiſchenräume zwiſchen den noch einzeln unterſcheidbaren, auseinanderweichenden oder zuſammentretenden Nervenfäden mit einem röthlichen gefäßreichen Zellgewebe ausgefüllt ſind. Man beobachtet ſogar hier und da, wie einzelne Fäden der auf der einen Seite in ein Ganglion eintretenden Nerven in die Fäden der auf der andern Seite deſſelben austretenden Nerven ununterbrochen übergehen. Aber es gelingt keineswegs, die Mehrzahl der zertheilten Nervenfäden durch die Nervenknoten hindurch zu verfolgen, vielmehr findet man, daß die Enden und Anfänge der ſehr fein zertheilten eintretenden und austretenden Nerven in kleinen röthlichen durchſichtigen Klümpchen liegen, in welchen

Digitized by Google

sie unserm Auge verschwinden. Die Untersuchung kann hier nur mit Hülfe des Mikroskops fortgesetzt werden. Es ist nicht genug, im Allgemeinen an jeder Stelle des Nervenknotens Nervenfäden zu entdecken, die eine gewisse Richtung haben, sondern man muß die einzelnen Nervenfäden von den eintretenden zu den austretenden Nerven herüber verfolgen. Weil nämlich nicht alle Nervenfäden an der nämlichen Stelle in ihre feinsten Zweige gespalten werden und in die röthlichen durchsichtigen Klümpchen eintreten, sondern der eine etwas früher, der andere etwas später, so kann man leicht die Nervenfäden auch an solchen Stellen fort zu verfolgen meinen, wo man einzelne Nervenfäden nicht mehr im Auge zu behalten im Stande ist. Es begegnet nämlich hierbei dem Beobachter leicht, daß, wenn ein Nervenfädchen verschwindet, er es nicht bemerkt, weil er sich an das benachbarte, in derselben Richtung gehende, noch deutliche, hält. Diese Untersuchung ist so schwierig, daß gar nicht daran zu denken ist, daß die anatomische Streitfrage über das Verhalten der Nerven in den Nervenknoten, durch die Untersuchungen und Abbildungen Scarpa's und Wutzers gelöst sei, welche dicke Nervenfäden abbilden, die von den eintretenden zu den austretenden Nerven herübergehen. Dieselbe Einrichtung, welche sich in vielen Nerven findet, daß nämlich die Nervenfäden innerhalb der Scheide der Nerven ein Geflecht bilden, findet sich auch hier in den Nervenknoten, aber deswegen darf man nicht mit J. F. Meckel d. ä. [1]), Zinn [2]), Haller [3]), Haase [4]), Scarpa [5]) und Monro [6]) behaupten [7]), es bestände die Einrichtung der Nervenknoten ganz allein darin, daß sich die Nerven in den Nervenknoten in feinere Bündel und Fäden zertheilten, und daß diese daselbst in anderer Ordnung wieder zu größeren Nerven zusammenträten; ferner, es entstünde die Anschwellung der Nerven daselbst nur dadurch, daß die Zwischenräume zwischen den auseinander weichenden und wieder zusammentretenden Nervenfäden durch eine weiche, gallertartige, grauröthliche gefäßreiche Masse erfüllt würden, welche die zerspaltenen Nerven auseinander hielte, ihnen wie ein Polster diente, und eine an-

---

[1]) *J. F. Meckel*, Observations anatomiques sur un noeud ou ganglion etc. Hist. de l'ac. roy. de Berlin 1749.

[2]) *Zinn*, Hist. de l'ac roy. de Berlin 1753. p. 137.

[3]) *Haller*, Elem. phys. c. h. T. IV. Lib. X. sect. 6. §. 11.

[4]) *J. G. Haase* resp. *Peschel*, Diss. de ganglüs nervorum. Lipsiae 1772. 4 und in *Ludwig*, scriptores nevrologici minores. 4. T. I. p. 74.

[5]) *A. Scarpa*, Annotationum anatomicarum Lib. I. 4.

[6]) *A. Monro*, Bemerkungen über die Structur und die Verrichtung des Nervensystems übers. Leipzig 1781. 8. p. 410.

[7]) Die Bemerkungen dieser und anderer Schriftsteller über die Nervenknoten findet man mit ihren eignen Worten angeführt in *C. G. Wutzer*, de c. h. gangliorum fabrica atque usu monographia, c. tab. aen. Berolini 1817. 4.

Digitized by Google

dere Beschaffenheit als die Nervensubstanz hätte. Denn am Ganglion des 5ten Nervenpaars, welches sich zu einer genauen Untersuchung vorzüglich gut eignet, weil hier die einzelnen anschwellenden Nervenbündel mehr als in andern Knoten auseinander gezogen sind, überzeugt man sich, daß man viele feine Fäden, in die sich die Bündel spalten, nicht ununterbrochen durch die röthlichen durchsichtigen Stellen hindurch verfolgen kann, in welche sie eintreten und aus welchen gegenüber andere feine Fäden austreten. So wenig als man hier das röthliche, in den Theilungswinkeln der einzeln unterscheidbaren Nervenästchen gelegene Zellgewebe mit den röthlichen durchsichtigen Klümpchen verwechseln wird, in welche endlich viele nicht mehr einzeln unterscheidbare Fädchen übergehen, eben so wenig darf man diese 2 röthlichen Substanzen an andern Ganglien mit einander verwechseln.

Es ist sehr wohl möglich, daß in diesen letztern röthlichen durchsichtigen Stellen der Nervenknoten viele kleine Nervenfäden mittels ihres Nervenmarks zusammenstoßen, oder daß sich in ihnen die Zahl der kleinsten Nervenfäden vergrößern, entweder, indem manche Fäden an den röthlichen durchsichtigen Stellen ihren Anfang nehmen, oder indem die kleinsten Nervenfäden, ohne kleiner zu werden, Aeste abgeben, und daß außerdem eine Vermengung mancher Nervenbündel bewirkt werde, indem sie sich in ihre Fäden zertheilen, die dann ununterbrochen von neuem zu größern Bündeln zusammentreten.

Die hier gegebene Darstellung von dem Baue der Nervenknoten steht zwischen den einander entgegengesetzten Behauptungen mancher Anatomen über diesen Gegenstand in der Mitte, und zwar, wie ich glaube mit Recht, weil von beiden Seiten übertrieben und mehr ausgesagt worden ist, als was sich durch Beobachtungen darthun läßt. Dieser Uebertreibung hat sich auf der einen Seite Bichat [1]) schuldig gemacht, wenn er sagt, man könne in den Ganglien keine Fäden und Linien unterscheiden, sondern die Masse derselben sei gleichartig. Dieser Uebertreibung machen sich aber auch auf der andern Seite diejenigen schuldig, welche, weil sie finden, daß sich manche dickere, mit unbewaffnetem Auge noch sichtbare Fäden der in die Ganglien eintretenden und aus ihnen austretenden Nerven geflechtartig vereinigen, behaupten, daß dieses mit allen Fäden der Fall sei, und daß ganz allein hierin der Bau der Nervenknoten beruhe, da sie doch zugestehen sollten, daß sich manche Fäden so fein zertheilen, daß sie sich unsern Nachforschungen ganz entziehen.

Man darf sich nicht darüber wundern, daß die chemischen Untersuchungen Bichats, Wutzers, Mangendie's und Lassaignes über

[1]) Bichat, allgemeine Anatomie, übers. v. Pfaff. Th. I. 299.

die Beschaffenheit der Nervenknoten, beweisen, daß dieselben aus einer ganz andern Substanz bestehen, als das Gehirn, und daß die Substanz mehr mit der der Häute, welche aus Zellgewebe bestehen, übereinstimmt. Das nämliche ist auch bei den meisten in vielen Hüllen eingeschlossenen Nerven der Fall, und rührt daher, daß die häutigen Hüllen einen großen Theil der Substanz ausmachen, und das Nervenmark vor der Einwirkung unserer chemischen Reagentien schützen.

Ueber den Nutzen der Nervenknoten und des mit vorzüglich vielen Nervenknoten versehenen sympathischen Nerven.

1. Die Nervenknoten haben den Nutzen, den die Nervengeflechte überhaupt hervorbringen.

Weil es unbestreitbar ist, daß in den Ganglien eine geflechtartige Verbindung verschiedener Nervenbündel Statt finde, so ist es auch gewiß, daß dieselben den Nutzen haben, welche die Geflechte hervorbringen, den nämlich, die kleineren Bündel und Fäden der Nerven von einander zu trennen, in anderer Ordnung wieder zusammen zu fassen und sie bequem nach verschiedenen Richtungen zu vertheilen. Auch ist dieser Zweck nicht von geringer Wichtigkeit, denn A. Monro machte mit Recht unter andern darauf aufmerksam, daß es sehr wichtig sei, daß die zur Erhaltung des Lebens unentbehrlichen Organe nicht von einem einzelnen Nervenpaare, sondern von vielen zugleich mit Nerven versehen würden, damit, wenn ein Nervenpaar durch einen zufälligen äußeren Einfluß oder durch Krankheit gelähmt würde, nicht auch zugleich die Function eines so wichtigen Organs, z. B. die des Herzens aufhörte, sondern vielmehr nur ein wenig geschwächt würde. Denn das Herz, welches seine Nerven aus mehreren Ganglien empfängt, erhält Nervenfäden, welche von den meisten Halsnerven und von dem obersten Rückennerven entspringen, wodurch zugleich bewirkt wird, daß das Herz mit einer großen Strecke des Rückenmarks in Verbindung steht.

2. Man darf vermuthen, daß in den Ganglien und vielleicht auch in manchen Geflechten des sympathischen Nerven eine Uebertragung von Eindrücken von einem Nerven auf die mit ihm zusammenstoßenden Nerven geschehe.

Diese Vermuthung gründet sich darauf, daß es den Anschein hat, daß manche Nervenfäden der in den Ganglien sehr fein zertheilten Nerven unter einander durch ihr Nervenmark zusammenstoßen. Dieses ist nach den Beobachtungen Fontana's, Prevost's und Dumas's, (s. Th. I. S. 274 sq.) bei den Nerven an andern Stellen nicht der Fall, denn die Nerven bestehen nach ihnen im Allgemeinen aus unzäh-

Digitized by Google

tigen, sehr kleinen, in Scheiden eingeschlossenen, keine Aeste abgebenden oder aufnehmenden Nervencylindern. Wäre nun diese mikroskopische Untersuchung für andere Nerven richtig, und litte sie nur in den Ganglien und in manchen Geflechten des sympatischen Nerven, welche jene Schriftsteller nicht besonders untersucht haben, eine Ausnahme, so würde man die Möglichkeit einer solchen Uebertragung eines Eindrucks von einem Nerven auf den andern außerhalb des Gehirns und des Rückenmarkes als eine sehr wichtige Wirkung der besonderen Einrichtung der Ganglien betrachten müssen. Denn Anastomosen und Geflechte der Nerven, in welchen die von ihren Häuten umgebenen Nervenfäden und Nervenbündel aus der Scheide des einen Nerven in die des andern übergehen, können, wie man vermuthen darf, eine solche Uebertragung des Eindrucks von einem Nerven auf den andern nicht bewirken. Bekanntlich läßt es sich aber bei weiten bei den meisten Nervenverbindungen großer Nervenstränge beweisen, daß die Verbindung von dieser Beschaffenheit sei.

Hierdurch wird man daher auf die von vielen Physiologen gehegte, noch neuerlich von G. R. Treviranus vertheidigte Ansicht geführt, daß die Ganglien die Ursache eines Consensus, oder einer Sympathie der Nerven wären, und dieser Vermuthung verdankt auch der sympathische Nerv seinen, von Winslow ihm gegebenen Namen.

Mit dieser Vermuthung kann nun zwar eine andere Vermuthung über den Nutzen der Nervenknoten in Verbindung gebracht, und einigermaßen als eine Anwendung derselben dargestellt werden. Indessen ist sie doch noch weniger durch Gründe gestützt, und noch hypothetischer als jene.

3. Dieselbe besteht nämlich darin: in den Nervenknoten vermehre sich die Zahl der Nervenfäden, oder mit einem andern Worte, sie wären die Mittelpunkte, aus welchen daselbst Nervenfäden entspringen.

Wenn man nämlich von einem Nervenfaden sagt, daß er an derjenigen Stelle entspringe, an welcher sein mit dem übrigen Nervensystem verbundenes Ende liegt, und wenn man die Vorstellung hegt, daß von einem Punkte aus, in welchem die zu verschiedenen Theilen des Körpers gehenden Nervenfäden sich durch ihr Mark vereinigen, viele Theile zu einer gemeinschaftlichen Thätigkeit erregt werden können, so muß man gestehen, daß die Vermuthung nichts Widersprechendes enthalte, daß auch Nervenfäden in den Ganglien entspringen, und daß auch die Ganglien vielleicht Mittelpunkte für die in ihnen entspringenden Nervenfäden sind. Hiermit ist aber nicht behauptet, daß, wenn ein Ganglion an einem Nerven befindlich ist, der ganze Nerv von dem Ganglion entspringe. Es entspringt vielleicht nur daselbst eine geringe Anzahl von Nerven-

Digitized by Google

fäden, und mengt sich dem zertheilten, aus dem Gehirne oder Rückenmarke hervorgegangenen Nerven bei. Vielleicht sind alle Ganglien, auch die an den Gehirn- und Rückenmarknerven befindlichen, Theile eines einzigen, durch Fäden zusammenhängenden Systems; denn es giebt, so viel wir jetzt wissen, kein einziges Ganglion; zu welchem sich nicht Fäden des sympathischen Nerven hin verfolgen ließen, sie mögen nun direkt, oder nachdem sie zuvor in die Scheiden anderer Nerven aufgenommen worden, dahin gelangen. Vielleicht bewirkt dieses allgemeine Ganglienſystem die Regulirung der vom Willen unabhängigen Thätigkeiten, und vielleicht entspringen also auch in den Ganglien der Gehirn- und Rückenmarknerven einzelne kleine Fäden, welche mit den Bündeln und Fäden der Rückenmarknerven zu Theilen hingehen, welche ohne Zuthun des Willens thätig sind, z. B. zu der die Ausdünstung absondernden Haut und zu den die Ernährung bewirkenden Gefäßen, welche sich an solchen Stellen des Körpers befinden, zu welchen man die Aeste des sympathischen Nerven aus andern Ganglien noch nicht zu verfolgen im Stande gewesen ist.

Diese Vorstellung, nach welcher Nervenknoten, die so genau mit den Gehirn- und Rückenmarknerven verschmolzen sind, als Theile des sympathischen Nerven betrachtet werden, ist um so eher zulässig, da solche Knoten, welche mit Gewißheit für Theile des sympathischen Nerven zu halten sind, bei manchen Thieren unmittelbar auf der Oberfläche der Rückenmarknerven aufsitzen, z. B. die untersten ganglia cervicalia, und die obern ganglia thoracica auf den Flügelnerven der Vögel[1]).

Es ist denkbar, daß es auch Nervenknoten gebe, aus welchen alle die Nervenfäden entspringen, welche mit den Knoten in Verbindung stehen, so daß also durch sie keine Nerven hindurchgehen, und daß sich eben hierdurch die mit den Gehirn- und Rückenmarknerven verschmolzenen Ganglien von manchen Ganglien des sympathischen Nerven unterscheiden.

Mit den bei den letzteren Sätzen hängt auch die Vermuthung zusammen:

4. die Ganglien und vielleicht auch manche Geflechte beschränkten den Einfluß des Gehirns auf die Theile, welche von den Ganglien Nerven erhielten, und verursachten dadurch, daß die von den Ganglien mit Nerven versehenen Muskeln dem Willen nicht unterworfen wären, und sie verhinderten auch, daß die Fortpflanzung der Eindrücke von gewissen Stellen des Körpers zu dem Sitze der Empfindungen durch die aus den Ganglien entspringenden Nerven geschehen könnte.

---

[1]) *E. H. Weber*, Anatomia comparata nervi sympathici. Tab. II. Fig. 2. p. 32 sq.

Digitized by Google

Denn wenn es Stellen giebt, wo die feinſten Nervenfäden unter einander durch ihr Nervenmark zuſammenſtoßen, und wo ſie alſo nicht durch ihre Hüllen iſolirt bis zu dem Gehirne und Rückenmarke fortgehen, wenn es Stellen giebt, wo der durch einen Nervenfaden fortgepflanzte Eindruck in vielen mit ihm zuſammenſtoßenden Nervenfäden Wirkungen hervorbringt, ſo darf man wohl vermuthen, daß dieſe Stellen verhindern, daß der Wille vermittelſt dieſer Nerven beſtimmte Bewegungen hervorbringe, oder daß die Seele von gewiſſen Organen durch ſolche Fäden deutliche Empfindungen erhalten könne, und folglich, wenn es Theile giebt, deren Nervenfäden nicht bis zum Gehirne und Rückenmarke fortgehen, ſondern deren Enden in den Ganglien aufzuſuchen ſind, ſo können dieſelben vielleicht auch von andern Mittelpunkten des Nervenſyſtems, als vom Gehirne aus zur Thätigkeit angeregt werden. Indeſſen ſind noch auch dieſe Annahmen ſehr hypothetiſch und keineswegs erwieſen.

Winslow [1]), Le Cat [2]), Eſchenbach [3]), Hirſch [4]) hatten die unter Nr. 3. angeführte Vermuthung vorgetragen, Johnſtone [5]), Unzer [6]), Pfeffinger [7]), Iwanoff [8]), und neuerlich Bichat [9]), Reil [10]) und Gall [11]), und andere neuere Schriftſteller, haben die unter Nr. 4. dargeſtellte Vermuthung damit verbunden [12]).

Für die Winslowſchen und Johnſtonſchen Anſichten

---

[1]) *Winslow*, Exposition anatomique. Tab. III. éd. Paris 1732, und in der lateiniſchen Ueberſ. Frankfurt 1753. §. 364. T. IV. P. 2. §. 125.

[2]) *Le Cat*, Traité des sensations et des passions. T. I. Paris 1767. p. 127, 144.

[3]) C. C. Eſchenbach, anatomiſche Beſchreibung des menſchlichen Körpers. Roſtock 1750. §. 1298.

[4]) *A. B. H. Hirsch*, Paris quinti nervorum encephali disquisitio anatomica. Viennae 1765. §. 47. *Ludwig* script. nevr. minor, Tom. I. p. 254. §. 63.

[5]) *J. Johnstone*, in den Philos. Transactions T. 54. 1763. p. 177. T. 57. p. 121. T. 60. p. 30. und Essays on the use of the ganglions of the nerves. Shrewsbury 1771. Deutſch: Ueber den Nutzen der Nervenknoten. Stettin 1787, und Medical essays and observations, with disquisitions relating to the nervous systems, by *James Johnstone Evesham*. 1795. Deutſch: Unterſuchungen über das Nervenſyſtem ꝛc., überſ. von Michaelis. Leipzig 1796.

[6]) J. A. Unzer, der Arzt, 5ter Bd. St. 233. Hamburg und Leipzig 1769. p. 324. und deſſen Phyſiologie thieriſcher Körper. Leipzig 1771. S. 66.

[7]) *J. Pfeffinger*, de structura nervorum. Argentorati 1782. §. 30. in *Ludwig*, script. nevrolog. min. Tom. I. p. 25.

D Iwanoff, Diss. de origine nervorum intercostalium. Argentorati 1780. §. 23. in *Ludwig* script. novrolog. min. Tom. III. p. 102.

[8]) *A. Bichat*, Anatomie gén. Paris 1801. Deutſch v. Pfaff. Leipzig 1802. T. I. S. 290.

[10]) *J. C. Reil*, im Archive für die Physiol. T. VII. Halle 1807. p. 226.

[11]) *J. F. Gall* und *Spurzheim*, Versuch einer Darſtellung des Nervenſyſtems und insbeſondere des Gehirns.

[12]) Die ausführlichſte Literatur hierüber, mit Anführung der wichtigſten Stellen, findet man in *C. G. Wutzer*, de corporis humani gangliorum fabrica atque usu monographia, c. tab. aen. Berolini 1817. 4.

Digitized by Google

lassen sich vorzüglich folgende Gründe zur Unterstützung anführen:

1. Kein einziger Muskel, der nur Fäden vom sympathischen Nerven erhält, kann willkührlich bewegt werden. Das Herz, die Gedärme, die Ausführungsgänge der Leber, die Gallenblase, liefern hierzu die Beispiele. Wohl aber sind gewisse andere Muskeln, die zum Theile von sympathischen Nerven, zum Theile von Rückenmarks- und Gehirnvenen mit Fäden versehen werden, zu einer halb willkührlichen Bewegung bestimmt, die nur bis zu einem gewissen Punkte nach Willkühr aufgehalten oder beschleunigt werden kann. Ihre Bewegungen sind also gewissermaßen halb willkührlich, halb unwillkührlich, z. B. die des Zwerchfells, der Harnblase, des Mastdarms und vielleicht die der Iris.

2. Ferner kann man anführen, daß kein einziger Muskel, dessen Bewegungen ganz willkührlich sind, sichtbare Nerven vom Nervus sympathicus erhalte. Denn obgleich Haase und einige andere Anatomen Fäden beschrieben haben, die vom Halstheile des sympathischen Nerven zu den M. scalenis oder zu dem M. longus colli gingen, so ist doch diese Beobachtung nicht mehr anzunehmen, weil man neuerlich gefunden hat, daß in dieser Gegend solche Fäden zuweilen die Muskeln durchbohren und als Verbindungsfäden zu den Halsnerven gelangen.

Es würde aber sehr übertrieben sein, wenn man behauptete, daß alle Theile, die ihre Funktionen unwillkührlich und bewußtlos vollbringen, sichtbare Nerven vom sympathischen Nerven erhielten.

Denn alle Gefäße der Extremitäten des Rückens und des Bauchs, welche, ohne daß der Wille daran Antheil hat, die Ernährung dieser Theile und die Absonderung durch die Haut bewirken helfen, erhalten, so viel man jetzt weiß, ihre Nerven nicht vom N. sympathicus, sondern von den an den Extremitäten liegenden Rückenmarksnerven [1]), welche Lucä, Bock und andere untersucht haben, und die Lucä wohl noch nicht gänzlich von Zellgewebe gereinigt abbilden ließ. Auch zur Milchdrüse der weiblichen Brust und zur Thränendrüse hat man bis jetzt noch keine Fäden des Nervus sympathicus verfolgt, darf indessen aber auch den Nervus lacrimalis, der vom 5ten Nervenpaare entspringt, nicht mit Gewißheit für den Nerven der Thränendrüse halten, da seine Zweige nur an ihr vorbei und zum Theil durch sie hindurch zu andern Theilen zu gehen scheinen.

Sogar die Regel, daß alle Rückenmarks- und Gehirnnerven, die zu unwillkührlich thätigen Organen der Brust und der Bauchhöhle liefen, erst durch Ganglien des sympathischen Nerven hindurch müßten, hat einige Ausnahmen. Zwar bilden die Reihe von Knoten an der Wirbelsäule gleichsam eine Umzäunung für die unwillkührlich thätigen Organe der Brust und des Unterleibes, durch welche die meisten Nerven, welche von dem Rückenmarke und dem Gehirne kommen, hindurchgehen, aber der Nervus vagus ist die auffallendste Ausnahme. Er geht zu den Lungen, zum Herzen, zum Oesophagus, zum Magen und zur Leber. Indessen verbreitet er sich in jenen Theilen geflechtartig, und seine Fäden werden allerdings den des sympathetischen Nerven durch die röthliche Farbe ähnlich, auch besitzt er meistens 2 knotige Anschwellungen, und zeichnet sich durch eine sehr auffallende Verkettung seiner Bündel innerhalb der Scheide aus.

---

[1]) *Ribes*, Mém. de la soc. d'émulat. VIII. 1817. und *Meckels* Archiv B. V. p. 442. glaubt jedoch Fäden der Ganglienerven bis zum untern Ende der Armarterie und ihrer Aeste, so wie andere bis zur Poplitaea verfolgt zu haben. Diese Beobachtungen bedurfen indessen noch einer Bestätigung.

Digitized by Google

3. Daß die Nerven des N. sympath. und seine Ganglien gestochen und auf andere Weise gereizt, keinen Schmerz hervorbrächten, eine Behauptung mehrerer experimentirender Physiologen, die ich jedoch noch nicht für erwiesen halte.

Bichat [1]) hat nämlich das Gangl. coeliacum beim Hunde mit dem Messer und mit Säuren gereizt, ohne Schmerz zu erregen, das Ganglion cervicale inferius immer verletzt, ohne Muskelbewegung zu veranlassen; der hervorgezogene Darm wurde von ihm, ohne einen Schmerz des Thiers zu veranlassen, gereizt. Auch fand er, daß die Zusammenschnürung der Samennerven bei der Unterbindung der Samenarterien keinen Schmerz verursache, was viele Chirurgen nicht zugeben. Die Sache ist schwierig, weil außer den Samennerven noch andere von den Lendennerven im Funic. sperm. verlaufen.

Reil [2]) fußt wohl bloß auf Bichats Versuche. Dupuy [3]) schnitt das Gangl. cerv. inf. angeblich ohne daß das Thier Schmerz empfand, heraus. Magendie [4]) sagt, man könne ein Ganglion stechen, schneiden, abreißen, und das Thier schiene kein Bewußtsein davon zu haben. Er behauptet, oft an Pferden und Hunden Versuche mit den Ganglien des Halses gemacht und dieses erfahren zu haben. Man nehme, sagt er, die Ganglien des Halses und selbst die ersten der Brust hinweg, und man sieht keine wahrnehmbare Störung in den Functionen erfolgen. Wutzer [5]) öffnete 2 lebenden Hunden den Bauch, und reizte die Lendenknoten durch mannichfaltige mechanische Reizmittel; nachdem der Hund schon den ersten Schmerz verwunden hatte, und während er daher ruhig lag, ohne allen Erfolg. Hingegen erregte es den Hunden sogleich heftigen Schmerz, wenn er den Plexus brachialis stach.

Ich meines Theils halte die alltäglichen Beobachtungen über die Schmerzen in diesen Theilen, welche unempfindlich sein sollen, für beachtungswerther als jene Experimente. Angehäufte Blähungen können bekanntlich im Darmkanale zu jeder Zeit das heftigste Leibschneiden, und Ueberfüllung der Lunge mit Blut schon, ohne alle Entzündung, heftiges Bruststechen erregen. Bei Entzündung der Gedärme vollends können die heftigsten Schmerzen in diesen Organen ihren Sitz haben. Wie käme es also, daß der Weg zum Gehirne in diesem Falle offen sein kann? Welche Veränderung könnte wohl bewirken, daß die Ganglien der Fortpflanzung des Reizes kein Hinderniß in den Weg legten? Um diesen Einwurf zu beseitigen, nahm Reil an, daß die graue Substanz, aus der die Ganglien und Nerven des Nervus sympathicus beständen, weniger vollkommen die Empfindungen leiteten, als die weiße, und nannte sie in dieser Rücksicht Halbleiter. Seien nun die zu leitenden Eindrücke schwach, so gelangten sie nicht bis zum Gehirne. So wie sich aber eine große Menge angehäufter Electricität auch durch einen Halbleiter Bahn breche, so auch sehr heftige Reizungen durch die Ganglien und grauen Nerven. Daher leitet es auch Wutzer [6]) her, daß ein Hund den heftigsten Schmerz verrieth, dem er den Unterleib aufgeschnitten, das 2te Gangl. lumbale frei gemacht und auf eine Glasplatte gelegt hatte, wenn er es mit dem Drahte des positiven und negativen Poles berührte. Dahingegen dasselbe Thier vorher, wenn das Unterleibsstück des sympathischen Nerven gestochen und zerschnitten würde, keinen Schmerz verrieth.

Aber mit der Berufung auf diese Analogie, welche nach manchen Physiologen zwischen den electrischen Processen und dem Vorgange in den Nerven Statt findet, durch welchen die Fortpflanzung der Eindrücke

---

[1]) *Bichat*, allgemeine Anatomie, übers. v. *Pfaff*. I. p. 305, 322.

[2]) *Reil*, Archiv für die Physiologie. B. VII. 230.

[3]) *Dupuy*, Bullet. de la soc. d'émulation. Paris 1816. No. XII. Déc.

[4]) *Magendie*, Physiologie, übers. von *Heusinger*, p. 149.

[5]) *Wutzer*, de corp. hum. gangliorum fabrica atque usu. Berol. 1817. p. 126.

[6]) *Wutzer* a. a. O. S. 127.

Digitized by Google

geschieht, muß man vorsichtig sein, und darf nicht auf eine noch nicht bewährte Hypothese eine neue bauen.

4. Manche haben auch behauptet, daß, wenn Aeste oder Ganglien des Nervus sympath. galvanisirt würden, die unwillkührlichen Muskeln, die von daher Fäden erhalten, nicht in Zuckungen geriethen, was doch bei den willkührlichen Muskeln der Fall ist, wenn ihre Nerven galvanisirt werden, eine Behauptung, welche, wie man sogleich sehen wird, gleichfalls noch nicht bewiesen werden kann.

Humboldt [1]) versicherte 1797, daß, wenn das Herz schnell und mit Schonung einiger Nervenfäden aus der Brust genommen werde, man bei alleiniger Armirung der Nervenfasern Zuckungen in diesem Organe hervorbringen könne, und schon 3 Jahre vor ihm hatte Fowler [2]) dasselbe Resultat erhalten, und Pfaff [3]) erzählt denselben Erfolg von seinen Versuchen. Bichat dagegen widersprach den Humboldtschen Versuchen. Wenn er Ganglien und Därme, oder den Plexus mesentericus, Därme, oder die Herznerven und das Herz, oder den Nerv. vagus und das Herz armirte, niemals entstanden Zuckungen. Eben so wenn man Gehirn und Herz, Rückenmark und Herz ꝛc. armirte, obgleich, wenn zugleich willkührliche Muskeln in die Kette gebracht wurden, immer Zuckungen entstanden. Er gebrauchte dabei die Vorsicht, um eine mechanische Reizung zu vermeiden, welche die Conductoren auf das Herz machen könnten, indem sie dasselbe berühren, die Conductoren ans Herz zu bringen, ehe die Voltaische Säule geschlossen war, und dann die Säule zu schließen [4]).

Bichat erregte dagegen constant Contractionen des Herzens, wenn er dessen Substanz, nachdem er es herausgenommen hatte, an 2 Orten armirte. Wer sieht aber nicht ein, daß die Resultate der Versuche von Bichat auf einem Fehler des Apparats beruhen können? Denn da er den einen Pol mit den Nerven, den andern mit dem Fleische in Verbindung brachte, so mußten die Nerven, wenn nicht als Nerven, doch als feuchte Stränge, die die Electricität leiten, ihre Dienste thun, sobald das Fleisch Contractionen zu machen geschickt und der Apparat wirksam gewesen wäre. Dergleichen Versuche beweisen also nicht die Abwesenheit des lebendigen Leitungsvermögens der Nerven, sondern die Untauglichkeit der Muskeln oder des Apparates.

Es widersprechen auch diesen Versuchen die von Wutzer [5]), da er das 2te Ganglion lumbare, das er durch untergelegtes Glas isolirt hatte, armirte und alle im Unterleibe enthaltenen Theile, und selbst den Schenkel dieser Seite in zitternde, krampfhafte Bewegung gerathen sah.

5. Mechanische Reizung des Gehirns und Rückenmarks kann, wie es scheint, zwar alle Muskeln in Bewegung setzen, welche von dem Gehirne und Rückenmark-Nervenfäden erhalten, nicht aber die unwillkührlich wirkenden Muskeln, die vom Nervus sympathicus und vom Vagus mit Zweigen versehen werden.

Allerdings wird das Herz zuweilen durch Reizung des Rückenmarks zu häufigeren Zusammenziehungen veranlaßt, oder zu erneuerten, wenn es schon auf

---

[1]) A. v. Humboldt, Versuch über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. B. I. S. 347.

[2]) *Rich. Fowler*, Experiments on animal electricity. 1794.

[3]) Pfaff, über die thierische Electricität und Reizbarkeit.

[4]) Recherches sur la vie et la mort. Paris 1800.

[5]) *Wutzer* a. a. O. S. 127.

Digitized by Google

gehört hatte zu schlagen. Allein diese erweckte Thätigkeit, die nach der gewöhnlichen Regel von beiden Vorkammern anfängt, und während diese erschlaffen, auf die Herzkammern übergeht, hat keine Aehnlichkeit mit den unregelmäßigen Zuckungen, in welche die willkührlichen Muskeln bei derselben Gelegenheit gerathen. Auch haben die Beobachter oft nicht hinzugefügt, ob diese Bewegungen augenblicklich dem Reize folgen, oder erst nach einigen Augenblicken. Sie könnten demnach wohl sympathisch wie das Herzklopfen bei Gemüthsbewegungen sein. Denn umgekehrt wirken ja auch Einflüsse, die auf den sympathischen Nerven geschehen, heftig aufs Gehirn zurück. Man will Fälle beobachtet haben, wo ein Schlag auf den Magen unmittelbar und augenblicklich den Tod nach sich zog. Wie wirkt nicht Magenverderbniß auf den Kopf?

Durch den Satz No. 5. scheint es erklärlich, warum, wenn wegen organischer Fehler im Gehirne Epilepsie, Katalepsie ꝛc. entsteht, zwar die willkührlichen Muskeln plötzlich und von den heftigsten Zuckungen ergriffen werden, keineswegs aber die, welche der Willkühr entzogen sind, in einigem Grade aber einige halbwillkührliche, z. B. die Respirationsmuskeln.

Der Puls dagegen wird nur beschleunigt, was bei einer so heftigen Muskelanstrengung nicht anders sein kann. Er setzt keineswegs aus ꝛc., die Sphincteren gerathen nicht in Convulsionen, denn sonst müßten sie sich abwechselnd öffnen und schließen, und dann würde unwillkührlicher Kothabgang und Harnabgang Statt finden.

6. Bei Lähmung und Vernichtung des Gehirns, ja sogar bei Vernichtung des Gehirns und Rückenmarks zugleich, dauert die Pulsation des Herzens, das vom N. vagus und vom N. sympathicus seine Nerven erhält, bei Säugethieren, Amphibien und Fischen noch einige Zeit fort.

Sogar die Beobachtungen des Le Gallois [1]) widersprechen diesem Satze nicht, denn Le Gallois hat nur bewiesen, daß die Pulsationen des Herzens, nachdem das Rückenmark ganz zerstört worden, kraftlos und unzureichend zur Unterhaltung des Blutlaufs wären, und daß sie bei warmblütigen Thieren bald aufhören. Ich spreche daher hier nur von diesen nicht kraftvollen, aber doch sehr regelmäßig sich wiederholenden Pulsationen des Herzens, welche man nicht mit dem Zittern und Zucken der Fasern anderer Muskeln bei so eben geschlachteten Thieren vergleichen darf. Denn die Muskelfasern des Herzens wirken hierbei gemeinschaftlich und in einer gewissen Ordnung, was kaum zu begreifen ist, wenn man nicht annehmen will, daß sie durch ihre Nerven unter einander zusammenhängen, und daß die Nerven derselben ihre Wirkung, mittels deren sie die Muskelfasern des Herzens zu einer gemeinschaftlichen geordneten Bewegung verbinden, noch unabhängig vom Gehirne und Rückenmarke fortsetzen. Ich will hier an die mit Unrecht vergessenen Beobachtungen von R. Whytt erinnern.

R. Whytt [2]) zerstörte bei einem Frosche das Rückenmark, nachdem er ihn geköpft hatte, durch Einstoßen eines glühend heißen Drahtes. Er öffnete die Brust, und das Herz schlug nach 35 Minuten 30mal in einer Minute, — nach 1 Stunde und 51 Min. 20mal, — nach 3 St. 51 Min., da das Zimmer wärmer ward, 25mal, — in die Sonne gebracht 31mal, — in kühlerer Luft am Fenster 25mal, — wieder in die Sonne gebracht 30mal, nach 6 Stunden und 16 Minuten, wo der Ventrikel ohne Bewegung war, das Herzohr 12mal, — und eben dasselbe nach 9 Stunden 11 bis 12mal. Und sogar aus dem Körper herausgenommene Froschherzen, in Wasser gethan, pulsirten noch ziemlich lange, das eine, 12 Minuten nach dem Herausnehmen, 20mal in einer Minute, — ein anderes 11 bis 9mal, — ein anderes 15 bis 11mal, — ein anderes 25 bis 9mal.

---

[1]) *Le Gallois*, Expériences sur le principe de la vie, notamment sur celui des mouvements du coeur. Paris 1812.

[2]) *R. Whytt*, Edinburger Versuche (neue) B. II. 316.

Digitized by Google

Eintheilung der Nerven des Gehirns und Rückenmarks in Empfindungs- und Bewegungsnerven.

Nachdem schon früher von verschiedenen Physiologen mancherlei Vermuthungen über die Existenz einer doppelten Classe von Nerven für die Empfindung und für die Bewegung vorgetragen worden waren, hat Ch. Bell durch pathologische Beobachtungen am Gesichte des Menschen, und bald darauf Magendie durch directe Versuche an den Rückenmarksnerven lebender Thiere zu beweisen gesucht, daß die mit einem Knoten versehenen Wurzeln der an diesen Stellen verbreiteten Nerven (die hinteren Wurzeln aller Rückenmarksnerven, und die große Wurzel des Nervus trigeminus) der Empfindung, die nicht mit Knoten versehenen Nervenwurzeln der Bewegung gewidmet wären.

Magendie [1]) entblößte bei jungen Hunden das Rückgrat hinten in der Lenden- und Kreuzgegend, und durchschnitt dann mit einer kleinen Scheere die hinteren Wurzeln der Nerven auf einer Seite. Dadurch ging die Fähigkeit zu empfinden im Hinterbeine dieser Seite verloren, aber das Thier machte deutliche Bewegungen damit. Nun glückte ihm endlich bei einem andern Hunde der viel schwierigere Versuch, die vorderen Rückenmarkswurzeln ohne eine Verletzung der hinteren ebendaselbst mittels eines Staarmessers zu durchschneiden, das Glied wurde völlig unbeweglich und schlaff, aber es blieb deutlich empfindlich. Um die Richtigkeit des vorigen Versuchs noch mehr zu bestätigen, gab er dem Thiere, dessen Nervenwurzeln eben daselbst so eben vorn oder hinten durchschnitten worden waren, nux vomica ein. Weil nun die nux vomica alsbald bei diesen Thieren allgemeine sehr heftige Convulsionen zu erregen pflegt, so gab er Achtung, ob dieselben auch in den hinteren Gliedmaßen entstehen würden, deren vordere oder hintere Nervenwurzeln durchschnitten worden wären. Denn da die Nux vomica ein Gift ist, welches zunächst auf das Centrum des Nervensystems wirkt, und von da aus mittels der Nerven krampfhafte Zusammenziehungen in den Muskeln hervorbringt, so erwartete er, daß, wenn die Wurzeln der Bewegungsnerven der hinteren Gliedmaßen durchschnitten wären, zwar andere Muskeln, aber nicht die der hinteren Gliedmaßen in Zuckungen gerathen würden. Das Resultat stimmte mit dem vorigen überein, denn waren die hinteren Wurzeln durchschnitten, so gerieth das Glied eben so sehr als andere Theile in Convulsionen, waren es aber die vorderen, so blieb das Glied unbewegt und schlaff, während die andern

[1]) *Magendie*, Journal de physiologie expérimentale et pathologique. T. II. 1822. p. 276—279, 366—371. und zum Theil in *Meckels* Archiv übers. B. VIII. 1823. p. 113.

Digitized by Google

Muskeln des Körpers heftige tetanische Zusammenziehungen erlitten, denn in diesem letzteren Falle konnte das Gift mittels der vorderen Nervenwurzeln auf die Muskeln jenes Glieds nicht wirken, weil sie durchschnitten waren, und durch die hinteren auch nicht, weil diese, wie er glaubt, keine Bewegungsnerven enthalten. Man mußte nun hier noch erwarten, daß, wenn er die vorderen oder die hinteren entblößten Wurzeln stäche und auf andere Art reizte, die hinteren Wurzeln heftigen Schmerz, aber keine Bewegung des Glieds, zu welchem sie gehen, die vordere Bewegung des Glieds aber keinen Schmerz verursachen würden. Das erwartete auch Magendie. Allein dieses war der Fall nicht. Die Reizung beider Arten von Wurzeln erregte Schmerz und Bewegung des Glieds. Wann er ein Bündel der hinteren Wurzeln quer durchschnitt, so entstand eine Bewegung des Gliedes im Ganzen (da doch diese Wurzel nur Empfindungsnerven enthalten soll), und der Schmerz war, wenn er sie reizte, gar nicht mit demjenigen zu vergleichen, welcher entstand, wenn das Rückenmark an der Ursprungsstelle dieser Nerven auch nur leise berührt wurde. Er behauptet aber, daß die erregte Bewegung bei Reizung der vordern Wurzeln und die erregte Empfindung bei Reizung der hinteren Wurzeln heftiger gewesen wäre. Da nun Magendie vermuthete, daß wohl der angebrachte Reiz durch den Nerven auf das Rückenmark übergehen und hierdurch den scheinbaren Widerspruch der Versuche verursachen möchte, so schnitt er erst die Wurzeln ganz durch, und reizte nun die Durchschnittsflächen der zu den hintern Gliedmaßen übergehenden Nerven; allein hierdurch brachte er meistens gar keine Wirkung hervor, und in den 2 einzigen Fällen, wo eine Wirkung erfolgte, entstand sowohl bei Reizung der hinteren als der vorderen Wurzeln Bewegung.

Die Zweifel, welche hierdurch erregt wurden, schienen noch durch die Versuche von Bellingeri [1]) vermehrt zu werden, welcher zu dem Resultate gelangte, die hinteren, nicht die vorderen Wurzeln der Rückenmarknerven dienten zur Empfindung; aber beide Wurzeln der Lendennerven wären der Bewegung gewidmet, die hinteren nämlich der Streckung der Füße, die vorderen ihrer Beugung.

Indessen sind diese Zweifel neuerlich durch die vortrefflichen Versuche von Johannes Müller in Bonn, und von Panizza in Pavia beseitigt worden.

Müller [2]) öffnete bei vielen lebenden Fröschen mittels einer scharf schneidenden, spitzigen Zange eine Gegend des Rückgrats. Die Frösche

[1]) *C. Bellingeri*, experimenta physiologica in medullam spinalem. Memorie della reale academia delle scienze di Torino, Tom. XXX. p. 293. und *Férussac* Bullet. des sc. méd. Sept.

[2]) Johannes Müller, in Froriep's Notizen, März 1831. B. 30. S. 113.

Digitized by Google

hüpften hierauf noch munter umher. Nun hob er die ziemlich dicken hinteren Wurzeln der Rückenmarknerven in die Höhe, ohne die vorderen mit zu faſſen, durchſchnitt ſie, faßte einen einzelnen Nerven mit der Pincette, und zerrte ihn mit der Spitze einer Haarnadel.

Ungeachtet er dieſen Verſuch ſehr oft an einer Menge von Fröſchen wiederholte, ſo gelang doch jeder Verſuch, und hierdurch überzeugte er ſich daß auf die mechaniſche Reizung der hinteren Wurzeln niemals auch nur die entfernteſte Spur einer Zuckung in den Extremitäten, zu welchen die Nerven gehen, entſtehe.

Hebt man nun aber eine der vorderen, gleichfalls ſehr dicken Wurzeln aus dem Canale des Rückgrats in die Höhe, ſo erfolgen ſchon bei der leiſeſten Berührung derſelben die allerlebhafteſten Zuckungen in der hinteren Extremität. Schnitt er ſie nun ab und faßte das abgeſchnittene Ende mit der Pincette, und zerrte die angeſpannte Wurzel mit der Nadelſpitze, ſo erfolgten bei jeder Reizung, er mochte den Verſuch ſo vielemal und an ſo vielen Fröſchen wiederholen als er wollte, die lebhafteſten Zuckungen. Uebrigens fand er nun auch daß die Reizung der vorderen Wurzeln durch den Galvanismus ſogleich die heftigſten, die der hinteren Wurzeln dagegen niemals Zuckungen bewirkt.

Zu ähnlichen Reſultaten iſt faſt gleichzeitig in Italien Panizza [1] gelangt.

Ch. Bell [2] ſtützt ſich vorzüglich auf pathologiſche Beobachtungen von Verletzungen der Geſichtsäſte des 5ten und 7ten Paares.

Wenn Aeſte des 5ten Paares gelähmt werden, ſo geht das Gefühl und der Gebrauch der Muskeln beim Kauen verloren, in wiefern aber die Geſichtsmuskeln beim Athmen, beim Lachen, beim Weinen und ähnlichen Verrichtungen thätig ſind, verlieren ſie ihre Kraft nicht. Die Kaumuskeln, Backenmuskeln und die Muskeln der Lippen erhalten nach Bells Vermuthung diejenigen Bewegungsnerven, welche die beim Kauen

---

[1]) Scarpa ſchreibt über dieſe Verſuche Panizza's, denen er ſelbſt beiwohnte, folgendes: „In tanta circa gravissimum hoc argumentum ambiguitate Anatomes Professor noster *Panizza* eximia qua pollet tum in anatomicis tum in physiologicis dexteritate et ingenii acumine, negotium in se suscepit: tanto autem cum successu experiundo in frigidi aeque ac calidi sanguinis animalibus, ut semini in praesens amplius dubitare liceat, radicem unius cujusque nervi spinalis *anteriorum motui* musculorum voluntario inservire, *posteriorem* vero radicem *sensui* famulari. Horum experimentorum descriptio quam primum prodibit, non sine magna auctoris laude. Siehe *Antonii Scarpa* de ganglio nervorum deque origine et essentia nervi intercostalis ad *Henricum Weber*, Anatomicum Lipsiensem. Milano 1831. 8. p. 7. (Estrato dagli Annali universali di Medicina. Maggio e Giugno 1831.)

[2]) *Ch. Bell*, Idea of a new anatomy of the brain submitted for the observations of his friends. Siehe *Magendie*, Journal 1822. p. 370. 1827. p. 9. und Phil. Transact. 1826. P. II. Siehe auch die Eintheilung der Gehirnnerven weiter unten.

zu machenden Bewegungen veranlassen, von der kleinen Wurzel des 5ten Nervenpaars, die bekanntlich keinen Antheil an der Bildung des Knotens des 5ten Nervenpaars nimmt, deren Aeste sich aber mit den aus dem Knoten kommenden, dem Gefühle dienenden Aesten vereinigen. Das 7te Nervenpaar ist nach ihm nicht Empfindungsnerv, sondern nur Bewegungsnerv, der vorzüglich die Muskeln beim Mienenspiel und beim Athmen in Bewegung setzt. Da nun ein und derselbe Muskel zuweilen sowohl beim Kauen als auch beim Athmen mitwirkt, so bekommt er nicht selten doppelte Bewegungsnerven, einen vom 5ten, und den andern vom 7ten Hirnnervenpaare. Dessenungeachtet erregt doch die Verletzung des 7ten Gehirnnervenpaars Schmerz [1]). Wenn das 5te Nervenpaar gelähmt ist, so wird das Gesicht beim Kauen schief gezogen, und während des Lachens kann es wieder gerade werden. Umgekehrt verhält sichs, wenn das 7te Nervenpaar gelähmt ist.

Noch einen Grund aber für die Meinung, daß es besondere Nerven, die die Empfindung, und besondere Nerven, die die Bewegung vermitteln, gebe, bilden die zahlreichen Fälle, wo beim Schlagflusse das Vermögen der willkührlichen Bewegung gewisser Theile aufgehoben ist, während in ihnen das Gefühl fortdauert, oder sogar eine solche übermäßige Empfindlichkeit eintritt, daß die Einreibung von Salben schmerzhaft ist. Viel seltener sind die entgegengesetzten Fälle, in welchen das Gefühl vernichtet gewesen sein soll, während das Vermögen der willkührlichen Bewegung der nämlichen Glieder fortdauerte, ein Zustand, den man Anästhesie nennt. Ich hege indessen hinsichtlich der meisten mir bekannt gewordenen Beobachtungen noch Zweifel, ob sie beweisen, daß das Bewegungsvermögen in den nämlichen Theilen fortdauert, in welchen das Empfindungsvermögen vernichtet war. Da nämlich die Muskeln der Finger am Unterarme, die der Zehen am Unterschenkel liegen, so kann allerdings der Fall eintreten, daß die Finger oder Zehen, oder die Hand und der Fuß, oder sogar auch ein großes Stück des Unterarms oder des Unterschenkels wirklich abgestorben ist, während die Finger oder Zehen noch bewegt werden können [2]). Man erwäge hier den Einwurf, welcher Theil I. S. 295 gegen eine ähnliche Folgerung gemacht worden ist.

---

[1]) *F. Eschricht*, De functionibus nervorum faciei et olfactus organi. Diss. Hafniae 1825. 8. und im Auszuge in *Gerson* und *Julius* Magazin d. ausl. Lit. März 1826. p. 224.

[2]) Eine ansehnliche Sammlung von neueren Beobachtungen von Anaesthesie findet man in *Nasse*, Zeitschrift für psychische Aerzte. 1822. II. 2. S. 203. Einen sehr merkwürdigen Fall, der, wenn er Zutrauen verdient, dem von mir geäußerten Zweifel nicht unterliegt, ist der von *A. Reid* in *Froriep* Notizen 1820. B. XXIV. p. 217. Zimmermann, von der Erfahrung, S. 219, erwähnt auch einen Fall von Anästhesie, der mit der Kriebelkrankheit verbunden war.

Digitized by Google

Von den
Häuten, von welchen das Gehirn und Rückenmark umgeben werden.

Die harte Haut.

Die harte Haut, dura mater, oder dura meninx, oder dura membrana, ist eine dicke, dichte und sehr feste Haut, welche theils die ganze inwendige Fläche der Hirnschale überzieht und das Gehirn einschließt, theils innerhalb des Canales des Rückgrates liegt und das Rückenmark wie eine Scheide umgiebt.

Der Kopftheil, pars cephalica, dieser Haut und der Rückgratstheil, pars spinalis, hängen durch das große Loch des Hinterkopfs mit einander zusammen, und dieser ist als ein Fortsatz jenes Theiles anzusehen.

Sie ist die dichteste und härteste Haut im ganzen menschlichen Körper, besteht aus einem sehr dichten, durch einen besondern Glanz ausgezeichneten Gewebe, in welchem sich in verschiedenen Richtungen liegende sehnige Fasern unterscheiden lassen. Sie gehört zu den fibrösen Häuten.

Die harte Hirnhaut.

Man kann die Pars cephalica der harten Hirnhaut künstlich in 2 Platten zertheilen, welche aber in der Natur nicht wirklich unterschieden und durch eine Lage Zellgewebe von einander getrennt sind, zwischen welchen indessen doch an gewissen Stellen Zwischenräume für daselbst verlaufende Venen befindlich sind.

Die auswendige Platte liegt dicht an der inwendigen Fläche der Hirnschale an, dient derselben als Beinhaut, und ist mit ihr durch dünne Blutgefäßchen, welche aus ihr in die Hirnschale, oder umgekehrt, dringen, und auch durch kurzes Zellgewebe verbunden. Je jünger der Körper ist, desto mehr sind dieser Blutgefäßchen, je älter er wird, desto mehr derselben werden geschlossen.

Die auswendige Fläche der harten Hirnhaut und die inwendige der Hirnschale hängen daher, und ganz vorzüglich bei kleinen Kindern, sehr fest zusammen [1]), bei Erwachsenen am festesten da, wo die Näthe sind.

[1]) Es wird daher, wenn man (wie man zu thun pflegt, um das Gehirn zu untersuchen) das Gewölbe der Hirnschale rund herum durchgesägt hat, eine große Kraft erfordert, dasselbe von der harten Hirnhaut loszureißen. An jungen Kinderköpfen ist die Trennung, wegen der größeren Menge der verbindenden Blutgefäßchen, gar nicht thunlich, wenn man Stücke der Hirnschale abkeißt, so reißen Stücke der harten Hirnhaut mit ab.

Digitized by Google

Wenn man die Hirnschale von der harten Hirnhaut losgerissen hat, so erscheint die auswendige Fläche der letzteren von zerrissenen Gefäßen und Zellgewebe rauh, die Oberfläche der Hirnschale aber blutig.

Die inwendige Platte wendet ihre inwendige Fläche dem Gehirne zu, ist aber nur an einigen Stellen mit demselben verbunden. Nur gewisse Blutgefäße gehen durch die harte Hirnhaut zum Gehirn, und gewisse vom Gehirne in die Bluthöhlen der harten Hirnhaut über. Die inwendige Fläche derselben ist glatt, und beständig feucht und schlüpfrig von einer Feuchtigkeit, welche das Zusammenwachsen der harten Hirnhaut mit dem Gehirne verhütet. Diese Feuchtigkeit wird wahrscheinlich von aushauchenden Gefäßen beständig ausgehaucht, und von Zeit zu Zeit in einsaugende Gefäße wieder aufgenommen, so daß im gesunden Zustande nicht mehr derselben da ist, als zur Befeuchtung erfordert wird [1]).

Die inwendige Platte der harten Hirnhaut bildet in der Höhle der Hirnschale, indem sie von der auswendigen abweicht, gewisse Falten oder Fortsätze.

Es giebt eine senkrechte, in der Mittellinie an der Decke der Hirnschale gelegene, und eine horizontale, über die hervorspringendsten Unebenheiten der Grundfläche der Hirnschale ausgespannte Falte der harten Hirnhaut. Beide Falten durchkreuzen sich an der Protuberantia occipitalis interna.

Die erstere heißt der sichelförmige Fortsatz, oder die Sichel, processus falciformis oder falx cerebri et cerebelli, oder mediastinum cerebri et cerebelli. Er ist eine häutige Falte, welche vorn am Hahnenkamme des Siebbeins befestigt ist, dann in der Mitte des Gewölbes der Hirnschale, an der Spina frontalis interna (wenn 2 Stirnbeine da sind, an der Stirnnath), ferner unter der Pfeilnath, endlich an dem obern Schenkel der Spina cruciata des Hinterhaupts, bis zur Protuberantia occipitalis interna, und von da als falx cerebelli bis zum großen Hinterhauptloche fortgeht. Ihr vorderer Theil, falx cerebri, liegt so in der Höhle der Hirnschale, zwischen den beiden Hälften des großen Gehirns, daß er senkrecht, bisweilen ein wenig schief auf den markigen Querbalken, corpus callosum, hinabragt. Der obere an der Hirnschale angewachsene Rand der Sichel ist conver; ihr unterer ist concav. An ihrem vorderen Ende ist sie am niedrigsten, nach hinten wird sie allmählig höher, so daß sie wirklich die Gestalt einer Sichel hat. An ihrem obern Rande ist sie am dicksten, nach unten dünner.

[1]) Wenn sich zu viel derselben ansammelt, weil zu viel ausgehaucht, oder zu wenig eingesogen wird, so entsteht der innere Wasserkopf (hydrocephalus internus), bei dem zuweilen die Hirnschale widernatürlich erweitert wird.

Digitized by Google

An der Sichel sind glänzende, unregelmäßig laufende Fasern zu sehen. Zuweilen ist sie nach ihrem untern Rande zu hie und da durchlöchert. In dieser Falte, wo sie an der Hirnschale befestigt ist, befindet sich ein dreieckiger Canal, der Sinus longitudinalis superior, in welchem das Venenblut des benachbarten Theiles des Gehirns zusammenkommt. (Siehe S. 278.)

Beide Platten dieser Falte gehen an ihrem hinteren Ende auswärts in das Gezelt, tentorium cerebelli, über.

Diese häutige Wand befestiget die Hälften des großen Gehirns in ihrer Lage, daß eine die andere nicht drücke, wenn der Kopf auf einer Seite liegt. Weil aber die andern Hirnhäute in der Längenspalte des Gehirns an vielen Stellen dieser Falte festhängen, und durch Venen, die in den Sinus longitudinalis übergehen, mit ihr verbunden sind, so hängt das Gehirn selbst an dieser Falte.

Die zweite Falte, welche quer liegt, und das Gezelt, tentorium cerebelli oder septum encephali, heißt, ist von derselben Beschaffenheit. Jede Hälfte derselben erstreckt sich von der Protuberantia occipitalis interna, wo sie mit der Sichel zusammenhängt, des Schenkels der Spina cruciata des Hinterkopfs bis an den obern Winkel des Felsenbeins. Der innere Rand dieser Falte ist zum Theil frei, scharf und concav. Er umgiebt eine elliptische Oeffnung, durch welche der Anfang des verlängerten Markes hinabgeht. Der vorderste, an der Spitze des Felsenbeins befestigte Theil der Falte geht neben dem Türkensattel noch weiter vorwärts, und überzieht daselbst den freien Rand des kleinen Flügels des Keilbeins.

Der hintere große Theil liegt in der Querspalte, durch welche das große Gehirn vom kleinen getrennt wird, der vordere kleine Theil liegt in der Querspalte, fossa Sylvii, durch welche der vordere Lappen des großen Gehirns vom hinteren geschieden ist.

Das Tentorium dient daher, das große Gehirn zu unterstützen, damit dasselbe das kleine nicht drücke.

Die Schlagadern dieses Theiles der harten Hirnhaut (arteriae meningeae), deren Aeste auf ihrer auswendigen Fläche sich baumförmig vertheilen, und auf der inwendigen Fläche der Hirnschale Furchen bilden, sind an jeder Seite: die Arteria meningea media. Sie ist für den ganzen Theil der harten Hirnhaut, der in der Schläfengegend und am Scheitel liegt, bestimmt und ein Ast der A. maxillaris int. Die unbedeutenden Arteriae meningeae anticae liegen vorn und sind Aeste der A. ophthalmica und der A. ethmoidea. Die gleichfalls sehr kleinen Arteriae meningeae post. dem hinteren Theile bestimmt, sind Aeste der A. occipitalis, der A. vertebralis, oder der A. pharyngea.

Digitized by Google

Die sehr kleinen Arteriae meningeae inferiores, für den mittlern Theil in der Basis, sind Aeste der Carotis cerebralis.

Die Venen der harten Hirnhaut ergießen sich in den Sinus und in die Vena meningea media, welche die Arterie gleiches Namens mit doppelten Zweigen begleitet, und zuweilen durch das Foramen spinosum aus der Schädelhöhle tritt, zuweilen aber sich gleichfalls in einen Sinus öffnet.

Die Venen der harten Hirnhaut s. in der Abbildung eines vortrefflichen injicirten Präparats Walters, des Vaters, bei dess. Schrift von den Krankheiten des Bauchfells und dem Schlagflusse. Taf. 1. 2.

Diese Bluthöhlen, sinus durae matris, sind Behälter, welche zwischen der inwendigen und auswendigen Platte derselben, theils zwischen Fortsetzungen der inwendigen Platte, eingeschlossen werden. Wahrscheinlich sind diese Bluthöhlen in der harten Hirnhaut selbst deswegen angelegt, damit sie nicht leicht ausgedehnt werden und eine Ansammlung des Blutes gestatten oder gar bersten können. Von ihnen ist oben S. 277 sq. die Rede gewesen.

Auch Saugadern sind von Mascagni in der harten Hirnhaut beobachtet worden [1]).

Nerven hat die harte Hirnhaut nicht. Die Nerven des Gehirnes gehen durch sie heraus, ohne ihr Fäden zu geben. Einige haben zwar geglaubt, daß sie Nervenfäden erhalte [2]), diese waren aber wahrscheinlich nur Fäserchen der Tunica arachnoidea oder feine Gefäßchen. Sie ist unempfindlich [3]). F. Arnold glaubt indessen neuerlich wieder Nervenfäden, welche vom 1sten Aste des 5ten Paars entspringen, zur Dura mater verfolgt zu haben.

Theils zwischen den beiden Platten der harten Hirnhaut, theils auf ihrer auswendigen Platte, am obern Theile derselben, meist in der Nähe

---

[1]) Mascagni behauptet, sie gesehen zu haben, wie sie dem Laufe der Blutgefäße folgen, mit ihnen durch das Foramen spinosum herausgehen ꝛc. (Beschreib. der einfang. Gefäße. S. 97. 98. und Prodrome d'un ouvrage sur les vaisseaux lymphatiques c. 2.) und hat sie auch auf der letzten Tafel seines großen Werkes selbst abgebildet.

[2]) *Vieussens* Neurographia, p. 171. *Winslow*, expos. anat. Tête n. 47. *Lieutaud*, essays anatomiques, p. 434. *Laghi* in *Fabri* sulla insensitivita et irritabilita *Halleriana*, opuscoli di vari autori raccolti. Bologna 1757. II. p. 113, 333. *Le Cat*, sur la sensibilité de la dure mère. Berlin 1765. p. 176.

[3]) *Haller*, opp. min. I. p. 345. *Zinn*, exp. p. 45. *Zimmermann*, de irritabilitate p. 6. Arnemann Vers. S. 101.

Phil. Jac. Beyckert, praes. *Jo. Fried. Lobstein*, de nervis durae matris. Arg. 1772. 4.

Henr. Aug. Wrisberg, de quinto pari nervorum encephali et de nervis, qui ex eodem (de quinto pare) duram matrem ingredi falso dicuntur. Goett. 1777. 4. Vide Comment. Vol. I. Gottingae 1800. *Arnold* in *Tiedemann* und *Treviranus* Zeitschrift für Physiologie, B. II. 1827. p. 164, und B. III. p. 151.

Digitized by Google

der Sichel, liegen hie und da kleine Körperchen (glandulae Pacchioni) [1]), an unbestimmten Stellen, von unbestimmter Anzahl, welch von verschiedener Gestalt, meist rundlich, von verschiedener Größe, theil weicher, theils härtlicher, röthlich oder gelbbräunlich sind. Einige der selben liegen dicht zusammen. Die inwendige Fläche der Hirnschale ha Grübchen, in denen sie liegen, so weit sie aus der harten Hirnhaut her ausragen. Andere ähnliche liegen an den Fortsetzungen der inwendige Platte, welche die Sichel ausmachen. Der Nutzen dieser Körperchen i noch unbekannt. Einige haben sie mit Unrecht für Glandulae con globatae gehalten. Bei Kindern fehlen sie.

Die harte Rückenmarkhaut.

Die Pars spinalis der harten Hirnhaut ist eine Fortsetzung de Pars cephalica, die durch das große Loch des Hinterhaupts in sie über geht. Sie umgiebt das Rückenmark, und am untern Theile des Rück grats, wo das Rückenmark aufhört, die daselbst liegenden vielen Rücken marknerven. Wie ein weiter Schlauch liegt sie in dem Canale des Rück grats vom Kopfe bis zu dem untern Theile des heiligen Beins.

Sie hat die Gestalt eines sehr langen Sackes, der von dem vie dünneren Rückenmarke nicht ausgefüllt wird, in der Gegend der Len denwirbel weiter ist, als oberhalb derselben, dann nach unten wieder all mählig enger wird, und am Ende des Canals im heiligen Beine spitzig zuläuft.

Dieser Sack oder Schlauch liegt auch nicht dicht an der inwendigen Fläche des Canales des Rückgrats, wie die Pars cephalica an der in wendigen Fläche der Hirnschale, sondern nur locker, und zwar hinten lockerer als vorn, so daß zwischen ihm und der inwendigen Fläche des Canals ein Zwischenraum ist, den eine wässerig-gallertartige Materie, nach vorn Zellengewebe, am Kreuzbeine Fett ausfüllet. Hier liegen die Ve nen des Rückgrats. Die harte Rückenmarkhaut ist daher auch nicht zu gleich die Beinhaut des Rückgratcanals, wie die Pars cephalica die der Hirnschale, sondern die inwendige Fläche der Wirbelbeine hat ihre be sondere Beinhaut.

Es wird folglich dieser Schlauch, der einen etwas kleineren Durch messer hat als der Rückgratscanal, in diesem letzteren schwebend erhal ten, in dem er großen Theils durch lockeres Zellgewebe anhängt. Nur in der Nähe des großen Hinterhauptlochs ist er etwas fester durch einen

---

[1]) *Ant. Pacchioni*, Ital. Prof. Rom. diss. epistolaris ad *Luc. Schroeckhium* de glandulis conglobatis durae meningis humanae, indeque ortis lymphaticis ad piam matrem productis. Rom. 1705. 8.

Digitized by Google

sehnigen Ring angewachsen. Innerhalb des heiligen Beins hängt er durch einige sehnige Bändchen an der Wirbelsäule fest.

Die inwendige Fläche dieses Schlauchs, welche, wie an der Pars cephalica, glatt und feucht [1]) ist, ist dem Rückenmarke zugewendet, liegt aber nicht so nahe an demselben an, als die Pars cephalica am Gehirne.

Diese Einrichtung ist sehr zweckmäßig, damit das Rückenmark bei den verschiedenen Beugungen des Rückgrats nicht gedrückt werden möge.

An den Stellen, wo die Rückenmarknerven durch die Zwischenwirbellöcher aus dem Canale des Rückgrats heraustreten, begleitet sie dieselbe mit einer canalartigen Verlängerung, welcher sich in dem aus Zellgewebe bestehenden Ueberzuge dieser Nerven allmählig endigt.

Die Blutgefäße der harten Rückenmarkhaut sind Aeste derer, welche zum Rückenmarke selbst gehören und unten angegeben werden.

Was von den Nerven der harten Hirnhaut gesagt worden, gilt auch von diesem Theile der harten Haut.

Die Spinnwebenhaut.

Die Spinnwebenhaut, tunica arachnoidea, oder Schleimhaut, tunica mucosa, [2]) des Gehirns ist eine sehr dichte, aber zugleich eine sehr dünne, zwischen der harten und der weichen Haut gelegene Membran in der Hirnschale und im Rückgrate, welche im Rückgrate bis ins heilige Bein reicht. Sie liegt nämlich auf der inwendigen Seite der harten und auf der auswendigen Fläche der weichen Hirnhaut, und ist von diesen Häuten ganz verschieden. Man unterscheidet einen doppelten Theil derselben; der eine Theil überzieht die innere Oberfläche der harten Haut des Gehirns und des Rückenmarks, giebt derselben die glatte glänzende Oberfläche, ist aber mit dieser sehnigen Haut so fest verwachsen, daß es kein Mittel giebt, sie von ihr zu trennen. Der andere Theil bedeckt die weiche Hirnhaut des Gehirns und des Rückenmarkes. Beide Theile gehen an dem unteren Ende im Kreuzbeine ununterbrochen in einander über. Jeder Gehirn- und Rückgratnerve, ferner auch die Blutgefäße, werden, während sie von der Oberfläche des Gehirns und des Rückenmarkes zur harten Haut hinübergehen, von einer Fortsetzung der Spinnwebenhaut überzogen, so daß diese Theile daselbst in einem Canale desselben liegen. Durch diese canalartigen Fortsetzungen hängt der die

[1]) Wenn die Feuchtigkeit der harten Hirnhaut sich hier anhäuft, so entsteht die Wassersucht des Rückgrats, bei welcher meist die Bogen der Wirbelbeine am untern Theile des Rückgrats, wo sie sich am meisten sammelt, hinten offen sind (spina bifida).

[2]) Den Namen Spinnwebenhaut hat man ihr wegen ihrer Dünnheit gegeben. Da sie aber nicht aus einzelnen Fäden besteht, so ist dieser Name nicht so schicklich, als der Name muköse oder Schleim-Haut des Gehirns und des Rückenmarks.

Digitized by Google

harte Haut und der die weiche Haut überziehende Theil gleichfalls ununterbrochen zusammen. Die Spinnwebenhaut umgiebt folglich einen völlig geschlossenen Zwischenraum. Man kann sich daher die Spinnwebenhaut als einen doppelten Schlauch vorstellen, von welchem der weitere den engeren einschließt, und von welchem der weitere in den engeren an dem Ende beider Schläuche sich umbeugt, und welche außerdem noch durch Canäle, die quer durch den Zwischenraum zwischen beiden Schläuchen liegen, unter einander zusammenhängen. Es verhält sich folglich diese seröse Haut fast so wie die der Sehnenscheiden. (Siehe Th. I. S. 371.) In dem Zwischenraume zwischen beiden Theilen ist ein wenig Feuchtigkeit enthalten. Nach Magendie's Bemerkung befindet sich aber auch zwischen dem Theile dieser Haut, welcher die weiche Rückenmarkhaut sehr locker überzieht, und dieser weichen Haut selbst, eine nicht unbeträchtliche Menge Wasser, sowohl bei lebenden als bei todten Thieren wie auch beim Menschen, die man nicht mit jener Flüssigkeit verwechseln darf. Krankhafter Weise kann sich auch im Schädel eine größere Menge dieses Wassers, und zwar theils zwischen der äußeren und inneren Platte der Spinnwebenhaut, theils in dem Zellgewebe der weichen Hirnhaut unter der Spinnwebenhaut anhäufen. Auf der Oberfläche der Windungen des großen und kleinen Gehirns liegt die Arachnoidea unzertrennlich an der weichen Hirnhaut an; wo aber Vertiefungen zwischen den Windungen sind, tritt sie nicht mit der weichen Hirnhaut in dieselben hinein, sondern geht, wie eine Brücke, über dieselben von einer Windung zur andern hin [1]). Auf der Grundfläche des Gehirns liegt sie lockerer, geht, ohne in die Fossa Sylvii hineinzutreten, von den vorderen zu den hinteren Lappen des großen Gehirns, auch von einer Hälfte des großen Gehirns zur andern, und vom großen Gehirne zum kleinen über. Auch das Rückenmark umgiebt sie, wie schon gesagt, sehr locker.

Darüber, ob die Spinnwebenhaut in die Ventrikeln des Gehirns eindringe und dieselben inwendig überziehe, oder ob nur die weiche Hirnhaut in dieselben gelange, und ob also das in den Höhlen des Gehirns enthaltene Serum in dem Sacke der Spinnwebenhaut liege und von ihr abgesondert werde, oder ob es wie die von Magendie [2]) entdeckte Flüssigkeit in der Wirbelsäule, ein Produkt der weichen Haut (Gefäßhaut) sei, ist noch nicht völlig entschieden. Wenn das erstere der Fall wäre, so müßte es am Eingange in die Höhlen des Gehirns eine Oeffnung geben, durch welche die Höhlen des Gehirns mit dem zwischen der harten und der weichen Hirnhaut befindlichen, von der Spinnwebenhaut ausgekleideten Zwischenraume communicirten. In der That hat Bichat [3]) behauptet, eine in den 3ten Ventrikel führende Querspalte zwischen dem Hirnbalken und der Zirbeldrüse beobachtet zu haben, und auch Savary [4]), Wenzel [5]), J. F. Meckel

[1]) Wenn man eine kleine Oeffnung in dieselbe macht, und Luft einbläset, so erhebt sie sich von der auswendigen Fläche der weichen Hirnhaut.

[2]) *Magendie*, Journal de physiologie exp. 1825. p. 27 — 36.

[3]) *Bichat*, Traité des membranes. p. 186. sq.

[4]) *Savary*, im Dictionnaire des sciences méd. Tome II. p. 264.

[5]) *Wenzel*, de penitiori cerebri structura. Tubingae 1812. Fol.

Digitized by Google

d. j. [1]), und neuerlich van den Bröcke [2]), sind dieser Behauptung beigetreten. In der That bedarf es zur Entscheidung dieser Streitfrage noch einer wiederholten Erörterung. Denn Guyot [3]), und später Martin Saint-Ange [4]), welcher letztere seine Untersuchung speciell auf diese Spalte richtete, fanden keine Spalte. Der letztere behauptet, daß man, wenn man die Hälfte der Basis cranii wegnehme, und dann das Gehirn von unten her zergliedere, sich überzeuge, daß der von Bichat beschriebene Canal nicht existire, sondern daß er bei der gewöhnlichen Zergliederungsweise durch eine Zerreißung entstehe. Ungeachtet sich Wenzels [5]) viel Mühe gegeben haben, so haben sie doch keinen Uebergang dieser Membran in den 3ten Ventrikel finden können. Wäre eine Spalte an der von Bichat angeführten Stelle, so wäre es schwer erklärlich, wie das in den Ventrikeln befindliche Serum im gesunden und kranken Zustande daselbst zurückgehalten werden könne. In der That scheinen auch die Beobachtungen des Cotugno zu beweisen, daß es bei Gesunden nicht daselbst zurückgehalten werde. Cotugno öffnete nämlich die Rückgrathöhle, und schnitt die Dura mater ein. Hierbei floß eine beträchtliche Menge Serum aus, die sich also in dem Sacke der Arachnoidea befunden hatte; hob er nun den Kopf in die Höhe, so floß von neuem eine Menge Flüssigkeit, wie aus einer neuen Quelle. Nach Versuchen, die er an 20 Leichnamen machte, schätzt er die Menge beider Portionen Flüssigkeit im Mittel zusammen 4 bis 5 Unzen. Nach Magendie soll aber auch die zwischen der Spinnwebenhaut und der Gefäßhaut des Rückenmarkes enthaltene Flüssigkeit mit der Flüssigkeit in den Ventrikeln des Gehirns communiciren, was er durch gefärbte Flüssigkeiten darzuthun suchte.

Die Spinnwebenhaut ist sehr dünn und durchsichtig [6]), und scheint unorganisch, ohne Gefäße und Nerven, nur eine dünne Lage von Faserstoff zu sein [7]), welche aus Serum entsteht, das aus aushauchenden Gefäßchen der weichen Hirnhaut abgesetzt wird.

Die weiche Haut, oder die Gefäßhaut des Gehirnes und des Rückenmarkes.

Die weiche Hirnhaut oder eigene Haut des Gehirns, pia mater, s. membrana mollis, s. membrana propria cerebri et medullae spinalis, ist eine dünne weiche Haut, welche das ganze Gehirn sammt dem Rückenmarke überzieht.

Da, wo die Oberfläche des Gehirns und des Rückenmarkes Vertiefungen (sulci cerebri, sulci cerebelli, fossa Sylvii, fissura medullae spinalis anterior et posterior etc.) hat, geht sie nicht, wie

---

[1]) J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. Th. III. S. 553.

[2]) *Jac. Corn. van den Bröcke*, Commentatio de membrana arachnoidea praemio ornata, in Annales academiae Gandaviensis. Gandavi 1823. 4. p. 19.

[3]) *H. Guyot*, Essai sur les vaisseaux sanguins du cerveau, in *Magendie* Journal de physiol. exp. 1829. p. 42.

[4]) *Martin Saint-Ange*, Recherches anatomiques et physiologiques du cerveau et de la moëlle épinière et sur le liquide cérébro-spinal. Journal hebdomadaire de méd. Jan. 1830. p. 97.

[5]) *Wenzel*, a. a. O. p. 87.

[6]) In jungen Körpern ist sie durchsichtiger als in alten. Auch krankhafter Weise kann sie von ihrer Durchsichtigkeit verlieren.

[7]) Sömmerring hat zwar 1778 Saugadern auf einem Kalbsgehirne mit Queckſilber angefüllt; allein er will doch nicht behaupten, daß sie in der Substanz dieser Haut liegen. (Hirnlehre, S. 9.) Mascagni behauptet, Saugadern in dieser Haut angefüllt zu haben. (Beschreib. d. einsaug. Gef. S. 98.)

Digitized by Google

die Arachnoidea, über dieſelben hin, ſondern in dieſelben hinein, ſo daß ſie durchaus auf der Oberfläche des Gehirns, auch auf den vertieften Theilen derſelben, liegt. Auf dieſe Weiſe gelangt ſie ſogar durch die große Querſpalte des Gehirns in das Innere deſſelben, in die Gehirnkammern ꝛc. hinein, und überzieht die inwendige Fläche derſelben, die Erhabenheiten in denſelben, und trägt auch daſelbſt zur Bildung der Aderſtränge (plexus choroidei) bei.

Ihre auswendige Fläche iſt ziemlich glatt, der Arachnoidea zugewandt und, ſo weit ſie nicht vertieft liegt, von derſelben zunächſt bedeckt; wo ſie aber vertieft liegt, ſo wie auch in den Gehirnkammern, von derſelben entfernt.

Ihre inwendige Fläche liegt dicht auf der Gehirnmaſſe, und Aeſte ihrer Blutgefäße dringen daſelbſt allenthalben zahlreich in die Gehirnmaſſe hinein.

Sie hat eine Menge Blutgefäße, mit deren Aeſten und Aeſtchen ſie netzförmig durchzogen iſt; oder vielmehr dieſe Blutgefäße machen mit dem Zellengewebe, das ſie verbindet, die weiche Hirnhaut aus [1]).

Es iſt merkwürdig, daß die Schlagadern und Venen einander in dieſer Haut nicht, wie anderswo, begleiten.

Sie hat auch Saugadern [2]). Nerven aber hat ſie nicht, und iſt daher auch ohne Empfindlichkeit [3]).

Die weiche Rückenmarkhaut, pia mater medullae spinalis, oder mit einem andern Worte, die Gefäßhaut deſſelben, iſt dicker und feſter als die Gefäßhaut des Gehirns. Sie umgiebt das Rückenmark ſo dicht, daß ſie ſich in einem geſpannten Zuſtande befindet, und daher das Mark hervorpreßt, wenn das Rückenmark quer durchſchnitten wird. Ihre äußere Oberfläche iſt glatt, und wird nur locker von der Spinnwebenhaut bedeckt. Ein dickerer vorderer und ein dünnerer hinterer Fortſatz dringen in die vordere und hintere Rückenmarkſpalte. Dieſe ſehr gefäßreiche Haut hängt durch Gefäße und durch kleine häutige, an vielen Stellen in das Rückenmark eindringende Verlängerungen an dem Rückenmarke ſehr feſt. Wenn man das Rückenmark in dünne Scheiben ſchneidet, und das Mark deſſelben durch Uebergießen mit einer Auflöſung von Kali erweicht und auspreßt, ſo bleiben die erwähnten häutigen Fortſätze übrig, welche untereinander zuſammenhängen und den von der Pia mater umſchloſſenen Raum in viele canalartige Räumchen theilen. In dieſen Räumchen lag zuvor das Mark. Die Pia mater erſtreckt ſich

---

[1]) Sömmerring nennt ſie daher Membrana vasculosa, Gefäßhaut.

[2]) *Edm. King*, in phil. transact. n. 189. *Pacchioni*, epist. de gland. dur. mat. p. 116. Mascagni a. a. O. S. 98. Ludwig bei Mascagni a. a. O. S.

[3]) *Haller*, opp. min. I. p. 348. *Castell*, experimenta, Sect. IV.

ücht als einfacher Schlauch bis ins Kreuzbein, sondern so wie sie auch
ber oben den Rückenmarknerven ihre Scheiden giebt, so überzieht sie
uch unter dem 2ten Lendenwirbel, wo das Rückenmark aufhört, nur
ie Nerven. Sie hält die Substanz des Gehirns und Rückenmarkes
ısammen und dient den eindringenden Blutgefäßen zur Grundlage.

Das gezahnte Band, ligamentum denticulatum, ist eine
chmale, längs dem Rückenmark verlaufende, zu beiden Seiten zwischen
en vorderen und hinteren Nervenwurzeln gelegene Falte der weichen Rü-
enmarkhaut, welche meistens zwischen je 2 Nerven des Halses oder des
Rückens durch einen sehnigen Faden seitwärts in dem Zwischenraume
wischen 2 austretenden Nervenpaaren an der Dura mater angeheftet ist,
nd daher daselbst Zacken bildet, deren Zahl nicht ganz bestimmt ist, weil
ier oder da ein solcher Faden und Zacken fehlt. Oben sind die Fäden
ürzer und liegen wie die Nerven mehr quer, nach unten zu werden sie
änger und liegen schief. Der erste Zacken liegt noch über dem Hinter-
auptloche hinter der A. vertebralis, aber vor dem N. accessorius
Willisii. Das Band liegt überhaupt den vorderen Wurzeln etwas nä-
er, als den hinteren.

Uebersehen wir nun die Mittel, welche zum Schutze des Rücken-
arks angewendet sind, mit einem Blicke, so sehen wir, daß es an seiner
berfläche und in seinen 2 Spalten von der weichen Rückenmarkhaut
icht eingeschlossen, mittels derselben durch 2 Reihen Fäden in dem häuti-
en Canale der harten Rückenmarkhaut locker aufgehangen, und daselbst
urch die Umschläge einer serösen Haut, der Spinnwebenhaut, befestigt
t; daß aber der Canal der harten Rückenmarkhaut selbst wieder in dem
Rückgratcanale locker durch Zellgewebe und einzelne sehnige Fäden auf-
ehangen ist, und daß hierdurch sowohl die Beugung der Wirbelsäule,
s ihre Drehung um die Längenare keinen nachtheiligen Einfluß auf
as Rückenmark hat.

Das Rückenmark, medulla spinalis.

Das Rückenmark ist ein walzenförmiger, von hinten nach vorn et-
as plattgedrückter Strang, der beim Erwachsenen vom Hinterhaupt-
che ungefähr bis zur Mitte des 2ten Lendenwirbels reicht, zuweilen
doch etwas kürzer oder auch ein wenig länger ist. Bei sehr kleinen Embryo-
en, z. B. nach Meckel und Tiedemann bei etwa 7wöchentlichen Embryonen,
nd nach meinen eigenen Beobachtungen, an einem im gebogenen Zustande $5^1/_2$ Par.
in. messenden, und also etwa 6 Linien langen Embryo, reicht er bis ans Ende

Digitized by Google

des Kreuzbeins, und vielleicht sogar bis auf das Schwanzbein, welches in dem von mir beobachteten Falle nach Art eines Schwänzchens umgebogen war; beim Neugebornen erstreckt es sich bis in den 3ten Lendenwirbel. Den übrigen Theil des Canals der Wirbelsäule und der harten Rückenmarkhaut erfüllen die sehr langen Nervenwurzeln, die man zusammen cauda equina, Roßschweif, nennt.

Die merkwürdige Erscheinung, daß sich das Rückenmark allmählig beim Wachsthum gegen das Gehirn zu etwas zurückzieht, ist, wie Meckel [1]) bemerkt, dem Menschen eigenthümlich. Nach ihm reicht es ungefähr zur Zeit der 14ten Woche bis an den 2ten Kreuzwirbel. Nach Tiedemann [2] reicht es um die 27ste Woche bis ans Ende der Lendenwirbel, und um die 36ste Woche bis zu dem 3ten Lendenwirbel. Diese Verkürzung geschieht dadurch, daß die Wirbelsäule und die in dem Rückgratcanale gelegenen Nervenwurzeln schneller wachsen als das Rückenmark, denn anfangs fehlt die cauda equina, und das entsteht und vergrößert sich, während das Rückenmark verhältnißmäßig kurz wird. Bei Thieren mit kurzem Schwanze reicht, nach Serres, das Rückenmark auch weniger weit im Canale der Wirbelsäule herab, als bei Thieren mit langem Schwanze.

Dieser Strang des Rückenmarks hat an den 2 Stellen, wo die dicksten Nerven entspringen (die Nerven der Arme und Füße), eine Anschwellung; die eine ist im Nacken, die andere an der Vereinigungsstelle von Brust und Lendenwirbeln gelegen. Bei sehr kleinen Embryonen, bei welchen die Gliedmaßen noch nicht entwickelt, oder noch sehr klein sind, fehlen diese Anschwellungen, oder sie sind unmerklicher, und bei Thieren, denen, wie den Schlangen, die Gliedmaßen fehlen, sind das ganze Leben hindurch keine solche Anschwellungen vorhanden. Wo die Gliedmaßen klein sind, sind sie weniger merklich. Bei Amphibien mit 2 Gliedmaßen ist nur eine solche Anschwellung vorhanden, bei mißgebildeten menschlichen Embryonen, denen die Bauchglieder fehlen, gleichfalls nur eine. Am auffallendsten ist, nach Serres [3]), die Veränderung der Gestalt des Rückenmarks gleichzeitig mit dem Wachsthume der Gliedmaßen an den Froschlarven zu bemerken.

Das Rückenmark läuft unten in eine Spitze aus, an der Hall und Sömmerring eine bis 2 kleine Anschwellungen bemerkten, die indessen oft nicht deutlich sind. Gall glaubte bemerkt zu haben, daß die Umrisse des Rückenmarks wellenförmig gebogen wären, und daß das Rückenmark an der Ursprungsstelle jedes Nerven eine kleine, kaum merkliche Anschwellung bilde.

Von der Spitze des Rückenmarks geht zum Ende des Kreuzbeins und zum Schwanzbeine ein Faden, der nach Bock längere Zeit mit dem letzten sehr dünnen Nervenpaare begleitet wird, nach Burdach soll er etwas Nervenmark enthalten soll, der aber nach der meisten Anato-

---

[1]) *J. F. Meckel d. j.*, Versuch einer Entwickelungsgeschichte der Centraltheile des Nervensystems in den Säugethieren, im Archive für die Physiol. 1815. p. 78. u. 92.

[2]) *Fr. Tiedemann*, Anatomie und Bildungsgeschichte des Gehirns im Foetus des Menschen, nebst einer vergleichenden Darstellung des Hirnbaues in den Thieren. Mit 7 Tafeln. Nürnberg, 1816. 4. p. 49, 91.

[3]) *Serres*, Anatomie comparative du cerveau. Paris 1821. 8.

Digitized by Google

Untersuchungen, unter welchen ich auch Rudolphi nenne, nur häufig ist.

Zwei tiefe, in der mittleren Ebene des Körpers liegende Spalten, eine hintere und eine vordere, gehen in das Rückenmark hinein, und nehmen einen Fortsatz der weichen Rückenmarkhaut auf. Sie stoßen fast zusammen. Die vordere ist an den meisten Stellen weiter, und deswegen leichter zu finden. Die hintere ist enger, aber tiefer, und läßt sich sehr gut an einem etwas erhärteten Rückenmarke wahrnehmen. Unter den neuen Beobachtungen stimmen die von Gall, Bellingeri, Rolando und meine eigenen Beobachtungen über die Existenz dieser 2 Spalten vollkommen überein. Sie würden das Rückenmark in 2 gleiche, von einander abgesonderte Seitenhälften theilen, wären nicht diese Seitenhälften auf dem Boden der vorderen Spalte durch eine Lage weißer, auf dem der hinteren durch eine Lage grauer Substanz vereinigt. Diese beiden Lagen kann man die weiße und die graue Commissur des Rückenmarks nennen. Sie verdienen die Aufmerksamkeit der Anatomen in vorzüglichem Grade, weil sie die beiden Hälften des Rückenmarks zu einem Ganzen machen. Sie sind aber noch nicht genau genug untersucht. Nach Vicq d'Azyr, Cuvier, Sömmerring und Gall [1]) laufen die Fasern der vorderen Commissur quer, und verbinden dadurch die Seitentheile, deren Fasern ganz an den Seitenwänden der Spalte der Länge nach gehen. Gall läugnet, daß sich diese queren Fasern einander durchkreuzen, was die genannten Schriftsteller behauptet hatten. An der Oberfläche, welche die Seitentheile in der hinteren Spalte einander zukehren, laufen die Fasern der Quere, aber nicht in der daselbst befindlichen Commissur. Diese Commissur besteht nach Bellingeri und Rolando nur aus grauer Substanz.

Außer den 2 beschriebenen Spalten giebt es keine, in welche von außen ein sichtbarer Fortsatz der weichen Rückenmarkhaut hineinginge. Wohl aber theilt sich das in Weingeist erhärtete, von seiner weichen Haut entblößte Rückenmark noch an mehreren Stellen vorzüglich leicht, und hat auch an mehreren Stellen, vorzüglich am verlängerten Marke, der Länge nach gehende vertiefte Linien.

Das Rückenmark besteht aus einer äußeren weißen und aus einer inneren grauen Lage. Beide Lagen liegen nicht concentrisch. Wenn man, wie Bellingeri, das in sehr verdünnter Salpetersäure, oder, wie in einer Auflösung von salzsaurem Kalke und Weingeist etwas erhärtete Rückenmark des Menschen und der Thiere in Scheiben schneidet, so sieht die inwendig liegende graue Substanz auf dem Querschnitte an

---

[1]) *J. F. Gall* und *K. Spurzheim*, Anatomie und Physiologie des Nervensystems im Allgemeinen und des Gehirns insbesondere. Paris 1810. T. I. p. 119.

Digitized by Google

den meiſten Stellen ungefähr die Figur von zwei Hörnern, die durch einen Querſtrich (die graue Commiſſur) untereinander verbunden ſind (die eine ſenkrechte Lücke, die nicht ganz bis an den Querſtrich geht, ſtellt die vordere Rückenmarkſpalte, die 2te ſenkrechte Linie, die ganz bis an den Querſtrich geht, die hintere Rückenmarksſpalte vor). Doch iſt die Form nicht überall dieſelbe. An einigen Stellen nähern ſich die beiden Mondviertel ſo ſehr, daß ſie einem ähnlich werden, an ſehr vielen Stellen iſt die Figur ungefähr ſo geſtaltet, daß der Querſtrich nahe an den vorderen Hörnern der Mondviertel liegt. Mit einem Worte, die graue Subſtanz an jeder Hälfte des Rückenmarks hat 2 Hörner, ein vorderes und ein hinteres, die unter einander durch die graue Commiſſur verbunden werden. An den meiſten Stellen ſind die vorderen Hörner kürzer, aber dicker als die hinteren, und zuweilen ſogar zweigeſpalten. Jeder Lappen der grauen Subſtanz kommt derjenigen Stelle der äußeren Oberfläche des Rückenmarks vorzüglich nahe, wo die vorderen und hinteren Wurzeln der Rückenmarknerven entſpringen. Dieſe Stelle liegt vorn der Rückenmarkſpalte näher als hinten, und die Rückenmarkwurzeln treten auch vorn näher an der Spalte aus dem Rückenmarke hervor, als hinten. Es gelingt zuweilen, wie ich ſelbſt bezeugen kann, die Spuren der Nervenwurzeln bis zur grauen Subſtanz zu verfolgen. Rolando [1]) und Bellingeri [2]) haben über die Geſtalt, die die graue Subſtanz an verſchiedenen Stellen des Rückenmarks der Menſchen und der Thiere hat, ſehr ſpecielle Unterſuchungen angeſtellt, und die auf den vielen gemachten Querſchnitten befindliche Figur abbilden laſſen.

Am oberen Theile des Halſes liegt dicht neben der hinteren Rückenmarkſpalte auf jeder Seite ein ſchmales Bündel, welches ſich durch ſeine ſehr weiße Farbe und Erhabenheit auszeichnet, und durch eine Furche begränzt wird. Es begleitet dieſe Spalte ein Stück abwärts, wird aber dann ſchwerer unterſcheidbar, und verſchwindet endlich ganz. Es iſt aber nicht durch eine ſo deutliche Spalte, in welche ein Fortſatz der weichen Rückenmarkhaut dränge, von dem Seitentheile des Rückenmarks geſchieden. Rolando nennt dieſe ſchmalen Bündel die hinteren Pyramiden des Rückenmarks. Er läugnet, daß es vorn neben der vorderen Spalte auch 2 ſolche Bündel und 2 Furchen gebe, was früher Chauſſier und

[1]) *L. Rolando*, Ricerche anatomiche sulla struttura del midollo spinale con figure. Art. tratto dal Dizionario periodico di Medicina. Torino 1824. 8. p. 55.

[2]) *C. F. Bellingeri*, De medulla spinali nervisque ex ea prodeuntibus. Augusta Taurinorum 1823. 4. p. 6.

Digitized by Google

neuerlich Burdach behauptet haben. Sömmerring glaubte zu beiden Seiten des Rückenmarks, zwischen den vorderen und hinteren Wurzeln der Nerven, eine der Länge nach laufende Spalte gesehen zu haben. Allein sie ist, wie Gall und Chaussier gezeigt haben, nicht wirklich vorhanden. Ein Eindruck, von welchem das Ligamentum denticulatum anfängt, veranlaßt nur diesen Schein.

Man sieht leicht ein, daß, wenn man die am meisten vorspringenden Spitzen der 2 halbmondförmigen Lappen der grauen Substanz des Rückenmarks als die Gränzen gewisser Hauptabtheilungen der weißen Substanz, welche die graue Substanz umgiebt, ansehen will, man 6 weiße Abtheilungen am Rückenmarke unterscheiden könne, 2 kleine vordere zwischen der vorderen Rückenmarkspalte und den Hörnern der Halbmonde, 2 hintere, zwischen der hinteren Rückenmarkspalte und den Hörnern der Halbmonde, und endlich 2 größte mittlere Abtheilungen zwischen den genannten Bündeln an der Seite des Rückenmarks, am concaven Rande der Halbmonde gelegenen. In der That kommt hiermit auch die Eintheilung des Rückenmarks, welche Bellingeri gegeben hat, ziemlich überein. Er hat auch Spalten gezeichnet, welche oft auf diese hervorspringendsten Spitzen der grauen Substanz gerichtet wären, die ich aber nicht gefunden habe. Burdach rechnet zu diesen 6 Bündeln noch die erwähnten 2 sehr kleinen Bündel an der hinteren, und 2 andere sehr kleine an der vorderen Rückenmarkspalte hinzu.

Rolando unterscheidet am oberen Theile des Rückenmarks 2 vordere Bündel, 2 hintere Bündel, und an diesen dicht an der hinteren Rückenmarkspalte 2 kleine pyramidale Bündel.

Diejenigen, welche angenommen haben, daß die 4 Reihen von Nervenwurzeln auf der Mitte einer Abtheilung des Rückenmarks entspringen, zählen natürlich 4 Abtheilungen des Rückenmarkes. Indessen hat diese Meinung wenig für sich, denn am verlängerten Marke kommen die entspringenden Nerven nicht aus der Mitte der daselbst unterscheidbaren 6 Bündel, sondern an den Furchen hervor, welche dieselben trennen.

Zwischen der grauen und der weißen Commissur des Rückenmarks befindet sich bei dem menschlichen Embryo ein Canal, der nicht selten auch bei Erwachsenen noch angetroffen wird, und den ich an den Durchschnitten des erhärteten Rückenmarks wiederholt deutlich gesehen habe. Carus [1]) fand ihn bei Neugebornen deutlich, und bei Embryonen ist er desto größer, je jünger sie sind. Bei den Säugethieren, nach Meckel [2]), und bei allen andern Classen der Wirbelthiere, nach Carus, fin-

[1]) *C. G. Carus*, Versuch einer Darstellung des Nervensystems und insbesondere des Gehirns etc. Leipzig 1814. 4. p. 129.
[2]) *J. F. Meckel d. j.*, Archiv d. Physiol. B. I. p. 336.

det er sich das ganze Leben hindurch. Er ist für das Rückenmark unstreitig dasselbe, was die Ventrikel für das Gehirn sind [1]). In der That erweitert er sich auch bei den Vögeln in der unteren Anschwellung des Rückenmarks in einen ziemlich ansehnlichen, mit Wasser gefüllten Ventrikel. Daß er sich beim Menschen mit dem Wachsthume so sehr verengt und bei Erwachsenen meistens unsichtbar wird, ist eine Erscheinung, die außer dem Menschen vielleicht nur noch dem Affen zukommt [2]).

Das Rückenmark ist frühzeitig bei den Embryonen schon sehr dick, und unterscheidet sich bei den kleinen Embryonen, wie man sie im bebrüteten Ei beobachten kann, nur wenig von dem Gehirne. Nach J. F. Meckel [3]) und Tiedemann [4]) besteht das Rückenmark bei sehr kleinen menschlichen Embryonen aus 2 rinnenförmig gebogenen langen Markstreifen, welche vorn schwach, hinten vielleicht gar nicht unter einander zusammenhängen. Diese vom Rückenmarke gebildete lange, mit Flüssigkeit gefüllte Rinne, wird dadurch zu einem geschlossenen Canale, daß die Haut, welche sie umgiebt, die Oeffnung an ihrer hinteren Seite verschließt. So lange die graue Substanz im Centro des Rückenmarks noch nicht sehr ausgebildet ist, sondern das Rückenmark auf seinem Querschnitte wie eine gebogene Markplatte erscheint, giebt es noch keine vordere und hintere Rückenmarkspalte. Die vordere Rückenmarkspalte, welche das ganze Leben hindurch die weitere ist, entsteht früher als die hintere, wie es scheint durch eine Art von Einbeugung jener Lamelle nach innen.

Was den inneren Bau der Markwände des Rückenmarks betrifft, so ist es gewiß, daß die weiße Substanz großentheils aus unter einander verflochtenen, der Länge nach laufenden Fasern besteht, zwischen welche hier und da häutige Verlängerungen der weichen Rückenmarkhaut hineingehen. An einigen Stellen an der weißen Commissur und an den Wänden der hinteren Rückenmarkspalte finden sich auch Querfasern. Alle diese Fasern sind nicht in continuirlichen häutigen Scheiden eingeschlossen, und weil sie sehr weich sind, so kann man sich am besten von

---

[1]) Die Geschichte der Entdeckung dieses Canals haben Gall, Carus und Almas gegeben. Er wurde zuerst von C. Stephanus (de dissectione partium, Lib. III. p. 337.) beim Erwachsenen gefunden, und von Columbus, Piccolomini, Bauhinus, Malpighi, Morgagni und Portal bestätigt. Burdach sahe ihn wiederholt im Leichname der Erwachsenen in den Hals- und oberen Brustwirbeln. Gall behauptete, es wäre ein doppelter Canal vorhanden, was durch die Beobachtungen Anderer nicht bestätigt wird.

[2]) *F. Tiedemann*, Icones cerebri simiarum et quorundam animalium rariorum. Heidelbergae 1821. Fol. c. tab. aen. p. 9. *F. Almas*, de evolutione et vita encephali. Pestini 1823. 8. §. 20. p. 36.

[3]) *J. F. Meckel*, a. a. O. 35. sq 43. sq. 341.

[4]) *F. Tiedemann*, a. a. O. 12. 17.

Digitized by Google

ihrer Lage am Rückenmarke überzeugen, das durch Weingeist, oder durch eine Auflösung von salzsaurem wasserfreien Kalke in Weingeist erhärtet ist. Hiermit stimmen auch Keuffels unter Reils Leitung gemachte Beobachtungen überein, und Olliviers Schlüsse, daß es keine Längenfasern geben könne, weil die ins Rückenmark eindringenden häutigen Fortsätze der weichen Hirnhaut keine Scheiden für die Fasern, sondern ein Netzwerk bilden, reichen nicht hin, die Existenz der Längenfasern zweifelhaft zu machen, die ich am erhärteten Rückenmarke oft genug deutlich gesehen und abgezogen habe.

Rachetti [1]) und Rolando [2]) haben aber noch auf eine besondere Einrichtung, die unsere Beachtung verdient, aufmerksam gemacht. Rachetti bemerkte nämlich, daß die weiße Substanz durch graue, vom grauen Centrum nach außen gehende Linien in Lamellen getheilt werde. Rolando bemerkte dieses auch, und sahe, daß, wenn man das Rückenmark auf eine gewisse Weise vorbereite, die Marksubstanz desselben (vorzüglich deutlich die vordere) aus einer gefalteten Markhaut bestünde, deren umgeschlagene Ränder abwechselnd an dem Centrum und an der Peripherie lägen und die längs des Rückenmarks verliefen. Zwischen die Platten dieser Falten treten von außen dünne Fortsätze der Pia mater, von innen dünne Lagen der grauen Substanz. Die weiße vordere Commissur bestünde nur aus der von der einen Seite zur andern sich fortsetzenden Markhaut. In der hinteren Spalte finde kein solcher Uebergang der Markhaut von der einen Seite zur andern Statt, und die Markhaut sei daher als ein gefaltetes Blatt zu betrachten, dessen Ränder nach hinten umgerollt wären. Er zeigte diesen Bau auf dem mit einem scharfen Rasirmesser gemachten Querschnitte eines Stücks Rückenmark, das er lange Zeit hatte in einer Salzauflösung liegen, und dann 15 bis 20 Tage in Wasser maceriren lassen. Diese Beobachtungen, welche auch, um den Bau sowohl des Rückenmarks als des Gehirns aufzuklären, sehr wichtig sein würden, bedürfen jedoch noch sehr der Bestätigung.

Bei einem neugebornen Kinde, dessen Rückenmark ich in frischem Zustande in viele Lamellen zerschnitt, fand ich, daß sich die hinteren weißen Bündel durch ihre weiße Farbe und Festigkeit sehr vor allen andern Theilen des Rückenmarks auszeichneten. Die mittlere graue Substanz nahm einen sehr großen Umfang ein, und ging an der Stelle, wo Bellingeri die hintere Seitenspalte annimmt, meistens bis an die Oberfläche. Die übrige Substanz war in der Nähe der Oberfläche grau, und nur da, wo sie an die mittlere graue Substanz gränzte, weiß. Daher sah man hier eine weiße, zwischen der mittleren und der an der Oberfläche gelegenen grauen Substanz laufende Linie, deren Fortsetzung die vordere Commissur bildete. An dem hinteren sehr weißen Bündel unterschied man dicht neben der Mittelspalte die 2 kleinen eben so weißen Bündel, die man mit Rolando hintere Pyramiden nennen kann. An einigen Stellen glaubte ich zu bemerken, daß die Substanz, welche später den vorderen Theil des Rückenmarks bildet, und

---

[1]) *Rachetti*, Della struttura, delle funzioni e delle malattie della midolla spinale. Milano 1816. 8. p. 156.

[2]) *Rolando*, Ricerche anatomiche sulla struttura del midollo spinale, con figure. Torino 1824. 8. p. 64. sq. Tav. III.

Digitized by Google

die hier noch grau war, aus Falten bestand, die von der Oberfläche nach der Peripherie zugekehrt waren.

Ursprung der Rückenmarknerven.

Vom Rückenmarke entspringen 30 bis 31 Nervenpaare, nämlich 8 Halsnervenpaare, nervi cervicales, wovon das 1ste zwischen dem Hinterhaupte und dem 1sten Halswirbel, das 8te zwischen dem 7ten Halswirbel und dem 1sten Rückenwirbel hervortritt, 12 Rückennervenpaare, nervi dorsales, von denen das 12te zwischen dem 12ten Brustwirbel und dem 1sten Lendenwirbel, 5 Lendennerven, nervi lumbales, von denen das letzte zwischen dem 5ten Lendenwirbel und dem 1sten Kreuzwirbel, und 5 Kreuznerven und 1 Schwanzbeinnerv, nervi sacrales et coccygeus, von denen die 2 letzten durch die Oeffnung des Wirbelcanals zwischen dem Kreuz- und Schwanzbeine hervortreten. Alle Rückenmarknerven, mit Ausnahme des letzten oder der 2 letzten, und zuweilen des 1sten, entspringen mit 2 Wurzeln, einer vorderen und einer hinteren, von der vorderen und hinteren Hälfte des Rückenmarks, während die Gehirnnerven nicht mit 2 von entgegengesetzten Seiten entspringenden Wurzeln ihren Anfang nehmen. Am unteren Ende des Rückenmarks entspringen die Rückenmarknerven so dicht an einander, daß gar keine Zwischenräume zwischen ihren Wurzeln bemerklich sind, in den mittleren Rückenwirbeln sind die Zwischenräume zwischen den Nervenpaaren am größten. Ganz oben gehen sie mehr quer zu ihren Intervertebrallöchern; je mehr sie nach abwärts liegen, einen desto spitzigeren Winkel bilden sie mit dem Rückenmarke, und desto länger verlaufen sie im Rückgratcanale und im Sacke der Dura mater, ehe sich ihre Wurzeln vereinigen. Kein einziger Rückenmarknerv hat, wie das bei vielen Gehirnnerven der Fall ist, eine Richtung nach vorn und oben. Alle Rückenmarknerven, welche mit hinteren und vorderen Wurzeln entspringen, haben an ihrer hinteren Wurzel einen länglichen, harten, grauen Spinalknoten, ganglion spinale, der bei den meisten Nerven im Ausgange derselben durch die Intervertebrallöcher liegt. Nur bei den Kreuznerven liegt er noch innerhalb des Wirbelcanals, bei allen aber befindet er sich in einer canalförmigen Verlängerung der Dura mater. Die vordere Wurzel läuft in einer Rinne des Knoten hin, ist an ihn angeheftet, vermischt sich aber, wie Haase und Prochaska zuerst bewiesen haben, erst am äußeren Ende desselben mit dessen Fäden; von hier an erhält auch der Nerv erst eine äußere dicht anliegende Scheide, die theils eine Fortsetzung der fibrösen Dura mater, theils von zelliger Beschaffenheit ist, dahingegen die einzelnen Fäden ihr Neurilem schon an der Oberfläche des Rückenmarks von der Pia mater bekommen. Die Ganglia

Digitized by Google

spinalia der dickeren Nerven, die zu den Brust- und Bauchgliedern gelangen, sind größer als die der dünnern. An den mit einfachen Wurzeln entspringenden Nerven sind sie nicht deutlich, oder fehlen ganz. Die Zahl der Bündel der Wurzeln ist auf beiden Seiten und bei verschiedenen Menschen nicht dieselbe. Die hinteren Wurzeln kommen auch ziemlich in einer Linie aus dem Rückenmarke hervor. Bellingeri glaubt sie auf den Querschnitten des Rückenmarks, das er in verdünnter Salpetersäure erhärten ließ, bis an die hinteren Hörner der grauen Substanz verfolgt zu haben. Die vorderen Wurzeln haben dünne Fäden, die nicht so in einer Linie liegen, sondern bald mehr nach vorn und bald mehr nach hinten hervorkommen. Unter der Pia mater spalten sich alle Wurzeln in sehr feine Fäden. Auf dem Querschnitte des Rückenmarks sieht man hier und da weiße Linien, welche eine solche Richtung nach der Are haben, als wären sie die in das Innere eindringenden Wurzeln. Jede Wurzel nähert sich nach und nach der andern, doch geht jede durch eine besondere Oeffnung der harten Rückenmarkhaut heraus. Die hinteren Wurzeln haben, wie Willis und neuerlich Rachetti bemerkt, und Gall sehr schön abbildet, an der Hals- und Lendenanschwellung dickere Fäden, und entspringen ebendaselbst entfernter von der Mittelspalte, als die vorderen Wurzeln.

Bellingeri behauptet, die hinteren (mit Ganglien versehenen) Wurzeln der Rückenmarknerven hätten einen dreifachen Ursprung, 1) von den hinteren Hörnern der grauen Substanz, 2) von der weißen Substanz der hinteren Bündel (diese wären nicht so groß), 3) von den Seitenbündeln des Rückenmarks (diese wären meistens sehr voluminös, und trügen allein nur zur Bildung der Spinalganglien bei).

Die vorderen Wurzeln hätten auch einen dreifachen Ursprung: 1) von den vorderen Bündeln, 2) von den Seiteneinschnitten, 3) von den Seitenbündeln des Rückenmarks. Es sei zweifelhaft, ob sie zur grauen Substanz dringen. Diese Symmetrie des dreifachen Ursprungs der vorderen und hinteren Wurzeln hat aber nicht viel für sich, denn die hinteren Wurzeln kommen, wie schon bemerkt worden, mehr in einer Reihe aus dem Rückenmarke hervor, und unterhalb der Pia mater ist die Verfolgung der Wurzeln äußerst schwer. Rolando glaubt zwar auch, daß die Wurzeln in die Tiefe dringen, aber zwischen den Falten, welche das weiße Markblatt macht, aus welchem nach ihm die weiße Substanz des Rückenmarks besteht. Daher glaubt er auch nicht, daß die Wurzeln bis zur grauen Substanz drängen.

Das Gehirn, cerebrum.

Das Gehirn läßt sich, nach dem Ansehen seiner Oberfläche, in 3 Abtheilungen theilen:

1) in das große Gehirn, cerebrum, das sich durch gewundene, ½ bis über einen ganzen Zoll tiefe Furchen auszeichnet, zwischen welchen breite, darmähnlich gewundene Windungen, gyri, liegen, die an beiden Hälften des Gehirns und bei verschiedenen Menschen nicht dieselben sind. Die ganze Oberfläche desselben ist mit einer 1 Linie bis 1½ Linien dicken Lage grauer Substanz, substantia corticalis, überzogen;

Digitized by Google

2) in das kleine Gehirn, cerebellum, das durch viele tiefe quere Einſchnitte in Lappen getheilt wird, die ſelbſt wieder durch weniger tiefe Einſchnitte in eine Menge ſchmaler, querer, ziemlich paralleler Windungen getheilt werden. Auch die Oberfläche des kleinen Gehirns wird von einer ½ bis ¾ Linie dicken Lage grauer Subſtanz überzogen. Bei dem großen und kleinen Gehirne ſcheinen dieſe Furchen und Windungen dazu zu dienen, eine recht große Oberfläche zu bilden, an welcher ſich recht viele Faſern der weißen Subſtanz des Gehirns endigen, und in der ſich die Blutgefäße der Pia mater vertheilen können. Das kleine Gehirn liegt unter dem hinteren Theile des großen Gehirns, mit dem es durch die Vierhügel in Verbindung ſteht;

3) in den Verbindungstheil, durch den das Rückenmark mit dem großen und kleinen Gehirne, und dieſe beiden unter ſich vereinigt werden, und von welchem faſt alle Gehirnnerven entſpringen. Er hat keine Windungen, und beſteht theils aus weißen Faſern, theils aus eingeſtreueter grauer Subſtanz. Auch ſchließt er in ſeiner Subſtanz keine Höhle ein.

Das ganze Gehirn iſt ein Oval, das vorn etwas ſchmäler als hinten, beträchtlich weniger hoch als breit, und alſo von unten nach aufwärts zuſammengedrückt iſt. Eine an manchen Stellen faſt 2 Zoll tiefe obere Spalte theilt das große Gehirn von obenher und von vorn, das kleine von hintenher und von unten in 2 Seitenhälften, zwiſchen welchen die ſenkrechte Falte der harten Hirnhaut, falx cerebri und falx cerebelli aufgenommen wird. Eine noch viel breitere, horizontale, vom tentorium cerebelli ausgefüllte Spalte, die ſich hinten und unten mit der vorigen kreuzt, trennt das große Gehirn vom kleinen. Das große Gehirn iſt an ſeiner unteren und auf ſeiner äußeren Seite ſelbſt durch einen queren Einſchnitt, der ſich in die Furchen zwiſchen den Windungen fortſetzt (fossa Sylvii), in einen vorderen und in einen großen hinteren Lappen getheilt. Oben ſind beide Lappen vollkommen untereinander verſchmolzen.

Die untere Oberfläche des Gehirns paßt in die auf der Grundfläche des Schädels befindlichen Erhabenheiten und Vertiefungen, und die am höchſten gelegene Schädelgrube nimmt den vorderen Lappen des großen Gehirns auf, der am wenigſten nach unten hervorragt, die tiefen Seitentheile der mittleren Schädelgrube nehmen das ſehr weit herabragende vordere Ende des hinteren Hirnlappens jeder Seite auf, und der vom kleinen Flügel gebildete ſcharfe Vorſprung, der noch durch eine Falte der Dura mater vergrößert wird, die eine Fortſetzung des Tentorium cerebelli iſt, legt ſich in die erwähnte Querfläche, fossa Sylvii, zwiſchen dieſe 2 Hirnlappen hinein. Das kleine Gehirn liegt in

Digitized by Google

der hinteren Schädelgrube unter dem Tentorium verborgen, vor ihm steigt aus dem Hinterhauptloche an dem Mittelstücke des unpaaren Os basilare der unpaare Verbindungstheil herauf und erstreckt sich bis auf den Türkensattel hinauf.

Das Gehirn von oben angesehen. Man sieht in dieser Stellung von dem kleinen Gehirne gar nichts, denn es wird bei dem Menschen von dem hinteren Theile des großen Gehirns ganz bedeckt, und ragt hinten gar nicht hervor. Eine tiefe Längenfurche, in welche der sichelförmige Fortsatz der harten Hirnhaut tritt, theilt das Oval in 2 ziemlich gleich große Hälften, die man, so weit sie zu dem großen Gehirne gehören, Halbkugeln, hemisphaerium dextrum und sinistrum nennt. Die Furchen, die an manchen Stellen fast einen Zoll tief sind, und die zwischen 2 Furchen gelegenen ½ bis ½ Zoll breiten Wülste oder Windungen, gyri, haben an dieser äußeren Oberfläche einige Aehnlichkeit mit den Falten eines gefalteten Tuchs. Sie sind keineswegs auf den beiden Hälften symmetrisch. Die Abweichungen in der Gestalt und Zahl dieser Furchen von der Symmetrie sind, nach Wenzel, bei dem Menschen viel größer als bei den Thieren.

Beugt man die 2 Hälften des großen Gehirns auseinander, so sieht man in der Tiefe der Furche eine sehr breite und weiße Markbinde, corpus callosum, quer aus der einen Hälfte in die andere gehen. Sie nimmt bei weitem nicht die ganze Länge der Furche, sondern nur etwa die Hälfte derselben ein, und liegt auch nicht genau in der Mitte, sondern etwas mehr nach vorn als nach hinten. Ihre obere Oberfläche ist gewölbt, zeigt viele Querstreifen wegen des queren Verlaufs der Markfasern, und einen in der Mittellinie gelegenen Längenstreifen. Hinten hört die Binde mit einem dicken freien Rande auf, unter welchem man in die Hirnhöhlen eindringen kann; vorn beugt sie sich knieförmig nach abwärts, läßt keine Oeffnung übrig, durch die man in die Hirnhöhlen eindringen könnte, sondern setzt sich mit einer grauen Platte in Verbindung, welche auf der Grundfläche des Gehirns beide Seitenhälften des Gehirns unter einander vereinigt. An der Stelle, wo diese Markbinde aus den 2 Hemisphären hervorkömmt, hören die Windungen und Furchen auf. Denn es befindet sich dicht über der Binde eine Spalte, in welcher die graue Substanz der Windungen an die weiße innere Substanz des Gehirns grenzt.

Das Gehirn von seiner äußeren Seite angesehen. Man sieht, daß der Umriß der uns zugewendeten Hälfte des großen Gehirns ungefähr die Gestalt eines halben Ovals hat, und daß unter dem hinteren Theile desselben das kleine Gehirn liegt, welches durch die tiefe Querfurche, die das Tentorium cerebelli aufnimmt, von dem großen Gehirne getrennt ist, sich durch seine schmalen, nicht so gewundenen Furchen und Wülste sehr von dem großen Gehirne unterscheidet, und daß es von hier aus gesehen sehr niedrig erscheint, so daß sein Umkreis etwa nur ⅓ oder ⅛ oder nicht einmal so viel von dem hier sichtbaren Umkreise des großen Gehirns ausmacht. Vorn und unten bemerkt man am großen Gehirne einen Einschnitt, die fossa Sylvii, welcher von der Grundfläche aus schief nach hinten und oben emporsteigt, und den sehr hochliegenden und kleinen vorderen Hirnlappen von dem tiefer herabreichenden und größeren hinteren Hirnlappen scheidet. Die Seite des hinteren Hirnlappens, welche über dem kleinen Gehirne liegt, ist concav. Das vordere Ende dieses Lappens ragt etwas nach unten hervor, weniger das hintere Ende. Vor dem kleinen Gehirne steigt der Verbindungstheil fast senkrecht gegen die Mitte des großen Gehirns empor.

Das Gehirn von unten angesehen. Es stellen sich uns hier 3 Paar Erhabenheiten dar, nämlich die durch die mittlere Längenspalte getrennten vorderen Hirnlappen, welche am wenigsten hervorragen, ferner die stärker hervorragenden und weiter von einander abstehenden vorderen Spitzen der hinteren Hirnlappen (welche von manchen Anatomen mittlere Hirnlappen genannt werden), endlich die am allermeisten hervorragenden, näher an einander liegenden Seitenhälften des kleinen Gehirns, welche hinten und unten durch eine tiefe Furche von einander geschieden sind. In der zwischen diesen Erhabenheiten übrig bleibenden vertieften Stelle, welche zwischen den genannten mittleren Erhabenheiten am breitesten und tiefsten ist, liegt der Verbindungstheil, welcher das Rückenmark mit dem kleinen und großen Gehirne in Verbindung setzt, namentlich unten das verlängerte Mark, über ihm und

Digitized by Google

vor ihm die Brücke, vor ihr und über ihr die 2 auseinander weichenden, durch eine Furche geschiedenen, durch graue Substanz vereinigten Hirnschenkel, vor ihnen endlich der die beiden Halbkugeln des großen Gehirns unter einander vereinigende graue Hügel mit den 2 Markkügelchen, dem Trichter, dem Hirnanhange, der Vereinigung der Sehnerven und der vor der Vereinigung der Sehnerven gelegenen, zum Balken übergehenden grauen Platte.

Hebt man das kleine Gehirn möglichst in die Höhe, schlägt es vorwärts, und sieht dann zwischen ihm und dem hinteren Lappen des großen Gehirns hinein; so sieht man zwischen den Hälften des großen Gehirns den hinteren Rand des Balkens, dann, näher nach dem kleinen Gehirne zu, die obere Seite des Verbindungstheiles, an welcher die Vierhügel in die Augen fallen. Man überzeugt sich, daß hier dieser Verbindungstheil, der das kleine Gehirn und das Rückenmark mit dem großen Gehirne in Verbindung bringt, einen sehr kleinen Umfang hat. Zwischen diesem Verbindungstheile und dem hinteren Rande des Balkens hängt an einem an den Sehhügeln befestigten Markbogen die Zirbeldrüse, die auf den Vierhügeln aufliegt, und zwischen ihr und neben ihr ist die von Häuten bedeckte und verschlossene große Oeffnung der Hirnventrikel, die seitwärts um den Hirnschenkel herum bis auf die Grundfläche des Gehirns herabgeht. Zieht man das verlängerte Mark vorwärts, so erkennt man zwischen ihm und dem über ihm liegenden kleinen Gehirne die Oeffnung der Hirnhöhle des kleinen Gehirns oder der 4ten Hirnhöhle, welche zwischen dem Verbindungstheile und dem kleinen Gehirne liegt.

Das Gehirn von seiner mittleren senkrechten Durchschnittsfläche betrachtet, nach Wegnahme des Bogens und der Scheidewand. Man sieht von der glatten, den Hirnhöhlen zugekehrten Oberfläche des Gehirns nur sehr wenig, weil sich die Hirnwindungen hinten herum und unten herum umbeugen, und sie dadurch zum Theil verdecken.

In der Mitte (jedoch etwas näher nach unten) sieht man 2 glatte, unter einander verschmolzene Hügel, den weißen Sehhügel und den grauen gestreiften Körper. In den Sehhügel pflanzt sich von unten her der Verbindungstheil ein.

Der Umfang der Stellen, durch welche beide Hälften des Gehirns unter einander zusammenhängen, ist sehr klein. Das hier durchschnittene Corpus callosum (der Balken), ferner die vordere, die hintere Commissur und der Bogen der Glandula pinealis sind die vorzüglichsten weißen Verbindungen des großen Gehirns. Die graue Commissur und die graue Platte an der unteren Seite des Gehirns sind die durch die graue Substanz bewirkten Verbindungen beider Hälften des großen Gehirns. Das Mittelstück des kleinen Gehirns ist der einzige Hirntheil, wo die aus einer grauen und aus einer weißen Lage bestehenden Windungen sich von einer Seitenhälfte zur anderen begeben. Der Verbindungstheil (die Vierhügel, die Hirnschenkel, die Brücke und das verlängerte Mark) hängen durchgängig in fast allen Punkten ihrer mittleren Ebene zusammen.

Beugt man die gegen die genannten Hügel herumgebogenen Hirnwindungen zurück, so macht man den großen Seitenventrikel des großen Gehirns sichtbar, der die 2 genannten Hügel als eine Vertiefung fast rings herum umgiebt, so daß hier die nach innen gekehrte glatte Oberfläche des großen Gehirns sichtbar wird. Die genannten Hügel ragen also in dieser Vertiefung wie ein Berg hervor, und in diesen Berg pflanzt sich der Verbindungstheil ungefähr wie der Stiel in den Hut eines Pilzes ein. An der den Seitenventrikel bildenden Vertiefung unterscheidet man ein vorderes, oberes und ein unteres Ende oder Horn, denn die Vertiefung ist nicht völlig ringförmig. Hinten geht eine Verlängerung der Vertiefung in den hinteren Lappen des großen Gehirns ziemlich tief hinein, die man das hintere Horn nennt.

Der Verbindungstheil des Gehirns und Rückenmarks.

Der Verbindungstheil hat, wie aus dem Vorigen erhellt, 5 Theile, medulla oblongata, pons Varolii, corpora quadrigemina, crura cerebri und tuber cinereum.

Digitized by Google

Die Medulla oblongata, das verlängerte Mark, die Fortsetzung des Rückenmarkes innerhalb des Schädels, hat noch ziemlich die Form des Rückenmarks. Es besitzt eine vordere und eine hintere Spalte, aber im Innern nicht jene weiße und jene graue Commissur. Es schwillt nach oben zu an und ist an seiner Oberfläche deutlich in 6 aus Längenfasern bestehende Erhabenheiten getheilt, die aber nach innen zu so genau unter einander zusammenhängen, daß man daselbst schwer die Grenzen zwischen ihnen bestimmen kann, nämlch 1) in zwei hintere, corpora restiformia, die zu beiden Seiten der hinteren Spalte liegen, welche sich hier dadurch erweitert, daß die Corpora restiformia auseinander weichen und in das kleine Gehirn treten. Dicht an der hinteren Spalte zeichnet sich an diesen Erhabenheiten selbst wieder ein hervorspringendes, sehr weißes, schmales Bündel aus, welches man die hintere Pyramide genannt hat; 2) in zwei mittlere, und 3) in zwei vordere Bündel, die zu dem großen Gehirne in die Höhe steigen. Die zwei mittleren schließen zwischen ihren Fasern zwei sehr längliche, ovale, an der Seite liegende Hügel, die in ihrer Mitte einen von einer gezackten graugelblichen Schicht umgebenen Kern haben, die Oliven, corpora olivaria, ein. Von diesen Erhabenheiten gehen Bündel zu den Vierhügeln und zu dem großen Gehirne, welche Reil die Schleife genannt hat. Die zwei vorderen Bündel sind die vorderen Pyramiden, corpora pyramidalia, welche neben der vorderen Spalte liegen, und sich in die Hirnschenkel fortsetzen.

Pons Varolii, die Brücke oder der Hirnknoten, protuberantia annularis, ist eine ungefähr einen Zoll breite Binde, welche aus markigen Querfasern bestehet, die aus der einen Seitenhälfte des kleinen Gehirns hervorkommen und bogenförmig zu der anderen Seitenhälfte hinübergehen, zwischen welchen und hinter welchen die fortgesetzten Längenfasern des verlängerten Markes zu dem großen Gehirne emporsteigen. Die Querfasern der Brücke legen sich mit ihrer gewölbten Seite hinter und unter dem Processus clinoideus posterior an, und schließen mit dem kleinen Gehirne zusammen einen Ring, durch welchen die Fortsetzung der Pyramiden und Oliven zum großen Gehirne in die Höhe steigen. Zum Theil durchkreuzen und durchflechten sich die innern Querfasern der Brücke und die Längenfasern der Pyramiden, und in die Zwischenräume zwischen den zum Theil auseinander weichenden Fasern ist graue Substanz eingestreuet. An ihrer vorderen Seite hat die Brücke einen Eindruck, in welchem die Arteria basilaris liegt. Da die Brücke, nebst der ihren hohlen Bogen ausfüllenden Fortsetzung der Oliven, sich an die Spalte in dem unteren und vorderen Theile des Mittelstücks des kleinen Gehirns anlegt, ohne daselbst angewachsen zu sein, so wird diese

Digitized by Google

Spalte dadurch in eine ziemlich verschlossene Höhle, in die 4te Hirnhöhle, verwandelt, die zwischen den 2 Corporibus restiformibus und dem Mittelstücke des kleinen Gehirns ihren Eingang hat. Diese Oeffnung wird jedoch durch die (wenigstens beim Embryo, zuweilen auch bei Erwachsenen) von einer Lamelle grauer Substanz überzogene Pia mater verschlossen. Neben ihr zu beiden Seiten, über dem Nervus vagus und glossopharyngeus, befindet sich ein Plexus choroideus, d. h. ein aus einem vielfach zusammengefalteten Theile der Pia mater und gewundenen Blutgefäßen, vorzüglich Venen, bestehender weicher Klumpen, über dessen Nutzen man noch nichts weiß. Auf dem von der Brücke gebildeten Boden der 4ten Hirnhöhle sind einige weiße und graue quere Streifen sichtbar.

Crura oder pedunculi cerebri, Hirnschenkel. Nachdem die verschmolzene Fortsetzung der Pyramiden durch den von den Querfasern der Brücke und dem kleinen Gehirne gebildeten Ring durchgegangen ist, kommen sie oben und vorn in der Gestalt zweier viel dickerer, aus etwas schief gewundenen Längenfasern bestehender, allmählig auseinander weichender Bündel zum Vorschein, die zu dem großen Gehirne in die Höhe steigen, indem jedes in die platte Oberfläche, die sich beide Hemisphären des großen Gehirns einander zukehren, eindringt. Sie sind unten durch eine Furche geschieden, die sich nach vorn erweitert, in welcher graue Substanz liegt, durch welche beide Hirnschenkel unter einander verbunden sind. In ihrem Inneren befindet sich ein wenig schwärzlich-graue Substanz. An ihrer oberen und zugleich nach hinten gekehrten Seite sind sie mit einander und mit den Vierhügeln verschmolzen. Nur ein zwischen ihnen und den Vierhügeln aus der 4ten in die 3te Hirnhöhle emporsteigender Canal giebt die Grenze zwischen ihnen und den Vierhügeln an.

Corpora quadrigemina, die Vierhügel, ragen an der hinteren und oberen Oberfläche der Hirnschenkel nach hinten in die Höhe. Man sieht sie, wenn man die hinteren Lappen des großen Gehirns in die Höhe hebt, das Tentorium cerebelli entfernt, und in die zwischen dem großen Gehirne und dem kleinen Gehirne befindliche Querspalte hineinsieht. Man sieht nämlich dann vorn aus der oberen Hälfte des Mittelstücks des kleinen Gehirns 2 weiße, durch eine dünne Gehirnlamelle (valvula cerebelli) verbundene, neben einander liegende weiße Markschenkel hervorkommen, und in die vier, paarweise gelegenen, von einander durch eine kreuzförmige Vertiefung geschiedenen Hügel übergehen, welche selbst wieder zu beiden Seiten mit dem rechten und mit dem linken Sehhügel zusammenhängen. Seitwärts an der Stelle, wo dieser Zusammenhang bewirkt wird, befindet sich ein kleines graues Hügelchen, welches mit dem Sehnerven sehr genau zusammenhängt, das Corpus

Digitized by Google

geniculatum internum, der kniefömige Körper. Die Vierhügel nehmen außer den erwähnten Bündeln des kleinen Gehirns die Fortsetzung der Oliven auf, und vermitteln dadurch die Verbindung des kleinen Gehirns und der vorderen Rückenmarkbündel mit dem großen. Die 2 hinteren Hügel heißen testes, die 2 vorderen nates.

Tuber cinereum. Die 2 Seitenhälften oder Hemisphären des großen Gehirns sind nicht nur an ihrer oberen Oberfläche durch eine obere Spalte, sondern auch großentheils an ihrer unteren Oberfläche durch eine untere Spalte getrennt. Diese untere Spalte wird aber auf der Grundfläche des Gehirns durch die hinzutretenden Hirnschenkel und durch die zwischen demselben gelegene graue Substanz verdeckt, vor dem Hirnschenkel aber durch einen über dem Türkensattel liegenden grauen Hügel, tuber cinereum, geschlossen, an welchem der Trichter, infundibulum, herabhängt, der sich in dem aus 2 Lappen bestehenden Hirnanhange, glandula pituitaria, endigt. An der hinteren Seite des Hügels bemerkt man 2 runde und weiße Markkügelchen, corpora mamillaria oder candicantia, vor ihnen die Durchkreuzung der Sehnerven, chiasma nervorum opticorum. Da nun die untere Spalte, welche die Hemisphären des großen Gehirns trennt, von allen diesen Theilen von unten her bedeckt und geschlossen wird, so verwandelt sie sich in eine ziemlich geschlossene mittelste Höhle des großen Gehirns, in die 3te Hirnhöhle, deren Boden der Hirnschenkel und das Tuber cinereum ist.

Das große Gehirn.

Corpus callosum, der Balken. Die durch eine Spalte geschiedenen 2 Seitenhälften oder Hemisphären des großen Gehirns werden aber nicht nur an ihrer unteren Seite durch die Hirnschenkel und durch das Tuber cinereum unter einander verbunden, sondern auch auf dem Boden der sehr tiefen oberen Spalte des großen Gehirns liegt, wie schon gesagt worden, eine aus weißen Querfasern bestehende dicke Binde, der Balken, die fast aus der Mitte der einen Hemisphäre in die Mitte der andern herübergeht, und von hinten nach vorn ungefähr halb so breit ist, als der Abstand des hintersten Theiles des großen Gehirns vom vordersten beträgt. Der vordere Rand dieser Binde liegt der vorderen Spitze der Hemisphären näher, als der hinteren Spitze. Vorn hat diese Binde kein freies Ende, sondern sie beugt sich daselbst unter einem Winkel, den man, nach Reil, das Knie des Balken nennt, nach unten, und geht in die vor den Sehnerven liegende graue Substanz über, die selbst wieder eine Fortsetzung des Tuber cinereum ist. Weil nun also die weiße Querbinde, die oben die beiden Seitenhälften des großen Ge-

Digitized by Google

hirns unter einander verbindet, mit der grauen Subſtanz, welche dieſe Verbindung der beiden Seitenhälften unten auf der Grundfläche des großen Gehirns bewirkt, ununterbrochen durch die vordere Umbeugung des Balkens zuſammenhängt, ſo iſt der Zwiſchenraum zwiſchen den Hemiſphären nach vorn zu nicht offen, ſondern durch das Knie des Balkens geſchloſſen. Es giebt daher keinen vorderen Eingang in dieſen Zwiſchenraum, den man die Ventrikel des großen Gehirns nennt. Wohl aber iſt dieſer Zwiſchenraum nach hinten offen, denn hinten endigt ſich der Balken mit einem dicken, etwas umgerollten, freien Rande, der zwar auf den Vierhügeln aufliegt, mit ihnen aber nicht verwachſen iſt, ſo daß ſich zwiſchen dem Balken und den Vierhügeln der große Eingang in die Ventrikel des großen Gehirns befindet, durch den auch Gefäße in dieſelben eintreten, oder aus ihnen hervorkommen, der aber übrigens durch die Hirnhäute verſchloſſen iſt.

Thalamus nervi optici, der ſogenannte Sehhügel oder das hintere Hirnganglion, und corpus striatum, der geſtreifte Körper oder das vordere Hirnganglion. Der größte Theil der platten Oberfläche, die die eine Hemiſphäre des großen Gehirns der andern zukehrt, iſt wie die äußere, obere und untere Oberfläche des großen Gehirns von breiten Windungen bedeckt. Nur ein ſchmaler, zwiſchen dem Balken und dem Tuber cinereum gelegener Fleck iſt davon ausgenommen. Er wird an der rechten und an der linken Hälfte des Gehirns von einem unteren, weißen, ovalen, ſtärker hervorſpringenden Hügel, dem Sehhügel, thalamus nervi optici, und von einem oberen, keulenförmigen, flacheren, gebogenen grauen Hügel, dem geſtreiften Körper, corpus striatum, gebildet. Dieſer letztere Hügel liegt dicht unter dem vorderen Theile des Balkens, und umgiebt mit ſeinem vorderen keulenförmigen Ende den vorderen Theil des Sehhügels von oben und außen her. Hinten läuft er ſpitz aus, und wird durch eine durchſichtige, etwas aufgeworfene Linie, taenia, vom Sehhügel geſchieden. In den unteren hinteren Theil des Sehhügels jeder Seite tritt der heraufſteigende Hirnſchenkel, faſt wie der Stiel in die Frucht, ein. Daher hat er auch den Namen Pedunculus cerebri bekommen. An ſeiner hinteren Seite treten auch mit ihm die Faſern der Vierhügel mit ein. Alle dieſe Markbündel ſpalten ſich im thalamus federbuſchartig, haben graue Subſtanz zwiſchen ſich, gehen zum Theil durch das Corpus striatum hindurch, zum Theil unmittelbar ſtrahlenförmig in das Mark der Hemiſphäre des Gehirns, bis zu den Windungen über. Daher wechſelt graue und weiße Maſſe im Thalamus und Corpus striatum ab und giebt ihnen innerlich ein geſtreiftes Anſehn. Dieſe beiden Hügel ragen alſo an der inneren Seite, welche die eine Gehirnhälfte der andern zukehrt, hervor, und der äußere, etwas nach vorn und oben gekehrte

Digitized by Google

Theil dieser Hügel geht unmittelbar in die weiße Substanz über, die den großen Theil des Kerns des großen Gehirns ausmacht. Die Windungen des großen Gehirns stoßen nirgends unmittelbar an diese Hügel. Denn oben und vorn kommen zwischen diesen Hügeln und den Windungen die Querfasern des Balkens aus dem großen Gehirne hervor, vorn und unten hängen die Windungen der einen Seite mit denen auf der andern Seite durch die graue Lamelle zusammen, welche das Tuber cinereum und die Verbindung zwischen ihm und dem Knie des Balkens bildet. Hinten und unten trennt eine tiefe, in die Ventrikel führende Spalte die Windungen des großen Gehirns von der Substanz der 2 genannten Hügel. Denn der hintere Lappen des großen Gehirns beugt sich über den Sehhügel von unten her herum, und läßt daselbst einen Zwischenraum, der den unteren Theil des Seitenventrikels ausmacht.

Ventriculus tertius. Der rechte und der linke Sehhügel liegen in der mittleren Ebene, durch welche man sich das große Gehirn in 2 Hälften getheilt denken kann, ziemlich dicht neben einander. Sie kehren einander 2 platte und graue Seitenflächen zu. Zwischen diesen 2 Seitenflächen liegt zwar an der einen Stelle etwas graue Substanz, die weiche Commissur der Sehhügel, commissura mollis, indessen ist doch der größere Theil dieser Seitenflächen nicht unter einander verwachsen, sondern durch einen engen Zwischenraum getrennt, den man die 3te Hirnhöhle, ventriculus tertius, nennt.

Die dritte Hirnhöhle ist demnach eine nur einmal vorhandene Höhle, deren Seitenwände die Sehhügel, deren Boden das Tuber cinereum und der Trichter, infundibulum, bildet; vorn ist sie durch die vom Tuber cinereum zu dem Knie des Balkens gehende graue Platte geschlossen, hinten ist der Zugang zu ihr zum Theil durch die Vierhügel verengt, indessen communicirt sie daselbst durch einen unter den Vierhügeln befindlichen (zwischen den Vierhügeln und den Hirnschenkeln nach hinten gehenden) Canal, aquaeductus Sylvii, mit der 4ten Hirnhöhle (der Höhle des kleinen Gehirns), und zwischen dem hinteren Umschlage des Balkens und den Vierhügeln dringt die weiche Hirnhaut nebst Blutgefäßen in die 3te Hirnhöhle herein.

Ventriculi laterales, die Seitenventrikel. Der Raum an der oberen, hinteren und unteren Oberfläche des Sehhügels und des gestreiften Körpers, der von den über diese Hügel herübergebogenen, benachbarten Hirntheilen jeder Seite bedeckt wird, ist der Seitenventrikel, ventriculus lateralis, dessen Form man mit einem $\mathcal{L}$ vergleicht.

Der Seitenventrikel ist also eine in jeder Hemisphäre befindliche Höhle, die den Thalamus von seiner oberen, hinteren und unteren Seite umgiebt. Der Theil desselben, der sich zwischen der oberen Seite des Seh-

hügels, der oberen des Corpus striatum und der unteren Oberfläche des Corpus callosum, das beide deckt, befindet, heißt Cornu anterius, vorderes Horn des Seitenventrikels, der, welcher sich hinter dem Thalamus befindet, und von einer großen Einbeugung im hinteren Lappen des großen Gehirnes gebildet wird, heißt hinteres Horn, cornu posterius (auf seinem Boden sind einige Wülste und Furchen sichtbar, die man Pes hippocampi minor oder calcar avis nennt), der Theil des Seitenventrikels endlich, welcher sich zwischen der unteren Seite des Sehhügels und den sie daselbst überragenden und verdeckenden Hirnwindungen des unteren Theiles des Gehirns befindet, heißt unteres Horn, cornu inferius.

Septum pellucidum, die Scheidewand, fornix, der Markbogen, und pes hippocampi major, der große Seepferdefuß. Oben würde der 3te Ventrikel mit dem Raume, der sich über dem Sehhügel und unter dem Balken befindet (mit den Seitenventrikeln) zu einer einzigen ungetheilten Höhle zusammenfließen, hinge nicht von der Mittellinie der unteren Oberfläche des Balkens eine aus 2 Blättern gebildete Scheidewand, septum pellucidum, senkrecht herab, die vorn breit ist und den Raum zwischen dem Knie des Balkens ausfüllt, hinten schmal und spitz ausläuft. An ihrem unteren Rande ist sie von 2 Markbogen begrenzt, und ist mittels derselben auf den Sehhügeln befestigt. Diese Scheidewand liegt zwischen beiden Seitenventrikeln. Der Bogen fängt vorn mit 2 Schenkeln an, und endigt sich auch hinten in 2 Schenkel. Es fängt nämlich von jedem Corpus mamillare am Tuber cinereum ein, anfangs in grauer Substanz verborgener, aus Längenfasern bestehender Bogen an (vorderer Schenkel des fornix), der in die Höhe steigt, wie ein Saum an dem unteren Rande des septum pellucidum liegt, sich mit dem der anderen Seite vereinigt, die zwischen beiden Sehhügeln befindliche Spalte (die 3te Hirnhöhle) bedeckt, und sich an der Grenze der inneren Seitenfläche des Sehhügels um denselben herumwindet und an ihm durch die Pia mater angeheftet ist. Hinten, wo das Septum pellucidum aufhört, schließen sich die 2 hinteren Schenkel des Fornix an den Balken an, verlassen ihn aber hierauf wieder, und jeder umgiebt die Stelle an der unteren Seite des Sehhügels, in welche der Hirnschenkel eindringt. An der unteren Seite des Sehhügels verwächst er mit einer gebogenen weißen Hirnwindung, die in das untere Horn des Seitenventrikels hineinragt, pes hippocampi major.

Dadurch, daß der Fornix in diesem ganzen Verlaufe an den Sehhügel durch die weiche Hirnhaut angeheftet ist, trägt er dazu bei, daß der Seitenventrikel auf der Grundfläche des Gehirns, wo der Hirnschenkel in den Sehhügel eindringt, nicht offen steht, sondern durch ihn und

Digitized by Google

durch Häute verſchloſſen iſt; ferner daß die beiden Seitenventrikel nicht in einander und auch nicht in den 3ten Ventrikel übergehen. Nur zwiſchen dem vorderen Theile des Fornix und den Sehhügeln bleibt eine kleine Oeffnung, foramen Monroi. Die Pia mater, welche die Höhle der Seitenventrikel überzieht, iſt längs der Stelle, wo ſich der Fornix an den Sehhügel anſchließt, vielfach in Falten gelegt, und dieſe Falten ſind ſelbſt wieder durch viele Nebenfalten und Zotten kraus, und zahlreiche Venen und einige Arterien laufen geſchlängelt zwiſchen den Falten hin. Man nennt dieſen Theil der weichen Hirnhaut den Plexus choroideus des Seitenventrikels. An dem Orte, wo der plexus choroideus ſich ins untere Horn hinabkrümmt, liegt in ihm eine ovale weiche Maſſe, die von derſelben Beſchaffenheit zu ſein ſcheint, als die ſogenannten Glandulae Pachioni. Durch die Monroiſche Oeffnung gehen die Plexus choroidei des 3ten Ventrikels, von welchen ſogleich die Rede ſein wird, in die des Seitenventrikels über.

Commissura anterior, commissura posterior, commissura mollis und plexus choroideus. Die innere Seitenfläche jedes Thalamus macht, wie wir geſehen haben, die Seitenwand des 3ten Ventrikels aus, deſſen Decke der Fornix und der unter dem Fornix gelegene Plexus choroideus medius iſt. Der Plexus choroideus medius fängt nämlich nahe an der Oeffnung der Ventrikel am hinteren Rande des Corpus callosum an, läuft unter dem Fornix vorwärts und geht durch das Foramen Monroi in 2 Theile getheilt zu jedem Seitenventrikel über. Zwiſchen den 2 Thalamis liegt, wie ſchon erwähnt worden, etwas graue Subſtanz, die dieſelben vereinigt, commissura mollis, vor ihnen, und zwar dicht vor den vorderen Schenkeln des Fornix, die weiße Commissura anterior, die wie ein Rabenkiel ſtark und rund iſt, und aus dem Corpus striatum der einen Seite in das der andern bringt; hinter den Thalamis, dicht vor den Vierhügeln, befindet ſich die Commissura posterior. Vom oberen Rande der inneren Oberfläche des Thalamus entſpringt auf jeder Seite ein Pedunculus glandulae pinealis, der ſich über den Vierhügeln und unter dem hinteren Rande des Balken mit dem anderen in einem Bogen vereinigt, an dem die graue, röthliche, weiche Glandula pinealis hängt, die auf den Vierhügeln ruht. In ihr und an den Pedunculis ſind kleine, harte, gelbliche, unorganiſirte Körnchen befindlich, welche man Hirnſand nennt, die man zuſammen mit dem Namen Acervulus bezeichnet. Dicht unter der hinteren Commiſſur öffnet ſich der ſchon erwähnte Gang, aquaeductus Sylvii, welcher aus der 3ten Hirnhöhle in die 4te führt, und unter den Vierhügeln und über den Hirnſchenkeln nach hinten geht. Der Boden der 3ten

Hirnhöhle geht in den Trichter über. Die sehr vertiefte Stelle desselben heißt aditus ad infundibulum.

Das kleine Gehirn, cerebellum.

Es ist der größte unpaare Theil des Nervensystems. Sein von rechts nach links gehender Querdurchmesser ist viel größer (ungefähr 4 Zoll), als der von vorn nach hinten gehende. Am kleinsten ist der senkrechte Durchmesser. Eine Furche in der Mitte seiner hinteren, unteren und vorderen Seite macht zwar, daß man ein in der Furche liegendes, schmales Mittelstück, Wurm, vermis, und 2 rundliche, von oben und unten etwas plattgedrückte Seitentheile, ein rechtes und ein linkes Hemisphaerium, zur Bequemlichkeit bei der Beschreibung unterscheiden kann; aber sie sind durch diese Furche nicht so vollkommen wie die Hemisphären des großen Gehirns und die Seitentheile des Rückenmarks geschieden, denn das Mittelstück des kleinen Gehirns ist so groß, und der Bau desselben dem der Hemisphären so entsprechend, namentlich weil die Windungen beider Hemisphären sich über das Mittelstück fortsetzen, daß man das Ganze als einen einzigen unpaaren Theil ansehen muß. An der oberen Seite desselben ist nicht einmal eine deutliche mittlere Furche vorhanden.

Eine sehr tiefe horizontale Querfurche (die einzige, in welcher nach vorn die Marksubstanz des kleinen Gehirns bloß zu liegen scheint, oder wo sie wenigstens nur von einer sehr dünnen, nicht deutlich sichtbaren Lage grauer Substanz überzogen wird, theilt die Hemisphären in eine obere und in eine untere Hälfte. Auch das Mittelstück oder der Wurm, vermis, wird durch eine solche Furche, die aber nicht genau die Fortsetzung der vorigen ist, in ein oberes und in ein unteres Stück, den oberen und den unteren Wurm getheilt. In jener Furche der Hemisphären endigen sich vorn die schmalen Windungen der oberen und unteren Hälfte der Hemisphären, und aus ihr tritt daselbst nach unten der mittlere, aus Fasern bestehende Schenkel des kleinen Gehirns, processus cerebelli ad pontem, hervor, und geht in einem Bogen quer von der großen Querspalte der einen Hemisphäre zu der der andern ununterbrochen hinüber, und bildet die schon oben erwähnte Brücke, pons Varolii. Das kleine Gehirn und dieser Bogen schließen zusammen einen Ring, durch den die Pyramiden und Oliven des verlängerten Markes zum großen Gehirn emporsteigen. Das kleine Gehirn macht das hintere, die Brücke das vordere Stück des Ringes aus. Dieser Markbogen verbindet die Seitentheile des kleinen Gehirns unter einander, und je größer sie daher sind, desto breiter und dicker ist die Brücke, und bei gewissen Thieren, deren kleines Gehirn keine Seiten-

Digitized by Google

theile hat, fehlt sie ganz. Beim Menschen ist sie vorzüglich groß. Das aus queren Windungen, gyri, und aus innerer Marksubstanz bestehende schmale Mittelstück umgiebt den Mittelpunkt, um den es sich von hinten nach vorn herumkrümmt, nicht von allen Seiten. An einer nach der hohlen Seite der Brücke hingerichteten kleinen Stelle ist eine Lücke, durch welche die vorderen Windungen der oberen Hälfte des Mittelstücks von den vorderen Windungen der unteren Hälfte desselben getrennt sind, und diese Lücke führt in eine im kleinen Gehirne befindliche, hinten sich mit einer verschlossenen Spitze in seiner Mitte endigende Höhle. Die Lage weißer und grauer Substanz, welche durch eine Art von Faltung die queren Windungen des kleinen Gehirns, und namentlich auch des Mittelstücks desselben bildet, erstreckt sich von der Stelle, wo die Windungen der oberen Hälfte des Mittelstücks aufhören, in Form einer Membran, die aus einer Lage weißer und aus einer Lage grauer Substanz besteht (die Hirnklappe, valvula cerebelli anterior, oder das vordere Marksegel, nach Reil), zu den Vierhügeln, und ist seitwärts an den 2 zu den Vierhügeln gehenden oberen Schenkeln des kleinen Gehirns angewachsen. Diese Membran bildet selbst meistens eine Anzahl Querspalten, welche große Aehnlichkeit mit den Windungen des Mittelstücks haben. Auf eine ähnliche Weise erstreckt sich von der Stelle, wo diese Windungen der oberen Hälfte des Mittelstücks an der Oeffnung des kleinen Gehirns aufhören (vom Knötchen), eine Membran abwärts, die die Fortsetzung der Windungen desselben ist, (valvula cerebelli posterior, die hintere Hirnklappe, das hintere Marksegel), und ist seitwärts an dem innersten Theile der Seitenhälfte (an den Flocken und Mandeln, und an den unteren Schenkeln des kleinen Gehirns) angewachsen. Diese letztere aber sieht ziemlich weiß aus, ist nicht so dick als die vordere Hirnklappe, und besteht nicht aus einer deutlich unterscheidbaren grauen und weißen Lage. Die innere Oberfläche dieser Markhäute ist mit einer Fortsetzung des die Höhle des kleinen Gehirns auskleidenden, durchsichtigen, von der Pia mater herrührenden Ueberzugs bedeckt.

An der in die Höhle des kleinen Gehirns führenden, vom Mittelstücke unbedeckt gelassenen Oeffnung dringen von unten die unteren Schenkel des kleinen Gehirns (processus cerebelli ad medullam oblongatam, corpora restiformia), die die Fortsetzung der hinteren Bündel des Rückenmarks sind, und von oben, die oberen Schenkel des kleinen Gehirns (processus cerebelli ad corpora quadrigemina), die mit den Vierhügeln in Verbindung stehen, ein. Zwischen ihnen liegt auf jeder Seite der schon beschriebene mittlere Schenkel des kleinen Gehirns (processus cerebelli ad pontem). Auf jeder Seite sind alle 3 Schenkel unter einander verwachsen, und außerdem ist der obere

Digitized by Google

Schenkel der rechten Seite mit dem der linken Seite durch die schon erwähnte Valvula cerebelli anterior, der untere Schenkel der rechten Seite mit dem der linken Seite durch die Valvula cerebelli posterior verbunden.

Die Fortsetzung der Oliven und überhaupt der vorderen Rückenmarkbündel, welche den Bogen der Brücke ausfüllt, und ihre, die Hirnschenkel zum Theil mit bildende Verlängerung, macht die vordere Wand der Höhle des kleinen Gehirns, der vierten Hirnhöhle, ventriculus quartus, aus. Die 3 Schenkel des kleinen Gehirns, nebst der Aushöhlung der Seitenhälften desselben, machen auf jeder Seite die Seitenwände dieser Höhle, endlich die Valvula cerebelli anterior das etwas ausgehöhlte Mittelstück des kleinen Gehirns, und die Valvula cerebelli posterior machen zusammen die hintere Wand derselben aus. Die vierte Hirnhöhle liegt folglich zwischen der concaven, nach hinten gerichteten Oberfläche der Brücke und der Hirnschenkel, und der ausgehöhlten, nach vorn gerichteten Stelle des Mittelstücks des kleinen Gehirns und dessen Verlängerungen, den beiden Hirnklappen, und besitzt ein verschlossenes, in der Mitte des kleinen Gehirns eindringendes, spitzes Ende. Unten befindet sich zwischen dem verlängerten Marke und dem Mittelstücke des kleinen Gehirns der durch die weiche Hirnhaut verschlossene, zuweilen auch durch eine Gehirnlamelle gedeckte Eingang in die vierte Hirnhöhle. An diesem Eingange setzt sich diese Höhle in die hintere Rückenmarkspalte fort, und bildet dadurch die Schreibfeder, calamus scriptorius. Am oberen Ende derselben, zwischen den oberen Schenkeln des kleinen Gehirns (processus cerebelli ad corpora quadrigemina), geht die vierte Hirnhöhle in den Aquaeductus Sylvii über, der zwischen den Vierhügeln und den Hirnschenkeln zur 3ten Hirnhöhle (zu dem Zwischenraume zwischen den Sehhügeln) führt.

An der Stelle, wo auf jeder Seite die 3 Schenkel des kleinen Gehirns unter einander verschmelzen, befindet sich im Marke der Hemisphären des kleinen Gehirns nach vorn ein von einer grauen gelblichen gezackten Linie umgebener Kern, corpus ciliare.

Die Markmasse des kleinen Gehirns ist durch Einschnitte, die sich an ihrer Oberfläche befinden, in Lappen, Läppchen und Windungen getheilt, die am Mittelstücke (Wurme) und an den Hemisphären der Gestalt und Zahl nach nicht ganz übereinstimmen. Man unterscheidet, wenn man die Lappen vom vorderen, oberen Rande der Hemisphären hinten herum bis zum vorderen unteren zählt, folgende, durch tiefe Einschnitte getrennte Lappen: den vierseitigen, den hinteren oberen Lappen, von ihm durch die tiefe horizontale Querfurche geschieden den hinteren unteren, den zarten, den zweibäuchigen Lappen und die Mandeln; außer diesen sitzt noch auf jedem Processus cerebelli

ad pontem eine Flocke auf. Das Innere jedes Lappens besteht aus Markfasern, die nach der Oberfläche des kleinen Gehirns zu divergiren, und eine Fortsetzung mehrerer von den 6 Markbündeln sind, die einander am Kerne des kleinen Gehirns zum Theil kreuzen. Die Oberfläche der Lappen, Läppchen und Blättchen ist von einer überall ziemlich gleich dicken Lage grauer Substanz überzogen, die auch in den tiefen Einschnitten von einem Lappen auf den andern ununterbrochen übergeht. Daher entsteht auf der senkrechten Durchschnittsfläche des Wurms das Ansehn des Lebensbaums, arbor vitae, der einen senkrecht stehenden vordern, und einen liegenden hinteren Zweig hat. Der liegende Zweig ist der Durchschnitt der unteren Hälfte des Mittelstücks (des unteren Wurms), der von vorn nach hinten 4 Lappen hat, nämlich das Knötchen, den Zapfen, die Pyramide, und einen 4ten, der die Querbänder und Quercommissur für solche Windungen der Hemisphären bildet, die theils unmittelbar über, theils unmittelbar unter der tiefen Querfurche liegen, so daß also die tiefe Querfurche der Hemisphären auf diesen 4ten Lappen des Wurms stößt. Die Grenzen dieser 4 Lappen werden durch 4 tiefe Einschnitte bestimmt, welche bis auf den liegenden Zweig dringen, in welchen aber die graue, sie überziehende Platte nicht unterbrochen ist. Der stehende Zweig ist der Durchschnitt der oberen Hälfte des Mittelstücks (des oberen Wurms), der aus 2 Lappen, aus dem hinteren oberen und aus dem weiter vorn liegenden vierseitigen besteht. Auch beide Hälften des Mittelstücks sind durch die graue Substanz, die sie überziehen, ununterbrochen unter einander verbunden.

Zergliederung des Gehirns von oben.

Man schneidet die Dura mater auf, beugt die Hemisphären des großen Gehirns auseinander, trennt die kleinen weißen, körnigen Körperchen, glandulas Pachioni, durch welche die Dura mater bei Erwachsenen, nicht aber bei Kindern, hier und da mit der Pia mater zusammenhängt, schneidet die von der Dura mater gebildete Falx cerebri vorn in der Hirnspalte quer durch, und schlägt sie rückwärts, sieht dann im Grunde der oberen Hirnspalte die quere Markbinde des Balkens, corpus callosum, seine queren Fasern, in der Mitte desselben eine Längenlinie, die Nath, raphe, seinen vordern Umschlag, das Knie, der zur grauen Substanz auf der Grundfläche des Gehirns heruntergeht, seinen dicken hinteren freien Rand, der weiter von der hinteren Spitze des Gehirns entfernt liegt, als das Knie von der vorderen, endlich die gewölbte Oberfläche desselben. Einige Linien über dem Balken schneidet man jede Hemisphäre des großen Gehirns horizontal durch, sieht dann den größten Markdurchschnitt des großen Gehirns, öffnet einige Linien neben der Stelle, wo der Balken in die Hemisphären eintritt, der Länge nach das vordere Horn jedes der 2 Seitenventrikel, dessen Decke der Balken ist, sieht auf dem Boden desselben vorn und seitwärts nach außen das keulenförmige graue Corpus striatum, das hinten spitz ausläuft, vorn nahe an dem andern, hinten weiter von ihm liegt; hinter und unter ihm den weißeren, ovalen Thalamus nervorum opticorum, der auch vorn dem andern näher ist, hinten weiter von ihm absteht. Zwischen dem Thalamus und dem Corpus striatum jeder Seite sieht man die Grenze beider, die Taenia, auf dem

Digitized by Google

Thalamus den Plexus choroideus des Seitenventrikels. Nun zieht man den Balken in die Höhe, sieht das dünne Septum pellucidum zwischen beiden Seitenventrikeln senkrecht herabhängen, das aus 2 Blättern besteht, zwischen denen eine kleine Höhle, ventriculus septi pellucidi, sich befindet. An seinem unteren Rande bemerkt man den Fornix wie einen weißen Saum des Septum, der sich auf die Spalte zwischen beiden Thalamis legt, und die Monroische Oeffnung, die dicht hinter dem vorderen Schenkel des Fornix aus einem Seitenventrikel in den andern, und aus beiden in den 3ten Ventrikel führt. Man schneidet nun das Knie des Balkens und die vorderen Schenkel des Fornix durch, hebt beide von der Spalte zwischen den Sehhügeln, welche der Fornix bedeckt, auf, und schlägt sie rückwärts, sieht nun die untere Oberfläche des Balkens und den an ihr angewachsenen Fornix, so wie den Plexus choroideus der 3ten Hirnhöhle, der auf der Spalte zwischen beiden Thalamis liegt, zuvor von dem Fornix bedeckt wurde, unter dem hinteren Rande des Balkens hereinkommt, und durch die Monroische Oeffnung in den Seitenventrikel übergeht.

Man öffnet die Decke des hinteren Horns, sieht die Falten an der Wand desselben, calcar avis oder pes hippocampi minor, öffnet die äußere Wand des unteren Horns, sieht, wie sich der hintere Schenkel des Fornix um den Sehhügel herum nach abwärts in dieses Horn begiebt, und mit dem weißen, gekrümmten auf dem Boden des unteren Horns gelegenen Wulste, pes hippocampi major verwächst, als dessen Saum, fimbria, er nun angesehen wird, und den er an den Sehhügel anheftet; ferner den Plexus choroideus, der die Verbindung der Fimbria mit dem Sehhügel befestigt, und der an seinem Uebergange ins untere Horn eine längliche Anschwellung enthält. Beugt man die Sehhügel, so sieht man zwischen ihnen eine Spalte, die 3te Hirnhöhle, in ihr in der Mitte die graue Commissura mollis, vorn, vor den abgeschnittenen vorderen Schenkeln des Fornix, die weiße Commissura anterior, hinten vor den Vierhügeln die weiße Commissura posterior, unter ihr den Aditus ad aquaeductum Sylvii, auf dem Boden der 3ten Hirnhöhle den Aditus ad infundibulum. Nun nimmt man zwischen dem großen und kleinen Gehirne das Tentorium cerebelli weg, sieht unter dem hinteren Rande des Balkens zwischen den hinteren Spitzen der Sehhügel die schief nach hinten und aufwärts gerichteten Corpora quadrigemina, an ihnen die Glandula pinealis an ihren Pedunculis hängen, die von dem oberen Rande der inneren platten Oberfläche der Sehhügel herabkommen, und einen Bogen, und folglich auch eine Commissur bilden. Von den Vierhügeln zu dem kleinen Gehirne erstrecken sich die Processus cerebelli ad corpora quadrigemina, die von oben durch die Valvula cerebelli anterior gedeckt werden; diese schneidet man auf, und öffnet so die 4te Hirnhöhle. Nun nimmt man das Gehirn heraus und betrachtet seine Grundfläche und das kleine Gehirn.

Betrachtungen über die einzelnen Hirntheile.

Das verlängerte Mark, medulla oblongata.

Die vorderen Pyramiden, corpora pyramidalia, sind 2 schmale, neben der vorderen Mittelspalte gelegene Stränge, welche deutlicher aus Längenfasern zusammengesetzt sind, als irgend ein anderer Theil des verlängerten Marks. An dem Querschnitte des Rückenmarks sind sie ziemlich gut zu unterscheiden, an manchen Stellen cylindrisch, an manchen elliptisch. Bei ihrem Uebergange zur Brücke sind sie etwas schmäler, und lassen daher zwischen sich und der Brücke eine kleine Vertiefung übrig. Ihre Fasern gehen zwischen den verschiedenen Lagen der Querfasern der Brücke hindurch zu den Hirnschenkeln und zu dem großen Gehirne über.

Weniger ist ihr Zusammenhang mit den Bündeln des Rückenmarks bekannt. An einer 14 bis 16 Linien von der Brücke entfernten Stelle des Rückenmarks ist die vordere Rückenmarkspalte sogleich an der Oberfläche verschlossen. Der Fortsatz der weichen Rückenmarkhaut, welche an allen andern weiter unten gelegenen Stellen des Rückenmarks in diese Spalte bis auf die ziemlich tiefliegende vordere weiße Commissur des Rückenmarks eindringt, endigt sich hier sogleich an der Oberfläche, und schickt mehrere fadenartige Fortsätze zwischen die Faserbündel hinein, die wie in einander geschobene Finger sich zu durchkreuzen scheinen. Man sieht diese in einander eingreifenden Bündel sowohl von vorn, wenn man die vordern Seitenhälften des Rückenmarks auseinander zieht, als auch von

züglich von hinten, wenn man das Rückenmark von seiner hinteren Spalte aus theilt, wie namentlich Reil gethan hat. Diese Durchkreuzung, welche, wie Gall anführt, schon von Mistichelli 1709, und von Petit 1710 beschrieben, und von einer großen Anzahl von Anatomen bestätigt worden ist, wurde von einigen berühmten Anatomen, namentlich von Morgagni, Haller, Vicq d'Azyr, Cuvier, Prochaska, Sabatier, Chaussier, und neuerlich von Rolando nicht als eine wahre Durchkreuzung anerkannt. Santorini läugnete nicht ab, daß an dieser Stelle vielleicht nur ein Schein einer Durchkreuzung durch das Auseinanderziehen der Fasern entstehe. Noch viel weniger soll nach Rolando bei den Säugethieren eine Durchkreuzung Statt finden. Ich kann diese Zweifel nicht theilen, denn schon das Verhalten des an dieser Stelle in die vordere Rückenmarksspalte tretenden Fortsatzes der weichen Rückenmarkhaut beweiset, daß hier die beiden Hälften des Rückenmarks, die anderwärts nur in der Tiefe unter einander zusammenhängen, an der Oberfläche vereinigt sind. Da nun von dieser Stelle an bis zur Brücke eine regelmäßige weiße Commissur in der vorderen Mittelspalte fehlt, so darf man vielleicht vermuthen, daß die weißen Querfasern, welche weiter unten die weiße Commissur bilden, an jener Stelle der Durchkreuzung eine mehr oberflächliche und schiefe Lage angenommen haben, und daß aus ihrer Fortsetzung die Pyramiden entstehen. Selbst Anatomen, welche sich sehr viel Mühe mit der Untersuchung der Structur des verlängerten Marks gegeben haben, wie Reil und Rolando, konnten die Pyramiden nur bis zu diesen sich durchkreuzenden Bündeln, nicht noch tiefer herab verfolgen. Tiedemann und Serres sahen, daß die erwähnte Durchkreuzung der Pyramiden schon bei sehr kleinen Embryonen sichtbar sei.

Die Olivenbündel, oder die vorderen Rückenmarkbündel, nach Rolando [1]), das 2te seitliche Bündelpaar nach Reil [2]), crura medullae oblongatae ad corpora quadrigemina nach Langenbeck [3]). Da die Pyramiden nicht die Fortsetzung der vorderen Bündel des Rückenmarks sind, so fragt es sich, in welchen andern Theil der Medulla oblongata diese übergehen. Nach den hier angeführten Schriftstellern liegt die Olive zwischen den auseinander weichenden Fasern dieses Bündels. Besonders genau haben das Burdach, Rolando und Langenbeck abgebildet. Die vordern Pyramiden liegen wie 2 cylindrische Stränge vor den vordern Rückenmarkbündeln. Dieses sieht man vorzüglich deutlich an der Schnittfläche des quer durchschnittenen verlängerten Marks. Die Olive liegt zwischen den auseinander weichenden Fasern desselben, und es gehen daher auch an der Oberfläche Fasern dieses Bündels theils zwischen der Pyramide und Olive, theils zwischen der Olive und dem strickförmigen Körper hin zu der Brücke. An der vorderen Wand der vierten Hirnhöhle sieht man diese Bündel ziemlich unbedeckt zu dem hinteren Theile der Hirnschenkel gehen und zwischen sich die Wasserleitung bilden, welche zwischen den Hirnschenkeln und Vierhügeln aus der 4ten Hirnhöhle in die 3te Hirnhöhle führt. Den Theil dieses Bündels, welcher zwischen der Olive und Pyramide liegt, nennt Reil [4]) die Schleife. Er geht nach ihm an der concaven, der 4ten Hirnhöhle zugekehrten Oberfläche der Brücke, theils zu dem hinteren Theile der Hirnschenkel, welcher durch schwärzliche Substanz vom vordern geschieden ist, theils durch die Vierhügel hindurch zu den Thalamis opticis. Dieses Bündel liegt übrigens an den Fasern der Pyramiden und den vom Corpus olivare ausgehenden Fasern so dicht an, daß die Gren-

---

[1]) *Rolando*, Recherches anatomiques sur la moëlle allongée. Memorie della reale acad. delle scienze di Torino, Tome XXIX, année 1822. Besonderer Abdruck p. 17.

[2]) *Reil*, im Archive für die Physiologie, 1809. B. IX. p. 490, 488. Reil beschreibt sie »als ein starkes Bündelpaar, welches die Seiten des verlängerten Rückenmarks zwischen den (vorderen) Pyramiden und den hinteren Schenkeln des kleinen Gehirns einnimmt.« Dieses ist das mittlere Bündel, von welchem Rosenthal in seinem Beitrage zur Encephalotomie, Weimar 1815. S. 24 — 27, und J. F. Meckel in seinem Handbuche der Anatomie, B. 3. S. 458, sprechen, welches auf die Oliven stoße, sie einschließe und durch den Hirnknoten nach vorn zu den Vierhügeln dringe.

[3]) *Langenbeck*, Icones anatomicae Neurologiae. Fasc. I. Tab. XXXI. fig. 4. h. i. fig. 31.

[4]) *Reil*, a. a. O. S. 505.

Digitized by Google

zen oft nicht mit Sicherheit gezogen werden können. Die Oliven, corpora olivaria [1]), liegen zwischen den Fasern des beschriebenen Bündels. Jede Olive ist eine abgeplattete, ovale, weiße Erhabenheit, welche durch eine ziemlich bestimmt begrenzte Oberfläche von den benachbarten Theilen unterschieden werden kann, neben der Pyramide und etwas weiter nach hinten an der Oberfläche in der Gestalt eines ovalen unbedeckten Hügels hervorragt. Der größere Theil derselben ist im verlängerten Marke verborgen, sie liegt der Länge nach, und ihr innerer Rand grenzt dicht an die Mittelspalte. Schneidet man sie durch einen durch ihre Länge gehenden Schnitt in eine vordere und in eine hintere, oder durch einen quer durch das verlängerte Mark gehenden Schnitt in eine obere und in eine untere Hälfte, so bemerkt man, daß sie durch eine dünne, gelbliche, gefaltete Lage in einen etwas ins Graue fallenden ovalen platten Kern, und in eine weiße, diese gelbe Lage umgebende Schale getheilt wird. Auf diesen Durchschnittsflächen nimmt sich diese dünne gelbliche Lage wie eine zackige Linie aus, die den Kern von allen Seiten, ausgenommen von der Seite, wo die Olive an die Mittelspalte stößt, umgiebt. An dieser Stelle wenden die beiden neben einander liegenden Oliven ihren unbedeckten Kern der Mittelspalte zu. Die Farbe des Kerns fällt zwar etwas ins Graue, aber er ist dennoch weißer als die benachbarte graue Substanz im Innern des verlängerten Marks; auch ist der Kern nach Rolando aus Fasern, die strahlenförmig von der Mittelspalte aus in den Kern nach außen gehen, gebildet. Die Fasern, welche aus den Oliven hervorzukommen scheinen, vermengen sich mit den Fasern des vorderen Rückenmarkbündels, zwischen welchen jede Olive liegt, und die sich, nachdem sie theils vor, theils hinter der Olive weggegangen sind, am oberen Ende der Olive zum Theil vereinigen. Nach Langenbeck [2]) gehen die Fasern der Olive hinter denen der Pyramide durch die Substanz der Brücke hindurch, und in den hinteren Theil der Hirnschenkel über.

Es folgen nun hinter den vorderen Rückenmarkbündeln die strickförmigen Bündel, corpora restiformia, die auch die unteren Schenkel des kleinen Gehirns, crura, processus cerebelli ad medullam oblongatam, oder auch die hinteren Rückenmarkbündel genannt werden, und welche die dicht an der hinteren Mittelspalte liegenden sehr schmalen Stränge, die hinteren Pyramiden, pyramides posteriores, zwischen sich liegen haben. Während die vorderen Pyramiden und die Olivenbündel (vorderen Rückenmarkbündel) die Verbindung des Rückenmarks mit dem großen Gehirne (mit dem Sehhügel und mit den Vierhügeln) bewirken, ist durch die hinteren Rückenmarkbündel und durch die hinteren Pyramiden eine Verbindung des Rückenmarks mit dem kleinen Gehirne bewerkstelligt.

Die hinteren Rückenmarkbündel werden an der Stelle, wo die Kreuzung der Pyramiden geschieht, durch graue Substanz, welche seitwärts am verlängerten Marke bis an die Oberfläche reicht, von den vorderen Rückenmarkbündeln getrennt. Sie vergrößern sich beträchtlich, während sie sich der Brücke nähern, weichen aus einander, ragen an der Seite des verlängerten Markes hervor, und bedecken hier den Theil der vorderen Rückenmarkbündel, welcher hinter der Olive weggeht. Die zwischen ihnen gelegenen hinteren Pyramiden liegen immer dicht neben der hinteren Mittelspalte, und entfernen sich daher in der Nähe der Brücke auch von einander, bilden daselbst gemeinschaftlich mit der hinteren Mittelspalte die Stelle, welche man mit dem Schnabel einer Schreibfeder, calamus scriptorius, vergleicht, und zeichnen sich hier durch eine kleine Anschwe-

---

[1]) Die Oliven haben von Vieussens, weil sie eine ähnliche Gestalt haben, ihren Namen von der Olivenfrucht erhalten. Vorzüglich genau haben sie Prochaska, Reil. Rolando und Langenbeck theils beschrieben, theils abgebildet. *Prochaska*, de structura nervorum. Vindobonae 1779. 8. Tab. I. p. 85 sq. bildet schon sehr gut die innere Structur derselben ab.

[2]) *Langenbeck*, Icones anatomicae Neurologiae. Fasc. I. Taf. XXXI. Fig. 4. f. Die hinteren Pyramiden sind schon von *Ruysch*, Epist. problem. XV. et Tab. XIV. beobachtet, von Haller und Chaussier bemerkt, von Wenzel und Gall. Pl. VI. ii abgebildet, aber nicht beschrieben, endlich von *Reil*, Archiv f. d. Physiol. B. IX. 1809. p. 491. Burdach und von *Rolando* a. a. O. p. 25 genau beschrieben worden.

ung aus. Sie sind, wie man sieht, wenn man das verlängerte Mark quer durchschneidet, oben 2 ziemlich cylindrische, deutlich unterscheidbare, oft zum Theil getrennte Bündel, die aus gewundenen Fasern bestehen, tiefer unten am Rückenmarke sind sie 2 platte prismatische Streifen. An der Seite der hinteren Abtheilung der 4ten Hirnhöhle beugen sich die hinteren Rückenmarkbündel rückwärts, vereinigen sich mit den Schenkeln der Brücke und treten in das kleine Gehirn ein.

Nach der Beschreibung dieser Hauptbündel des verlängerten Marks, welche in Innern an manchen Stellen allerdings so untereinander zusammenhängen, daß sie nicht durch ganz bestimmte Grenzen getrennt sind, ist nun das Verhalten der grauen Substanz zu untersuchen, welche tiefer unten die Mitte des Rückenmarks einnimmt. In der Nähe, wo sich die Fasern der Pyramiden zu durchkreuzen anfangen, nimmt die graue Substanz, welche zuvor 4 Hörner hatte, eine andere Gestalt an, denn ihre vorderen Hörner verschwinden, und die hinteren werden sehr groß, reichen endlich bis zur Oberfläche an der Seite des verlängerten Marks, und bilden eine graue, quer durch das verlängerte Mark gehende Lage, durch welche die vorderen Rückenmarkbündel von den hinteren und von den hinteren Pyramiden getrennt werden. Daher sieht man auch, wie Rolando bemerkt, neben der Stelle, an welcher die Durchkreuzung der vorderen Pyramiden geschieht, seitwärts an der Medulla oblongata zwischen den vorderen und den hinteren Rückenmarkbündeln einen etwa 7 bis 8 Linien langen, und ungefähr eine Linie dicken grauen Strang. Höher oben theilt sich die graue Substanz in 2 getrennte, in jeder Seitenhälfte des verlängerten Markes liegende Abtheilungen, die oben am Schnabel der Schreibfeder an die Oberfläche der 4ten Hirnhöhle treten, die sie mit einer Lage grauer Substanz überziehen, welche selbst wieder von einem, von der weichen Hirnhaut gebildeten, durchsichtigen Ueberzuge, Epithelium, bedeckt wird. Oben kommen daher die vorderen und hinteren Bündel wieder in eine unmittelbare Berührung unter einander. Rolando hat die Lage der grauen Substanz im verlängerten Marke sehr sorgfältig durch zahlreiche Querschnitte erörtert.

Bisweilen findet man, daß eine von den Seitentheilen der Brücke oder des kleinen Gehirns ausgehende Lage dünner Fasern sich über die Oliven und Pyramiden wegschlägt und in die vordere Mittelspalte eindringt. Die Oberfläche, welche sich die 2 Rückenmarkshälften einander in der vorderen Mittelspalte zukehren, zeigt dann deutliche Fasern, welche quer von vorn nach hinten laufen. Zuweilen gehen diese Fasern bogenförmig um das untere und obere Ende der Olive herum. Santorini, Malacarne, Gall und Spurzheim nennen sie processus arciformes. Rolando hat sie mit vorzüglicher Sorgfalt beschrieben.

Ferner ist schon bemerkt worden, daß da, wo die hinteren Rückenmarkbündel, corpora restiformia, oder processus medullae ad cerebellum aus einander weichen, die zwischen ihnen und dem hinteren Wurme des kleinen Gehirns befindliche Oeffnung der vierten Hirnhöhle von der weichen Hirnhaut geschlossen werde, welche von dem daneben liegenden plexus choroideus kommt, und daß dieser über die auseinander weichenden corpora restiformia hingespannte Theil dieser Haut bei Erwachsenen nicht selten, bei Embryonen, nach Tiedemann, immer inwendig von einer dünnen Lage grauer Gehirnsubstanz überzogen ist, welche folglich die beiden corpora restiformia durch eine Art von Brücke unter einander verbindet. Endlich ist zu erwähnen, daß J. F. Meckel [1]) beobachtet hat, daß auch die vorderen Pyramiden zuweilen nahe an der Stelle, wo sie in die Substanz der Brücke eintreten, durch eine kleine 1½ Linie hohe markige, quere Commissur vereinigt werden.

Entwickelung des verlängertrn Marks.

Hinsichtlich der Entwickelung des verlängerten Marks bei den Embryonen ist zu bemerken, daß die Durchkreuzung der Pyramiden von Tiedemann und Serres schon bei sehr kleinen Embryonen beobachtet worden ist, daß die Oliven von Carus schon im 3ten Monate, von J. F. Meckel bei 5monatlichen Embryonen, und von Tiedemann erst am Ende des 6ten Monats unterschieden wurden. Tiedemann sah bei Embryonen, daß die Fasern der Oliven theils zu den

[1]) Meckel, Handbuch d. Anatomie, B. 3. S. 451.

Vierhügeln emporsteigen, sich daselbst mit den der andern Seite vereinigen, das Gewölbe des Aquaeductus Sylvii bilden, theils aber zum Sehhügel gelangen.

Das verlängerte Mark der Säugethiere.

Die hinter der Oeffnung der 4ten Hirnhöhle über die Corpora restiformia hingespannte, die 4te Hirnhöhle verschließende graue Platte existirt, nach Tiedemann, bei den Säugethieren das ganze Leben hindurch.

Rolando bemerkt, daß die Kreuzung der Pyramiden bei ihnen nicht einmal so deutlich als bei dem Menschen sei; ferner, G. R. Treviranus[1]) sah, daß die vorderen Rückenmarkbündel, welche bei Säugethieren an der Stelle der Oliven des Menschen liegen, keinen solchen gezackten Kern enthalten, wie diese. Sie sind hier von einer queren, von der Gegend des Ursprungs der Gehörnerven herkommenden Binde umgeben, welche Treviranus corpus trapezoideum nennt, und welche quer über die Mittelspalte hinweggeht, während die processus arciformes, die nach Rolando auch bei den Säugethieren vorhanden sind, nur höchstens bis zu der Mittelspalte gehen[2]). Je kleiner bei den Säugethieren die Brücke ist, desto größer ist diese Binde. Bei den Vögeln, wo die Brücke ganz fehlt, umgiebt sie die ganze untere Fläche des verlängerten Marks, und ist bisweilen mit der Brücke verwechselt worden. Alle von Rolando untersuchte Säugethiere besaßen die zwischen den hinteren Rückenmarkbündeln befindlichen hinteren Pyramiden. Viele Säugethiere haben auch nach ihm die über das Ende des 4ten Ventrikels und über die Corpora restiformia hingespannte Lamelle.

Die Brücke.

Die Brücke, pons Varolii, oder der Hirnknoten, protuberantia annularis. Unter diesem Namen verstehe ich hier die Vereinigung von Querfasern, von Längenfasern und von grauer, die Zwischenräume erfüllender Substanz, durch welche ein etwa viereckiger, gebogener Hirntheil gebildet wird, dessen längster Durchmesser quer zwischen den Seitentheilen des kleinen Gehirns liegt, dessen kürzerere Durchmesser von unten aufwärts, und von vorn nach hinten gegen das Mittelstück des kleinen Gehirns gerichtet ist. Ihre vordere Oberfläche ist ein wenig der Länge nach und sehr stark der Quere nach gewölbt, und liegt an der Vereinigungsstelle des Grundtheils des Keilbeins und des Hinterhauptbeins, jedoch mehr in senkrechter Lage, als die Oberfläche dieses Knochens, und hat in ihrer Mitte eine Furche, in welcher die A. basilaris liegt. Ihre hintere Oberfläche ist ein wenig der Quere nach concav, und der von dem Mittelstücke des kleinen Gehirns gebildeten Höhle zugekehrt. Das Mittelstück des kleinen Gehirns hat nämlich die Gestalt einer dicken Scheibe, aus welcher nach vorn ein keilförmiges Stückchen herausgeschnitten ist. Der äußere Rand dieser Scheibe ist durch sehr viele tiefe Einschnitte in querlaufende Zacken (Windungen) getheilt, die daselbst wieder von neuem durch kleinere quere Kerben zackig sind. Dieses scheibenförmige Mittelstück liegt nun so hinter der Brücke, daß die hintere Oberfläche der Brücke nach der inneren Stelle desselben gekehrt ist, wo ein keilförmiges Stück aus demselben fehlt. Hierdurch entsteht zwischen der Brücke und dem Mittelstücke eine Höhle, welche man die vierte Hirnhöhle oder den Ventrikel des kleinen Gehirns nennt. Die hintere Wand dieser Höhle wird von jenem Ausschnitte des scheibenförmigen Mittelstückes des kleinen Gehirns gebildet, und vergrößert sich noch dadurch, daß von dem über dem Ausschnitte gelegenen ersten Zacken eine aus weißer und grauer Gehirnsubstanz bestehende Platte (die vordere Hirnklappe, valvula cerebelli anterior) bis zu den Vierhügeln hinauf geht, und daß von dem ersten Zacken unter dem Ausschnitte eine großentheils aus weißer Substanz gebildete dünnere Platte (die hintere Hirnklappe, valvula cerebelli posterior) herabhängt, und seitwärts an den Seitentheilen des kleinen

---

[1]) *G. R. Treviranus* und *L. Ch. Treviranus*, Vermischte Schriften anatomischen und physiologischen Inhalts. B. III. Bremen 1820. 4. Ueber die Verschiedenheiten der Gestalt und Lage der Hirnorgane in den verschiedenen Classen des Thierreichs, p. 12.

[2]) *Malacarne*, Memorie della academia in Mantova. T. I. p. 87 nannte sie *Lastre midollare*, Gall Querbrücke hinter der Varolsbrücke.

Digitized by Google

Gehirns befestigt ist. Die erstere Platte ist inwendig eben und weiß, und äußerlich durch quere Falten uneben, die wie die Windungen des kleinen Gehirns aus einer weißen inneren und aus einer grauen äußeren Lage bestehen.

Die vordere Wand der vierten Hirnhöhle wird, wie schon oben gesagt worden, durch die hintere Oberfläche der Brücke und der Hirnschenkel gebildet.

Die Seitenwände der vierten Hirnhöhle werden durch die Seitentheile des kleinen Gehirns, die inwendig auch ein wenig ausgehöhlt sind, und durch die aus ihnen hervorkommenden Markschenkel gebildet, der obere Theil der Seitenwände nämlich durch die oberen Schenkel des kleinen Gehirns, welche zu den Vierhügeln emporsteigen, processus cerebelli ad corpora quadrigemina, der untere durch die unteren Schenkel des kleinen Gehirns, processus cerebelli ad medullam oblongatam oder corpora restiformia, welche zum verlängerten Marke herunter gehen und sich daselbst in die hinteren Rückenmarkbündel fortsetzen. Endlich der mittelste und weiteste Theil dieser Höhle durch die Seitentheile des kleinen Gehirns und durch die zur Brücke gehenden vorderen Schenkel des kleinen Gehirns, processus cerebelli ad pontem. Denn denkt man sich die Brücke, beide Seitenhälften und das Mittelstück des kleinen Gehirns als ein einziges Ganzes, so stellen sie einen Ring dar, dessen Loch die vierte Hirnhöhle ist, dessen Reif vorn von der Brücke, hinten von den Seitentheilen und von dem Mittelstücke des kleinen Gehirns gebildet wird.

Diese vierte Hirnhöhle steht nun nach unten offen, oder ist daselbst von einer Haut verschlossen, mit welcher man zuweilen eine sichtbare Platte von Gehirnsubstanz verbunden findet, oben verlängert sie sich in einen Canal, aquaeductus Sylvii, die Wasserleitung des Sylvius, der zwischen den Vierhügeln und den Hirnschenkeln zur dritten Hirnhöhle (d. h. zu dem zwischen den Sehhügeln befindlichen engen Raume) emporsteigt. Inwendig ist die vierte Hirnhöhle glatt und ziemlich weiß, und wie es scheint, von einer durchsichtigen Fortsetzung, der pia mater (epithelium derselben) überzogen.

An der gewölbten vorderen Oberfläche der Brücke liegen bis zu einer gewissen Tiefe nur Querfasern, welche aus der Mitte der einen Seitenhälfte des kleinen Gehirns in die Mitte der andern Seitenhälfte hinübergehen, an der concaven hinteren, der vierten Hirnhöhle zugekehrten Oberfläche der Brücke liegen keine Querfasern, sondern nur Längenfasern, welche von den Olivenbündeln des verlängerten Marks zu den Vierhügeln, zu der Wasserleitung und zu den Hirnschenkeln, alle aber zu den Sehhügeln und zu dem großen Gehirne emporsteigen; auch sieht man hier formlose Materie. Zwischen beiden Lagen befindet sich ein Theil der Brücke, welcher aus Längenfasern und aus Querfasern besteht, welche sich fast rechtwinklich durchkreuzen und durchflechten, aus Längenfasern nämlich, die die Fortsetzung der Pyramiden sind, und zu den Hirnschenkeln, zum gestreiften Körper und zum Sehhügel emporgehen, und aus Querfasern, die von derselben Art sind, als die schon früher erwähnten. Die zwischen diesen Fasern befindlichen Zwischenräume werden in der Brücke von grauer Substanz ausgefüllt.

In der Mittellinie der hinteren Oberfläche der Brücke befindet sich die Spur einer Spalte, die Fortsetzung der hinteren Mittelspalte des verlängerten Marks, und zu beiden Seiten neben ihr sieht man 2 schmale Bündel, die fortgesetzten vorderen Bündel des Rückenmarks, welche hier nicht mehr von den hinteren Bündeln bedeckt werden, und zu der Gegend der Wasserleitung emporsteigen. Sie sind mit einer Lage halbgrauer Substanz und von dem Epithelium bedeckt. Aus dieser mittlern vertieften Linie kommen mehrere unter dem Epithelium liegende weiße, meistens quer zu den mittlern Schenkeln des kleinen Gehirns laufende, auf beiden Seiten oft nicht symmetrisch liegende Streifen, die wie weiße Markfäden aussehen, hervor. Man findet, daß sie sehr vielen Verschiedenheiten unterworfen sind, man mag nun ihre Zahl, oder ihre Größe, oder ihren Verlauf berücksichtigen. Prochaska, Wenzel und J. F. Meckel sahen sie bisweilen auf einer oder auf beiden Seiten ganz fehlen. Bisweilen laufen einige aufwärts zu den obern Schenkeln des kleinen Gehirns. Zuweilen verflechten sie sich. Nach mehreren Anatomen hängen einige derselben mit den Wurzeln des Gehörnerven zusammen.

Mit diesen weißen Streifen darf man die queren grauen, von Wenzel sehr genau beschriebenen Leisten nicht verwechseln, welche sehr beständig mit den Wurzeln des Hörnerven zusammenzuhängen scheinen. Sie sind dicker, gehen nicht ganz bis zur Mittellinie, und liegen meistens symmetrisch. Auf jeder Seite

Digitized by Google

ist nur eine solche Leiste, die aber oft in der Nähe der Mittellinien in mehrere getheilt ist.

Die Querfasern der Brücke liegen nicht ganz parallel. Rolando glaubt 3 Abtheilungen an derselben unterscheiden zu können, die obere und die untere Abtheilung hätten eine quere Lage. Die mittlere aber läge sehr oberflächlich und kreuzte sich mit der unteren, weil sie stärker gekrümmt wäre und deswegen an der Seite sehr aufwärts ginge. Sie soll, nach ihm, nicht nur mit den mittleren Schenkeln des kleinen Gehirns, sondern mit den corporibus restiformibus zusammenhängen, und dem Theile entsprechen, welchen G. R. Treviranus bei den Säugethieren corpus trapezoideum genannt hat.

Kleines Gehirn, cerebellum.

Die von dem verlängerten Marke zum kleinen Gehirne übergehenden unteren Schenkel des kleinen Gehirns, die die Brücke bildenden mittleren Schenkel des kleinen Gehirns und endlich die mit den Vierhügeln in Verbindung stehenden oberen Schenkel des kleinen Gehirns vereinigen sich in der weißen Substanz des kleinen Gehirns. An der Vereinigungsstelle derselben liegt in der rechten und linken Seitenhöhle des kleinen Gehirns ein von einer gelblichen gefalteten Schale umgebener grauer Kern, corpus ciliare, der gezahnte Körper, welcher dem sehr ähnlich ist, welcher sich in dem Innern der Oliven befindet. Er ist runder und größer. Auf der Durchschnittsfläche eines senkrechten oder horizontalen, durch die Hemisphäre des kleinen Gehirns und durch die 4te Hirnhöhle geführten Schnittes zeigt sich die Schale dieses Kerns unter der Form einer zackigen, graugelblichen Linie, welche nicht in sich selbst zurückläuft, sondern mit der Wand der 4ten Hirnhöhle in Verbindung tritt. In jeder Hemisphäre ist ein solcher Kern. Beide Kerne hängen nicht unter einander unmittelbar zusammen, daher sieht man von diesem Kerne nichts, wenn man das Mittelstück des kleinen Gehirns durch einen senkrechten Schnitt in 2 gleiche Hälften theilt.

Jeden von den 3 Schenkeln des kleinen Gehirns kann man, wenn man an einem in Weingeiste erhärteten kleinen Gehirne in einer passenden Richtung Stücken losreißt, so darstellen, daß er zu der Hemisphäre und zu dem Wurm Blätter und Fasern zu schicken scheint. Man hat daher die Meinung, daß die Blätter und Fasern aller 3 Schenkel durch einander durchgehen, und daß an der Stelle dieser Durchkreuzung in jeder Seitenhälfte das Corpus ciliare liege. Die Darstellung der Fasern eines Schenkels beruht aber darauf, daß die Fasern des andern Schenkel bei dem Auseinanderziehen der Hirnstücken abgebrochen werden und daß nur diejenigen Fasern ganz bleiben, in deren Richtung die Theilung bewirkt wird. In der That scheint eine solche Vorstellung von der Lage der Fasern im kleinen Gehirne bestätigt zu werden, wenn man das in Weingeiste erhärtete kleine Gehirn in der Nähe der tiefen Horizontalspalte in einer dieser Spalte parallelen Richtung von hinten nach vorn in eine obere und in eine untere Hälfte zerreißt, denn diese Richtung ist ungefähr die mittlere zwischen den Richtungen der 3 Schenkel, und es werden dabei die Fasern keines der 3 Schenkel gänzlich abgebrochen. Bei dieser zuerst von Reil ausgeführten Operation sieht man nun, daß die Fasern jeder Hemisphäre des kleinen Gehirns nach der Eintrittsstelle der 3 Schenkel zu convergiren, daß sie in der Nähe der Peripherie in feinere Bündel zertheilt liegen, die so wenig von einander in der Richtung abweichen, daß man die Fasern der verschiedenen Schenkel noch nicht von einander unterscheiden kann, daß man aber, wenn man dem Durchkreuzungspunkte beim Auseinanderreißen näher kommt, dickere, zum Theil cylindrische Bündel durch einander durchgehen und sich ästig theilen sieht. Bei dieser Verfahrungsart laufen die Fasern des Mittelstücks ziemlich parallel und gerade von hinten nach vorn, dagegen convergiren die Fasern der Hemisphären nach dem Corpus ciliare zu. Sehr merkwürdig ist es aber, daß fast alle hierdurch sichtbar gewordenen Fasern an gewissen Stellen gemeinschaftlich eine kleine Beugung machen, und dann ihren Weg fortsetzen, daß also der Kern des kleinen Gehirns von einigen concentrischen Linien umgeben ist, an welchen die Fasern diese Beugung machen, und daß das kleine Gehirn sich in diesen Linien in mehrere hohle, um den Kern desselben herumgehende, in einander eingeschlossene Schalen theilen läßt, so daß Reil mutmaßt, daß die von einem Schenkel des kleinen Gehirns ausgegangenen Fasern keineswegs ununterbrochen bis zur Oberfläche des kleinen Gehirns fortgehen, sie

dern daß sie aus mehreren an einander-passenden und von einander leicht trennbaren Stücken bestehen.

Von dem Kerne des kleinen Gehirns gehen nach vielen Richtungen eine gewisse Anzahl dicker, weißer Markwände aus [1]), von denen jede die Grundlage für einen Hauptlappen des kleinen Gehirns bildet. Diese Markwände lösen sich an der Stelle, wo sie auf dem Kerne der Hemisphäre aufsitzen, leicht los, und zwar so, daß die Trennungsfläche an der losgelöseten Wand concav ist, und also eine Rinne bildet, an dem Kerne der Hemisphäre aber conver ist, und also einen Vorsprung bildet, welchen Reil einen Riff nennt.

Jede solche Wand spaltet sich in mehrere dicke Markplatten, von denen jede die Grundlage eines von den vielen, an dem Hauptlappen befindlichen Nebenlappen ist. Auch diese dicken Platten lösen sich leicht von den Stellen los, wo sie an der noch dickeren Wand des Hauptlappens angewachsen sind, und die Trennungsfläche der Platte zeigt dabei eine ziemlich tiefe, spitz ausgehende Furche, während dagegen dieselbe an der markigen Wand des Hauptlappens einen spitz auslaufenden Vorsprung hat, der in die Furche eingriff, als noch beide Theile mit einander in Verbindung waren. Dasselbe findet nun auch da Statt, wo noch kleinere Läppchen von diesen Lappen ausgehen. Die dünnsten weißen plattenartigen Productionen dieser vielfach gespaltenen Markplatten sind endlich von einer ½ Linie bis ¾ Linie dicken Lage grauer Substanz überzogen, welche von einem Blättchen auf das andere, und von einem Läppchen auf das benachbarte Läppchen, und eben so von einem Lappen auf den benachbarten Lappen ununterbrochen durch die zwischen denselben liegenden Vertiefungen hindurch fortgeht. Auch diese graue Platte löset sich im erhärteten Zustande leicht von der weißen Unterlage ab, und läßt sich oft wie eine zusammengefaltete Haut in zusammenhängenden Stücken abschälen. Nur in der großen horizontalen Furche an der Stelle, wo der Schenkel für die Brücke hervortritt, ist die Lage der grauen Substanz so dünn, oder fehlt zum Theil so ganz, daß man sie hier nicht vom Anfange einer Windung zur gegenüber liegenden verfolgen kann. An diesem Schenkel liegt daher der kleinste Lappen der Hemisphäre des kleinen Gehirns sehr isolirt wie ein Markbäumchen, das von grauer Substanz überzogen ist, und an welchem man das Verhalten der Fasern im Kleinen sehr übersehbar wahrnehmen kann, welches an den größeren Theilen viel verborgener und verwickelter ist. Der graue Ueberzug endigt sich an den Spalten, durch welche die Schenkel aus dem kleinen Gehirne hervortreten, und an der Oeffnung, durch welche die Höhle des kleinen Gehirns nach außen offen steht; hier hängt er mit dem inneren Ueberzuge dieser Höhle zusammen, der in der Mitte zwischen grauer und weißer Substanz zu stehen scheint.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Markplatten oder die Markfasern, die den gegenüber liegenden Schenkeln ausgehen, in einander ununterbrochen übergehen, z. B. daß die Markplatten und Fasern, die von dem rechten Schenkel der Brücke ausgehen, sich ununterbrochen in die Platten oder Fasern, die vom linken Schenkel der Brücke ausgehen, fortsetzen, und daß auf gleiche Weise in jeder Hemisphäre des kleinen Gehirns die Platten oder Fasern, die vom unteren Schenkel des kleinen Gehirns ausgehen, sich ununterbrochen in die Platten fortsetzen, welche vom oberen Schenkel des kleinen Gehirns ausgehen. Ist diese Vermuthung richtig, so giebt es 2 Classen von Markplatten oder Markfasern im kleinen Gehirne, die an den mittleren Schenkeln (Brückenschenkeln) welche quere Ringe bilden, und also in sich selbst abgeschlossen sind, und die der untern und obern Schenkel (Rückenmarkschenkel und Vierhügelschenkel) welche keine Ringe bilden und also nicht in sich selbst abgeschlossen sind, sondern Fortsetzungen der Fasern sind, die der Länge nach durch das Centrum des Nervensystems gehen.

Entwickelung des kleinen Gehirns und der Brücke beim Embryo und bei verschiedenen Thieren.

Hinsichtlich der Entstehung und Entwickelung des kleinen Gehirns und der Brücke bei dem menschlichen Embryo findet man unter andern Folgendes: Das

[1]) *Reil*, im Archive für die Physiol. B. VIII. 1808. p. 385 sq.

Digitized by Google

kleine Gehirn ist bei sehr kleinen Embryonen, nach Meckel [1]) und Tiedemann, eine in eine einfache Querfalte erhobene Platte, welche von den hinteren Hirnschenkeln ununterbrochen zu den Vierhügeln übergeht, die selbst wieder aus einer auf eine ähnliche Weise gebildeten erhobenen Falte bestehen, aber anfangs sehr groß sind. Die 4te Hirnhöhle ist daher gleichfalls lange Zeit sehr groß und hängt nicht, wie später, durch einen engen Canal, aquaeductus Sylvii, sondern ununterbrochen mit der 3ten Hirnhöhle zusammen. Nach Carus enthält das Corpus ciliare im 3ten Monate eine Höhle. Die Größe der Brücke steht mit der Größe der Hemisphären des kleinen Gehirns im Verhältnisse. Bei kleinen Embryonen sind die Hemisphären verhältnißmäßig zu dem Mittelstücke sehr klein, und bei ihnen ist es auch die Brücke. Dasselbe findet auch bei den Säugethieren Statt, und bei den Vögeln, wo es nur ein kleines Rudiment der Hemisphären giebt, fehlt die Brücke ganz. Die Größe der Brücke steht daher im Verhältnisse zur Größe der Seitentheile, nicht aber zu der des Mittelstücks des kleinen Gehirns; dagegen mag die Größe des Mittelstücks in einem gewissen Verhältnisse stehen zur Größe der in dasselbe eintretenden unteren und oberen Schenkel des kleinen Gehirns. Die Ausbildung der durch das kleine Gehirn gehenden Längenfasern steht folglich weder bei Embryonen von verschiedenem Alter, noch bei verschiedenen Thierclassen in einem bestimmten Verhältnisse zu der Größe der im kleinen Gehirne und in der Brücke liegenden Querfasern. Die Brücke bildet sich, nach Tiedemann, bei dem menschlichen Embryo erst in die Zeit des 4ten Monats. Die Windungen des kleinen Gehirns entstehen, nach Meckel und Tiedemann, durch eine Faltung der anfangs glatten Haut.

Die Hirnschenkel, crura oder pedunculi cerebri, und die Vierhügel, corpora quadrigemina, oder eminentia bigemina.

Die Hirnschenkel sind 2 dicke, ziemlich cylindrische, etwa $\frac{2}{3}$ eines Zolls lange, aus Längenfasern bestehende Bündel, welche diejenigen Längenfasern enthalten, die theils (als Pyramiden) zwischen den Querfasern der Brücke, theils (als die die Oliven einschließenden vorderen Rückenmarkbündel) hinter ihnen an der concaven Seite der Brücke emporgestiegen sind. An ihrer Oberfläche sind sie weiß und haben sehr sichtbare, am rechten Hirnschenkel links und am linken rechtsgewundene Furchen, und dazwischen gebogene Faserbündel, und werden, je höher sie emporsteigen, desto dicker. Zwischen ihnen liegt graue Substanz in einer tiefen Längenfurche, welche die Fortsetzung der vorderen Mittelspalte des verlängerten Marks ist. Diese graue Substanz verschließt die 3te Hirnhöhle von unten. Sie steigen sehr senkrecht und nur ein wenig nach vorn geneigt empor, und weichen dabei nach rechts und links auseinander, so daß die mit grauer Substanz geschlossene Vertiefung oben immer breiter wird.

Ihre hintere Seite bildet einen Theil der vorderen Wand der 4ten Hirnhöhle und des aquaeductus Sylvii. Seitwärts sind sie mit den oberen Schenkeln des kleinen Gehirns und mit den Vierhügeln verwachsen. Daher sieht man an ihrer äußeren Seite eine Furche emporsteigen, welche die Grenze zwischen ihnen und den oberen Schenkeln des kleinen Gehirns anzeigt.

Am vorderen Rande der Brücke schlagen sich einige von ihr etwas abgesonderte liegende Querfasern um die Hirnschenkel in die Furche derselben. Ein solches Bündel geht zuweilen nach der Gegend, wo der 3te Hirnnerv in dieser Furche zum Vorschein kommt. Die vordere Lage der Fasern der Hirnschenkel ist die Fortsetzung der vorderen Pyramiden. Diese Pyramiden nämlich, welche bei ihrem Eintritte zwischen die Querfasern der Brücke sehr schmal geworden waren, spalten sich hierauf in mehrere, durch jene Querfasern und durch graue Substanz getrennte Bündel, sie vergrößern sich zugleich und vereinigen sich am oberen Rande der Brücke und bilden die vorderste Lage an den Hirnschenkeln. Zu dieser kommt eine mehr hintere Lage hinzu, welche die Fortsetzung derjenigen Fasern der (die Oliven einschließenden) vorderen Rückenmarkbündel ist, welche an der hohlen Seite der Brücke hinter den Querfasern derselben emporsteigen. Es ist im Hirnschen-

[1]) *J. F. Meckel*, Archiv für die Physiologie. B. I. p. 358.

Digitized by Google

kel von den fortgesetzten Fasern der Pyramiden durch eine Lage dunkelgrauer (schwarzer) Substanz getrennt, bildet die vordere Wand der 4ten Hirnhöhle, grenzt daselbst an die oberen Schenkel des kleinen Gehirns, processus cerebelli ad corpora quadrigemina, und dringt theils unmittelbar in die Mitte des Sehhügels, theils mit einem Bündel durch die Vierhügel hindurch, in den Sehhügel ein. Dieses Bündel, welches Reil und Langenbeck genau abgebildet haben, kommt hinten am Hirnschenkel zwischen dem Processus cerebelli ad pontem und dem Processus cerebelli ad corpora quadrigemina an die Oberfläche des Hirnschenkels, geht durch die Grundfläche der Vierhügel hindurch und breitet sich hier und im Sehhügel in eine Menge strahlenförmig auseinander weichender Fasern aus [1]). Diese neben der oberen Spitze der Olive und neben der Pyramide in die Brücke tretenden, hinter ihren Querfasern emporsteigenden Bündel, nennt Reil die Schleife, lemniscus.

Die Vierhügel, corpora quadrigemina, hängen demnach so genau mit den Hirnschenkeln zusammen, daß es, die Stelle ausgenommen wo die Wasserleitung zwischen diesen Theilen liegt, keine bestimmte Grenze zwischen ihnen giebt. Diese 4 unter einander verschmolzenen grauen, von einer sehr dünnen weißen Lage an ihrer Oberfläche überzogenen Hügel, sind nach oben und hinten gerichtet, und an der eben dahin gekehrten Oberfläche der Hirnschenkel angewachsen. Weil sie auf den weißen, strahlenförmig auseinander gehenden Fasern der Schleife aufsitzen, und auch an ihrer Oberfläche mit einer dünnen Lage weißer Substanz bedeckt sind, so sieht man, wenn man sie durchschneidet, eine graue Lage zwischen 2 weißen Lagen. Die 2 vorderen Hügel, nates, und die 2 hinteren, testes, sind ziemlich von gleicher Größe. Bei den fleischfressenden Thieren pflegen, wie Treviranus [2]) noch neuerlich bestätigt, die hinteren, bei den wiederkäuenden dagegen die vorderen größer zu sein. Sie vereinigen die hinteren Theile der Sehhügel, in die sie seitwärts übergehen, und hierdurch die beiden Hirnhälften. Ein weißes, queres, an dem vorderen Rande der Vierhügel, dicht über der Oeffnung der Wasserleitung gelegenes Bündel, führt auch den Namen der hinteren Commissur, commissura posterior. Zugleich vermitteln sie und die zu ihnen übergehenden oberen Schenkel des kleinen Gehirns die Verbindung des kleinen Gehirns mit dem großen, von welchem dasselbe außerdem so sehr abgesondert ist. Diese Schenkel sind die kleinsten unter allen Schenkeln des kleinen Gehirns, fast wie eine Binde platt, in den Vierhügeln unter einander bogenförmig verbunden, und außerdem auch durch die vordere Hirnklappe vereinigt, welche offenbar den Zweck hat, das Mittelstück des kleinen Gehirns mit den Vierhügeln zu vereinigen. Da, wo sie sich an die Vierhügel ansetzt, befindet sich in der Mittellinie ein von ihr zu den Vierhügeln übergehender, dickerer Strang, frenulum. Seitwärts gehen von jedem Paare der Vierhügel erhabene Streifen zu den Sehhügeln, und zwischen diesen Streifen befindet sich an der Furche, welche die Vierhügel von den Hirnschenkeln trennt ein kleiner, ovaler, grauer Hügel, der innere Kniehöcker, corpus geniculatum internum. Er ist nicht mit dem äußeren Kniehöcker, corpus geniculatum externum zu vergleichen, welcher äußerlich weiß, und am Sehhügel selbst befindlich ist, und mit dem vom vorderen Paare der Vierhügel ausgehenden erhabenen Streifen in Verbindung steht. Die Kniehöcker, jene Streifen und dadurch auch die Vierhügel, vorzüglich aber das Corpus geniculatum externum, hängen mit dem Streifen des entspringenden Sehnerven zusammen.

Der Sehnerv benagt sich an der Grenze des in den Sehhügel eindringenden Hirnschenkels zur Grundfläche des Gehirns herum, und bildet daselbst vor dem Tuber cinereum die Vereinigung der Sehnerven, chiasma nervorum opticorum.

Daß die Vierhügel die Verbindung des kleinen Gehirns mit dem großen bewirken, sieht man bei kleinen Embryonen sehr deutlich, wo diese beiden Abtheilungen des Gehirns von einer einzigen in 2 Falten erhobenen Membran gebildet werden. Die Falte, welche dem kleinen Gehirne entspricht, ist anfangs beträcht-

---

[1]) *Reil*, im Archiv für die Physiologie. B. IX. 1809. Tafel XI. v. x.
Langenbeck, Icones anatomicae Nevrologia. Fasc. I. Tafel XXXI. k. m.

[2]) *Treviranus*, Vermischte Schriften. 1820. B. III. 4. p. 72.

Digitized by Google

lich kleiner als die, welche den Vierhügeln entspricht. Unter dieser Falte befindet sich eben so gut als unter der, welche das kleine Gehirn darstellt, eine große Höhle, durch welche die 4te und die 3te Hirnhöhle ohne Absatz in einander übergehen. Dadurch, daß der hohle Raum jener Falte durch feste Substanz ausgefüllt wird, verwandelt sich jene Höhle nach und nach in den engen aquaeductus Sylvii. Bis zum 4ten oder 5ten Monate des Embryolebens, nach Carus, liegen die Vierhügel unbedeckt, dann aber wachsen die hinteren Lappen des großen Gehirns über sie hinweg.

Nach Meckel ist jene Falte, welche die Vierhügel darstellt, anfangs eine einfache Falte, welche zuerst durch einen Längeneindruck in 2 Seitenhälften, und bald darauf im 7ten Monat durch einen queren Eindruck in ein vorderes und in ein hinteres Paar Hügel getheilt wird.

Merkwürdig ist es, daß die Vierhügel bei den Säugethieren größer als bei den Menschen sind, und daß sie bei denen vorzüglich groß sind, bei welchen, wie bei den Nagethieren, das übrige Gehirn verhältnißmäßig sehr klein und sehr wenig ausgebildet ist. Sie sind bei manchen Säugethieren absolut größer als bei dem Menschen. Dieses ist um so schwerer zu erklären, weil wir, wie Treviranus bemerkt hat, keinen anderen Hirntheil kennen, der hierin den Vierhügeln gliche und mit ihnen in einem bestimmten Verhältnisse der Größe stünde. Ihre Größe scheint folglich in einem gewissen Grade unabhängig von der Größe anderer Hirntheile zu sein. Zwar hat Gall das vordere Paar der Vierhügel als die Ursprungsstelle der Sehnerven angesehen, und behauptet, daß auch die Größe desselben bei verschiedenen Thieren der Größe der Sehnerven entspreche. Treviranus [1]) hat indessen, wie bei der Beschreibung der Sehnerven gesagt worden wird, gezeigt, daß der Sehnerv an mehreren Stellen des Gehirns seinen Anfang nehme, und daß die Vierhügel bei denjenigen Thieren, bei welchen, wie beim Maulwurfe, der Sehnerv ein fast unsichtbares, nicht bis zu den Vierhügeln gelangendes Fädchen ist, eine bedeutende Größe haben, und nicht kleiner sind als bei vielen Thieren, bei welchen der Sehnerv beträchtlich dick ist.

Vergleichung des großen Gehirns mit dem kleinen.

Es ist nicht zu verkennen, daß eine gewisse Aehnlichkeit zwischen der Bildung des kleinen und des großen Gehirns Statt finde. Seit Gall stimmen alle Anatomen darin überein, daß die Hemisphären des großen Gehirns mit den Hemisphären des kleinen Gehirns, der Balken mit der Brücke, die Hirnschenkel mit dem verlängerten Marke verglichen werden müssen. Aus dieser Vergleichung sieht man aber ein, daß das große Gehirn fast eine umgekehrte Lage hat.

Das kleine Gehirn und seine Brücke bilden nämlich zusammengenommen einen Ring. Dieser Ring besteht aus 2 Hemisphären und aus 2 dieselben verbindenden mittleren unpaaren Theilen, dem sogenannten Wurme (einer ununterbrochenen Fortsetzung der Hemisphären) und der Brücke (einer weißen, aus einer Hemisphäre in die andere gehenden Markbinde).

Das große Gehirn bildet gleichfalls einen Ring, welcher aus 2 mit Windungen versehenen Hemisphären und aus 2 dieselben verbindenden unpaaren Theilen besteht. An der Stelle des Wurms ist hier die graue Lage da, welche die Hemisphären vor den Hirnschenkeln auf der Grundfläche des Gehirns verbindet, die sich aber allerdings dadurch von dem Mittelstücke des kleinen Gehirns unterscheidet, daß sie wenig weiße Substanz enthält und keine Windungen besitzt. Wäre diese Lage mit Windungen versehen, so wäre die Aehnlichkeit derselben mit dem Wurme unverkennbar. An der Stelle des 2ten unpaaren Verbindungstheils, der aus queren weißen Fasern bestehenden gewölbten Brücke, ist der Balken da, der auch aus queren weißen Fasern bestehet, welche aus der Mitte der einen Hemisphäre des großen Gehirns in die Mitte der anderen Hemisphäre dringen. In die Seitentheile des Ringes des kleinen Gehirns treten 2 aus fortgesetzten Längenfasern des Rückenmarks bestehende untere Schenkel ein, und breiten sich in denselben mit divergirenden Blättern und Fasern aus. Eben so treten 2 aus fortgesetzten Längenfasern des Rückenmarks bestehende Hirnschenkel in die 2 Sei-

[1]) *G. R. Treviranus*, a. a. O. S. 76.

Digitized by Google

entheile des Ringes des großen Gehirns ein, und breiten sich in denselben mit divergirenden Blättern und Fasern aus [1]).

Fasern, welche die Fortsetzung der Hirnschenkel und des Balkens sind.

Der Sehhügel, thalamus nervorum opticorum (Corpus striatum posterius nach Vieussens, Ganglion cerebri posticum, nach Gall) und der gestreifte Körper, corpus striatum, (Corpus striatum anticum nach Vieussens, Ganglion cerebri anticum nach Gall) sind 2 an der inneren Seite jeder Hemisphäre des Gehirns in einer ovalen Vertiefung derselben emporragende, oben schon beschriebene, Hügel.

In die Sehhügel, die weiter nach unten und hinten liegen und eine weißere Oberfläche haben, pflanzen sich von unten und von hinten die Hirnschenkel und die mit ihnen verschmolzenen Vierhügel ein. Die Fasern dieser Theile weichen in diesen Hügeln auseinander, werden durch graue Substanz getrennt und vermehren sich, während sie durch dieselben hindurch gehen. Manche Fasern gehen erst durch den Sehhügel, und dann auch durch den gestreiften Körper hindurch, manche Fasern scheinen von der inneren Seite der Hirnschenkel aus nur in den gestreiften Körper überzugehen, ohne vorher durch den Sehhügel hindurch gegangen zu sein, noch andere endlich (namentlich die nach hinten, nach außen und die nach unten laufenden Fasern) gehen nur durch den Sehhügel hindurch. Manche Bündel scheinen sich in dem gestreiften Körper in kleinere zu zertheilen und sich wieder unter einander zu vereinigen. An der Seite, an welcher diese Hügel mit der Marksubstanz der Hemisphären des großen Gehirns verschmolzen sind, gehen die fortgehenden Fasern, wie die Federn eines Federbusches gekrümmt, zu fast allen Win-

---

[1]) Man kann diese Analogie, oder Vergleichung des großen und kleinen Gehirns, noch weiter verfolgen. Indessen thut man wohl, dabei vorsichtig zu sein, und Vermuthungen, welche selbst auf einer etwas entfernten Analogie beruhen, nicht für ausgemachte Wahrheiten zu halten. Ich bemerke daher, daß folgende Vergleichungen noch mehrere Einwendungen zulassen. Einige Bundel von Längenfasern, die Fortsetzungen der vorderen Rückenmarkbundel (der Oliven des verlängerten Marks), gehen an der concaven Seite der Brücke durch die Höhle des kleinen Gehirns zum großen Gehirne über, ohne sich in die Substanz des kleinen Gehirns zu verbreiten und zu endigen, und kommen zu den Sehhügeln und zu den Vierhügeln. Auf ähnliche Weise gehen auch von den in die Sehhügel des großen Gehirns eingetretenen Längenfasern einige Bündel, ohne sich sogleich in die Substanz des großen Gehirns auszubreiten, in die Corpora candicantia, und von da längs der Höhle des großen Gehirns als fornix bis an das Ende dieser großen Hirnhöhle fort. So wie jene Längenfasern des kleinen Gehirns an der concaven Seite der Brücke, und an der Wand der Höhle des kleinen Gehirns liegen, so liegen diese an der concaven Seite des Balkens und an der Wand der Höhle des großen Gehirns. Der Anfang der Höhle des großen Gehirns ist an dem Aquaeductus Sylvii, der die Höhle des kleinen Gehirns mit der des großen verbindet. Von hier aus erstreckt sie sich als 3te Hirnhöhle zwischen den Sehhügeln vorwärts, setzt sich hierauf mittels der Monroischen Oeffnungen in die Seitenventrikel fort, und geht gekrümmt über den Sehhügel herum nach hinten, und endigt sich, indem sie sich unter dem Sehhügel weg nach vorn krümmt. Die Höhlen des großen Gehirns sind also wie Widderhörner gewunden, und das Ende dieser gewundenen Höhle ist das Ende des unteren Horns des Seitenventrikels. Daß auch das vordere Ende des Gehirns, wenn man den Verlauf der Längenfasern des Gehirns berücksichtigt, nicht an der Stirn, sondern da, wo sich das untere Horn des Seitenventrikels endigt, zu suchen sei, hat Laurencet (*Laurencet*, Anatomie du cerveau dans les quatre classes d'animaux vertébrés, comparée et apliquée spécialement à celle du cerveau de l'homme; avec planches. Paris 1825. 8. Fig. XIII.) durch eine ihm eigenthümliche Zergliederung des Gehirns anschaulich gemacht, und dieselbe Ansicht wird auch dadurch, wie das Gehirn beim Embryo wächst, sehr wahrscheinlich, denn indem es wächst, krümmt sich die Höhle des Gehirns spiralförmig, und das Ende der Hirnhöhle, welches man später das Ende des unteren Horns des Seitenventrikels nennt, ist bei der wachsenden sich krümmenden Höhle der vorausgehende Theil.

Digitized by Google

dungen des großen Gehirnes fort. Von dieser ersten Classe von Fasern ist eine 2te Classe von Fasern zu unterscheiden.

Von den meisten Windungen der Hemisphären des großen Gehirns kommen nämlich ziemlich querlaufende Fasern, welche ununterbrochen aus einer Hemisphäre in die andere gehen und dadurch in der mittleren Ebene des Körpers den Hirnbalken, so wie auch die vordere und hintere Commissur bilden. In der Nähe der Oberfläche der Windungen des großen Gehirns haben die von den Vierhügeln und von den Hirnschenkeln ausgegangenen, und die in dem Balken und in den Commissuren zusammenkommenden Fasern ziemlich eine und dieselbe Richtung, und hier lassen sich die Fasern an durch Weingeist erhärteten Gehirnen leicht darstellen. Ob nun diese 2 Classen von Fasern neben einander bis zur grauen Substanz des Gehirns gehen, oder ob sie sich früher unter einander verbinden und sich umbeugen und in einander fortsetzen, läßt sich nicht entscheiden. Reil glaubte einmal in einem wasserſüchtigen Gehirne einen unmittelbaren Uebergang der fortgesetzten Fasern des Hirnschenkels in die des Balkens gesehen zu haben. Auch Tiedemann ist dieser Meinung günstig. Auf der Mitte ihres Verlaufs kreuzen sich beide Classen von Fasern, und an dieser Stelle lassen sie sich schwerer sichtbar machen, weil die eine durchrissen werden muß, damit die andere weiter verfolgt werden könne, keine von beiden Classen von Fasern sich aber gut durchreißen läßt, ohne daß die andere zugleich verletzt werde. An manchen Stellen der Wände des Seitenventrikels liegen die zu dem Balken laufenden Querfasern unbedeckt. Dieses ist namentlich an der Decke des Seitenventrikels nach innen zu und an einem großen Theile der Decke des hinteren Horns der Fall, denn hier sind sie nur vom epithelium überzogen. In einer kleinen Entfernung neben dem gestreiften Körper und neben dem Sehhügel befindet sich demnach eine gekrümmte Stelle, in welcher sich die Fasern an der Brücke und die der Hirnschenkel zu durchkreuzen anfangen. An der Stelle, wo die obere Oberfläche des Balkens in die Hemisphären eindringt, befindet sich eine Spalte, an welcher die Windungen sich endigen, indem die äußere graue Platte derselben in die weiße Substanz der Windungen übergeht. Die weiße Masse dieser Windungen besteht aus horizontalen Blättern, welche selbst wieder aus von vorn nach hinten laufenden Fasern zusammengesetzt sind. Hier kommen daher 2 horizontale Lagen von Markfasern in Berührung, die sich leicht von einander trennen lassen, und von welchen die des Balkens aus Querfasern, die der Windungen aus horizontalen Längenfasern bestehen. Etwas ähnliches findet auch an der Decke des hinteren Horns Statt. Löst man die von dem Balken herrührende horizontale Lage, die die Decke dieses Horns zunächst bildet, ab, so kommt man auf eine 2te horizontale, von den Hirnschenkeln herrührende Lage von Fasern, welche eine ganz andere, der Länge nach gehende Richtung hat. — Langenbeck hat hierüber vorzüglich gute Abbildungen herausgegeben. Neben den Vierhügeln ragen die hinteren Spitzen der Sehhügel hervor. Die Oberfläche, welche beide Sehhügel einander zukehren, ist platt und grau, und ungefähr in der Mitte durch graue Hirnsubstanz, die graue Commissur, commissura mollis, vereinigt. An der Grenze der gewölbten oberen und der platten inneren Oberfläche der Sehhügel hört der weiße Ueberzug des Sehhügels plötzlich mit einem etwas aufgeworfenen Rande auf. An dieser Stelle sollen, nach Meckel, die Sehhügel an sehr kleinen Embryonen unter einander verwachsen sein. Dieser Rand setzt sich bei dem Erwachsenen hinten in den weißen markigen Lagen fort, durch welche beide Sehhügel unter einander vereinigt werden, und an welchem die auf dem vorderen Vierhügelpaare ruhende Zirbel, glandula pinealis, oder conarium, hängt.

Die graue Substanz, welche die Windungen überzieht. Substantia corticalis.

Diese graue Substanz bildet eine etwa 1 Linie, bis 1½ Linie dicke Lage, welche über die an der Oberfläche der Windungen liegenden Enden der Markfasern des großen Gehirns ausgebreitet ist, und sich durch die Vertiefungen und über die Erhabenheiten der Windungen ununterbrochen fortzieht. Die Windungen scheinen dadurch zu entstehen, daß die beschriebenen Fasern der weißen Substanz an manchen Stellen kürzer, an manchen länger sind. Wo sie kürzer sind, entstehen die vertieften, da wo sie länger sind, die erhabenen Stellen der Windungen. Die graue Substanz, welche die Windungen und folglich auch die Enden

Digitized by Google

der bis zur Oberfläche reichenden weißen Faſern überzieht, beſteht nicht aus Faſern, welche die Fortſetzung jener weißen Faſern wären. Wenn man die weißen Faſern eines in Weingeiſt erhärteten Gehirns auseinander reißt, ſo reißt zwar auch die graue Subſtanz ſo durch, daß ſie eine faſerige Bruchfläche erhält. Dieſes rührt aber daher, daß ſie im erhärteten Zuſtande in jeder Richtung leicht durchbricht, in welcher die weißen Faſern ſich getrennt haben. Fängt man das Zerreißen bei der grauen Subſtanz an, ſo kann man an ihr keine Faſern ſichtbar machen.

Die Lage grauer Subſtanz, welche die Windungen des Gehirns überzieht, kann man daher vielleicht als eine Lage von Hirnſubſtanz betrachten, durch welche die Enden aller bis zur Oberfläche reichenden Hirnfaſern unter einander in Verbindung gebracht werden; und alſo als eine allgemeine Commiſſur für alle jene Hirnfaſern. Wäre dieſe Anſicht richtig, ſo würde man auch den Nutzen der Hirnwindungen einſehen, denn dieſer würde darin beſtehen, daß das Gehirn, vermöge ſeiner Ausbeugungen und Einbeugungen eine viel größere Oberfläche erhielte, als es haben würde, wenn die Oberfläche platt wäre, eine Oberfläche, welche hinreichend groß wäre, damit an ihr alle Hirnfaſern ſich endigen und mit der grauen Lage in Berührung kommen könnten. Hiermit würde man auch erklären können, warum das Gehirn bei Thieren, bei welchen es eine große Höhle, aber wenig Markfaſern beſitzt, ohne Windungen ſein könne, weil nämlich bei einem ſolchen Gehirne alle jene Enden der Markfaſern ſchon ohne dieß hinreichenden Platz an der Oberfläche des Gehirns finden.

Die ſehr merkwürdige Einrichtung, vermöge welcher der graue Ueberzug der Windungen ſeine Blutgefäße von außen von der Pia mater erhält, welche überall mit unzähligen, 1 bis 1½ Linien langen Zweigen ſenkrecht in ſie eindringen, aber nicht in die darunter gelegene weiße Subſtanz übergehen, und vermöge welcher die Blutgefäße in die übrige Gehirnſubſtanz von den Ventrikeln und von den grauen Oberflächen aus, an welchen das Gehirn keine Windungen hat, gelangen, und hauptſächlich in der Richtung der Markfaſern laufen, läßt auf eine wichtige Verſchiedenheit der grauen Rindenſubſtanz und der weißen Subſtanz ſchließen. Denn daraus, daß die Wege, auf welchen der grauen und der weißen Subſtanz Blut zugeführt wird, ſo ſehr verſchieden und von einander getrennt ſind, und daß die Blutgefäße dieſer in einer ſo innigen Berührung ſtehenden 2 Subſtanzen ſo wenig communiciren, läßt auf eine ſehr verſchiedene Verrichtung beider ſchließen, auf eine Verrichtung, die in beiden eine verſchiedene Art der Zuführung des Blutes nöthig macht. Der viel größere Gefäßreichthum der grauen Subſtanz läßt uns namentlich mit einiger Wahrſcheinlichkeit vermuthen, daß in ihr eine größere ernährende Thätigkeit herrſche, als in der weißen Subſtanz. Eine ſolche größere ernährende Thätigkeit kann aber aus verſchiedenen Urſachen in der grauen Subſtanz des Gehirns nöthig ſein, z. B. in dem Falle, wenn die Thätigkeit einer Markfaſer eine Thätigkeit in einer großen Strecke in der grauen Subſtanz anregen könnte; denn unter dieſen Umſtänden würde die graue Subſtanz faſt immerfort in Thätigkeit erhalten werden, während in der Markſubſtanz nur abwechſelnd bald dieſe, bald jene Faſern thätig wären, und es würde dann auch die graue Subſtanz eines reichlicheren Blutzufluſſes und einer reichlicheren Ernährung bedürfen, als die weiße.

Zirbel, glandula pinealis.

Von dem oberen Rande des Sehhügels, durch welchen die weiße obere Fläche des Sehhügels an die innere graue ſtößt, geht hinten ein weißer, aus Markfaſern beſtehender Bogen aus, durch welchen beide Sehhügel unter einander verbunden werden. An dieſem Bogen hängt ein graues, weiches, rundliches, meiſtens etwas längliches, zuweilen herzförmiges Klümpchen, von unbeſtändiger Größe, das auf den erſten Anblick einer Drüſe ähnlich iſt, bei genauerer Betrachtung aber ſich wie ein Hirntheil verhält. Bisweilen iſt er hohl und vorn offen, ſo daß ſeine Höhle, nach Sömmerring, mit der 3ten Hirnhöhle in Verbindung ſteht. Auf dem markigen Bogen, an welchem die Zirbel hängt, oder auch in ihrer Subſtanz, finden ſich, wie Sömmerring [1]) zuerſt bewieſen hat, im regelmäßigen Falle,

[1]) *S. Th. Sömmerring*, in *Nöthig* Dissert. de acervulo cerebri, und in *Ludwig* script. neurol. min. Tom. II. p. 322. sqq.

kleine Häufchen gelblicher, halbdurchsichtiger Körnchen, acervulus, welche aus ner thierischen Substanz bestehen und fast wie gelbe Sandkörnchen aussehen. Kinderhirnen sind sie blaß und werden nach dem Trocknen weiß, bei alten Leu sind sie desto gelber, je älter die Menschen sind. Nach Sömmerring [1]) der Hirnsand sogar schon bei unreifen Embryonen sichtbar sein, allein die Geb der Wenzel und J. F. Meckel widersprechen dem. Schon von der Geb an findet man nach den Brüdern Wenzel eine weiche, zuweilen halbflüssige, k rige Materie auf dem weißen Bogen; aber erst nach dem 7ten Jahre wird d Materie zum Hirnsande [2]). Die Zirbel verändert, nach Wenzel, während Wachsthums ihre Gestalt. Beim Embryo ist sie rund oder linsenförmig, bl grau und sehr weich; bis zum 7ten Jahre ist sie herzförmig und grauroth, d wird sie meistens länglich und grau, oder braunroth. Die Zirbel ist bei den S gethieren, Vögeln und Amphibien gefunden worden. Auch bei den Fischen, sie Tiedemann nicht fand, will sie Serres beobachtet haben; bei den Reb und wiederkäuenden Thieren ist sie, nach Treviranus [3]), größer, bei den Ra thieren kleiner als bei dem Menschen. Der Hirnsand wird aber, wie Tied mann [4]) bezeugt, nur bei dem Menschen, nicht bei den übrigen Säugethie (die Affen nicht ausgenommen) gefunden.

Corpora candicantia, Fornix, Taenia, Pes hippocampi maj

Auf der unteren Seite, zwischen den auseinander weichenden Hirnschenk liegt graue Substanz, und über derselben eine dünne Lage weißer, oder (wenigst im erhärteten Zustande) faseriger Substanz, welche mit der inneren Seite Hirnschenkels und mit der unter der Oeffnung des aquaeductus Sylvii befi chen, und von da zum Trichter sich erstreckenden Substanz zusammenhängt [5]). hilft den Boden der 3ten Hirnhöhle bilden. An dieser äußerst weichen Pla liegen nun die beiden auf der Grundfläche des Gehirns sichtbaren Markkug chen, corpora mammillaria, oder candicantia, 2 weiße Erhabenheiten, wel die Form der menschlichen Brüste haben. In jedes Markkügelchen dringt weißer, gebogener, aus Längenfasern bestehender Schenkel ein, welcher vorn der inneren Seite des Sehhügels in der grauen Substanz desselben verborgen li von jedem Markkügelchen geht auch wieder an der nämlichen Seite ein we gebogener Schenkel aus, der im Markkügelchen mit vielen Fasern anfängt, in der grauen, mit dem Tuber cinereum zusammenhängenden Substanz, aufw krümmt, und endlich an der vorderen Spitze des Sehhügels aus der grauen Subst hervortritt, um den Sehhügel sich herumkrümmt und den Namen Markbog fornix, erhält. Das beschriebene Markbündel von der Stelle an, wo es aus Markkügelchen austritt, bis zu der, wo es mit demselben Markbündel der ande Seite zusammenstößt, heißt vorderer Schenkel, oder vorderes Säulchen, anterius, des Fornix. Da wo dieser vordere Schenkel noch in der grauen S stanz unter dem Sehhügel verborgen ist, sieht er durch Markfasern, welch

---

[1]) S. Th. Sömmerring, ebendaselbst.

[2]) J. et C. *Wenzel*, de penitiore structura cerebri hominis et brutorum. T gae 1812. Fol. c. tab. aen. p. 155 — 165.

[3]) *G. R. Treviranus*, a. a. O. p. 19.

[4]) *Tiedemann*, Icones cerebri simiarum etc. p. 51.

[5]) Nach Vicq d'Azyr (Mém. de l'Ac. des sc. de Paris 1781. 8. p. 60 I. fig. 2. n.), welcher das Gehirn sehr genau untersuchte, indem er es planmäßig schnitt, hängt bei dem Menschen die wenige, am grauen Hügel befindliche weiße stanz, hinten mit dem verlängerten Marke zusammen (was auch Treviranus tigt); seitwärts geht von ihr eine Fortsetzung zu dem Sehenerven, und vorn bre sich zu der Sylvischen Grube und zu dem vorderen Ende des Balkens aus. Sie R. Treviranus, vermischte Schriften, B. III. 1820. S. 100. Mit allem hat Burdach die sehr zu empfehlende Methode, das Gehirn in mannigfacher Ri regelmäßig zu durchschneiden, die Durchschnittsflächen genau zu beobachten und über manche streitige Punkte Aufschluß zu geben, in seinem großen Werke üb Gehirn angewendet.

Digitized by Google

hm abgehen, die aber oft schwer aufzufinden sind, mit dem Grenzstreifen zwischen em Sehhügel und dem gestreiften Körper, und durch ein anderes Bündel von fasern mit dem Markbogen, an welchem die Zirbel hängt, in Verbindung. Jeer Schenkel des Fornix krümmt sich um die vordere Spitze des Sehhügels in ie Höhe, und weil es hier eine Stelle giebt, wo er nicht an dem Sehhügel anewachsen, oder durch die weiche Hirnhaut mit dem Sehhügel verbunden ist, so ntsteht hier zwischen dem Fornix und dem Sehhügel eine kleine Lücke, welche aan die Monroi'sche Oeffnung, foramen Monroi, nennt. Durch diese Lücke egt sich der 3te Ventrikel ununterbrochen in jeden der beiden Seitenventrikel ort. Von nun an legen sich die beiden Schenkel des Fornix an einander, und iegen wie ein Saum am unteren Rande der vom Balken herabhängenden Scheiewand, mit welcher sie verwachsen, und durch einige in sie übergehende Fasern erbunden sind. Sie decken die zwischen den Sehhügeln befindliche Spalte, oder öhle (den 3ten Ventrikel) von oben, und sind an die Sehhügel durch die Pia nater angeheftet. Da wo hinten die Scheidewand aufhört, legen sie sich an die ntere Oberfläche des Balkens an und trennen sich wieder von einander, crura osteriora fornicis, unter einem Winkel, den man die Leier, psallerium, nennt. Sie verwachsen nun mit den Fasern des Balkens, welche die Seitenwand des unteren Horns des Seitenventrikels bilden. Jeder Schenkel geht gekrümmt in das untere Horn über. Auf diesem Wege schickt er, nach Reil, Fasern in die hinteren Hirnlappen. Im unteren Horne liegt nun der letzte Theil des Fornix, als Fimbria, am concaven Rande des um den Sehhügel herumgekrümmten Pes hippocampi major, und ist durch den Plexus choroideus so mit dem Sehhügel verbunden, daß die Spalte zwischen dem Sehhügel und dem Pes hippocampi major, welche außerdem an der Grundfläche des Gehirns offen stehen würde, geschlossen ist.

Der Pes hippocampi major, der große Seepferdefuß, oder der gerollte Wulst, ist der freie wulstige Rand der sich hier endigenden Windungen des hinteren Hirnlappens in der Gegend der Fossa Sylvii, an welchem die weiße Substanz der Hirnhöhlen in die graue Substanz der Oberfläche des Gehirns ununterbrochen übergeht. Dieses ist namentlich an einem neben der Fimbria befindlichen grauen, ein wenig hervorspringenden Längenstreifen der Fall, welchem manche Anatomen den Namen Fascia denticulata gegeben haben. Nach oben, neben dem Pes hippocampi, verläuft zuweilen ein kleiner Nebenwulst, eminentia collateralis, und die auf dem Boden des hinteren Horns befindlichen Wülste führen bekanntlich den Namen Pes hippocampi minor, oder calcar avis. Der Pes hippocampi major ist also das an den Windungen des großen Gehirns, was das hintere Marksegel an den Windungen des kleinen Gehirns ist, die Stelle, an welcher die innere Oberfläche der Ventrikeln in die äußere der Windungen übergeht. Vicq d'Azyr, die Brüder Wenzel und Gall nannten sie eine nach innen gekehrte Hirnwindung. Döllinger und G. R. Treviranus [1]) erklärten sich gegen diese Ansicht. Treviranus bemerkte sehr richtig, es gebe hier einen Zusammenhang des Markes mit der äußeren Schale des Gehirns. Nach ihm stößt am keulenförmigen Ende das Mark des Hippocampus mit dem Markkerne und der grauen Substanz der Sylvischen Grube, und dadurch mit dem Anfange der Markfasern der vorderen Commissur, mit den des gestreiften Körpers und mit dem markigen Theile des Geruchsnerven zusammen. Außerdem fand Treviranus bei Säugethieren, daß der concave Rand des gerollten Wulstes einen Seitenfortsatz vom hinteren wulstförmigen Ende des Balkens erhält, der den weißen Saum bilden hilft, welcher längs desselben liegt. Bei dem Menschen und bei dem Affen ist der Pes hippocampi nach Treviranus klein, bei den Raubthieren, Nagern, Wiederkäuern, Einhufern und bei den schweineartigen Thieren ist der obere, im hinteren Horne liegende Theil desselben so breit, daß er den ganzen Sehhügel, und bei der Ratte sogar einen Theil des gestreiften Körpers bedeckt. Die Größe des Hippocampus steht bei den Säugethieren in keinem sich gleich bleibenden Verhältnisse zu der Größe der Hirnwindungen, wohl aber, wie es Treviranus scheint, mit der des Geruchsnerven.

In die weiße Masse des Pes hippocampi geht nun die Substanz des Endtheiles des Fornix über, und wird dabei schneller dünn, und erhält den Namen

[1]) G. R. Treviranus, über den Hippocampus, in den Vermischten Schriften. B. III. 1820. S. 130.

fimbria, Saum, des Pes hippocampi. Ueberblickt man daher den aus Längenfasern bestehenden Fornix, so sieht man, daß er vorn fast der ganzen Länge nach der Hirnhöhle des großen Gehirns folgt, an der Wand derselben sich um den Sehhügel herumkrümmt, und an diesem Hügel größtentheils durch die Pia mater angeheftet ist.

Scheidewand, septum pellucidum, oder lucidum.

Zwischen dem vorderen Theile des Fornix und dem Balken befindet sich in der Mittellinie des Gehirns die Scheidewand. Sie hat vorn, wo der Fornix weit vom Balken absteht, eine beträchtliche Höhe, hinten, wo sich der Fornix an den Balken anlegt, endigt sie sich spitz. Sie ist nicht einfach, sondern aus 2 an einander liegenden, nicht mit einander verwachsenen, Blättern zusammengesetzt, die man durch Einblasen von Luft leicht von einander bringen und dadurch die Höhle der Scheidewand, ventriculus septi pellucidi (die manche auch die 5te Hirnhöhle nennen), sichtbar machen kann. Wenn bei der Wassersucht des Gehirns Wasser in dieser Höhle befindlich ist, so kann man bemerken, daß sie von einer zarten Haut ausgekleidet ist [1]). Diese Höhle hängt bei Erwachsenen, im regelmäßigen Falle, nicht mit den übrigen Hirnhöhlen durch eine Oeffnung zusammen, wohl aber steht sie, nach Tiedemann [2]), bei Embryonen, mittels einer kleinen dreieckigen Oeffnung, welche sich zwischen den vorderen Schenkeln des Fornix und der vorderen Commissur befindet, mit der 3ten Hirnhöhle in Verbindung. Durch diese Oeffnung zieht sich auch die weiche Hirnhaut in die Höhle hinein. Uebrigens ist die Höhle der Scheidewand beim Embryo nicht auffallend groß, wie das bei den andern Ventrikeln der Fall ist. Die beiden Wände der Scheidewand bestehen zum Theil aus grauer Substanz, in welcher deutliche, vom Fornix ausgehende, auseinander weichende weiße Fasern zum Balken emporsteigen, die man, wie Tiedemann bemerkt, nicht als Fasern, welche vom Balken ausgehen, betrachten darf.

Quere Hirnspalte, grauer Hügel, Trichter und Hirnanhang.

Aus dem Vorhergehenden sieht man ein, daß es außer dem aquaeductus Sylvii noch eine 2te Stelle giebt, wo die Höhlen des großen Gehirns nicht durch Gehirnmasse geschlossen sind, die Querspalte nämlich. Sie fängt unter der Mitte des hinteren Randes des Balkens an. Zwischen ihm und den Vierhügeln ist nämlich eine Spalte, durch welche die Substanz an der Oberfläche der Vierhügel ununterbrochen in die Substanz an der Oberfläche der Hirnhöhlen, d. h. in die des Sehhügels und des gestreiften Körpers übergeht. Sie ist aber nicht, wie der aquaeductus Sylvii, offen, sondern durch die weiche Hirnhaut, welche hier in die Hirnhöhle eindringt, und durch die Spinnwebenhaut geschlossen. Hier treten mit diesen Häuten beträchtliche Blutgefäße in die Ventrikeln des Gehirns herein, oder, wie die Vena magna Galeni, aus ihnen heraus. Diese Spalte setzt sich nun seitwärts zwischen dem untersten Theile des Sehhügels und dem hinteren Lappen des großen Gehirns, der sich um den Sehhügel von unten her herumschlägt, fort. Denn wenn man den in den Sehhügel eindringenden Hirnschenkel auf der Grundfläche des Gehirns verfolgt, so findet man den Rand der Windungen, die den Sehhügel bedecken, hinten nicht durch Gehirnsubstanz am Sehhügel angewachsen, sondern durch die weiche Hirnhaut, die sich hier in die Hirnhöhle hineinschlägt und den Sehhügel überzieht, verschlossen. Die Windungen endigen an dieser Stelle mit einem freien wulstigen Rande, den man, wie oben bemerkt worden ist, den großen Seepferdefuß, pes hippocampi major, nennt, und der mit der vielfach gefalteten, durch Nebenfältchen und Zotten krausen Stelle der weichen Hirnhaut (plexus choroideus des unteren Horns) in Verbindung steht und an dem Sehhügel angeheftet ist. Vorn, in der Nähe der zwischen dem ver-

---

[1]) *J. F. Meckel* d. ä., Obs. sur la glande pinéale sur la cloison transparente, in Mém. de Berlin 1765. p. 96.

[2]) *Tiedemann*, Anat. und Bildungsgeschichte etc. S. 169.

Digitized by Google

deren und hinteren Hirnlappen befindlichen queren Furche, welche man Fossa Sylvii nennt, setzt sich die graue Rindensubstanz der Hirnwindungen in die des grauen Hügels (tuber cinereum) fort, und hierdurch hängt die Rindensubstanz der Windungen der rechten Seite mit der der linken Seite ununterbrochen zusammen. Durch den grauen Hügel ist die 3te Hirnhöhle von unten verschlossen.

In der Fossa Sylvii ist die graue Substanz nicht in Windungen gelegt. Sie ist aber von vielen Löcherchen durchbohrt, durch welche Blutgefäße (nicht wie anderwärts zur grauen Rinde), sondern tief in die Markmasse des Gehirns eindringen. Man nennt die an dieser Stelle gelegene durchlöcherte Gehirnsubstanz, nach Vicq d'Azyr, Substantia perforata anterior.

Von der Vereinigung der Sehnerven geht die graue Platte zum Knie des Balkens über. Sie ist hier oft äußerst dünn, so daß die vordere Commissur durchschimmert.

Der graue Hügel geht in der Mitte in den Trichter, infundibulum, über, und vor dem Trichter vereinigen sich die Sehnerven untereinander und stehen daselbst mit der grauen Substanz in genauem Zusammenhange.

Der Trichter besteht äußerlich aus grauer Substanz, ist hohl, und geht mit seiner Spitze ziemlich in die Mitte des auf dem Türkensattel ruhenden, von der Hirnhaut umschlossenen Hirnanhanges, hypophysis, glandula pituitaria, hinein. Dieser längliche, quer liegende Hirntheil, dessen Querdurchmesser etwa ½ Zoll, dessen 2 andere Durchmesser kaum ¼ Zoll messen, besteht aus 2 Lappen, aus einem vorderen viel größeren, bohnenförmigen, und einem hinteren kleineren, rundlichen, in einer Grube des vorderen liegenden Lappen. Zwischen beiden Lappen tritt der Trichter hinein. Der vordere Lappen ist härter, und man unterscheidet inwendig in seiner röthlich braunen Substanz meistens eine etwas weißere Substanz. Der hintere Lappen ist weicher und mehr grau zu nennen. Bichat [1]) hat bisweilen im Hirnanhange oder auf seiner Oberfläche eine feste sandartige Substanz, Hirnsand, gefunden, ein Umstand, der eine gewisse Aehnlichkeit des Hirnanhangs mit der Zirbel andeutet.

Der Hirnanhang und die Zirbel werden, nach Tiedemann, zu Ende des 3ten Monats sichtbar.

Die vordere Commissur.

Dieser weiße, cylindrische, sehr bestimmt von den benachbarten Fasern unterscheidbare Strang, der im vordersten Theile der 3ten Hirnhöhle quer aus einer Hirnhälfte in die andere hinübergeht, liegt vor den vorderen Schenkeln des Fornix. Er dringt in den vorderen Theil des Corpus striatum ein, krümmt sich dann ein wenig nach hinten, und breitet sich mit vielen dünnen Fasern im vorderen Theile des hinteren Hirnlappens aus. Nach Tiedemann [2]) sollen auch Fasern der Hirnschenkel im gestreiften Körper direct in die Fasern der vorderen Commissur übergehen.

Die Adernetze.

Die Adernetze, plexus choroidei, sind vielfach zusammengelegte, krause, mit zahlreichen geschlängelten Arterien und Venen versehene Falten der Pia mater, welche in der Nähe der Stellen liegen, wo sie sich in die Höhlen des Gehirns hineinschlägt und die innere Oberfläche des Gehirns überzieht. Ein kleiner plexus choroideus liegt auf jeder Seite neben der Querspalte, durch welche die 4te Hirnhöhle zwischen dem verlängerten Marke und dem kleinen Gehirne offen steht. Der Theil der Pia, der diese Höhle verschließt, scheint inwendig mit einer dünnen Lage Gehirnsubstanz überzogen zu sein, die von dem freien Rande der Windungen des kleinen Gehirns vom hinteren Marksegel auf ihn übergeht. Jeder Plexus choroideus des kleinen Gehirns liegt daher an der Stelle, wo die Flocken mit dem hinteren Marksegel zusammenhängen, und geht am vorderen Rande der Mandel und über dem Ursprunge des Nervus facialis, acusticus, glosso-pharyngeus und vagus hin, und steht durch den die 4te Hirnhöhle verschließenden Theil der Pia mater mit dem der anderen Seite in Verbindung. Zuwei-

[1]) *Bichat*, Anat. descript. T. III. p. 75.
[2]) *Tiedemann*, a. a. O. S. 138.

Digitized by Google

len findet man in demselben kleine weiße Klümpchen, die sogenannten Pachionischen Körper oder Drüsen.

Die Adernetze des großen Gehirns liegen an der großen Hirnspalte des großen Gehirns. Das untere Horn des Seitenventrikels würde auf der Grundfläche des Gehirns an der Stelle, wo die Hirnschenkel in die Sehhügel eintreten, offen stehen, hinge hier nicht die Pia mater, die das Gehirn äußerlich überzieht, mit dem freien Rande der Hirnwindungen des großen Gehirns, mit der Fimbria, zusammen, und heftete diesen Saum an den Sehhügel an. An dieser Stelle bildet sie den Plexus choroideus des unteren Horns. Dieser Plexus choroideus begleitet nun immerfort die Fortsetzung der Fimbria, den Fornix um den hinteren Theil des Sehhügels und auf der oberen Fläche desselben herum bis zur Monroischen Oeffnung. An dem hinteren Theile des Sehhügels bemerkt man in ihm ein meistens ovales, von Vicq d'Azyr und Wenzel beschriebenes Klümpchen, welches oft selbst mit Pachionischen Körperchen bedeckt ist. An dieser Stelle sind die Faltungen des Plexus choroideus noch weit vielfacher und die Blutgefäße desselben ausgedehnter. Durch die Monroische Oeffnung geht der Plexus choroideus aus dem rechten und linken Seitenventrikel zur oberen Wand des 3ten Ventrikels über. Beide sind sehr dünn und laufen neben einander an der unteren Oberfläche des Fornix bis zu der Stelle, wo der 3te Ventrikel zwischen den Vierhügeln und dem hinteren Rande des Balkens durch die Pia mater verschlossen wird. Nach meinen Untersuchungen über die Entwickelung des Gehirns, bin ich geneigt anzunehmen, daß die Plexus choroidei ein verkümmerter und zusammengefalteter Theil der Pia mater und der blasenförmigen Gehirnwand des verlängerten Markes des kleinen Gehirns und des großen Gehirns sind.

Serum der Gehirnventrikel.

Die Ventrikel des Gehirns enthalten nach dem Tode eine geringe Menge eines etwas gelblichen Serum. In lebenden Thieren scheint in ihnen, wie Bohn, Lieutaud und Portal gezeigt haben, nur ein Dampf vorhanden zu sein, der von den Gefäßen der weichen Hirnhaut ausgehaucht wird. Kaauw hat wenigstens gezeigt, daß man die Absonderung dieses Dampfs nach dem Tode durch Einspritzung von Wasser in die Adern anschaulich machen könne. Daß aus verletzten Ventrikeln eines lebenden Menschen eine große Menge Wasser in kurzer Zeit auslaufen könne, ist schon Theil I. S. 290. bemerkt worden.

Bei Gehirnwassersucht vermehrt sich diese Flüssigkeit ungemein, und dehnt oft ohne eine beträchtliche Störung in den Seelenverrichtungen hervorzubringen, das Gehirn sehr aus.

Im gesunden Zustande berühren sich die Hirntheile einander, und die zwischen ihnen befindlichen Zwischenräume sind sehr klein. Bei jungen Embryonen dagegen ist eine große Ausdehnung der Gehirnventrikel, und die Gegenwart von vielem Wasser in ihnen der regelmäßige Zustand.

Ueber den Zusammenhang, in welchem die hauptsächlichsten Theile des Rückenmarks und Gehirns unter einander stehen.

Am Schlusse dieser Betrachtungen wäre nun eine Darstellung zu wünschen, durch welche man eine Uebersicht über den Zusammenhang der einzelnen Bündel des Rückenmarks mit den verschiedenen Hirntheilen, und über den Zusammenhang, in welchem diese unter einander stehen, erhielte. Allein eine so genaue Kenntniß des Gehirns besitzt man noch nicht, um diese Aufgabe vollständig zu lösen. Ich will mich daher begnügen, einiges aus der Darstellung auszuheben, welche Burdach [1]) hierüber zu geben versucht hat.

Das Rückenmark besteht nach Burdach aus den durch die vordere und

---

[1]) *C. F. Burdach*, vom Baue und Leben des Gehirns. B. I. Mit 2 K. Leipzig 1819. 4. B. II. 1822. Mit 7 K. B. III. 1826. Mit 1 K. 4., der größten Sammlung anatomischer und physiologischer Beobachtungen über das Nervensystem, die wir besitzen.

Digitized by Google

durch die hintere Rückenmarkspalte getrennten 2 Seitenhälften, und aus dem diese beiden Seitentheile vereinigenden Kerne.

Jede von jenen Seitenhälften besteht

erstlich aus 2 im Innern gelegenen grauen Strängen, aus einem vorderen und aus einem hinteren grauen Strange;

zweitens aus der die grauen Stränge umgebenden weißen Substanz, welche selbst auf jeder Seite in 5 Stränge eingetheilt werden kann, nämlich

in einen sehr großen zwischen der vorderen und hinteren Reihe von Nervenwurzeln gelegenen Seitenstrang,

in die 2 neben den beiden Reihen von Nervenwurzeln gelegenen Stränge, in den vorderen äußeren, und in den hinteren äußeren Strang, und

in die die 2 kleinsten, nicht überall sichtbaren Stränge, welche neben den vorigen und dicht an der vorderen und hinteren Rückenmarkspalte liegen, in den vorderen inneren und hinteren inneren Strang.

Der unpaare Kern besteht theils aus grauer Masse, welche die 4 grauen Stränge unter einander vereinigt und den Rückenmarkcanal einschließt, und aus einer den Boden der vorderen und den der hinteren Rückenmarkspalte überziehenden Lage von weißen Grundfasern, welche die weiße Substanz der beiden Seitenhälften unter einander verbindet.

Bei dem Uebergange in das verlängerte Mark, wird nur der Theil des Rückenmarkes, welcher bis jetzt den unpaaren Verbindungstheil desselben ausmachte, gleichfalls in paare Bündel gespalten, und zwar in 2 vordere und in 2 hintere.

Die 2 vorderen sind die vorn neben der Spalte liegenden Pyramiden. Sie entstehen hauptsächlich aus den weißen Grundfasern und aus der vorderen Hälfte der grauen Substanz des unpaaren Verbindungstheiles.

Die 2 hinteren sind die runden Stränge, welche hinten neben der Spalte in der 4ten Hirnhöhle liegen. Sie entstehen aus der hinteren Hälfte der grauen Substanz des unpaaren Verbindungstheiles und aus dem den Grund der hinteren Spalte bildenden weißen Ueberzuge.

Die doppelt vorhandenen Stränge des Rückenmarks verhalten sich, nach Burdach, bei ihrem Fortgange durch das verlängerte Mark so, daß auf jeder Seite

erstlich der vordere graue Strang den grauen Kern der Olive bildet, und der hintere graue Strang nach hinten und außen tretend sich mit dem hinteren äußeren Strange zum Keilstrange vereinigt.

Zweitens, daß der vordere innere weiße Strang den grauen Olivenkern an seiner inneren Seite,

der vordere äußere weiße Strang den Olivenkern an seiner äußeren Seite überzieht und einschließt,

der weiße Seitenstrang an jeder Seite fortläuft,

der hintere äußere weiße Strang sich mit dem hinteren grauen Strange zum Keilstrange vereinigt, und endlich

der hintere innere Strang den neben dem Ende der Rückenmarkspalte gelegenen zarten Strang bildet.

Die Bündel folgen also am verlängerten Marke, nach Burdach, so auf einander, daß neben der vorderen Rückenmarkspalte die Pyramiden, neben ihr der innere Olivenstrang, der graue Kern der Olive und der äußere Olivenstrang folgen, daneben der weiße Seitenstrang, neben ihm der Keilstrang, und neben ihm endlich dicht an der hinteren Rückenmarkspalte der zarte Strang liegen. Außer diesen Strängen kommt von der Stelle an, wo sich die 4te Hirnhöhle aufgethan hat, längs der Spalte in der 4ten Hirnhöhle der runde Strang zum Vorschein. Die Stränge, welche Burdach Seitenstrang und Keilstrang nennt, nannten Andere corpora restiformia.

Außerdem nimmt man, nach ihm, Fasern wahr, welche eine Vereinigung mehrerer von diesen Bündeln bewirken. Denn nach Burdach begeben sich Fasern der Seitenstränge zu den Pyramiden, und gehen in die sich durchkreuzenden Bündel der Pyramiden über, theils laufen Fasern, welche von den hinteren Bündeln kommen, an der Oberfläche des Rückenmarks fast quer über die Oliven weg zu den Pyramiden, theils endlich geht eine Fortsetzung der Oberfläche des Markes des kleinen Gehirns zu der weichen Hirnhaut, welche die 4te Hirnhöhle verschließt, und überzieht dieselbe inwendig.

Digitized by Google

Der größte Theil des Seitenstranges und des Keilstranges bildet auf jeder Seite den in das kleine Gehirn eindringenden Schenkel, crus medullae oblongatae ad cerebellum. Dieser geht durch das Ganglion des kleinen Gehirns, durch das Corpus ciliare hindurch, und bildet die Markstämme der Lappen und Läppchen des kleinen Gehirns. Die Oberfläche dieser letzteren ist mit einer, die Blatter des kleinen Gehirns bildenden weißen und grauen Platte bedeckt.

Von der die oberflächlichste Lage des kleinen Gehirns ausmachenden weißen und grauen Platte, zum Theil auch vom Marke des kleinen Gehirns, gehen die beiden Brückenarme nach vorn um die vom Rückenmarke zum großen Gehirne aufsteigenden Bündel herum und bilden die Commissur des kleinen Gehirns. Von der die oberflächlichste Lage des kleinen Gehirns ausmachenden weißen und grauen Platte, zum Theil auch vom Marke des kleinen Gehirns gehen die oberen Arme des kleinen Gehirns zu den Vierhügeln, und bringen eine Vereinigung des großen und des kleinen Gehirns hervor. Das unpaare Mittelstück dieses Verbindungstheiles ist die vordere Hirnklappe.

Der zarte Strang und der runde Strang bilden mit dem inneren Theile des Keilstranges die Wand der 4ten Hirnhöhle an der Seite nach der Brücke zu. Einige mehr querlaufende Fasern des äußeren Olivenstranges und des runden Stranges bilden die Markleisten der 4ten Hirnhöhle. Die der Länge nach gehende Fortsetzung des runden Stranges (die Fortsetzung des unpaaren Theiles des Rückenmarks) nebst einem Theile des zarten Stranges, des Keilstranges und des Seitenstranges laufen längs der mittleren Ebene hin, die das Gehirn in eine rechte und linke Hälfte theilt, und bilden den Boden der Wasserleitung und der 3ten Hirnhöhle. Die Fasern der runden Stränge laufen bis zum Trichter, und der Hirnanhang ist also als das Ende des unpaaren Theiles des Rückenmarks anzusehen. Einige Fasern vereinigen sich vielleicht an der inneren Seite des Sehhügels, um die Schenkel der Zirbel zu bilden. In diesem Falle würde auch die Zirbel als ein 2tes Ende des unpaaren Theiles des Rückenmarks im Gehirne anzusehen sein.

Die äußeren Olivenstränge gehen hinter den Querfasern der Brückenarme in die Höhe, und kommen in dem Winkel, welchen die zur Verbindung des kleinen und großen Gehirns dienenden oberen Arme des kleinen Gehirns mit den Brückenarmen bilden, und hinter den Hirnschenkeln zum Vorschein. Ihre hintere Lage stellt den Theil dar, den Reil die Schleife nennt, und so gehen sie in die Vierhügel ein, die dadurch ihre Form erhalten, daß 4 zusammenfließende Haufen grauer Substanz diese äußeren Olivenstränge bedecken, und daß eine Fortsetzung der Rinde des kleinen Gehirns, die sich unter der Form der Valvula cerebelli dahin erstreckt, die Vierhügel überzieht. Die beiden äußeren Olivenstränge vereinigen sich in den Vierhügeln unter einander, und der vordere wulstige Rand dieser Vereinigung, wenn er so weit reicht, und der Ueberzug der Vierhügel bilden vielleicht die sogenannte commissura posterior.

Die Fortsetzung des grauen Kerns der Olive, der vorderste Theil des äußeren Olivenstranges und die innere Portion des Seitenstranges gehen vom verlängerten Marke aus zu dem Sehhügel über, und zu ihnen kommt ein Theil der durch die Vierhügel gegangenen äußeren Olivenstränge (der Schleife) hinzu.

Der Pyramidenstrang und der innere Olivenstrang gehen erst in den Hirnschenkel über, unter dem Sehhügel zum gestreiften Körper fort, und zu ihnen kommen die von den Vierhügeln aus in den Sehhügel übergegangenen Bündel des äußeren Olivenstranges hinzu. Von den Sehhügeln und gestreiften Körpern aus gehen nun die Fasern strahlenförmig nach der äußeren Oberfläche des großen Gehirns, und haben noch an einigen von Burdach näher bestimmten Stellen Klumpen von grauer Substanz zwischen sich.

Den Fornix, die Scheidewand, den Balken und die vordere Commissur hält Burdach für Gehirntheile, durch welche andere Gehirntheilungen mit einander in Verbindung gebracht würden, und zwar durch die Scheidewand der untere Theil des Gehirns mit höher gelegenen Theilen desselben, durch die vordere, mit hinteren Stellen des Gehirns, durch den Balken und die vordere Commissur endlich rechts gelegene Theile mit links gelegenen. Auch ist er der Meinung, daß die Fasern des Hirnschenkels nirgends direct durch Umbeugung in die des Balkens übergehen.

Digitized by Google

Die Entwickelung des Gehirns [1]).

Die Theile des Gehirns, welche aus Längenfasern bestehen und eine unmittelbare Verlängerung des Rückenmarkes sind, namentlich das verlängerte Mark und die als Hirnschenkel fortgesetzten Stränge desselben, sind bei den Vögeln und bei den Säugethieren, unter allen Theilen des Gehirns, am frühesten vorhanden. Sie bilden gewissermaßen den Grundtheil des Gehirns, aus welchem sich durch ein an verschiedenen Stellen ungleichförmiges Wachsthum die verschiedenen Hirntheile entwickeln. Auf gleiche Weise sind bei sehr kleinen Embryonen diejenigen Höhlen zuerst vorhanden, welche von diesen aus Längenfasern bestehenden Theilen eingeschlossen werden. Sie bilden zusammen einen ununterbrochenen Canal, der sich dadurch, daß er sich durch Wachsthum an manchen Stellen erweitert, an andern aber eng bleibt, in die 4te Hirnhöhle, in den Aquaeductus Sylvii und in die 3te Hirnhöhle verwandelt.

Das Gehirn hat daher anfangs eine ähnliche Form, als das Rückenmark. Es gleicht 2 neben einander liegenden Strängen, welche zwischen sich einen Canal einschließen. Ob jene Stränge, wie Serres annimmt, ganz zu Anfange von einander getrennt sind, oder ob sie schon ursprünglich in der Mittellinie vorn und hinten durch Nervensubstanz unter einander zusammenhängen, läßt sich sogar am bebrüteten Eie, wo man den Anfang der Entwickelung des Gehirns am besten beobachten kann, und wo man daher die beste Gelegenheit hat, die erste Periode der Entwickelung des Gehirns und des Rückenmarks zu beobachten, nicht mit Gewißheit entscheiden. Bär sahe sie von allem Anfange vereinigt. Von der Zeit an, wo man das Gehirn und Rückenmark bei menschlichen Embryonen untersuchen kann, sind sie hinten am Rückenmarke und unten am Gehirne offenbar vereinigt. Vorn aber sind sie durch eine durchsichtige Linie, welche Meckel und Tiedemann für eine Spalte halten, getrennt, und gewiß sieht man hier den Canal deutlicher durchschimmern, als an anderen Stellen.

Wegen dieser großen Aehnlichkeit des Gehirns und Rückenmarkes darf man aber nicht behaupten, daß das Gehirn aus dem Rückenmarke hervorwachse, vielmehr scheint, wie auch Burdach annimmt, der Theil

[1]) Dieser Gegenstand ist vorzüglich von J. F. Meckel d. j. und Tiedemann aufgeklärt worden. Nachher hat Serres seine Untersuchungen bekannt gemacht. Bär hat über die Entwickelung des Hühnchens im Eie die vollständigsten und genauesten Beobachtungen angestellt, und früher als diese Schriftsteller haben Carus und Döllinger interessante Bemerkungen über die Entwickelung des Gehirns bekannt gemacht.

Digitized by Google

der Stränge, aus welchem sich das Gehirn bildet, eben so früh zu entstehen, als der, aus welchem sich das Rückenmark bildet.

Das Gehirn unterscheidet sich sehr frühzeitig dadurch von dem Rückenmarke, daß der hohle Strang, aus welchem es anfangs besteht, mehrere Beugungen auf- und abwärts macht und einige Einschnürungen hat. Denn da, wo das verlängerte Mark entsteht, macht er eine starke Beugung vorwärts und bildet einen Bogen, dessen Convexität nach unten und nach vorn gekehrt ist, da wo sich die Vierhügel entwickeln, macht er einen großen Bogen, dessen Convexität nach oben gerichtet ist, da endlich, wo am vordersten Ende des hohlen Stranges der Sehhügel und der graue Hügel, und die Hemisphären des großen Gehirns später entstehen, ist er nach unten und vorn gebogen. Hierdurch entstehen 3 hinter einander liegende unpaare, hohle Anschwellungen, von welchen bei sehr kleinen Embryonen die für das verlängerte Mark die größte, die für die Vierhügel von mittlerer Größe, und endlich die, wo später die Sehhügel und der graue Hügel entstehen, die kleinste ist. Letztere ist anfangs nicht einmal deutlich sichtbar. Außer den erwähnten unpaaren Anschwellungen befindet sich noch an dem vorderen Ende der letzteren Abtheilung, vor der Stelle, an welcher sich die Sehhügel entwickeln, und neben ihr nach außen auf jeder Seite ein sehr kleiner hohler Hügel, die erste Spur der Hemisphären des großen Gehirns.

Von den Hemisphären des kleinen Gehirns ist bei so kleinen, 4 bis 6 wöchentlichen Embryonen noch nichts zu sehen, wohl aber bemerkt man über dem verlängerten Marke die erste Spur des Mittelstücks desselben, welches die Gestalt eines kleinen, queren, die aus einander gewichenen Schenkel des verlängerten Marks verbindenden Wulstes hat, der den vordersten Theil der erweiterten Höhle von hinten bedeckt, die später zur 4ten Hirnhöhle wird. Mir hat dieser Wulst ein unpaares Stück zu sein geschienen. Meckel und Tiedemann behaupten, daß er anfangs durch eine Spalte an seiner hinteren Oberfläche in 2 Seitenhälften getheilt sei. Die Hemisphären des kleinen Gehirns entstehen später durch ein weiteres Wachsen der Seitentheile dieses Wulstes.

Die Gestalt des Gehirns ändert sich nun bald noch vielmehr dadurch, daß der in ihm eingeschlossene Canal einige erweiterte, und daß die ihn umgebende, aus Gehirnsubstanz bestehende Wand einige verdickte Stellen bekommt. Der Canal erweitert sich namentlich an der Stelle, wo die 4te Hirnhöhle, welche zum Theil von den auseinander weichenden Strängen des verlängerten Markes gebildet wird, entsteht, ferner da, wo später der Aquaeductus Sylvii liegt und die Vierhügel sich ausbilden. Denn bei den kleinsten Embryonen ist die vom Gehirn eingeschlossene Höhle sehr klein, und das Gehirn fast solide. Jetzt im 3ten

und 4ten Monate vergrößert sie sich ungemein. Indem sich die obere Wand an der Stelle, wo die Vierhügel entstehen, blasenartig erhebt, bildet sich ein großer, unpaarer, hohler, aus einer dünnen Lage Gehirnsubstanz bestehender Hügel, der nicht durch eine Spalte in 2 Seitenhälften getheilt ist. Der quere Wulst, der das kleine Gehirn darstellt, und dieser Hügel sind 2 Falten einer und derselben aus Gehirnsubstanz bestehenden Membran, nämlich der oberen oder hinteren Wand der Röhre, welche anfangs das Gehirn darstellte. Die 4te Hirnhöhle und die in der hohlen Erhabenheit der Vierhügel eingeschlossene Höhle machen jetzt eine einzige ununterbrochene Höhle aus. Die Vierhügel scheinen anfangs überaus groß, sie sind es aber nicht in dem Grade, als sie es scheinen, denn ihre auffallende Größe rührt von der großen Höhle her, welche sie einschließen. Sie nehmen später auf eine doppelte Weise an Masse zu, durch wachsende Falten und durch das Dickerwerden der Membran, welche die Falten bildet. Dabei nimmt der hohle Hügel, der den Anfang der Vierhügel bildet, längere Zeit nicht sehr an Umfang zu, denn die Falten wachsen, wie ich mich überzeugt habe, nach innen, und verengern dadurch die Höhle, welche im ausgebildeten Gehirne so klein ist, daß sie nur einen engen Canal, den Aquaeductus Sylvii darstellt.

Auch das kleine Gehirn vergrößert sich auf diese doppelte Weise, aber die Falten desselben wachsen nach außen, und die Höhle desselben, die 4te Hirnhöhle, verengt sich daher nicht so sehr als die in den Vierhügeln befindliche. Zuerst entstehen Falten am Mittelstücke, dann entsteht zu beiden Seiten eine Erhabenheit, welche der Anfang der Hemisphären des kleinen Gehirns ist. Zu dieser Zeit erscheinen das Mittelstück und die beiden Hemisphären des kleinen Gehirns als 3 abgesonderte Erhebungen, die nur dadurch unter einander zusammenhängen, daß sie Falten einer und derselben Membran sind. Sie scheinen sich später dadurch unter einander zu vereinigen, daß sich der zwischen ihnen gelegene Theil der Membran auch in Falten erhebt. Zuerst entstehen am kleinen Gehirne die Einschnitte, welche später sehr tief werden und die Lappen und Läppchen von einander scheiden. Später erst werden die kleinen Einschnitte sichtbar, durch welche auf der Durchschnittsfläche des kleinen Gehirns das Ansehn von Blättchen entsteht. Am Mittelstücke bilden sie sich etwas früher als an den Seitentheilen.

Die Brücke entsteht durch eine Verdickung der unteren Wand der Röhre, welche anfangs das Gehirn ausmachte. An dieser Verdickung kann man anfangs nicht jene Bogen von Querfasern erkennen, welche später die gewölbte Oberfläche der Brücke bedecken. Diese scheinen sich später in dem Grade zu vermehren, als sich die Oberfläche der Hemi-

Digitized by Google

sphären des kleinen Gehirns durch Faltung vergrößert. Es stimmt auch diese gleichzeitige Entwickelung der Hemisphären des kleinen Gehirns mit den Querfasern der Brücke sehr mit dem Zwecke dieser Querfasern, die Oberfläche der einen Hemisphäre mit der der anderen in Verbindung zu bringen, überein.

Die Sehhügel entstehen auch als eine Verdickung an der Wand der Röhre, welche den Grundtheil des Gehirns ausmacht. Aus diesem Grunde sind sie auch nicht hohl.

Die gestreiften Körper entstehen auf dieselbe Weise, aber etwas später als die Sehhügel, neben und vor ihnen.

Die Hemisphären des großen Gehirns bilden sich auf folgende Weise:

In den ersten 2 Monaten des Embryolebens liegen die Theile des hohlen Stranges, welche sich in den Sehhügel verwandeln, frei und unbedeckt da, und man bemerkt, wie J. F. Meckel zuerst gezeigt hat, an der äußeren und vorderen Seite von jedem derselben nur eine kleine aus Gehirnsubstanz gebildete, mit dem Sehhügel zusammenhängende Blase, als den ersten Anfang der Hemisphären.

Bei 4monatlichen Embryonen geht die Hirnsubstanz der Sehhügel an der äußeren Seite derselben, unten neben dem Eintritte des Hirnschenkels in eine aus Gehirnsubstanz bestehende Membran über, welche sich über den Sehhügel nach vorn, oben und hinten, wie eine Kapuze, herumschlägt, so daß zwischen ihr und dem Sehhügel eine große Höhle (der Seitenventrikel) entsteht, der zu dieser Zeit oval ist und noch nicht jene 3 Winkel besitzt, die man cornua nennt. Diese aus Gehirnsubstanz bestehende Membran, welche sich von der äußeren Seite des Sehhügels über denselben bis zu seiner inneren Seite herunterkrümmt, ist an der inneren Seite desselben nicht angewachsen, sondern schlägt sich da, wo bei Erwachsenen der Balken liegt, über dem Sehhügel nochmals in den Seitenventrikel hinein, den sie selbst gebildet hat. Schneidet man daher von dem oberen Theile der Hemisphären bei einem 4monatlichen Embryo ein Stück ab, so findet man inwendig in dem außerordentlich großen Seitenventrikel einen sehr großen, sehr weißen, etwas steifen, zuerst von Döllinger, dann von Meckel und Tiedemann beschriebenen, Sack, welcher einerseits in die aus Gehirnsubstanz bestehende Membran übergeht, welche die Hemisphäre bildet, andererseits mit dem Sehhügel verwachsen ist. Dieser Sack muß offenbar mit Tiedemann [1]) für den hier sehr großen, in große Falten gelegten plexus choroideus gehalten werden, ob ich gleich nach meinen eigenen Unter-

[1]) *Tiedemann*, a. a. O. Tab. II. fig. 3.

Digitized by Google

suchungen nicht zu entscheiden wage, ob diese Haut nicht einen markigen Ueberzug besitze, wie auch Meckel [1]) zu meinen scheint.

Es scheint hiernach, daß jene oben erwähnte kleine Blase, welche den Anfang der Hemisphären bildet, dadurch in die eben beschriebenen Theile verwandelt werde, daß sie viel schneller als der Sehhügel wachse, und sich demnach um den Sehhügel fast von allen Seiten herumbeuge, daß diejenige Wand der Blase, welche den Sehhügel zunächst umgiebt, sich in den Plexus choroideus des Seitenventrikels verwandle, indem sie häutig und dünn bleibt, während die andere Wand markig und dick wird und sich in die Hemisphäre verwandelt. Diese Wand ist daher desto dünner, je jünger der Embryo. Noch lange bleiben die Hemisphären ohne Windungen und also einer Blase ähnlich, längere Zeit als die Hemisphären des kleinen Gehirns. Endlich aber ungefähr im 5ten Monate, wenn diese Wand schon viel dicker geworden ist, bilden sich einzelne vertiefte, gekrümmte Linien, welche die Spuren der nach innen wachsenden Falten sind, und indem sich dann die zwischen den Furchen liegenden erhabenen Stellen nach außen hin vergrößeren, und sich die Falten vervielfältigen, entstehen die Windungen des großen Gehirns.

Zuerst scheint sich der Theil der beiden Hemisphären des großen Gehirns auszubilden, an welchem die Hemisphären auch bei dem Erwachsenen nicht durch deutlich sichtbare Quersasern des Balkens unter einander verbunden sind, d. h. der Theil der vorderen Lappen der beiden Hemisphären, welcher nahe an der Vereinigung der Sehnerven liegt, und durch die graue Platte, welche bei dem Erwachsenen vom grauen Hügel zu dem Balken geht, verbunden ist. Daher ist anfangs beim Embryo zwischen den beiden Hemisphären kein weißer faseriger Balken, sondern nur eine vor den Sehnerven liegende, graue, die Hemisphären vereinigende Platte sichtbar. Sehr frühzeitig scheint aber auch der hinterste und unterste Theil der Hemisphäre vorhanden zu sein, zwischen welchem beim Erwachsenen die Fasern des Balkens nicht quer hinübergespannt sind, sondern zu welchem sie auf einem langen Umwege gelangen. Die Spitzen der hinteren Lappen, die bei dem Erwachsenen im hintersten Theile des Kopfes liegen, liegen bei kleinen Embryonen sehr weit vorn und sind sehr nach oben gerichtet, und man sieht daher bei Embryonen im 4ten Monate zwischen den Hemisphären nur ganz vorn und tief unten den noch sehr kleinen Balken. Der Zwischenraum zwischen dem Balken und den Vierhügeln, welcher bei Erwachsenen sehr klein ist, ist noch bei 4 monatlichen Embryonen sehr groß und nach

[1]) Meckel, Handbuch der Anatomie. B. 3. S. 576. 7.

Digitized by Google

oben gekehrt, und bei 2monatlichen Embryonen fällt der Anfang des Balkens völlig mit dem grauen Hügel zusammen. Beugt man daher die Hemisphären des großen Gehirns kleiner Embryonen auseinander, so findet man zwischen ihnen den Balken nicht, den man zu finden erwartet, den man aber auch bei dem ausgebildeten Gehirne nicht zwischen diesem Theile der Hemisphären findet. Später scheinen sich auf der rechten und linken Seite nun auch die Theile der beiden Hemisphären mehr auszubilden, welche beim Erwachsenen durch die Querfasern des Knies des Balkens unter einander verbunden werden, und mit der Ausbildung dieses Theiles der Hemisphären scheint sich auch der Theil des Balkens, der dem Knie desselben entspricht, zu entwickeln. Zu dieser Zeit erscheint der Balken als eine sehr schmale vorn und in der Tiefe gelegene Querbinde, die aus einer Hemisphäre in die andere dringt. Noch später bilden sich die mittleren Theile der beiden Hemisphären, die beim Erwachsenen durch den mittleren Theil des Balkens verbunden sind, aus, und zugleich nimmt auch der Balken von vorn nach hinten an Größe zu. Hierbei rückt der hintere Hirnlappen mehr nach hinten, und bedeckt nach Carus im 4ten oder 5ten Monate die Vierhügel, und noch später das kleine Gehirn.

Jede Hemisphäre des großen Gehirns wächst also so, daß der erste sichtbare Anfang derselben schon ein Ganzes ist, und also die Grundlage zu dem vordersten und zu dem hintersten Theile der Hemisphäre enthält. Weil nun aber der Theil derselben, welcher am grauen Hügel liegt, während des Wachsthums an seiner Stelle bleibt, das hintere Ende der Hemisphäre dagegen sehr nach hinten rückt, und nach und nach die Sehhügel, dann die Vierhügel und zuletzt auch das kleine Gehirn bedeckt; so hat es den Anschein, als fehlte dieser Theil der Hemisphären des großen Gehirns anfangs. Diesem zufolge scheint sich die Bildung des Balkens am grauen Hügel anzufangen. Er scheint sogleich anfangs als ein Ganzes zu entstehen, an welchem der vorderste und der hinterste Theil vorhanden, und der mittlere Theil des Balkens scheint sich nach und nach in dem Maaße zu vergrößeren, als der Theil der Hemisphären wächst, zu dessen Verbindung er bestimmt ist. Der Balken entsteht also durch eine weitere Ausbildung der grauen Substanz, welche sogleich anfangs auf der Grundfläche des Gehirns die Vereinigung der Hemisphären bewirkt, und er dehnt sich mehr aus in dem Maaße, als der Theil der Hemisphären mehr wächst, der durch ihn in Verbindung gebracht wird. Ich kenne keine Thatsachen, welche der Vermuthung einiger Anatomen günstig wäre, daß sich die beiden Seitenhälften des Balkens einzeln bildeten und dann erst in die Mittellinie verwüchsen. Zu dieser Meinung mag die Entstehung des Pes hippocampi major

Digitized by Google

und des Fornix Veranlassung gegeben haben, welche anfangs weit von einander abstehen.

Einen ähnlichen Gang der Entwickelung als die Hemisphären und des Balken nimmt auch der Fornix und der Pes hippocampi. Denn sobald der Fornix im 3ten Monate sichtbar wird, sind auch an ihm schon die hintersten weit von einander abstehenden Schenkel unterscheidbar, die aber in der Schädelhöhle viel weiter nach vorn liegen als später, während der Theil des Fornix, an welchem beide Hälften des Fornix parallel neben einander laufen, fast noch gar nicht gebildet ist. Beim 4monatlichen Embryo ist dieser hinterste Theil des Fornix verhältnißmäßig schon sehr groß, aber noch immer liegen die beiden Schenkel weit von einander entfernt und krümmen sich über die Stelle, wo der Sehhügel mit den Hemisphären zusammenhängt, nach hinten, und gehen bis an das Ende der Hirnhöhle fort, das aber eine solche Lage hat, daß man es noch nicht das untere Horn nennen kann.

Die Eminentiae candicantes machen, nach Tiedemann, vom Ende des 3ten Monats an, wo sie zuerst sichtbar werden, bis zu Anfange des 7ten Monats eine einzige Erhabenheit aus. Es ist schon oben bemerkt worden, daß sie bei den meisten Säugethieren auf ähnliche Weise, das ganze Leben hindurch, vereinigt sind.

Die Größe des Balkens scheint sowohl im ausgebildeten Zustande bei Menschen und Thieren, als auch während des Wachsthums des Gehirns bei Embryonen in einem gewissen Verhältnisse zur Größe der Oberfläche des Gehirns zu stehen. Weil aber die Hemisphären längere Zeit eine sehr große, mit Wasser ausgedehnte Hirnhöhle haben, scheinen sie bei kleinen Embryonen, verglichen mit dem Balken, der sie unter einander verbindet, sehr groß zu sein. Indessen ist, weil die Hemisphären zu dieser Zeit keine Windungen haben, ihre Oberfläche doch viel kleiner, als man auf den ersten Anblick glauben möchte. In dem Verhältnisse, als sich die Windungen ausbilden und die Oberfläche des Gehirns an Größe zunimmt, wächst auch der Balken. Bis zum 5ten Monate sind die Windungen der Hemisphären des großen Gehirns noch sehr undeutlich und der zwischen den Hemisphären liegende Balken noch sehr klein. Bei manchen Säugethieren, z. B. nach G. R. Treviranus bei den Nagethieren, Fledermäusen, Maulwürfen und Igeln, so wie auch nach Tiedemann bei den Gürtelthieren und Ameisenfressern fehlen die Windungen das ganze Leben hindurch an den Hemisphären des großen Gehirns, und von mehreren dieser Thiere ist es bekannt, daß auch bei ihnen der Balken sehr klein sei.

Vielleicht liegt der Grund, daß die Größe des Balkens ungefähr der Größe der grauen Oberfläche des großen Gehirns entspricht, darin, daß die Fasern des Balkens den Zweck haben, die graue Substanz an der Oberfläche der einen Hemisphäre mit der grauen Substanz an der entsprechenden Stelle der Oberfläche der andern Hemisphäre in Verbin-

Digitized by Google

dung zu bringen. Je größer nun die von grauer Subſtanz überzogene Oberfläche der Hemiſphären iſt, deſto mehr quere Markfaſern wird nach dieſer Vermuthung der Balken enthalten, um alle Stellen beider Oberflächen in Verbindung zu bringen.

Im 4ten und im 5ten Monate ſind die entſtehenden Windungen der Hemiſphären des großen Gehirns wirklich Falten einer aus Gehirnſubſtanz beſtehenden Haut. Denn zu dieſer Zeit haben die Hemiſphären noch die Form einer über die Sehhügel hinweggeſchlagenen, eine große Höhle bildenden Membran. Die aus dem Sehhügel zu dieſer Membran gehenden Faſern gehen nicht durch die Hirnhöhle hindurch auf dem kürzeſten Wege zu den Punkten der Membran hin, zu welchen ſie ſich begeben, ſondern ſie gehen nur an einer Stelle von geringem Umfange in dieſe Markhaut über und laufen dann an derſelben bis zu den entfernten Punkten derſelben hin.

Anders verhält ſich's, nachdem ſich die Windungen der Hemiſphären völlig ausgebildet haben. Denn dann iſt die Stelle, wo die Hemiſphären mit den Faſern des Sehhügels und des Balkens zuſammenhängen, ſehr groß. Die Windungen ſehen nur von außen angeſehen wie Falten aus, inwendig ſetzen ſich dieſe ſcheinbar vorhandenen Falten in unzählige, ſich federbuſchartig vereinigende Faſern fort, welche einerſeits in den geſtreiften Körper und in den Sehhügel, andrerſeits in den Balken und in die Commiſſuren übergehen und auf dieſem Wege einander durchkreuzen. Sobald ſich das Gehirn ſo weit entwickelt hat, iſt eine Entfaltung deſſelben durch die Kunſt der Anatomen, oder durch die Natur mittelſt der Gehirnwaſſerſucht, unmöglich.

Die Gehirnſubſtanz iſt bei dem Embryo ſehr weich, aber nach Petſche [1]) und Anderen ſchon bei 4 bis 6monatlichen Embryonen deutlich faſerig, nach Meckel und Tiedemann ſogar deutlicher faſerig als beim Erwachſenen. Bis zum 7ten Monate kann man die Theile, die ſpäter weiß ſind, noch nicht von den Theilen, welche ſpäter grau bleiben, durch dieſe Farbe unterſcheiden. Nach Meckel zeichnet ſich um dieſe Zeit zuerſt die mittlere Subſtanz des Rückenmarks durch ihre grauere Farbe vor der weißeren Subſtanz aus. Viele Theile des Gehirns, ob ſie gleich faſerig ſind, ſehen nämlich wegen der großen Menge Blutes, die ſie zu dieſer Zeit zugeführt erhalten, grau aus, und ſind an manchen Stellen ſogar dunkler, als die graue Subſtanz, welche bleibend dieſe Farbe behalten ſoll. Dieſes iſt in manchen Theilen des großen Gehirns noch beim neugebornen Kinde der Fall. Die zahlreichen Blut-

[1]) *Petsche*, sylloge observationum; recuss. in Halleri coll. diss. VI. p. 783. §. 86

Digitized by Google

gefäße im Innern des Gehirns haben bei ihnen deutlich die Richtung der Gehirnfasern.

Die Gehirnhöhlen sind bei zweimonatlichen und noch jüngeren Embryonen sehr klein nicht nur an und für sich selbst, sondern auch im Verhältnisse zur Gehirnsubstanz, in welcher sie eingeschlossen sind. Bei den etwas älteren Embryonen nehmen sie sehr an Größe zu, verkleinern sich aber bei dem starken Wachsthume des Gehirns in den letzten Monaten der Schwangerschaft wieder. Der Zweck dieser großen Hirnhöhlen scheint der zu sein, daß Raum für die nach innen zu wachsenden Hirntheile da sei. Wenn das Wachsthum des Gehirns vollendet ist, so stoßen die Hirntheile, welche die Hirnhöhlen begrenzen, an einander.

Das Gehirn der Säugethiere mit dem des Menschen verglichen.

Das Gehirn und Rückenmark des Menschen zeichnet sich in folgender Hinsicht vor den nämlichen Theilen bei den Thieren aus. Der Umfang des großen Gehirns mit dem Umfange der Nerven, oder des Rückenmarks, oder des kleinen Gehirns, oder der Vierhügel, oder der Corpora candicantia und des Bogens, oder endlich des Hirnanhangs, verglichen, wird bei dem Menschen viel größer gefunden als bei den Thieren, oder mit andern Worten: unter den Centraltheilen des Nervensystems ist das große Gehirn bei dem Menschen weit überwiegender, als bei den Thieren. Diese Bemerkung, welche man der Hauptsache nach Sömmerring [1]) verdankt, und die dann von mehreren Anatomen, von Wenzel,

[1]) Siehe Sömmerring, diss. de basi encephali p. 17., dessen Schrift über den Neger §. 57.; dessen Hirnlehre §. 169. Zweite Ausgabe §. 93. Tab. baseos encephali. Fref. 1799. p. 6. Man vergleiche z. E. das kleinere Gehirn eines Pferdes, Ochsen — mit dem größeren des Menschen, und dagegen die dickeren Nerven dieser Thiere mit den dünneren des Menschen. Die meisten Säugethiere haben auch nach Verhältniß ihres ganzen Körpers ein kleineres Gehirn; ja die Landthiere haben, einige der allergrößten Säugethiere ausgenommen, sogar ein absolut kleineres Gehirn, als der Mensch. Der 64 Fuß lange Pottfisch hat ein Gehirn, das nicht 3mal größer, als das menschliche ist. Doch kann man nicht allgemein behaupten, daß der Mensch nach Verhältniß zum ganzen Körper das größte Gehirn habe, weil es in einigen kleineren Affen und Singvögeln wirklich in dieser Beziehung noch größer ist. Sömmerring fand das Gehirn eines Sajou $^1/_{11}$, das eines Embryo von der Simia Cynomulga $^1/_8$ des ganzen Körpers ausmachen ꝛc. Tab. bas. encephal. p. 7. Ein vorzüglich kleines Gehirn haben die Amphibien und die Fische: es ist gleichsam nur ein kleiner Anhang des Rückenmarks. Unter allen Thieren hat der Elephant das größte Gehirn. Es ist absolut viel größer als das des Menschen. Nach Perrault wog es 9 Pfund. Allen Moulins fand es 10 Pfund. Das in der zootomischen Sammlung in Berlin befindliche Gehirn eines 75 Fuß langen gewöhnlichen Wallfisches wiegt nur 5 Pfd. $10^1/_4$ Loth. Siehe diese Angaben bei Rudolphi, Grundriß der Physiologie. Th. II. S. 11. und 12.

Nach Sömmerrings Beobachtungen variirt das Gewicht des menschlichen Gehirns, von 2 Pfund 11 Loth bis 3 Pfund $3^3/_4$ Loth. Unter 200 Gehirnen fand er keines von 4 Pfunden (Hirnlehre §. 24.). Rudolphi fand einmal bei einem Menschen das natürlich beschaffene Gehirn 4 Pfund und 24 Loth. Rudolphi Grundriß der Physiologie. B. II. p. 11.

Digitized by Google

Treviranus, Tiedemann und andern weiter ausgeführt worden ist, verdient um so mehr die Aufmerksamkeit der Physiologen, weil das Rückenmark und die Nerven, nachdem sie vom Gehirn durch einen Schnitt getrennt worden sind, bei denjenigen Thieren ihre auf die Erhaltung des Lebens sich beziehenden Verrichtungen in gewissem Grade noch längere Zeit fortsetzen können, bei welchen das Gehirn kein großes Uebergewicht über das Rückenmark und die Nerven hat, z. B. bei den Fröschen, daß dagegen bei dem Menschen, wo dieses Uebergewicht des Gehirns am größten ist, auch die Abhängigkeit des Rückenmarkes vom Gehirne am größten zu sein scheint, so daß man also vermuthen darf, daß die einzelnen Abtheilungen des Nervensystems desto unabhängiger von einander sind, je gleichmäßiger das Nervenmark durch das Nervensystem verbreitet und je weniger es an einer einzelnen Stelle angehäuft ist.

Bei dem Menschen ist nicht nur das große Gehirn verhältnißmäßig zum kleinen Gehirne und zum Rückenmarke, sondern bei ihm sind auch das kleine Gehirn und das Rückenmark verhältnißmäßig zu den Nerven größer, als bei den Säugethieren.

Bei den meisten Säugethieren sind ferner die Windungen des großen Gehirns mehr symmetrisch und regulärer, als bei dem Menschen, dem sich indessen hierin, nach Treviranus und Tiedemann, die Seehunde und die Beutelthiere nähern.

Das kleine Gehirn, dessen Hauptabtheilungen auch bei dem Menschen ziemlich symmetrisch sind, ist bei manchen Säugethieren symmetrischer, bei anderen weniger symmetrisch, als bei dem Menschen. Das letztere ist, wie Serres [1]) bemerkt, bei denjenigen der Fall, bei welchen das Mittelstück des kleinen Gehirns seitwärts in einen oder in mehrere Bogen gekrümmt ist.

Kleine Verschiedenheiten des Gehirns des Menschen und der Säugethiere bestehen darin, daß die Corpora candicantia, nach Treviranus [2]) und Tiedemann [3]), nur bei dem Menschen 2 vollkommen getrennte Hügel sind, daß der innerste untere Lappen der Hemisphären des kleinen Gehirns, welchen Malacarne und Reil, die Mandel, tonsilla, nennen, nach Treviranus und Serres bei den Säugethieren, namentlich auch bei den Affen fehlt, eine Behauptung, der indessen Tiedemann nicht ganz beistimmt, weil er ihn doch beim Affen wahrgenommen zu haben glaubt; ferner, daß nur die Olive bei dem Menschen die gezackte gelbe Linie in ihrem Innern enthält, endlich, daß die Glandula pinealis der Säugethiere, nach Tiedemann, keinen Hirnsand einschließt.

Gefäße des Gehirns.

Die Blutgefäßstämme, welche dem Gehirne Blut zuführen oder Blut aus dem Gehirne wegführen, sind sehr groß und zahlreich. Dennoch ist

---

Das große Gehirn ist bei dem Menschen ungefähr 8 mal größer, als das kleine Gehirn. Bei Kindern scheint das Cerebellum nach Verhältniß kleiner zu sein. Das Cerebellum wiegt bei Erwachsenen nach Sömmerring 10 bis 12 Loth. (Hirnlehre §. 63.)

[1]) *Serres* a. a. O. 393. 394.

[2]) *G. R. Treviranus* a. a. O. S. 14.

[3]) *Tiedemann*, Icones cerebri simiarum et quorundam mammalium rariorum. Fol. c. Tab. V. Heidelbergae 1821.

Digitized by Google

die Gehirnsubstanz, zumal die weiße, weder beim lebenden Menschen mit vielem Blute, noch bei Leichnamen, in deren Adern seine gefärbte Flüssigkeit eingespritzt werden, sehr damit erfüllt und davon sehr gefärbt. Hieraus muß man, wie schon erwähnt worden, schließen, daß sich die Adern sehr schnell, bis in die engsten Röhrchen spalten, und daß diese keineswegs sehr lang und sehr weit ausgedehnte Netze bilden, daß folglich ein in das Gehirn eingeführter Bluttropfen nicht auf langen Wegen in der Gehirnsubstanz hin und her geleitet wird, sondern daß er kaum angelangt in das Gehirn, sogleich durch die Venen wieder fortgeführt wird. Diese Einrichtung kann den Nutzen haben, daß zur Ernährung des Gehirns immer frisches Blut angewendet wird, was vielleicht deswegen nöthig ist, weil das Blut schnell der wenigen nährenden Theile beraubt wird, die für das Gehirn brauchbar sind. Durch das Gehirn fließt also in 24 Stunden viel mehr Blut als durch irgend einen anderen Theil des menschlichen Körpers, aber in jedem Momente enthält es nicht sehr viel Blut.

Sehr merkwürdig ist es, daß die vielen Arterien und Venen, welche sich zu der die Windungen des Gehirns überziehenden Lage grauer Substanz begeben, sich nur in dieser Lage grauer Substanz vertheilen und also nicht tiefer eindringen, als diese Lage dick ist, ferner, daß sie nicht einmal durch Aeste, welche ohne Vergrößerungsgläser wahrnehmbar wären, mit den Blutgefäßen der Marksubstanz zusammenhängen, wie ich ausdrücklich nach den von mir an Lieberkühnschen Präparaten gemachten Untersuchungen behaupten kann. Daher haben auch die Blutgefäße der die Windungen überziehenden Pia mater, wenn sie aus dem Gehirn herausgenommen werden, ein franzenförmiges Ansehen. In die Marksubstanz und in die graue Substanz im Innern des Gehirns dringen die Blutgefäße theils von der Oberfläche der Hirnhöhlen, theils von der Grundfläche des Gehirns aus, ein, namentlich ist das letztere in der Fossa Sylvii der Fall.

Diese Zuführung von Blut auf besonderen Wegen zur grauen Lage der Windungen und zur übrigen Substanz des Gehirns macht es, wie oben gezeigt worden ist, wahrscheinlich, daß jede von diesen 2 Abtheilungen des Gehirns in gewissem Grade unabhängig von der anderen entstehe und ernährt werde, und daß folglich, wie nahe auch diese 2 Abtheilungen der Gehirnsubstanz an einander liegen, sie doch für 2 Organe von einer sehr verschiedenen Thätigkeit gehalten werden müssen.

Bei ihrer Entstehung ist die Substanz aller Hirntheile sehr reichlich mit Blutgefäßen versehen und sieht daher röthlichgrau aus, auch wenn sie faserig ist. Etwas Aehnliches findet auch bei der Entstehung der Knochen statt. Deswegen aber die graue Substanz, mit Gall,

Digitized by Google

Urstoff und Nährstoff zu nennen, scheint mir unpassend. Jeder Theil wird durch die ihn durchdringenden Blutgefäße ernährt.

Gefäße des Gehirnes.

1) Die Schlagadern des Gehirns sind: die beiden Arteriae Carotides cerebrales, welche, nachdem jede die A. ophthalmica abgegeben, dem vorderen Theile des großen Gehirns Blut geben; die beiden Arteriae vertebrales, welche sich in die Arteria basilaris vereinigen, dem kleinen Gehirne, der Protuberantia annularis, dem hinteren Theile des großen Gehirnes, Blut geben.

Diese vier Adern haben, wie gesagt, nach Verhältniß der Größe des Gehirns eine große Weite; es geht daher in einer gegebenen Zeit viel Blut durch das Gehirn hindurch. Die Wände dieser Schlagadern sind dünner und schwächer, als bei anderen Schlagadern, daher sie bei einer Congestion des Blutes ins Gehirn der Zerreißung leichter ausgesetzt sind als andere Arterien.

Sie zerästeln sich vielfältig in der weichen Hirnhaut, und ihre Aeste senken sich mit dieser in die Vertiefungen zwischen die Windungen ein, so daß sie unter einander mit vielen Anastomosen Gemeinschaft haben.

Die Schlagadern der harten Hirnhaut des Gehirns sind schon oben S. 191 und 199 genannt.

2) Die Venen des Gehirns und seiner harten Hirnhaut ergießen sich in die Bluthöhlen, sinus, dieser Haut: Sowohl diese großen Venen als auch die meisten kleineren begleiten die entsprechenden Arterien nicht. Die Venen von den oberen Flächen des großen Gehirns gehen in den Sinus longitudinalis; von den innern Flächen desselben in denselben und den longitudinalis inferior; vom Corpus callosum in diesen; von der Grundfläche des großen Gehirns in die cavernosos, petrosos superiores und transversos; aus den Plexibus choroideis in den quartus und in die transversos.

Die auf der Oberfläche des Gehirns in der weichen Hirnhaut laufenden Venen laufen ebenfalls vielfältig zerästelt, und hängen durch netzförmige Verbindungen zusammen.

Die Sinus transversi nehmen unmittelbar das Blut aus dem Sinus longitudinalis superior, dem quartus, den petrosis superioribus und inferioribus, und dem occipitalis posterior, auf, haben mittelbar mit dem longitudinalis inferior, den cavernosis, dem circularis, dem occipitalis anterior Gemeinschaft, und können also alles Blut des ganzen Gehirnes empfangen.

Durch sie ergießt sich das Blut in die beiden Venas jugulares internas. Ein kleiner Theil des Blutes des Gehirns kann durch den Sinus circularis foraminis magni sich in die Venas vertebrales ergießen.

Die Bluthöhlen der Hirnschaale haben durch dünne Venen (emissaria Santorini), welche durch Löcher der Hirnschaale gehen, mit den äußern Venen des Kopfes Gemeinschaft. Diese sind namentlich diejenigen, welche 1) durch die Foramina mastoidea aus dem Sinubus transversis zu den Venis occipitalibus; 2) durch die Foramina parietalia aus dem Sinus longitudinalis superior zu denselben; 3) durch die Foramina condyloidea anteriora aus den Sinubus transversis zu den Venis vertebralibus; 4) durch die Foramina spinosa, 5) ovalia und 6) rotunda, aus den Sinubus cavernosis zu den Plexubus pterygoideis und endlich durch die Löcher der Siebplatte des Siebbeins in die Venen der Nase gehen.

Diese Venen sind jedoch unbeständig: man findet z. E. in einigen ein oder beide Foramina parietalia verwachsen; in einigen Köpfen nur ein Foramen mastoideum, in anderen mehrere ꝛc. Auch durch das Foramen coecum vor dem Hahnenkamme des Siebbeins gehen feine Venen aus dem Sinus longitudinalis superior zu den Venen der Nase.

Die Venae ophthalmicae, da sie sich hinten in die Sinus cavernosos, vorn in die Venas faciales ergießen, sind also auch als Emissaria anzusehen.

Gefäße des Rückenmarks.

1) Die Schlagadern desselben sind: a. die Arteria spinalis anterior, welche an der vorderen Fläche, b. die Arteriae spinales posteriores, welche an der hinteren Fläche des Rückenmarkes hinabgehen; beide Aeste der Arteriarum vertebralium. c. Zu diesen kommen durch die Foramina intervertebralia Arteriae spinales

les accessoriae, nämlich die Rami spinales der Arteriarum vertebralium intercostalium, lumbarium, sacralium. Jede derselben giebt im Canale des Rückgrats einen vorderen und einen hinteren Ast zu dem Rückenmarke, welche mit der A. spinalis anterior und posterior Gemeinschaft haben.

2) Die Venen des Rückenmarks gehen in äußerst dichte und zahlreiche Netze über, welche außerhalb der harten Rückenmarkhaut liegen. Diese oben beschriebenen Netze sind so groß, daß man glauben möchte, daß sie außer der Bestimmung, das Blut wegzuführen, noch die hätten, das Rückenmark warm zu halten und dasselbe, so wie auch die Rückenmarknerven in den Intervertebrallöchern, vor Druck zu schützen.

3) Saugadern. Diese Gefäße sind zwar an den Gehirnhäuten, sowohl auf der Oberfläche als in den Ventrikeln, gefunden worden. Sie treten durch das Foramen spinosum und jugulare aus der Schädelhöhle. Aber in die Substanz des Gehirns hat man sie noch nicht zu verfolgen vermocht.

Die Saugadern des Rückenmarks kennt man noch nicht [1]).

Gehirnnerven, nervi cerebrales.

Uebersicht über die Zahl der Gehirnnerven und über ihre Verschiedenheit im Allgemeinen.

Es giebt, wenn man ihre Zahl vorzüglich nach der Zahl der Oeffnungen in der Dura mater, durch die sie durchgehen, und zugleich darnach bestimmt, ob sich ihre Wurzeln und ihre Stämme ohne Gewalt zu gebrauchen, getrennt darstellen lassen, 12 Paare [2]).

---

[1]) Ueber die Saugadern des Gehirns haben außer Mascagni folgende Schriftsteller geschrieben: *Steno*, in *Barthol.* anat. p. 475. *Nuck*, de invent. nov. p. 152. Eruikshank's Beschr. der Saugadern S. 175. und Ludwig's Note ebend. B. R. Schreger fand in einem Ochsenhirne Saugadern, die in den gestreiften Hügel gingen, wo sie ein gewöhnliches Netz bildeten, das deutlich von den Blutgefäßen unterschieden werden konnte. (*Schreger*, de vasis lymphaticis in plexu choroideo et corpore striato cerebri inventis. In dess. fragm. anat. et physiol. Lips. 1791. fasc. 1.) — In den Plexubus choroideis erscheinen nicht sehr selten Hydatides. — Fischer fand darin Taenias hydatigenas. (S. *Joh. Leonh Fischer*, taeniae hydatigenae in plexu choroideo nuper inventae historia. Lips. 1779. 4.) Eine andere Species fand neulich in einem Menschengehirn Loschge, und zwar auf der weichen Hirnhaut. Joh. Georg. Steinbuch fand eben diese an einem Muskel derselben Leiche, untersuchte beide genauer, und hat sie in seiner trefflichen Inauguralschrift (de taenia hydatigena anomala. Erlang. 1801. 8.) beschrieben und abgebildet.

[2]) Man pflegte noch kürzlich 9 Paare, nämlich das Par acusticum und das Par faciale für 1 Paar; und ebenso das Par glossopharyngeum, das Par vagum und das Par accessorium für 1 Paar zu zählen. Denn die 2 ersteren Nerven hat man zuerst auf Sömmerring's, die 3 letzteren auf Andersch's Vorschlag als verschiedene Nervenpaare angenommen. In der That liegen die Wurzeln und der Stamm des 7ten Paares den des 8ten, und die des 9ten den des 10ten und 11ten so nahe, daß man mit Recht zweifelhaft sein konnte, ob man sie als verschiedene Nervenpaare betrachten sollte.

Ehedem zählte man sogar nur 7 Paare, indem man das Par olfactorium seiner besonderen Gestalt und Beschaffenheit wegen nicht mit zu den Nerven rechnete, und das Par trochlearo seiner Kleinheit wegen übersah, oder doch nur als einen Ast des

Digitized by Google

Die Gehirnnerven entspringen nicht wie die Rückenmarknerven mit so deutlich einander entgegengesetzten vorderen und hinteren Wurzeln. Bei dem N. trigeminus nimmt man indessen 2 Wurzeln wahr, von welchen die dickere einige Aehnlichkeit mit der hinteren Wurzel eines Rückenmarknerven hat und wie sie mit einem Ganglion versehen ist, die dünnere mit der vorderen Wurzel eines Rückenmarknerven verglichen werden kann und wie diese an der Bildung des Ganglion keinen Antheil nimmt. Ein ähnliches Verhältniß scheint auch nach Scarpa's [1]) Vermuthung bei dem N. vagus und accessorius Willisii statt zu finden. Scarpa ist nämlich der Meinung, daß diese beiden Nerven als ein einziger Nerv betrachtet werden sollten, und daß die Portion desselben, welche man N. vagus nennt, und die nach Scarpa [2]) in dem, oder unter dem Foramen jugulare einen beständigen Nervenknoten bildet, mit der hinteren Wurzel eines Rückenmarknerven zu vergleichen sei, während die andere Portion desselben, welche man N. accessorius Willisii nennt, mit der vorderen Wurzel eines Rückenmarknerven Aehnlichkeit habe, und indem sie sich mit dem Nervenstamme des

---

Trigeminus annahm. Folgendes Schema erleichtert die Uebersicht über diese Zählungen.

Neueste Nummern.	Namen.	Nummern vor Sömmerring; der Alten
1.	Par olfactorium	1. —
2.	Par opticum	2. 1.
3.	Par oculorum motorium	3. 2.
4.	Par trochleare	4. —
5.	Par trigeminum	5. 3.
6.	Par abducens	6. 4.
7.	Par faciale	7. 5.
8.	Par acusticum	
9.	Par glossopharyngeum	8. 6.
10.	Par vagum	
11.	Par accessorium	
12.	Par hypoglossum	9. 7.

Bis auf Achillini wurde das Par oculorum motorium als ein Ast des Trigeminus angesehen. Fallopius setzte das Par trochleare aber als das 4te Paar hinzu. Er sagt (obss. anatt. Col. 1562. p. 249.), nachdem er die 7 Paare aufgezählt hat: Unum adhuc superest nervorum par, ex iis, quae a cerebro vel medulla intra calvariam oriuntur, quod a divino Vesalio ob modestiam, ne numerum ab aliis anatomicis positum et confirmatum turbaret, pro distincto pari non est propositum, sed pro minori propagine tertii paris enumeratum..... Quoniam nihil commune habet cum tertio pari,..... ne novam pariam confusionem, elegi pro octavo pari enumerare ..... Massa und Willis zählten das Par olfactorium als das 1ste Paar, und Willis nahm das Par trochleare als das 4te Paar, betrachtete aber irrig das 1ste Paar des Rückenmarks als das 1ste Paar der Gehirnnerven. (S. dess. nervor. descript. cap. 21. 22. 29.) Haller unterschied zwar schon die Nervenpaare richtig, behielt aber die alte Zählung bei. El. phys. IV. p. 203. sqq.

[1]) *Antonii Scarpa*, de gangliis nervorum, deque origine et essentia nervi intercostalis ad *Henricum Weberum* Anatomicum Lipsiensem epistola. Estratto dagli Annali Universali di Medicina, Maggio e Giugno 1831. Milano 1831. 8. p. 8. Dieselbe Ansicht hat gleichzeitig Arnold aufgestellt.

[2]) *Scarpa*, in Act. Acad. chirurg. Vindob. Vol. I.

Digitized by Google

Vagus verbinde, unter andern zur Bildung derjenigen Nerven beitrage, welche zu den Muskeln des Schlundes und des Kehlkopfs gehen.

So wie es nun durch die früheren Versuche von Ch. Bell und Magendie, und durch die neueren Versuche von J. Müller in Bonn [1]) und Panizza in Pavia [2]) ziemlich ausgemacht ist, daß die hinteren einen Nervenknoten bildenden Wurzeln der Rückenmarknerven das Gefühl vermitteln, die vorderen Wurzeln aber die in den Muskeln von unserm Willen ausgehende Bewegung hervorrufen, so ist es auch durch Bells pathologische Beobachtungen und an lebenden Thieren angestellte Versuche sehr wahrscheinlich, daß die Nervenzweige, welche die Fortsetzung der großen, mit einem Nervenknoten versehenen Wurzel des N. trigeminus sind, nur das Gefühl vermittele, keineswegs aber zur Hervorrufung von Bewegungen in den dem Willen unterworfenen Muskeln diene, daß dagegen die kleine Wurzel desselben, welche an der Bildung des Ganglion keinen Antheil nimmt, nur zu Muskeln gehe und die Bewegung derselben veranlasse und nicht dazu diene, Eindrücke fortzupflanzen, welche Empfindungen erregen, und daß folglich die mit dem Ganglion zusammenhängenden Aeste des N. trigeminus nur in so fern auch an der Erregung der Bewegung Antheil nehmen, als Fäden von der kleinen Wurzel zu ihnen treten [3]), und daß sie sich nur zu dem Zwecke auch zu Muskeln begeben, als auch die Muskeln ein Gefühl besitzen, vermöge dessen man sich unter andern der Größe der Anstrengung bewußt wird, welche man bei der Bewegung derselben anwende.

Er nahm wahr, daß wenn er den Infraorbitalast des N. trigeminus bei einem Thier durchschnitt, der Tastsinn an den Lippen und in der Gegend der äußeren Nase verloren ging, während diese Theile noch fortwährend willkührlich bewegt werden konnten, daß dagegen, wenn er bei einem anderen Pferde den N. facialis durchschnitt, die Muskeln, welche die Lippen bewegen und die Nasenlöcher erweitern, gelähmt wurden, so daß das Pferd das Heu nicht mehr mit den Lippen ergreifen konnte. Panizza hat diesen Versuch in Gegenwart Scarpa's und Rigoni's in Pavia mit dem nämlichen Erfolge wiederholt, und sich und diese Gelehrten von der Richtigkeit dieser Thatsache überzeugt, und vorher schon hatte Joh. Müller bei Kaninchen gefunden, daß alle mechanische Reizungen des N. infraorbitalis nicht im Stande sind, Zuckungen in den Muskeln der Schnauze zu bewirken, daß dagegen jede Zerrung des N. facialis jedesmal Zuckungen in den Gesichtsmuskeln und namentlich in denen der Schnauze, zu welchen beiderlei Nerven gehen, hervorruft.

Ist nun die Ansicht Bells und Scarpa's richtig, so zerfallen die Gehirnnerven in 3 Classen,

---

[1]) Joh. Müller, Bestätigung des Bellschen Lehrsatzes, daß die doppelten Wurzeln der Rückenmarksnerven verschiedene Functionen haben, durch neue entscheidende Experimente in Froriep's Notizen. März 1831. S. 117.

[2]) Siehe *Scarpa*, de gangliis nervorum etc. p. 10.

[3]) *Ch. Bell*, in Phil. Transact. 1826. P. II. Siehe auch Annals of philosophy and philosophical magazine. Aug. 1829. und *Magendie*, Journal de physiologie. T. X. 1830. p. 1 — 21. Tab. I. et II.

Digitized by Google

1) in solche, welche nur der Empfindung dienen, wie der der N. olfactorius, opticus, acusticus,

2) in solche, welche nur die Bewegungen vermitteln, wie der N. oculi motorius, patheticus, abducens, facialis, und vielleicht der Hypoglossus und glossopharyngeus,

3) in solche, welche vermöge einer doppelten Wurzel sowohl die Empfindung als die Bewegung vermitteln, namentlich der N. trigeminus und der mit dem Accessorius vereinigt gedachte N. vagus.

Die 6 hinteren Gehirnnerven gehen durch Oeffnungen in der hinteren Schädelgrube, die 6 vorderen durch Oeffnungen in der vorderen und mittleren Schädelgrube aus dem Schädel. Nur der 1ste Gehirnnerv tritt durch die in der vorderen Schädelgrube befindliche Siebplatte. Dieser, der Geruchsnerv, ist auch der einzige Nerv, welcher von den vorderen Lappen der Hemisphären des großen Gehirns entspringt. Fast alle andern Gehirnnerven entspringen von dem Verbindungstheile des Gehirns, und zwar die 7 hinteren nahe bei einander hinter der Brücke. Die Stellen, wo die Nerven entspringen, sind bei vielen noch nicht ganz bestimmt, und es giebt nicht bei allen Nerven bestimmte graue Hügel, an welchen sie ihren Anfang nehmen. Zwar weiß man, daß sich bei Fischen die Zahl der hügelförmigen Abtheilungen des Gehirns vermehrt und vermindert, wenn gewisse Nerven mehr oder weniger ausgebildet sind, und man sieht an der Oberfläche mancher von diesen Hügeln ein Geflecht von Markfasern, dessen Zwischenräume durch graue Substanz erfüllt sind, und welches ununterbrochen in die Wurzeln der Nerven übergeht [1]). Allein die Hügel, welche am Gehirne des Menschen und der Säugethiere unterschieden werden, stehen, wie Treviranus [2]) bewiesen hat, in keiner solchen Beziehung zu gewissen Nerven. Sie sind hier offenbar nicht bloß wegen der Nerven da, die an oder aus ihnen entspringen. So sind z. B. die Vierhügel und die Sehhügel, welche man als die Ursprungsstelle der Sehnerven ansieht, beim Maulwurfe, bei welchem der Sehnerv ein fast unsichtbares Fädchen ist, nicht kleiner als bei andern Thieren. Ueberhaupt entspringen die Fasern eines Nerven nicht immer neben einander von einer einzigen beschränkten Stelle des Gehirns, sondern nicht selten von sehr verschiedenen, von einander ziemlich entfernten Stellen desselben.

Da nun unstreitig wenig darauf ankommt, ob mehrere Nervenfäden in einer gemeinschaftlichen Scheide eingeschlossen sind oder nicht, vielleicht aber sehr viel davon abhängt, mit welcher Stelle des Gehirns sie zusammenhängen, so ist es leicht möglich, daß oft Fäden, die in verschiedenen Nerven liegen, eine gemeinschaftliche, und Fäden, die in einem Nerven beisammen liegen, eine verschiedene Verrichtung haben.

Bei verschiedenen Thieren scheinen sogar, wie Treviranus bemerkt, diesel-

---

[1]) Siehe die von mir gegebene Abbildung des Karpfengehirns in Meckels Archiv 1817. St. 2. Tab. IV. fig. 26.

[2]) G. R. Treviranus, vermischte Schriften B. III. S. 87.

Digitized by Google

den Nerven nicht immer an der nämlichen Stelle des Gehirns zu entspringen. Dieser Umstand muß uns in unseren Folgerungen vom Ursprunge der Nerven bei den Säugethieren auf den bei den Menschen vorsichtig machen. Zugleich beweist er wohl, daß wir die wahren Enden der Nerven noch nicht kennen.

Die Gehirnnerven sind von verschiedener Dicke, und folgen, vom dicksten zum dünnsten, nach und nach ungefähr so auf einander.

N. trigeminus	N. acusticus	N. abducens.
opticus	vagus	accessorius Willisii
olfactorius	hypoglossus	glossopharyngeus
oculi motorius	facialis	trochlearis.

Der Geruchnerv ist bei dem menschlichen Embryo bis zum 6ten Monate, bei vielen Säugethieren aber das ganze Leben hindurch hohl. Bei einigen hängt seine Höhle mit der Höhle des Gehirns zusammen. Bei sehr kleinen Vogelembryonen glaubt Bär auch den Seh- und Gehörnerven hohl gefunden zu haben. Der Geruchnerv und der Gehörnerv sind die beiden weichsten Gehirnnerven, was daher zu rühren scheint, daß die Bündel und Fäden derselben nicht so vielfältig von häutigen Scheiden eingeschlossen sind, als bei andern Nerven.

Alle Gehirnnerven zusammengenommen sind im Verhältnisse zur Größe das Gehirns viel dünner, als alle Rückenmarknerven zusammengenommen im Verhältnisse zur Größe des Rückenmarks. Auch sind jene zusammengenommen absolut dünner, als alle Rückenmarknerven.

Uebersicht über den Ort, wo die Gehirnnerven an der Oberfläche des Gehirns zum Vorschein kommen und wo sie zu dem Schädel hinausgehen.

Erstes Paar, Geruchsnerv, nervus olfactorius, entspringt mit 2 weißen und einer grauen Wurzel aus der Fossa Sylvii, von der grauen Substanz vor dem Chiasma nervorum opticorum und am hinteren Theile des vorderen Hirnlappens, ist dreiseitig prismatisch, liegt in einer Furche der vorderen Lappen, wird nur im Ganzen von der Pia mater umhüllt, ohne Fäden zu haben, die in einzelne neurilematische Canäle eingeschlossen wären. Er ist deswegen sehr weich, besteht aus weißer und grauer Substanz, bildet auf der Lamina cribrosa ossis ethmoidei eine sehr weiche graue Anschwellung, bulbus cinereus, ist beim Embryo bis zum 6ten Monate hohl, bei manchen Säugethieren aber bis zur Lamina cribrosa offenbar ein Theil des Gehirns, und mit einer Höhle versehen, die mit der Höhle der Seitenventrikel zusammenhängt, und theilt sich schon innerhalb der Schädelhöhle in eine große Menge von Fäden, welche durch die Löcherchen der Lamina cribrosa in die Nase gehen.

Zweites Paar, Sehnerv, nervus opticus, entspringt theils vom Corpus geniculatum int., einem an der Seite zwischen dem Thalamus und den Vierhügeln liegenden Hügel, und von den Vierhügeln, theils

Digitized by Google

von dem am Thalamus gelegenen Corpus geniculatum externum und vom Thalamus oder Sehhügel ſelbſt, der aber noch wichtigere Verrichtungen für den Hirnſchenkel und für das große Gehirn zu haben ſcheint, und daher auch bei denjenigen Thieren groß iſt, die keinen oder einen ſehr kleinen Sehnerven beſitzen. Er geht an der Grenze, an welcher der Hirnſchenkel in den Sehhügel eintritt, um den Hirnſchenkel nach abwärts herum, bildet vor dem Tuber cinereum mit dem Sehnerven der entgegengeſetzten Seite eine theilweiſe Vereinigung und Durchkreuzung, das Chiasma nervorum opticorum hängt auf dieſem Wege mit den Hirnſchenkeln und mit der grauen Subſtanz des Tuber cinereum zuſammen und nimmt auf demſelben an Größe zu. Im Chiasma ſcheinen ſich die inneren Bündel der Sehnerven zu kreuzen, während die äußeren auf ihrer Seite bleiben, auch bekommen daſelbſt die einzelnen Fäden Hüllen. Von hier aus geht jeder dieſer beiden Nerven durch ein Foramen opticum in die Augenhöhle.

Drittes Paar, gemeinſchaftlicher Augenmuskelnerv, nervus oculorum motorius, tritt aus der Spalte zwiſchen den Hirnſchenkeln hervor. Man kann aber die Wurzeln noch weiter verfolgen. Es geht dann an der Seite des Türkenſattels durch die Falte der Dura mater in die Fissura orbitalis superior.

Viertes Paar, der obere Augenmuskelnerv, nervus patheticus, entſpringt von der Valvula cerebelli am hinteren Rande der Vierhügel, ſchlägt ſich um den Hirnſchenkel nach abwärts, und kommt an der Seite vor der Brücke zum Vorſchein, iſt der längſte und dünnſte ungetheilte Nervenſtamm, tritt in die Falte der Dura mater neben der vorderen Spitze des Felſenbeins, und von da zur Fissura orbitalis superior.

Fünftes Paar, der dreigetheilte Nerv, nervus trigeminus, kommt mit einer dicken und mit einer dünnen Portion an der Seite der Brücke zum Vorſchein, indem er den Processus cerebelli ad pontem durchbohrt. Die dicke Wurzel kann man noch viel weiter nach der Medulla oblongata hin verfolgen. Der Stamm des Nerven dringt durch eine Spalte des an der Spitze des Felſenbeins angehefteten Tentorium in die mittlere Schädelgrube, unter die Dura mater; hier ſchwillt die dicke Portion zwiſchen der Fissura orbitalis superior, dem Foramen rotundum und ovale an, und bildet das Ganglion semilunare, an deſſen Bildung die kleine Portion keinen Antheil nimmt, vielmehr in einer Furche unter demſelben weggeht. Die 3 Aeſte des Ganglion gehen durch jene 3 Oeffnungen, und die kleine Portion mit dem 3ten Aſte vereinigt durch das Foramen ovale aus dem Schädel.

Sechstes Paar, der äußere Augenmuskelnerv, nervus

Digitized by Google

abducens, kommt zwischen der Pyramide, Olive und dem hinteren Rande der Brücke zum Vorschein und geht schon hinter dem Processus clinoideus posterior durch die harte Hirnhaut und dann in die mittlere Schädelgrube, und von da eben so wie das 3te und 4te Paar durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle.

Siebentes Paar, der Antlitznerv, nervus facialis, und 8tes Paar, der Hörnerv, nervus acusticus. Sie treten beide an der Seite des hinteren Randes der Brücke hervor (der Facialis mehr nach innen), und lassen sich zu der Gegend verfolgen, wo die Medulla oblongata die Wand der 4ten Hirnhöhle bilden hilft. Beide Nerven gehen in den Meatus auditorius internus. Der kleinere Facialis liegt in einer Rinne des größeren, des Acusticus.

Neuntes und 10tes Paar, der Schlund-Zungennerv, nervus glossopharyngeus, und der umherschweifende Nerv, vagus. Beide kommen an der Spalte zwischen dem Corpus olivare und restiforme neben einander zum Vorschein, der Glossopharyngeus mit wenigen, der Vagus mit vielen Fäden, und gehen jeder durch eine eigene Oeffnung der Dura mater durch das Foramen jugulare.

Elftes Paar, der Beinerv, nervus accessorius Willisii, entspringt an der Seite der Medulla spinalis zwischen den vorderen und hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven, hinter dem Ligamentum denticulatum, bis zum 5ten, 6ten oder sogar bis zum 7ten Halsnerven herab. Die hintere Wurzel des 1sten Halsnerven geht zuweilen ganz in ihn über, oder in andern Fällen empfängt umgekehrt der 1ste Halsnerv statt der hintern Wurzel einen Ast von ihm. In diesen Fällen findet sich an ihm ein Knötchen. Er geht durch das Foramen magnum occipitale in die Schädelhöhle. Einige Fädchen treten noch von der Medulla oblongata zu ihm hinzu, dann legt er sich an die Seite des Nervus vagus und geht durch das Foramen jugulare.

Zwölftes Paar, der Zungenfleischnerv, nervus hypoglossus, kommt zum Theil an der Spalte zwischen den Corporibus pyramidalibus und olivaribus zum Vorschein, zum Theil entspringt er etwas tiefer; er geht durch das Foramen condyloideum anterius aus dem Schädel.

Digitized by Google

Besondere Beschreibung des Ursprungs und des Verlaufs der einzelnen Hirnnerven.

I. Nervus olfactorius, der Riechnerv.

Der erste Nerv, oder der Riechnerv, der Geruchnerv (nervus olfactorius s. primus) entspringt, wie schon oben bemerkt worden ist, mit 3 Wurzeln von dem hintern innern Theile der Grundfläche des vordern Lappens des großen Gehirns.

Die äußere längste Wurzel ist markig, entspringt am hintersten Theile der Grundfläche des vordern Hirnlappens, wo sie wie in die graue Masse eingelegt ist.

Die innere kürzere Wurzel ist auch markig, bisweilen zwiefach, entspringt ebenfalls am hintersten Theile der Grundfläche des vordern Hirnlappens, aber der Mitte näher. Beide markige Wurzeln vereinigen sich vorwärts gehend unter einem spitzigen Winkel, und zu ihnen kommt nun die dritte obere, welche grau ist, weiter vorn von einem kleinen Vorsprunge entspringt, und sich auf jene beiden legt, hinzu [1].

Der aus 3 Wurzeln entstandene Nerv hat eine dreieckig prismatische Gestalt. In Kindern ist er rundlicher. Auswendig hat er gefurchte Streifen. Er ist schon bei Erwachsenen, noch mehr aber bei Kindern sehr weich, und enthält weiße und graue Masse, welche in der Mitte und auch auswendig Streifen bilden. Im Embryo ist er fast ganz grau, und verhältnißmäßig dicker als bei Erwachsenen.

Der Nerv geht nun in einer schmalen Furche, welche an der vordern Fläche des untern Hirnlappens, nahe am innern Rande desselben, liegt, vorwärts zur Siebplatte. Hier liegt er nahe bei dem der andern Seite, denn nur der Hahnenkamm des Siebbeins und das andere Ende der Sichel scheiden hier beide Riechnerven von einander. Ueber der Siebplatte geht er in einen grauen Kolben (bulbus cinereus) [2] über,

---

[1] Nach Haller, Sabatier und Fodéré und Andern entspringt der Geruchnerv mit 2 Wurzeln; nach Vicq. d'Azyr mit 3 Wurzeln, nach Portal, Cuvier, Sömmerring bald mit 2, bald mit 3 Wurzeln. Bisweilen vereinigen sich beide markige Wurzeln so mit einander, daß sie eine Insel von grauer Masse einschließen. Sömmerrings Nervenlehre §. 204. Winslow (expos. anat. III. Nerves. n. 9.) leitet den Ursprung des Geruchnerven vom unteren Theile der gestreiften Körper her; eben dieses bestätigt Sömmerring. (Hirnlehre 2te Ausg. §. 47.) Den Wallfischen fehlt nach Cuvier und Rudolphi der Geruchnerv, aber dennoch haben sie den gestreiften Körper.

[2] Malacarne (osserv. di chirurg. I. c. 5.) nennt ihn ein Ganglion. Scarpa sagt (annott. II. p. 30.) „nil bulbo cinereo magis ganglio affine in h. c. re-

welcher aus grauer und markiger Masse gemischt, dicker als der Nerv und länglich rund ist, und so liegt, daß seine Länge von vorn nach hinten geht. Hier über der Siebplatte, also noch in der Hirnschale, theilt er sich in viele feine weiche Fäden. Diese treten durch die Löcher der Siebplatte und durch kleine Scheiden, welche als Fortsätze der harten Hirnhaut diese Löcher auskleiden, in die Nasenhöhle und verbreiten sich dann, feiner und weicher werdend, in der Schleimhaut derselben.

Diese Fäden liegen ziemlich in 2 Reihen. Die innere Reihe derselben geht durch die Löcher, welche der Mitte näher sind, und vertheilt sich am obern und mittlern, theils auch am untern Theile der Nasenscheidewand; die äußere Reihe von Fäden geht durch die Löcher, welche näher am Rande der Siebplatte liegen. Diese Fäden vereinigen sich unter einander zu einem Geflechte und vertheilen sich an die Haut der Zellen des Labyrinths der Nase und an den beiden obern Muschelknochen.

Hohl ist dieser Nerve bei dem Erwachsenen nicht [1]), wohl aber, wie schon oben bemerkt worden ist, bei kleinen Embryonen [2]) und bei vielen Säugethieren, bei welchen er eine hohle, äußerlich graue, inwendig weiße, Verlängerung der Windungen der Hemisphären ist, die man den Riechkolben nennt, und deren Höhle mit der der Seitenventrikel bei einigen Gattungen der Säugethiere in unmittelbarer Verbindung steht. Nur die Affen, nach Cuvier, und die Affen und die Seehunde, nach Gall, Treviranus und Tiedemann, haben Geruchnerven, die den menschlichen ähnlich sind. Bei vielen Säugethieren, welche einen Riechkolben besitzen, entstehen aus der grauen Substanz der vordersten und der innersten Windungen, nach Gall, zahlreiche feine strahlenförmige Fäden, welche den Riechnerven bilden helfen [3]). Nach Treviranus fehlt denjenigen Thieren, welche einen Riechkolben haben, die vordere vorspringende Spitze des hinteren Hirnlappens, und der Hippocampus ist sehr groß und hängt mit den Geruchnerven zusammen, und auch nach Serres fließt bei mehreren der untersten Säugethiergattungen der Hippocampus mit dem Ursprunge des Geruchnerven zusammen [4]).

Besonderheiten dieses Nerven, wodurch er sich auszeichnet, sind 1) seine gefurchte gestreifte Beschaffenheit, 2) seine dreieckig prismatische Gestalt, 3) seine Lage in jener Furche des Gehirns, 4) sein grauer Kolben, 5) die graue Masse in seiner Mitte, 6) seine Weichheit, die er jedoch mit dem Hörnerven gemein hat, 7) daß er durch viele kleine Löcher der Hirnschale dringt.

Dieser Nerve ist Empfindungsnerve des Geruchs, vielleicht jedoch nicht allein, sondern mit ihm die Aeste des N. trigeminus, welche in die Nasenhaut gehen. Vielleicht sind aber auch die Aeste des 5ten Paares nur dem Ge-

---

perio.« Eben dieser Meinung ist Metzger (opusc. anatt. I. p. 84.). *Kwiatkowsky* de nervorum fluido, decussatione, gangliis. Regiomont. 1784. p. 12. und Rudolphi.

[1]) Wie schon Vesalius ep. de rad. cornae 660. richtig bemerkt hat.

[2]) *S. Sömmerring*, de basi encephali. §. 28. 29. Nach ihm ist im menschlichen Embryo im 5ten Monate der Riechnerv deutlich hohl, so daß seine Hohligkeit mit der Seitenhirnhöhle des Gehirns in Verbindung steht. Götting. gel. Anzeig. 1796. 61es Stück. Sömmerring, über das Organ der Seele. §. 18.

[3]) *J. O. Horst*, Praes. Slevogt Diss. qua processus cerebri mamillares ex nervorum olfactoriorum numero exemtos disquisitioni submittit. recus. in Haller. disp. anat. sel. Vol. II. *J. Weitbrecht*, De vera significatione processuum mammillarium cerebri in Commentar. Acad. sc. Petrop. T. XIV.

[4]) *Serres* a. a. O. Tom. I. p. 285.

Digitized by Google

meingefühle gewidmet, und unter andern bestimmt, das Niesen zu bewirken. Dieser Ansicht scheinen die pathologischen Beobachtungen günstig zu sein, wo mit Zerstörung der Ursprungsstellen der Geruchnerven der Geruch aufgehört hatte. Das Gegentheil könnte man aus dem von Cuvier beobachteten gänzlichen Mangel der Geruchnerven bei den Wallfischen schließen, wenn es sich beweisen ließe, daß sie das Vermögen zu riechen besäßen. Treviranus glaubt indessen auch bei diesen Thieren ein sehr kleines, kaum noch sichtbares Fädchen gefunden zu haben, was den Geruchnerven vorstelle, was aber Rudolphi nicht fand.

Magendie's Experimente mit der Zerstörung der Geruchnerven und mit der Durchschneidung des 5ten Paares scheinen nichts für seine Meinung, nach welcher das 1ste Paar nicht Geruchnerv sein soll, beweisen zu können. Die Verletzungen, die den Thieren beigebracht wurden, waren zu groß, als daß man bei diesen Versuchen über den Geruch noch vor Täuschung sicher sein konnte.

II. Nervus opticus, der Sehnerv.

Der Sehnerv (nervus opticus) entspringt vom hintern untern Theile des Thalamus seiner Seite, ferner vom vorderen und hinteren Paare der Vierhügel [1]) und vom Corpus geniculatum, einer neben den Vierhügeln nahe am Sehhügel gelegenen grauen Erhabenheit [2]). Er wendet sich rückwärts, abwärts, auswärts zur Grundfläche des Gehirns hinab, krümmt sich um das Crus cerebri seiner Seite herum, und geht nun unter demselben hin und empfängt dabei noch einige markige Fasern von der Grenze des Sehhügels. Dann kommen endlich beide Sehnerven in der Mitte der Grundfläche des Gehirns vor dem Trichter zusammen, hängen daselbst sehr genau mit der Substanz des grauen Hügels zusammen, und nehmen also auch zum Theil von ihr ihren Anfang, und bilden die Vereinigung der Sehnerven, chiasma nervorum opticorum. Jeder Sehnerv geht nun auswärts, tritt durch seine Oeffnung der har-

---

[1]) *Santorini*, Tabulae septendecim p. 32. — Vicq d'Azyr glaubte die Markfasern des Sehnerven bis in das Innere der Sehhügel hinein verfolgt zu haben, und giebt auch den Ursprung gewisser Fasern derselben an den Vierhügeln an. Treviranus hält es nicht für unwahrscheinlich, daß sich die Fasern unter den Vierhügeln bis zur Hirnklappe, wo der 4te Hirnnerv entspringt, fortsetzen. Serres behauptet bei jungen Embryonen des Menschen und der Säugethiere, den Sehnerven bis an die innere Oberfläche der Höhle der Vierhügel verfolgt zu haben, eine Ursprungsart, die nach ihm bei den Vögeln, Amphibien und Fischen das ganze Leben hindurch sichtbar ist. (Anatomie comparée du Cerveau. Paris 1824. T. 1. p. 318.). Gall leitete den Sehnerven auch vorzüglich von dem vorderen Vierhügelpaare, vom Corpus geniculatum externum und vom Tuber cinereum ab. Treviranus (Vermischte Schriften 1820. B. III. p. 106.) sah daselbe, was Santorini, aber bei den Nagethieren fand er außerdem, daß der Sehnerv in einer sehr genauen Verbindung mit der Grundfläche des Gehirns und namentlich mit der Eminentia candicans stehe. Serres stimmt ihm in dieser letzteren Hinsicht bei. *Aimé Mathei* (Tentamen physiol. anat. de nervis in genere. Lugd. Batav. 1758. §. 10. bei Treviranus S. 107.) hat bei 2 Menschen einen Zusammenhang der Taenia mit der Wurzel des Sehnerven gefunden.

[2]) Er ist zwar härter als der Riechnerve und Hörnerve, aber doch weicher, als die übrigen Nerven. Sömmerring Nervenlehre. 2te Ausg. §. 156.

Digitized by Google

ten Hirnhaut und durch das Foramen opticum des Keilbeins in die Augenhöhle, geht in derselben unter dem M. rectus superior vorwärts, schräg auswärts und abwärts, in einem flachen, nach der Schläfe zu convexen Bogen. So erreicht er endlich die hintere Fläche des Augapfels, und tritt in ein seinem Eintritte bestimmtes Loch der Sclerotica, so daß der Ort seines Eintritts von oben und unten bestimmt in der Mitte, von der Schläfenseite und Nasenseite bestimmt, näher nach dieser, und also nach innen neben der Axe des Augapfels liegt.

Das Chiasma ist an jedem Sehnerven die Grenze zwischen dem hintern oder Hirnstücke, und dem vordern oder Augenstücke desselben.

In diesem Chiasma liegen sie nicht etwa bloß neben einander [1]), sondern sie sind vereinigt, so daß sowohl das Mark, als die häutige Scheide beider Nerven unmittelbar zusammenhängen. Man könnte zwar auf den ersten Anblick glauben, daß alle Fasern beider Sehnerven sich hier mit einander kreuzen, mithin der Sehnerv, welcher vom rechten Thalamus kommt, zum linken Auge, der, welcher vom linken Thalamus kommt, zum rechten Auge gehe; denn einestheils ist das bei allen Fischen und auch bei manchen Amphibien offenbar der Fall [2]); anderntheils hat man beobachtet, daß in gewissen Fällen, bei gewisser krankhafter Beschaffenheit des einen Auges, oder des Augenstückes des einen Sehnerven, das Hirnstück des Sehnerven der andern Seite, oder, was weniger glaublich ist, auch der Thalamus der andern Seite merklich am Umfange abgenommen habe [3]); indessen haben mehrere

[1]) Vesalius versichert, die Sehnerven an der Stelle, wo sie gewöhnlich vereinigt sind, ganz getrennt gefunden zu haben, doch so, daß sie sich gegen einander beugten. (De c. h. fabrica IV. c. 4.) Valverda sagt, indem er Vesal's Bemerkung anführt, er habe selbst beide Sehnerven getrennt gesehen. (Anat. c. h. VII. c. 3. p. 311.) Lösel erzählt, er habe beide Sehnerven ganz getrennt gefunden. (Scrutinium renum. Regiomont. 1642. p. 59.)

[2]) Bei den meisten Fischen gehen die Sehnerven bekanntlich über einander hin.

Nur bei einigen Fischen, z. B. bei den Rochen, geht ein Nerv durch den andern hindurch (Sömmerring, Nervenlehre, 2te Ausg. §. 155.), was ich auch beim Häringe fand. (Meckels Archiv 1827. St. 2.) Bei manchen Amphibien, z. B. beim Frosche, ist die totale Durchkreuzung nach Serres auch ganz offenbar (Anatomie comp. du cerveau. Tome I. à Paris 1824. 8. p. 317. Pl. V. fig. 127.). Bei den Vögeln beobachtete Petit (Mém. de l'academ. de Paris 1735. 144. in der Octavausg. 194.), ferner Carus (Versuch einer Darstellung des Nervensystems. Leipzig 1814. Tab. IV.), später A. Meckel (Archiv B. II. 25.) und hierauf Desmoulin, daß sich der Sehnerv am chiasma in horizontale Blätter spaltet, die durcheinander durchgehen, wie in einandergeschobene Finger. Serres und Joh. Müller läugnen aber, daß die äußeren Faserbündel des Sehnerven bei ihnen an der Bildung der sich durchkreuzenden Blätter Antheil nehmen.

[3]) Die ersten Bemerkungen hierüber sind von Sömmerring (in den Hess. Beitr. II. IV.) an einem Eichhörnchen, zweien Pferden und an einem monströsen Ferken, nachher auch an Hühnern und Enten gemacht worden. Blumenbach besitzt eins der von Sömmerring deßhalb untersuchten Pferdegehirne, an dem das Augenstück des Sehnerven des linken blinden Auges, und hingegen das Hirnstück des Sehnerven des

Digitized by Google

sorgfältige Anatomen [1]) gezeigt, daß die Kreuzung der Sehnerven des Menschen nur eine theilweise (der inneren Bündel) sei, und daß die

rechten Thalamus mager und geschwunden; hingegen das Augenstück des Sehnerven des rechten Auges, und das Hirnstück des Sehnerven des linken Thalamus viel stärker sind. Willmann fand bei einem Hunde, auf derjenigen Seite, wo derselbe blind war, den Augapfel kleiner, und nichts als eine dickliche, milchtrübe Masse enthaltend; der Nerv des kranken Auges war weit kürzer, dünner, glatter, grauer als der des gesunden Auges. Eben diese Veränderungen waren jenseits der Vereinigung auf der entgegengesetzten Seite zu bemerken. Ein erhabener weißer Streifen des gesunden Nerven lief über den kranken nach der entgegengesetzten Hirnhälfte. (Blumenbach's med. Bibl. II. 2. S. 391.)

Auch an Menschen sind solche Bemerkungen gemacht worden. Zuerst von Sömmerring. Er fand den rechten Sehnerven am Augapfel halb grau und halb durchsichtig, auch dünner als den linken, und jenseits des chiasma denselben auf der linken Seite kürzer und schwächer. (Blumenbach Bibl. II. 2. S. 368.) — Bei einem epileptischen Manne, der zuweilen wahnsinnig war, fand er den rechten Sehhügel und den rechten Nerven da, wo er sich um das crus cerebri herumschlägt, viel dicker und größer als den linken, bis zum Orte der Vereinigung. Von dieser bis zum Auge war nicht der rechte, sondern der linke Nerv größer. (*Noethig*, de decuss. nerv. opt. p. 40. 41.) — In einem alten Manne, dem aus beiden Augen die Linse gezogen war, fand er den rechten Augapfel ganz verdorben und zusammengefallen; den Nerven desselben dünner, härter und grauer, bis zum Chiasma; hinter demselben aber war der Sehnerv auf der linken Seite kürzer und dünner als auf der rechten, auch schien der linke Sehhügel kleiner. (Michaelis, über die Durchkr. d. Sehnerven S. 31.) — Phil. Michaelis fand bei einem Manne, der vor mehr als 30 Jahren sein rechtes Auge durch einen Schuß eingebüßt hatte, dasselbe klein, zusammengeschrumpft und mit einem bräunlichen Zellgewebe ausgefüllt; die runzlige Scheide des Sehnerven nur locker mit dem Nerven zusammenhängend, gar nicht von ihm ausgefüllt, den Nerven selbst zu einem linienbreiten ganz glatten Streifen zusammengeschrumpft, der nur in dem Grade, als er dem Orte der Vereinigung sich näherte, etwas mehr an Substanz zunahm. Der Nerve des gesunden Auges (auf dem auch einmal eine Zeitlang der schwarze Staar gewesen) war dicker als gewöhnlich, und stand mit der ihn bekleidenden harten Hirnhaut an allen Stellen in der genauesten Verbindung. Am Orte der Vereinigung ließ sich keine Veränderung bemerken, außer daß das ganze chiasma dicker als gewöhnlich zu sein schien, doch auf keiner von beiden Seiten vorzugsweise. Der Unterschied der Nerven setzte sich kreuzend fort, so daß der gesunde Nerv mit derselben Stärke sich auf die rechte Seite begab, und sich mit einer an Dicke zunehmenden Wurzel um das crus cerebri schlug. Der kranke rechte Nerve hatte hinter der Vereinigung auf der linken Seite nicht die Hälfte der Stärke, die der gesunde hatte, und schlug sich auch mit einer schmaleren und dünneren Wurzel um das crus cerebri. Der linke Sehnervenhügel war kleiner und niedriger. (Große, Mag. für die Naturgesch. des Menschen, II. St. I. S. 142, und Michaelis, über die Durchkr. d. S.-N. S. 24.) — Leveling fand an einem Gehenkten das rechte Auge, welches blind gewesen war, in eine knorpelartige Masse verwachsen, und den rechten Sehnerven bis an den Ort der Vereinigung geschwunden; von hier aus war der Sennerv auf der linken Seite bis zum Thalamus der linken Seite geschwunden. (Michaelis S. 27.) Noch einen Fall, der die Durchkreuzung bestätigt, soll Loder in Weingeist aufheben. (Michaelis, S. 31.) Folgende Anatomen haben eine vollkommene Durchkreuzung der Sehnerven geläugnet: *Galen.* de usu part. X. c. 12. »Quos si quis negligentius dissecuerit, alternare fore putaverit ...; at non non est ita.« — *Varolius*, de nerv. opt. p. 14. *Car. Stephanus*, de dissert. part. c. h. p. 247. *Jul. Casserii* pentaesthes. V. c. 16. *Plempii* ophthalmogr. I. p. 19. *Blasii* commentar. in *Vessling.* syntagma p. 221. *Santorini* observ. anatt. p. 63. *Morgagni* epist. anatt. XVIII. art. 40. (*Winslow* expos. anat. IV. Tête n. 137.). *Licutaud* essays anat. p. 346. *Zinn*, de oc. hum. p. 190. *Mathei* tentamen de nervis. *L. B.* 1758. p. 25. *Vicq-d'Azyr* in Mém. de l'ac. d. sc. de Paris 1781.

[1]) Für diese Ansicht haben sich unter andern Vicq-d'Azyr, Caldani, Ackermann, Cuvier, die Brüder Wenzel, G. R. Treviranus und Joh. Müller erklärt.

Digitized by Google

äußeren Bündel auf der Seite, auf welcher sie vorher lagen, bleiben; und hiermit stimmen auch die Erfahrungen, die man bei der Halbsichtigkeit (Hemiopie) macht [1]), sehr gut überein. Auch finden wir Beobachtungen von Fällen, wo sich die krankhafte Beschaffenheit des einen Auges oder des Augenstückes eines Sehnerven in das Hirnstück des Nerven derselben Seite, oder auf demselben Thalamus fortgesetzt haben soll [2]).

---

[1]) *Pravaz* in Archives générales de médecine. Paris 1825. Mai p. 59.

[2]) Andreas Cäsalpinus fand bei einer Schwäche des einen Auges den Sehnerven desselben dünner, und daß diese krankhafte Beschaffenheit sich hinter der Vereinigung nicht auf der andern, sondern auf derselben Seite fortsetzte. (Quaest. med. Ven. 1593. II. n. 10. fol. 22.) — Santorini fand den Nerven eines blinden rechten Auges dünner und graulich bis zu seinem Ursprunge, da der linke hingegen ganz weiß war. Auch am Orte der Vereinigung war der rechte Nerv grau, und deutlich vom linken zu unterscheiden. (Obss. anatt. c. 3. §. 14.) — Ehesel den fand den rechten Sehnerven bei beiden sonst gesund scheinenden Augen sehr viel dünner und mißfarbig, und dieser Unterschied ging hinter der Vereinigung bis zum Sehhügel hin (Philos. transact. XXVIII. n. 337. p. 281.). — Heiland erzählt, er habe gefunden, daß der Sehnerve eines fehlerhaften Auges vom Auge bis jenseits der Vereinigung dünner und weiter war. (Eph. N. C. Dec. III. Ann. 7. Obs. 157. p. 277.) — Meckel hat 3 Fälle beobachtet, in denen der Sehnerve des blinden Auges nebst dem Sehhügel derselben Seite kleiner und zusammengefallener als der andere war. (Anm. zu Haller's Grundriß, S. 386. §. 509.)

Ackermann (in der unten angeführten Schrift S. 388.) sucht die Kreuzung durch folgenden Fall zu widerlegen. An einem Menschen, dem das rechte Auge durch einen Schlag in der Kindheit zerstört worden war, fand er den rechten Sehnerven geschwunden und um mehr als um die Hälfte dünner; die harte Hirnhaut umschloß ihn nicht dicht, sondern war faltig; der Nerv selbst war zwar platt, aber wie zusammengedrückt. An der Vereinigung war der Nerv der kranken Seite dünner. Ob auch hinter derselben der rechte Nerv dünner war, will er nicht gewiß bestimmen, obwohl es ihm so schien. Aber am Orte des Uebergangs in den Sehhügel war der rechte Nerv dünner, und der rechte Sehhügel kleiner. Auch war der kranke Nerv röthlich grau, der andere weiß bis zum Sehhügel hin.

Einige Bemerkungen beweisen weder für, noch wider die Kreuzung. Morgagni fand bei einem Manne, dessen rechtes Auge um die Hälfte kleiner, runzlig und ausgelaufen war, in der Scheide des Sehnerven gar keine Nervensubstanz, sondern nur eine graue, zähe, dickliche, trübe Feuchtigkeit, bis einen Fingerbreit vom Auge. An der Vereinigung, und hinter derselben, war an beiden Nerven kein Unterschied. (De sed. et caus. morb. Ep. XIII. art. 8.) Bei einer Frau fand er das linke Auge fast eben so klein, aber weniger verdorben, der Sehnerv desselben war bis zur Vereinigung dünner, fester, inwendig grau. Hinter derselben war alles in beiden Nerven gesund. (L. c. Ep. XIII. art. 9.) Bei einem andern Menschen fand er das rechte Auge ganz verdorben, die Nervenhaut verknöchert, den Sehnerven dünner, fleischfarbig bis zur Vereinigung. Hinter derselben war alles in beiden Nerven gesund. (L. c. Ep. LII. art. 30.) Bei einem andern fand er das rechte Auge kleiner, den Sehnerven dunner, die Scheide desselben verdickt. Diese Beschaffenheit verlor sich nach hinten zu, und hinter der Vereinigung war kein Unterschied beider Nerven zu bemerken. (L. c. Ep. LXIII. art. 6.) Bei einem andern fand er den rechten Nerven von der Vereinignng bis in die Augenhöhle dünner und grauer. In der Augenhöhle war die Veränderung weniger merklich, und hinter der Vereinigung schienen beide Sehnerven völlig gesund. (L. c. Ep. LXIII. art. 5.) Isenflamm fand bei einem Menschen, der das rechte Auge, wahrscheinlich durch einen Schlag, schon lange verloren hatte, den Sehnerven vom Auge bis zur Vereinigung dünn, eingeschrumpft und mißfarbig. Hinter derselben war er, wie der Sehhügel, so gesund und dick als der linke, und beide waren gar nicht verschieden. (De difficili in obss. anatt. epicrisi resp. *J. G. Goldschmidt*. Erlang. 1771. p. 36. sqq.) Michaelis

Digitized by Google

Das Hirnstück des Nerven ist breiter und glatter, und wird vom Sehhügel nach dem Chiasma zu allmählig schmaler und walzenförmig. Vom Chiasma bis zum Augapfel bleibt der Sehnerv gleich dick. Er ist nächst dem N. trigeminus der dickste Gehirnnerv.

Der Sehnerv ist vom Sehhügel an mit einer weichen Scheide umgeben, welche eine Fortsetzung der weichen Hirnhaut ist, die den Sehhügel bekleidet. Wenn der Nerv durch das Loch der Sclerotica eingetreten ist, so verläßt ihn die weiche Hirnhaut, und scheint als Lamina fusca an die inwendige Fläche der Sclerotica zu gehen. Von der inwendigen Fläche der Scheide des Sehnerven gehen Fortsätze zwischen die Bündel des Nerven, welche dieselben mit kleineren canalartigen Hüllen umgeben. Reil hat gezeigt, daß diese letzteren den Bündeln des Hirnstücks des Nerven fehlen, und plötzlich am vorderen Theile des Chiasma ihren Anfang nehmen. (S. Th. I. Tab. II. Fig. 17.)

---

fand bei einer Zerstörung des linken Auges den Nerven desselben bis an die Vereinigung bis um die Hälfte kleiner als den rechten. Hinter der Vereinigung war kein Unterschied zu bemerken. Beide Nerven waren etwas weicher. (Große, Magazin für die Naturgeschichte des Menschen. II. St. I. S. 146, und Michaelis, über die Durchkr. S. 12.)

Es kann auch zuweilen der Sehhügel derselben Seite, an welcher das Auge und das Augenstück des Sehnerven krankhaft ist, zufällig kleiner sein. Zumal kann die mindere Größe des Sehhügels derselben Seite, und die des ihm zunächst liegenden Theiles des Sehnerven nichts beweisen, wenn desungeachtet der Sehnerv derselben Seite dicht hinter der Vereinigung nicht kleiner ist.

Manche Beobachtungen endlich sind einer theilweisen Durchkreuzung günstig. Die Brüder Wenzel beobachteten Folgendes. Eine Frau von 24 Jahren hatte in ihrem 5ten Jahre die Pocken bekommen. Beide Augen litten, vorzüglich aber das linke, welches auch 18 Wochen blind blieb, 12 Jahre vor dem Tode ging es in Eiterung über. Der Nerv desselben war da, wo er in die Augenhöhle trat, merklich kleiner, grau, hornartig und etwas durchsichtig, und ward von seiner Scheide nur sehr locker umgeben. Wie er sich dem andern Sehnerven näherte, verlor sich das hornartige Ansehen etwas, die nach außen liegenden Fasern des rechten Auges mischten sich dem Nerven der rechten Seite auch nach der Vereinigung ein. Die inneren Nervenfasern aber gingen auf die linke Seite hinüber, und kreuzten sich also mit den Fasern des andern Auges. Das kranke Auge erhielt ebenfalls von beiden Nerven Fasern, so daß die äußeren von derselben, die inneren aber von der entgegengesetzten Seite entsprangen; doch war dies letzte nicht ganz deutlich. (De penitiori cerebri structura, p. 116, 119, und Michaelis S. 29.) — »Neuerlich hat Billmann Sömmerringen ein sehr gut erhaltenes Präparat des Gehirns einer Frau geschickt, die ein Auge durch den Krebs ganz verloren hatte. Es bestätigt eine theilweise Durchkreuzung, aber auch der Sehhügel derselben Seite ist offenbar größer.« (Michaelis S. 31.)

Monro sagt, er habe ein partielles Durchkreuzen der Fasern gesehen, aus denen die Sehnerven bestehen. (Ueb. das Nervensystem, S. 31.) Ueber das Verhalten der Nervenfäden des Sehnerven im chiasma sehe man nach Sam. Thom. Sömmerring, über die Vereinigung der Sehnerven. In den Hessischen Beiträgen zur Gelehrsamkeit und Kunst, 2. u. 4. St. — J. E. Billmann über die Durchkreuzung der Sehnerven. In Blumenbach's med. Biblioth. II. 2. S. 391. — *Franc. Nicol. Noethig* praes. *Sam. Thom. Soemmerring*, de decussatione nervorum opticorum. Mogunt. 1786. 8. — *J. F. Ackermann*, de nervorum opticorum inter se nexu. Abgedruckt in Blumenbach's Bibl. III. 2. — Phil. Michaelis, über die Durchkreuzung der Sehnerven. Halle 1790. 8. — *Wenzel*, de penitiori cerebri structura. Cap. XI. p. 109. — Joh. Müller, zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes. Leipzig 1826. 8. S. 95.

Digitized by Google

Indem der Sehnerv in die Augenhöhle tritt, geht die auswendige Platte der harten Hirnhaut in die Knochenhaut der Augenhöhle über, die inwendige bleibt bei dem Sehnerven, und wird zur äußeren festen Scheide (vagina dura) desselben. Indem der Nerv in das Loch der Sclerotica tritt, endigt sich seine harte Scheide, und wird durch Zellgewebe mit der Sclerotica verbunden. Schneidet man an dieser Stelle den Sehnerven ab, erweicht daselbst das Mark und preßt es aus den canalartigen Scheiden der Bündel des Sehnerven aus, so stellen sich diese durchschnittenen canalartigen Scheiden unter der Form eines Siebes, lamina cribrosa, dar, das aber nicht von den Fasern der Sclerotica oder der Choroidea gebildet wird [1]).

Der ganze Nerv tritt also in das Loch des hintern Theils der Sclerotica und durch das Loch der Aderhaut, und breitet sich dann in die Nervenhaut des Auges aus, so daß diese seines Markes Fortsetzung ist.

Indem er durch das Loch der Sclerotica hineintritt, wird er allmälig (konisch) dünner. Auch ist hier an seinem Nervenmarke bei alten Menschen eine bräunliche oder schwärzliche Farbe bemerklich. Die Nervenhaut besteht bei dem Menschen, und nach Treviranus auch bei den meisten Thieren, nicht aus einzeln unterscheidbaren Fasern. Indessen fand er doch die Nervenhaut beim Narwall deutlich aus Fasern zusammengesetzt, und dasselbe sahen, wie er auch anführt, Valsalva, Morgagni, Zinn und Haller beim Hasen und Schweine [2]).

Dieser Nerv hat schon in einiger Entfernung vom Augapfel in seiner Mitte die Arteria centralis, welche in ihm einen feinen cylindrischen Canal (Porus opticus) ausfüllt, und näher am Augapfel auch die Vena centralis neben sich hat. Weiter hinten, wo die Arteria centralis noch nicht in ihm liegt, enthält er keinen Canal.

Uebrigens erhält der Sehnerv auch in der Hirnschale dünne Schlagäderchen aus der Carotis cerebralis, und in der Augenhöhle aus der A. ophthalmica, und den Ramis ciliaribus derselben.

Besonderheiten dieses Nerven sind: 1) seine Vereinigung mit demselben Nerven der andern Seite; 2) seine weiche Scheide, welche nicht bloß seine einzelnen Bündelchen, sondern den ganzen Nerven umgiebt; 3) seine harte Scheide, welche so offenbar eine Fortsetzung der harten Hirnhaut ist; 4) seine Endigung in der Nervenhaut. Dieser Nerv ist Empfindungsnerv des Gesichts.

---

[1]) *Jacob*, Medico-chirurgical Transactions by the medical and chirurgical Society of London. Vol XII. und G. R. Treviranus, Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Sinneswerkzeuge des Menschen und der Thiere. Heft I. Bremen 1828. Fol. p. 76.

[2]) *Vasalva*, Opera p. 142. — *Morgagni*, Ep. anat. XVII. §. 40. — *Zinn*, Commentar. soc. reg. Gotting. T. IV. 268. Descriptio oculi hum. c. III. §. 3. G. R. Treviranus a. a. O. S. 76.

Digitized by Google

III. Nervus Oculi motorius, der gemeinschaftliche Augenmuskelnerv.

Der dritte Nerv, oder der gemeinschaftliche Augenmuskelnerv, nervus oculi motorius s. tertius, entspringt aus dem innern Theile der untern Fläche des Crus cerebri, zwischen dem vordern Rande der ringförmigen Erhabenheit und der Eminentia candicans seiner Seite mit mehreren Wurzeln, deren einige weiter nach innen und hinten, andere weiter nach außen und vorn entspringen. Die innersten Wurzeln beider Nerven sind nahe bei einander [1]). Der Nerv ist anfangs glatter, nachher erhält er eine rundliche Gestalt. Er ist dicker als der N. acusticus, doch viel dünner als der N. opticus. Er geht schräg auswärts vorwärts, entfernt sich allmählig von dem der andern Seite, geht zwischen der Arteria superior cerebelli und der profunda cerebri durch [2]), unter dem N. opticus hin, tritt neben dem Türkensattel unter die harte Hirnhaut [3]), und dann durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle. Bei dem Durchgange durch die Fissura orbitalis superior liegt er weiter unten als der N. trochlearis und der Augenhöhlenast des 5ten Paares.

Endlich kommt er zwischen den beiden Köpfen des M. rectus externus, mit dem N. abducens und dem nasalis in ein Bündel verbunden, in den konischen Raum, welcher von den geraden Augenmuskeln umgeben wird, und liegt neben dem N. opticus weiter nach außen.

In der Augenhöhle theilt er sich nun in 2 Aeste, welche schon vor seinem Eintritte in die Augenhöhle durch eine Furche unterschieden waren

---

[1]) Sömmerring hat den Ursprung dieses Nerven oft bis fast auf die Wand der Augenhöhlen durch die schwarze Masse verfolgt. (Ueber das Organ der Seele, §. 19.) Auch Zinn sagt: »Originem trahunt satis profundae, ut fibrae, quo sunt interiores, eo profundiori loco nascantur, et nonnullae ad ipsam commissuram anteriorem pertingere videantur.« (De oculo hum. c. 9. §. 4. p. 175. Ed. *Wrisberg*). Gall verfolgte ihn bis weit unter die Brücke. — Malacarne beschreibt ein Bündel, welches vom obern Schenkel des kleinen Gehirns und von der Seite der Valvula cerebelli (an welcher auch der 4te Hirnnerv entspringt) aufsteigt, und sich mit dem Anfange des Nervus oculorum motorius zu verbinden scheint. — *Rolando* (Recherches anatomiques sur la moëlle alongée, Mem. della Reale Accademia della Scienze di Torino T. XXIX. Tab. I. Fig. 1—3.) ist der Meinung, er entspringe nicht von den Hirnschenkeln, d. h. von den fortgesetzten Fasern der Pyramiden, sondern von den über denselben liegenden fortgesetzten Fasern der vordern Rückenmarkbündel.

[2]) Bisweilen geht die Arteria cerebri profunda mitten durch seinen Stamm. Sömmerring, Nervenlehre, 2te Ausgabe §. 161.

[3]) Nach Bock's Untersuchungen verbindet er sich hier mit einem oder mit 2 Fädchen, die von dem an der Carotis gelegenen Geflechte zu ihm gehen.

Digitized by Google

1) Der obere Aſt iſt dünner, liegt an der äußeren Seite des N. opticus, ſteigt über den N. opticus hinauf, giebt dem M. rectus superior einige Aeſte und endigt ſich endlich im levator palpebrae superioris.

2) Der untere Aſt iſt viel dicker, geht unter dem N. opticus auf dem M. rectus inferior gerade vorwärts, bleibt nur in einer kurzen Strecke ungetheilt, und theilt ſich dann in 3 Aeſte: a) der innere Zweig des unteren Aſtes geht ſchräg einwärts unter dem N. opticus in den M. rectus internus; b) der untere Zweig iſt dünner als jener, und geht gerade vorwärts in den M. rectus inferior. Bisweilen kommen dieſer und der folgende aus einem gemeinſchaftlichen Aſte. c) Der äußere Zweig giebt eine Wurzel zum Ganglion ophthalmicum, geht zwiſchen dem M. rectus externus und dem rectus inferior vorwärts, unter dem Augapfel und in den M. obliquus inferior.

Dieſer Nerv verſorgt alſo den Levator palpebrae und die meiſten Muskeln des Augapfels, nämlich nur den M. rectus externus und den Trochlearis nicht, denn jeder von dieſen erhält einen beſondern Gehirnnerven.

IV. Nervus trochlearis, der Rollmuskelnerv.

Der vierte Nerv, oder der obere Augenmuskelnerv, oder Rollmuskelnerv, nervus trochlearis, s. patheticus, s. quartus, der dünnſte aller Nervenſtämme des ganzen menſchlichen Körpers, entſpringt hinter den Vierhügeln, aus dem Marke des Processus cerebelli ad corpora quadrigemina und der Valvula cerebelli, mit einer einfachen, zweifachen oder dreifachen Wurzel, ſo nahe bei dem der andern Seite, daß er mit ihm bisweilen zuſammenhängt [1]). Seine Wurzeln, wenn mehrere da ſind, vereinigen ſich ſogleich in einem Nervenſtamme. Dieſer Nervenſtamm geht auswärts, an der äußeren Seite des Crus cerebri abwärts herum, und kommt ſo zur Grundfläche des Gehirns, wo er zwiſchen dem hinteren Theile des großen und dem vorderen Theile des kleinen Gehirns, an der Seite des Hirnknoten, nicht weit von dem N. trigeminus erſcheint. Er hängt an einer Stelle mit dem N. trigeminus durch Zellgewebe locker zuſammen, geht hierauf über dem inneren Theile des Felſenbeines neben dem Sattel durch die für ihn beſtimmte Oeffnung der harten Hirnhaut über dem Sinus cavernosus hin, und dann durch die Fisura orbitalis superior in die

[1]) Zuweilen ſcheinen ſich, wie ich ſelbſt beobachtet habe, einige Faſern dieſer Nerven an der Urſprungsſtelle zu durchkreuzen.

Digitized by Google

Augenhöhle. Bei dem Eintritte in die Augenhöhle liegt er über dem N. oculi motorius und abducens weiter nach außen, als der N. oculi motorius, und dicht an der innern Seite des N. frontalis, mit welchem er nach Sömmerring und Bock nicht selten durch einen starken Faden verbunden ist.

In der Augenhöhle geht er schräg aufwärts, vorwärts, einwärts zum mittleren Theile des Bauches des M. trochlearis, und vertheilt sich in demselben mit mehreren Fäden. Uebrigens giebt er bis hieher keinen Ast ab, und versorgt also bloß jenen einzigen Muskel. Warum er sich nur zu diesem einzigen Muskel vertheile, und warum dieser Muskel allein einen besonderen ganzen Nervenstamm erhalte, das ist noch nicht mit hinlänglicher Wahrscheinlichkeit bestimmt worden [1]). Da er weit hinten in der Hirnschale entspringt, und von seinem Ursprunge an bis zum M. trochlearis keinen Ast abgiebt, so ist er der längste Nervenstamm des menschlichen Körpers.

V. Nervus trigeminus, der dreiastige Nerv.

Der fünfte Nerv oder der dreiastige oder der dreigetheilte Nerv, nervus divisus s. trigeminus, s. sympathicus medius [2]), s. quintus, kommt an dem äußeren Theile jeder Hälfte des Hirnknotens, da wo der Processus cerebelli ad pontem in derselben übergeht, zum Vorschein.

Er entspringt mit 2 Wurzeln; die dickere und längere Wurzel besteht aus vielen [3]), (nach Sömmerring bisweilen bis auf 100) Fäden von verschiedener Dicke, und kommt aus einer Spalte des Hirnknotens hervor. Die kleine Wurzel entspringt weiter vorn und oben, so daß sie mit jener einen Winkel macht, und besteht aus weniger, (aus drei, vier, fünf, sechs, —) aber dickeren Fäden, welche selbst in einige Bündel vereinigt sind und dicht neben der dicken Wurzel ein wenig tiefer zwischen den Fasern der Brücke hervorkommen, zuweilen aber auch durch die nämliche Spalte in der Brücke gemeinschaftlich mit der dicken Wurzel gehen. Diese kleinere Portion des Nerven scheint auch weicher und weißer zu sein, als die größere.

Nach Santorini's Beschreibung läßt sich die dicke Wurzel zwischen den Querfasern der Brücke nach hinten verfolgen. Eine Portion derselben dringt daselbst tief in die Brücke ein, ohne daß es sich bestimmen läßt, ob sie daselbst mit den in der Brücke emporsteigenden Fasern des verlängerten Markes in Verbindung

---

[1]) Otto, seltene Wahrnehmungen, 1816. S. 108. fand einmal, daß der N. naso-ciliaris von ihm entsprang.

[2]) Der Name divisus, auch der Name trigeminus (*Winslow* expos. anat. III. Nerves N. 28.) sind ihm angemessen, weil er sich, ehe er aus der Hirnschale herausgeht, in 3 Aeste theilt. Der Name sympathicus medius ist ihm wegen seiner wichtigen Verbindungen mit andern Nerven gegeben worden, ist aber nicht gut gewählt.

[3]) Wrisberg glaubt (§. 4.), daß die Zahl der Fäden nach der Geburt zunehmen.

Digitized by Google

ſtehe. Eine 2te Portion dieſer Wurzel, welche ſich durch ihre Weichheit auszeichnet, läßt ſich bis in die Medulla oblongata verfolgen. Hier liegt ſie nach Santorini [1]) faſt zwiſchen den Oliven und Pyramiden, nach Wrisberg [2]) an den Faſern der Pyramiden, nach Niemeyer [3]), Bock [4]) und J. F. Meckel [5]) in der Furche zwiſchen den Oliven und corpus restiforme, endlich nach Rolando [6]) und Langenbeck [7]) zwiſchen den Faſern des corpus restiforme.

Aus der großen und der kleinen Portion wird ein Nervenſtamm zuſammengeſetzt, welcher der dickſte aller Hirnnerven, plattrundlich und auf der rechten Seite gemeiniglich etwas dicker als auf der linken iſt.

Er tritt über dem oberen Rande des Felſenbeins durch eine längliche Oeffnung zwiſchen die auswendige und inwendige Platte der harten Hirnhaut.

Die größere Wurzel breitet bei dieſem Durchgange durch die harte Hirnhaut ihre Fäden aus, ſo daß ein platter Wulſt, intumescentia plana nervi trigemini [8]), oder ganglion semilunare Gasseri entſteht, welcher im Querdurchſchnitte halbmondförmig, nämlich nach oben platt, nach unten conver, mit vielen Blutgefäßen durchzogen, und daher röthlich iſt. Dieſer Wulſt iſt mittelſt einer zelligen Scheide, armilla, mit der umgebenden harten Hirnhaut feſter verbunden. Der Nerv nimmt in dieſem Wulſte an Dicke zu, und theilt ſich in demſelben in 3 Aeſte.

Die kleinere Wurzel geht, ohne ſich merklich auszubreiten, und ohne in den Wulſt einzutreten (obwohl einige Fädchen aus ihm zu derſelben zu gehen ſcheinen) hinter der größeren Wurzel herab und in den 3ten Aſt des Nerven über [9]).

Er geht aber dabei nicht durch den Sinus cavernosus ſelbſt [10]), ſondern

---

[1]) *Jo. Dom. Santorini*, observationes anatomicae. Venetiis 1724. 4. p. 64, 65.

[2]) *H. A. Wrisbergii* observationes anatomicae de quinto pare nervorum encephali. Gottingae 1777. rec. in *Ludwig*. Script. neurol. min. sel. T. I. 266.

[3]) C. H. Niemeyer, über den Urſprung des 5ten Nervenpaars des Gehirns in Reil's Archiv für die Phyſiologie 1812. B. XI. p. 79, 80.

[4]) A. E. Bock, Beſchreibung des 5ten Nervenpaars und ſeiner Verbindung mit andern Nerven, vorzüglich dem Ganglienſyſtem. Meißen 1817. Fol., letzte Tafel.

[5]) Meckel d. j., Handb. d. menſchl. Anat. B. III. S. 709, 710.

[6]) *Rolando*, Recherches anatomiques sur la moëlle allongée, lues etc. 1822. p. 25.

[7]) *Langenbeck*, icones anatomicae. Neurologia Fasc. I. Tab. XX und XXI. p. n. Tab. XXI. fig. 3. leitet ihn vom crus medullae ad corp. quadrigemina (von den vorderen Rückenmarkbündeln) her.

[8]) Bei Meckel (de quinto pare §. 33.) Taenia nervosa; bei Wrisberg (de quinto pare p. 11.) intumescentia semilunaris. Winslow (n. 29.) nennt ihn ein ganglion; dafür nahm ihn auch Gaſſer, und daher nennt ihn Hirſch (anat. paris quinti p. 14.) ganglion Gasseri, auch ganglion semilunare. — Meckel (p. 21.) und Wrisberg (§. 12.) nehmen ihn nicht für ein ganglion.

[9]) *Prochaska*, de struct. nerv. Tab. II. fig. 5. 6. Gött. gelehrte Anzeigen 1782. Zugabe, 21. St. S. 335. — Sömmerring, Nervenlehre §. 222. — *Paletta*, (de nervis crotaph. et bucc.) hat beobachtet, daß dieſe kleinere Portion beſonders den N. crotaphiticus und buccinatorius bilde, und theilt daher den ganzen Nerven in 5 Aeſte.

[10]) Wie Vieuſſens (neurographia p. 16.) und Winslow (n. 29. 30.) irrig angeben.

Digitized by Google

neben demselben, an seiner äußeren Seite vorbei, und wird durch die Wand desselben von ihm geschieden [1]). Nach einigen Anatomen, namentlich auch nach den neuesten Untersuchungen von Arnold, soll der Knoten einige Fäden an die harte Hirnhaut abgeben. Auch empfängt er, wie von mir [2]) bei Säugethieren, und von Bock und Arnold beim Menschen gezeigt worden ist, einige Fäden von dem an der Carotis cerebralis liegenden Geflechte des Nervus sympathicus.

Die 3 Aeste dieses Nerven, in welche er sich theilt, während er noch zwischen den Platten der harten Hirnhaut liegt, sind:

1) Der Ramus orbitalis s. ophthalmicus, der Augenhöhlenast, der dünnste und oberste Ast, der für die Iris, die Thränendrüse, die Stirne, und für einen Theil der Nasenhaut bestimmt ist, nach Bock 1 oder 2 Fäden von dem an der Carotis liegenden Geflechte des sympathischen Nerven aufnimmt und durch die obere Augenhöhlenspalte in die Augenhöhle geht.

2) Der Ramus maxillaris superior, der Oberkieferast, der für einen Theil der Nasenhaut, für die oberen Zähne, für den Gaumen, und für einen Theil der Wangenmuskeln und der Wangenhaut bestimmt ist, und durch das Foramen rotundum in die untere Augenhöhlenspalte geht, und

3) Der Ramus maxillaris inferior, der Unterkieferast, der dickste und unterste, für die Zunge, für die unteren Zähne, für die Muskeln der unteren Kinnbacke und für die Haut derselben bestimmte Ast. Er geht durch das ovale Loch aus dem Schädel heraus. Alle 3 Aeste weichen unter einem spitzigen Winkel von einander ab, der Winkel zwischen dem 1sten und 2ten ist aber spitziger, als der zwischen dem 2ten und 3ten.

Die große Portion des Nerven steht also mit allen Sinnesorganen in Verbindung, denn sie geht zur Haut, zur Zunge, zur Nase, zum Ohre (nämlich das Fädchen zum N. communicans faciei) und zum Auge. Die Rami nasales sind vielleicht Empfindungsnerven des Geruches; der Ramus lingualis ist gewiß der Empfindungsnerv des Geschmacks.

Die kleine Portion des Nerven gelangt nach den Untersuchungen von Paletta und Ch. Bell nur zu Muskeln, und zwar vorzüglich zu den Kaumuskeln, zum Masseter, Temporalis, zu dem Pterygoideus externus und internus, zum Buccinator, zu den Lippenmuskeln und zu dem Mylohyoideus. Die Zweige derselben mischen sich zum Theil den Aesten der großen Portion bei, und gehen mit Fäden derselben vereinigt zu diesen Muskeln hin.

---

[1]) *Meckel*, de quinto pare §. 34. *Haller*, elem. phys. IV. p. 209.

[2]) *E. H. Weber*, Anatomia comparata nervi sympathici. Lipsiae 1817. p. 11.

Digitized by Google

Erſter Hauptaſt, Nervus s. Ramus ophthalmicus oder orbitalis.

Der Augenaſt des 5ten Nerven (ramus ophthalmicus s. orbitalis) iſt der oberſte und dünnſte, viel dünner als die beiden anderen. Er geht neben dem Sinus cavernosus ſchräg aufwärts und vorwärts, tritt durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle, liegt im Eintritte weiter nach außen, als der N. tertius, quartus und sextus, und theilt ſich dabei wieder in 3 Aeſte, ramus nasalis, lacrymalis und frontalis, welche ſchon vor dem Eintritte in die Augenhöhle unterſchieden werden können und nur dicht neben einander und durch Zellgewebe verbunden liegen, dann in der Augenhöhle divergiren, und alleſammt vor- und aufwärts gehen.

a. Ramus nasalis oder naso-ciliaris, der Naſenaſt oder der Naſenaugenaſt.

Der Naſenaſt (ramus nasalis s. naso-ciliaris) iſt von mittlerer Dicke, liegt tiefer und mehr nach innen als die anderen beiden Aeſte, giebt den Ramus ciliaris zu dem ganglion ophthalmicum, welcher ſpäter beſchrieben wird, geht mit dem N. abducens und oculi motorius zwiſchen den beiden Köpfen des M. rectus externus in den koniſchen Raum der geraden Augenmuskeln, dann ſchräg über dem Sehnerven und unter dem M. rectus superior zur inneren Wand der Augenhöhle und theilt ſich daſelbſt in Zweige, vorher aber an der Stelle, wo er über den Sehnerven weggeht, ſchickt er 1 oder 2 dünne Ciliarnerven, welche, ohne in das Ganglion ophthalmicum einzutreten, zu der Iris gehen.

1) Ramus nasalis, geht an der inneren Wand der Augenhöhle, durch das vordere Foramen ethmoidale in ein Knochencanälchen, welches ihn zur Siebplatte in die Hirnſchale unter die harte Hirnhaut führt, von da kommt er durch eine der vorderen Oeffnungen der Siebplatte des Siebbeines in den vorderen oberen Theil der Naſenhöhle, und wird dabei ein wenig dicker. Er giebt hier einige kleine Zweige an die Schleimhaut, und kommt zwiſchen dem unteren Rande des Naſenknochens und dem Naſenknorpel auf den Rücken der Naſe und geht dicht auf dem Knorpel in 2 Zweige getheilt zur Haut der Naſenſpitze und zu dem Naſenflügel herab.

Oft giebt er ſchon, während ſeines Verlaufs in dem Knochencanälchen, einen Zweig zur Schleimhaut an der äußeren Wand der Naſenhöhle, der zum vorderen Ende der unteren Naſenmuſchel herabgeht, einen andern zur Schleimhaut an der Scheidewand der Naſe, und bisweilen einen zarten Zweig aufwärts und vorwärts zum

Digitized by Google

Rücken der äußeren Naſe. Nachdem er durch die Siebplatte wieder in die Naſenhöhle getreten iſt, geht er in einer Furche des Naſenbeines zwiſchen dem Periosteum und der Naſenhaut hinab, giebt in der Nähe des unteren Randes des Naſenbeines einen Aſt, der zur Naſenſcheidewand und zu der inneren Haut der Naſe bis an die Naſenlöcher läuft, und dringt dann da, wo der Knorpel des Naſenrückens angewachſen iſt, zur äußeren Naſe hervor, liegt hier unter dem Compressor nasi, und endigt ſich mit einem Zweige in die Haut der Naſenſpitze und in die innere Haut am Naſenloche, mit einem zweiten in die Haut des Naſenflügels.

Der erſtere Zweig vereinigt ſich mit einem Aſte des Infraorbitalnerven, der 2te giebt, wie Bock [1]) behauptet, auch Muskelzweige zum Compressor nasi und depressor alae nasi. Bisweilen ſind 2 Ethmoidalnerven vorhanden. Der 2te geht dann durch das mittlere Loch, und bleibt in der Naſenhöhle.

2) Ramus infratrochlearis geht unter der Rolle des M. trochlearis zum inneren Augenwinkel, verbindet ſich daſelbſt mit einem Aeſtchen des N. frontalis oder supratrochlearis, vertheilt ſich im Thränenſacke und deſſen Muskel, in der Carunkel, und tritt, in mehrere Zweige getheilt, aus der Augenhöhle hervor, welche ſich im Orbicularmuskel der Augenlieder und in der Haut der Stirne und der Naſenwurzel endigen [2]).

Ganglion ciliare [3]).

Der kleine Nervenknoten der Irisnerven (ganglion ciliare s. ophthalmicum) liegt an der äußeren Seite des Sehnerven, einige Linien weit von dem Eintritte deſſelben, durch Zellgewebe mit ihm verbunden, unter dem verbundenen Kopfe des M. rectus superior und rectus externus im Fette verborgen [4]); iſt länglich viereckig, nach dem Sehnerven hin etwas concav, nach außen conver.

Er hat vorzüglich 2 Wurzeln. Die kurze und dicke Wurzel giebt der S. 443. angeführte Aſt des N. oculorum motorius. Sie geht

---

[1]) Siehe Bock, Beſchreibung des 5ten Nervenpaars 1817, und außerdem deſſen Handb. der praktiſchen Anatomie 1820. 8. p. 170. 340.

[2]) Nach Langenbeck (Icones anatomicae, Neurologia Fasc. III. Tab. XXII. fig. 2. 3.) ſchickt der von der Lamina cribrosa in die Naſe übergegangene N. ethmoidalis einen Aſt zur Schleimhaut der Stirnhöhle.

[3]) Die erſte Bemerkung des Ganglion ophthalmicum ſ. in Polycarp. Gottlieb Schacher diss. de cataracta. Lips. 1705. 4. Die erſte Abbildung auf Halleri tab. baseos cranii in Iconum fascic. I.

[4]) Man kann den M. rectus externus nahe an ſeinem Urſprunge abſchneiden und aufbinden, um es zu ſehen.

Digitized by Google

zum Ganglion aufwärts. Die andere viel längere und dünnere Wurzel iſt ein Aſt des N. naso-ciliaris des Trigeminus, entſpringt ſchon vor dem Eintritte dieſes Nerven in die Augenhöhle, bleibt aber noch einige Zeit dicht mit dem Stamme durch Zellgewebe verbunden; und tritt von hinten und oben in das Ganglion. Selten iſt dieſe Wurzel doppelt, und noch ſeltener ſind beide Wurzel-Aeſte des N. oculi motorius [1]). Nach Bock [2]) ſteht der Knoten entweder unmittelbar mit den Geflechten des ſympathiſchen Nerven an der inneren Carotis durch Nervenfäden in Verbindung, oder wenigſtens mittelbar, indem eine oder beide Wurzeln deſſelben, oder die Nervenzweige, die dieſe Wurzeln abgeben, Nervenfäden von ihm aufnehmen. Hierüber ſiehe die Beobachtungen unten bei der Beſchreibung des ſympathiſchen Nerven, wo Ribes, Bock, H. Cloquet, Hirzel, Arnold und Langenbeck in dieſer Rückſicht angeführt worden ſind.

Nervi ciliares.

Die Nerven der Iris (nervi ciliares) ſind feine Nerven, doch von verſchiedener Dicke, die, einen oder zwei ausgenommen, welche vom N. naso-ciliaris unmittelbar abgegeben werden, alle aus dem Ganglion ciliare entſpringen. Sie liegen in 2, bisweilen in 3 Bündeln neben einander, welche vom vorderen Theile des Knotens entſpringen und meiſtens dicht am Sehnerven zur Sclerotica gehen. Einige zartere Fäden gelangen indeſſen auch auf größeren Umwegen, die ſie durch das den Sehnerven umgebende Fett machen, zur hinteren Seite des Augapfels [3]).

Außer dieſen Nerven kommen noch einer oder 2 Nervi ciliares an der Stelle aus dem N. naso-ciliaris ſelbſt, wo er ſchräg über den Sehnerven hingeht, und gehen auf dem Sehnerven vorwärts. Einer derſelben verbindet ſich mit einem Faden des Ganglion und ſetzt mit ihm einen Nerven zuſammen, der mit den anderen vorwärts geht. Bisweilen kommt auch ein Ciliarnerv aus der langen oder der kurzen Wurzel des Knotens beſonders hervor.

Alle dieſe Nervi ciliares gehen zum hinteren Theile des Augapfels, durchbohren daſelbſt die Sclerotica in ſchiefer Richtung, liegen dann zwiſchen der Sclerotica und der Aderhaut, werden platt, und gehen daſelbſt ungefähr 12 bis 16 an der Zahl am ganzen Umfange der äußerlichen Aderhaut an allen Seiten des Augapfels vorwärts bis zum

---

[1]) *Morgagni*, epist. XVI. §. 59. *Meckel*, de quinto pare p. 38. *Joh. Gottfr. Zinn*, descr. oculi hum. cap. IX. §. 8. Tab. VI. fig. 1. — *Bock*, a. a. O.

Das Verhalten des Augenknoten bei den Thieren hat Tiedemann's Schüler, (*Ferd. Muck*, diss. de ganglio ophthalmico et nervis ciliaribus animalium. Landsh. 1815. 4.) ſehr gut beſchrieben. Einige Beobachtungen darüber ſehe man auch in meiner Schrift: Tractatus de motu iridis. Lips. 1821. 4. — Retzius hat bewieſen, daß auch beim Pferde ein Ganglion ophthalmicum vorhanden ſei, wo es Muck nicht finden konnte.

[2]) Bock, Handb. der prakt. Anatomie. 1820. 8. p. 202. 203; die anderen Schriftſteller ſiehe citirt bei der Beſchreibung des ſympathiſchen Nerven.

[3]) Bock, Handbuch der praktiſchen Anatomie. 1820. B. 1. p. 339. Siehe auch unten die Beſchreibung des N. sympathicus

Digitized by Google

Orbiculus ciliaris, ohne unterwegs der Aderhaut Fäden zu geben [1]).

Am Orbiculus ciliaris theilt ſich jeder Nerv in 2 Aeſte, die von demſelben bedeckt werden und ſich nach und nach in feinere in die Iris tretende Aeſte zertheilen [2]).

b. Ramus lacrymalis.

Der Thränenaſt (nervus lacrymalis) iſt der dünnſte und am meiſten nach außen liegende Aſt. Er geht dicht unter dem Gewölbe der Augenhöhle ſchräg vorwärts, aufwärts und auswärts zur Thränendrüſe. Ehe er ſie erreicht, oder in ihr ſelbſt, theilt er ſich in 2 Fäden, welche ſich bisweilen durch einen Faden innerhalb der Thränendrüſe wieder mit einander verbinden.

Der äußere, welcher dünner iſt, tritt unter die Knochenhaut der äußeren Wand der Augenhöhle und daſelbſt in eine Furche oder in ein Canälchen des Wangenknochens, in welchem ein Aſt des Subcutaneus malae emporſteigt und ſich mit ihm verbindet. Von einer Stelle dieſer zuſammenſtoßenden Nerven geht in der Regel ein Nervenfaden in die Schläfengrube, meiſtens in einem Canälchen, zuweilen in einer Rinne des Wangenbeins, hinüber, der ſich daſelbſt mit dem N. facialis, ſeltener auch mit dem Temporalis ſuperficialis des 3ten Aſtes des Trigeminus verbindet.

Der innere, welcher dicker iſt, tritt auch in die Drüſe, theilt ſich in derſelben in mehrere Aeſte, welche ſich unter einander verbinden, ein an der concaven Seite der oberen Thränendrüſe liegendes Netz bilden, dünnere Zweige zur unteren Thränendrüſe oder zur Conjunctiva, und einen ſtärkeren Zweig zum M. orbicularis palpebrarum ſchicken, der ſich mit einem Zweige des N. supraorbitalis und des N. facialis verbindet. Bock iſt der Meinung, daß ſich einige Aeſte wirklich zwiſchen den Läppchen der Thränendrüſe endigen, was aber noch ungewiß iſt [3]).

---

1) Einige haben angenommen, daß ſie der Aderhaut Fäden geben (le Cat. tr. des sens. p. 154.).

2) J. F. Meckel d. ä. glaubte im Orbiculus ciliaris, wenn er ihn einige Zeit einweichte, kleine weiße, ziemlich regelmäßig von einander abſtehende Pünktchen zu bemerken, in welche auf der einen Seite Nerven übergingen, und von welchen auch Nervenfäden ausgingen, die ſich zur Iris begaben. Er hielt ſie für kleine Nervenknoten.

Bock glaubte an den in der Iris ſich verbreitenden Zweigen kleine Anſchwellungen bemerkt zu haben. — Heiſter nahm an, daß Aeſte der Ciliarnerven auch in das Corpus ciliare gingen; Zinn aber fand nie ein einziges Fäſerchen derſelben in daſſelbe hineingehen (de ocul. hum. p. 192.) Nach Tiedemann und Langenbeck ſollen Fädchen des Ganglion ophthalmicum mit der A. centralis retinae in den Sehnerven und in den Augapfel eindringen. Siehe unten die Beſchreibung des N. sympathicus.

3) Bock, Beſchreibung des 5ten Nervenpaars S. 20, erwähnt einen Fall, wo er einen dünnen Aſt vom äußeren Zweige des Thränennerven ſich mit einem Ciliarnerven verbinden und mit ihm in Begleitung der äußeren langen Ciliararterie in den Augapfel eindringen ſah.

Digitized by Google

c. Ramus frontalis.

Der **Stirnaſt** (ramus frontalis), welcher der dickſte und oberſte Aſt iſt, geht dicht unter dem Gewölbe der Augenhöhle über den Levator palpebrae superioris fort. In der Nähe ſeines Eintritts in die Augenhöhle nimmt er eine kurze Strecke hindurch den N. patheticus in ſeine Scheide auf. Bisweilen giebt er ſofort einen Faden, welcher zwiſchen dem M. obliquus superior fortgeht, an der inneren Seite der Augenhöhle ſich mit dem N. infratrochlearis verbindet, und ein Aeſtchen durch den Sinus frontalis hindurch zum M. corrugator supercilii [1]) ſchickt.

Dann theilt er ſich näher oder entfernter vom Margo supraorbitalis in 2 Aeſte:

1) Ramus frontalis maior s. supraorbitalis, der dickere Aſt, geht in 2 Aeſte getheilt durch die incisura supraorbitalis, oder durch das Foramen supraorbitale, ſteigt zur Stirne hinauf. Beide Zweige gehen bedeckt vom M. frontalis aufwärts, und ſchicken theils tiefliegende Aeſte zur behaarten Haut des Kopfes, theils oberflächlichere, welche dem M. frontalis und der Haut der Stirne angehören.

2) Ramus frontalis minor s. supratrochlearis, geht nach innen vorwärts, über der Rolle zur Augenhöhle hinaus, giebt unmittelbar vor der Rolle ein Aeſtchen dem N. infratrochlearis, läuft hierauf bedeckt vom M. orbicularis, dem Frontalis und dem Corrugator aufwärts, vertheilt ſich in dieſen Muskeln und in der Haut.

Zweiter Hauptaſt, Nervus maxillaris superior.

Der **Oberkiefernerv** (ramus maxillaris superior) iſt der 2te Aſt des N. trigeminus, und viel dicker als der erſte. Er geht durch das **runde Loch** des Keilbeins, gerade vorwärts aus der Hirnſchale heraus und kommt ſo an die Stelle, wo die Fissura spheno-maxillaris und orbitalis inferior zuſammenſtoßen.

1) Nervus subcutaneus malae.

Hier giebt er zuerſt den Wangenhautnerven. Dieſer dünne Nerv geht durch die Fissura orbitalis inferior, und dann (oft) in einer Furche am großen Flügel des Keilbeins, meiſtens unter der Knochenhaut, in der Augenhöhle vorwärts, und theilt ſich in einen **oberen** und in einen **unteren** Zweig. Der **obere Zweig** giebt 2 Fäden, die ſich mit dem N. lacrymalis und facialis verbinden.

[1]) Siehe *Wrisberg*, not. 125. ad Haller. prim. lin. Nach ihm kommen dieſer Aſt des N. frontalis und der N. infratrochlearis in ein Ganglion zuſammen, aus dem der Aſt in den Sinus frontalis geht. *Blumenbach*, de sinub. frontalib. p. 10. 11. und *Bock* a. a. O., der keinen Faden im Sinus frontalis bleiben ſahe.

Digitized by Google

Der eine geht nämlich am vorderen Ende der Fissura orbitalis inferior in ein Canälchen, oder in eine Furche des Wangenbeins über und verbindet ſich mit einem Aſte des Thränennerven, der andere Zweig tritt in eine in der Schläfengrube befindliche Furche, oder in ein Canälchen, welches bis an den Stirnfortſatz zu einem Aſte des N. facialis führt [1]). Der untere Zweig durchbohrt die Knochenhaut der Augenhöhle, geht unter dem M. rectus bis zur Augenhöhlenfläche des Wangenbeins und von da durch den Knochen hindurch, einfach oder in 2 Zweige geſpalten ins Geſicht, und gehört dem Orbicularis palpebrarum, unter welchem er zum Vorſchein kommt, und der Haut der Wange an.

Im oberen Theile der Fissura sphenomaxillaris giebt der N. maxillaris superior den Ramus sphenopalatinus, und dann den Alveolaris, und ſeine Fortſetzung geht als N. infraorbitalis fort.

2) Nervus sphenopalatinus.

Der Stamm des N. sphenopalatinus, des Keilbeingaumennerven, iſt ſehr kurz, geht ziemlich ſenkrecht hinab, und theilt alsbald ſeine beiden Hauptäſte in den Ramus pterygoideus und palatinus. Gewöhnlich befindet ſich an dieſer Theilungsſtelle ein dreieckiger oder unregelmäßig viereckiger, zuweilen herzförmiger Nervenknoten, ganglion sphenopalatinum Meckelii [2]), der an der äußeren Seite des Foramen sphenopalatinum liegt. Dieſes Ganglion giebt, wenn es vorhanden iſt, den Vidianus, die Palatinos, die Nasales superiores und den Nasopalatinus. J. F. Meckel d. ä. behauptete, daß dieſer Knoten dann vorhanden ſei, wenn der N. sphenopalatinus aus 2 Portionen beſtehe, welche neben einander aus dem N. maxillaris superior entſpringen, und ſich mittelſt des Knotens vereinigten. Hirzel ſahe dieſen Knoten nur ſelten fehlen. Arnold [3]) behauptet dieſen Knoten niemals fehlen geſehen zu haben, und ſieht daher die zu dem Knoten gehenden Aeſte des N. sphenopalatinus als die eine vom 5ten Nervenpaare kommende, den Ramus profundus des N. Vidianus als die 2te vom ſympathiſchen Nerven kommende Wurzel dieſes Knotens an, und betrachtet den Ramus superficialis des N. Vidianus, die Nervos palatinos, die Nervos nasales superiores und den N. nosopalatinus als die conſtanten Aeſte des Ganglion. Mir ſcheint dieſer Knoten ein zum ſympathiſchen Nerven gehörender Knoten zu ſein, der mit dem N. sphenopalatinus zuſammenhängt, und der auf der einen Seite den Ramus profundus des N. Vidianus empfängt, auf der andern Seite den N. nasopalatinus Scarpae in die Na-

[1]) Bisweilen vereinigt er ſich auch außerdem mit einem Aſte des N. temporalis superficialis des Trigeminus. Bisweilen kommt auch noch aus der erwähnten Verbindung mit dem Lacrymalnerven noch ein beſonderer durch den Wangenknochen zur Schläfengrube gehender Zweig.

[2]) *Meckel*, in mém. de Berlin 1749. p. 84. *Scarpa*, annotatt. anatom. II. p. 67.

[3]) *F. Arnold*, der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen in anatomischer und physiologischer Hinsicht bearbeitet. Mit 10 Kt. Heidelberg und Leipzig 1831. 4. p. 79.

Digitized by Google

ſenhöhle ſchickt. Denn dieſer Aſt iſt deswegen für einen Theil des ſympathiſchen Nerven zu halten, weil er ſich zuweilen oder vielleicht immer mit demſelben Nerven von der andern Seite auf eine ſichtbare Weiſe vereinigt, was, ſo viel wir wiſſen, bei keinem andern Aſte eines Gehirnnerven ſtattfindet. Hirzel [1]) will dreimal eine Verbindung des Ganglion sphenopalatinum mit dem Sehnerven beobachtet haben, welche durch einige Fäden geſchahe, die durch die Fissura orbitalis inferior in die Augenhöhle drängen und ſich da mit dem Sehnerven verbinden, wo er in die Augenhöhle trete. Arnold fand dieſe Fäden auch, ſahe aber nur, daß ſie ſich mit der Scheide des Sehnerven verbanden, während Hirzel glaubt, daß es ihm einmal geglückt ſei, dieſelben in die Subſtanz des Sehnerven hinein zu verfolgen [2]).

A. Nervus Vidianus oder pterygoideus.

Der zurückgehende Aſt oder Flügelaſt (ramus pterygoideus s. recurrens s. Vidianus) geht in dem Canalis Vidianus durch den oberſten Theil des Processus pterygoideus rückwärts und theilt ſich in 2 Aeſte.

a. Ramus petrosus s. superficialis ſieht nicht röthlich, ſondern wie der Aſt eines Gehirnnerven weißlich aus, geht durch die ſehnigknorpliche Subſtanz zwiſchen dem Keilbeine und Felſenbeine zur Höhle der Hirnſchale hinauf, und in einer Rinne der vorderen Fläche des Felſenbeines ſchräg auswärts rückwärts zum Hiatus des Fallopiſchen Canals, tritt in denſelben hinein und vereinigt ſich mit dem N. facialis, der durch dieſen Canal geht.

b. Ramus sympathicus s. profundus ſieht röthlicher und wie ein Aſt des N. sympathicus aus, geht durch die ſehnigknorplige Maſſe zwiſchen dem Ende des Felſenbeins und dem Anfange des Processus pterygoideus, tritt in den Canalis caroticus, geht durch denſelben zwiſchen der harten Hirnhaut des Canals und der Carotis cerebralis erſt rückwärts, dann hinab, vereinigt ſich ſchon im Canale (ſeltner erſt, nachdem er aus demſelben herausgekommen), mit einem oder 2 Aeſten des N. sympathicus, welche zu dem N. abducens von der Carotis interna emporſteigen, und geht mit dieſen in das an der Carotis interna liegende Geflecht des N. sympathicus und in den an den 2 oberſten Halswirbeln liegenden oberſten Halsknoten über. Man hat hinreichenden Grund, ihn als einen Aſt zu beſchreiben, der vom N. sympathicus zu dem Ganglion sphenopalatinum heraufſteigt. Hier wurde er nur des Zuſammenhanges wegen erwähnt, und es wird daher von ihm bei der Beſchreibung des N. sympathicus noch einmal die Rede ſein.

B. Aeſte, welche durch das Foramen sphenopalatinum in die Naſenhöhle gehen.

a. Der Schlundkopfzweig, (ramus pharyngeus) gelangt durch das Foramen sphenopalatinum in die Naſenhöhle, geht dann an der

[1]) *L. Hirzel*, Diss. inaug. med. sist. nexus nervi sympathetici cum nervis cerebralibus; o. Tab. Heidelb. 1824. 4. p. 38.

[2]) Tiedemann ſah einmal eine Verbindung des Ganglion sphenopalatinum und des

unteren Seite des Körpers des Keilbeins in einer Furche nach hinten, tritt oben an der Choana narium heraus, und giebt Zweige zur Schleimhaut der Naſe, der Trompete und zum Pharynx.

b. Die oberen Naſennerven, nervi nasales superiores, ſind 4 bis 5 kleine Zweige, welche von der inneren Oberfläche des Ganglion sphenopalatinum abgehen, gleichfalls die ſehnige, das Foramen sphenopalatinum verſchließende Haut durchbohren und ſich an der Schleimhaut der Seitenwand der Naſe verbreiten.

c. Der Naſengaumennerv, N. nasopalatinus Scarpae,[1]) welcher auch durch das Foramen sphenopalatinum vom Ganglion sphenopalatinum in die Naſenhöhle gelangt, und daſelbſt oben unter dem Keilbeinkörper bogenförmig zur Naſenſcheidewand geht, hier einige Zweige an die Schleimhaut giebt[2]), und nun zwiſchen der Schleimhaut und dem Periosteo nach vorn zum Boden der Naſenhöhle und zum Foramen incisivum herabſteigt, in welchem er ſich bei ſeinem Uebergange in die Mundhöhle mit dem Nerven der anderen Seite, und meiſtens auch, nach Bock, mit einem Endzweige des vorderen Zahnnerven vereinigt und im vorderſten Theile der Haut des harten Gaumens und in dem Zahnfleiſche endigt. Zuweilen ſcheint an der Vereinigungsſtelle ein Knötchen befindlich zu ſein[3]).

C. Aſt, welcher durch den Canalis pterygopalatinus zum Gaumen geht.

Der Gaumenaſt, ramus palatinus s. pterygopalatinus, weicht, indem er abwärts geht, vom N. pterygoideus unter einem rechten Winkel ab, tritt in die Grube zwiſchen dem processus pterygoideus des Keilbeins, dem Oberkiefer und Gaumenbeine hinab, und theilt ſich in 3 Aeſte, die zuweilen, wenn das Ganglion sphenopalatinum da iſt, aus ihm einzeln entſpringen.

a. Nervus palatinus maior s. anterior iſt die Fortſetzung des N. palatinus. Giebt, wenn das Ganglion sphenopalatinum fehlt,

---

ciliare durch einen ziemlich dicken durch die Fissura orbitalis inferior in die Augenhöhle gehenden Faden. Siehe Arnold a. a. O. p. 81.

[1]) *A. Scarpa*, Annotationes anatomicae II. c. 5.

[2]) Nach Wrisberg und Arnold, dem nach Scarpa ſoll er keine ſolchen Zweige abgeben.

[3]) Nach Arnold ſoll eine ſolche Vereinigung nicht immer, und ein Knötchen niemals vorhanden ſein. Mit Unrecht hält ſich Hipp. Cloquet für den Entdecker dieſes Ganglion, er iſt in den Handbüchern der Anatomie ſchon längſt angeführt worden, z. B. in der Hildebrandtſchen Ausgabe, 1802. p. 372. Arnold (über den Ohrenknoten. Heidelberg 1825. 4. S. 23.) läugnet, daß es hier einen wahren Knoten gäbe. — Ueber die Nerven der Naſe ſehe man: *J. Gottl. Haase*, de nervis narium internis. Lips. 1791. 4. und *Anton Scarpa*, de nervis nasalibus interioribus e pare quinto nervorum cerebri, in anatom. annotat. cap. IV. V. VI.

Digitized by Google

bei einigen erſt die Nervos nasales superiores, und den N. nasopalatinus, geht dann im Canalis pterygopalatinus anterior hinab, giebt durch Löcher des ſenkrechten Theiles des Gaumenbeines 1 oder 2 Naſennerven, nervi nasales inferiores, welche ſich in der Schleimhaut über der unteren Naſenmuſchel, und wenn 2 da ſind, in der des unteren Naſenganges verbreiten. Auch ſchickt er bisweilen in dieſem Canale ein Aeſtchen, das durch ein beſonderes Canälchen zwiſchen dem Canalis pterygopalatinus anterior und posterior abwärts auswärts zum Gaumen geht, und ſich in der Gaumenhaut vertheilt.

Der N. palatinus maior kommt auf dem Gaumen aus der unteren Oeffnung ſeines Canals heraus, und theilt ſich in einen äußeren dem Zahnfleiſche der Backenzähne und der angrenzenden Theile der Gaumenhaut angehörenden Aſt, und in einen oder 2 innere, längere in der Gaumenhaut und in dem vorderen Theile des Zahnfleiſches ſich endigende Aſte.

b. Nervus palatinus posterior s. minor, iſt dünner als jener, geht durch den Canalis pterygopalatinus posterior hinunter, kommt aus der unteren Oeffnung deſſelben an der unteren Fläche des Processus pyramidalis des Gaumenbeines heraus, und vertheilt ſich im Levator veli, im Velum palatinum, im Zäpfchen und in der Mandel.

c. Nervus palatinus externus s. minimus, iſt noch dünner, als der Posterior, und unbeſtändig. Er geht durch einen 3ten Canal zwiſchen dem Processus pyramidalis des Gaumenbeines und der letzten Zahnhöhle hinunter, und endigt ſich im Velum palatinum, in der Mandel und in dem Zäpfchen [1]).

3. Nervus alveolaris posterior maxillae superioris.

Der hintere Zahnnerv des Oberkiefers, N. dentalis posterior, entſpringt von dem N. maxillaris superior, nachdem er den Sphenopalatinus abgegeben hat; geht abwärts und theilt ſich in 2 Aeſte, welche bisweilen jeder beſonders entſpringen. Der hintere Zweig geht in den oberen Theil des Buccinator, und ſchickt zuweilen auch einen Aſt zum hinterſten Backenzahne und zu dem ihn umgebenden Zahnfleiſche, oder auch zum M. pterygoideus, denn er iſt ſehr veränderlich. Der vordere größere Zweig, den man den hinteren Zahnnerven des Oberkiefers nennt, geht durch ein Loch an der hinteren Seite des oberen Kinnbackenbeins in den Sinus maxillaris, läuft daſelbſt in einer bogenförmig

[1]) Bock ſah keine Nervenäſte vom Ganglion sphenopalatinum ſich zur Haut des Sinus sphenoidalis oder maxillaris verbreiten. Zwar ſah er zuweilen einen Nervenaſt, welcher vom Ganglion sphenopalatinum durch die Keilbeinhöhle, oder am Körper des Keilbeins unter der Knochenhaut emporſtieg, allein dieſer Aſt endigte ſich nicht in der Höhle, ſondern verband ſich mit dem 6ten Nervenpaare.

Digitized by Google

gekrümmten Furche hin und kommt mit der äußeren Oberfläche der Haut des Antrum Highmori in Berührung, jedoch ohne ihr Zweige zu geben, und verbindet ſich endlich mit 1 oder mit 2 Aeſten des vorderen, von dem N. infraorbitalis kommenden Zahnnerven. Er giebt kleine Zweige zu den Wurzeln der 3 hinteren Backenzähne und zu dem zwiſchen ihnen liegenden Zahnfleiſche.

4. Nervus infraorbitalis.

Der Unteraugenhöhlennerv iſt der letzte und dickſte Aſt des N. maxillaris superior, oder eigentlich die Fortſetzung deſſelben. Er geht vorwärts durch den Canalis infraorbitalis.

Im Durchgange durch dieſen Canal giebt er, außer unbeſtändigen Aeſten, welche durch Löcherchen in den Sinus maxillaris hinabgehen, und ſich mit dem Verbindungszweige des vorderen und des hinteren Zahnnerven vereinigen, den Ramus alveolaris anterior oder dentalis anterior maxillae superioris. Dieſer geht aus dem Canalis infraorbitalis durch ein Loch in ein zwiſchen den Platten des Oberkiefers gelegenes Canälchen, welches erſt nach außen herabgeht und ſich dann nach innen bis zum vorderen Naſenſtachel wendet. Auf dieſem Wege ſchickt der Nerv erſt einen Zweig, oder einige Zweige nach hinten, welche ſich mit dem hinteren Zahnnerven verbinden, und zuweilen ein Geflecht bilden. Aus ihm entſpringen die Nerven für die vorderen Backenzähne und für das zwiſchen ihnen gelegene Zahnfleiſch. Dann gehen Aeſte des vorderen Alveolarnerven zu dem Eckzahne, zu den Schneidezähnen und zu dem zwiſchen ihnen gelegenen Zahnfleiſche. In jede Wurzel geht ein äußerſt weicher Nerv und endigt ſich im Zahnſäckchen. Die für das Zahnfleiſch beſtimmten Aeſte durchbohren ziemlich regelmäßig die Zahnzellenwand zwiſchen je 2 Zahnzellen. Der Endzweig des vorderen Alveolarnerven geht meiſtens zu dem Foramen incisivum und verbindet ſich da mit dem N. nasopalatinus. Bisweilen entſpringen vom Verbindungsaſte mit dem hinteren Alveolarnerven ein Aſt, welcher ins Geſicht zum M. buccinator und levator anguli oris kommt, und ein anderer, welcher zur Schleimhaut in den unteren Naſengang geht.

Aus der vorderen Oeffnung des Canalis infraorbitalis kommt dann der N. infraorbitalis unter dem Levator labii superioris proprius ins Angeſicht und theilt ſich in 2 Aeſte.

Der innere Aſt ſpaltet ſich gewöhnlich in den inneren Nerven des unteren Augenlieds und in den oberen und unteren Naſenhautnerven, der äußere Aſt aber in den äußeren Nerven des unteren Augenlieds und in 3 Lippennerven.

Der innere Nerv des unteren Augenlieds, n. palpebralis inferior internus, geht nämlich hinter dem M. levator labii supe-

Digitized by Google

rioris in die Höhe, kommt zum M. orbicularis und zu der Haut des unteren Augenlieds, und verbindet ſich mit dem N. facialis und zuweilen auch mit dem N. infratrochlearis, ſchickt auch Fädchen zur Thränencarunkel, zum Thränenſacke und zu der Haut der Naſenwurzel.

Der äußere Nerv des unteren Augenlieds, n. palpebralis inferior externus, durchbohrt den M. levator labii superioris und geht zum M. orbicularis des unteren Augenlieds und zu der Haut deſſelben in die Höhe, und verbindet ſich auch mit dem N. facialis und subcutaneus malae. Bisweilen iſt auch nur ein einziger Nerv für das untere Augenlied vorhanden.

Der obere Hautnerv der Naſe, n. subcutaneus nasi superior, geht zwiſchen dem M. levator labii superioris und dem Levator labii superioris alaeque nasi in mehrere Aeſte geſpalten hervor zur Haut der Naſe und zu den Muskeln derſelben. Er verbindet ſich mit dem N. facialis, und am Rande des Naſenflügels mit dem N. ethmoidalis.

Der untere Hautnerv der Naſe, n. subcutaneus nasi inferior, geht zwiſchen dem M. levator labii superioris, dem Levator alae nasi und dem Depressor alae nasi zur Haut der beweglichen Naſenſcheidewand und der Naſenſpitze, giebt auch jenen Muskeln und dem Orbicularis oris Zweige, und verbindet ſich nahe an ſeinem Urſprunge mit dem N. facialis, und dann mit dem zuvorgenannten und dem folgenden Aſte.

Die 3 bis 4 Oberlippennerven, nervi labiales superiores, ſteigen hinter dem M. levator labii superioris ſtrahlenförmig herab, vereinigen ſich unter einander, mit den zuvorerwähnten Aeſten, und mit den Aeſten des N. facialis. Hierdurch entſteht ein zwiſchen dem M. levator labii superioris und dem M. levator anguli oris gelegener Plexus. Von ihm gehen Aeſte in die Haut der Lippen zu dem M. orbicularis oris, zum Compressor und depressor nasi und zur Schleimhaut der Lippen [1]).

Dritter Hauptaſt, nervus maxillaris inferior.

Der Unterkiefernerv, ramus maxillaris inferior, liegt etwas mehr nach außen, als der Maxillaris superior, iſt dicker, als dieſer, der dickſte unter allen 3 Aeſten des N. trigeminus. Nur ein kurzer Theil deſſelben liegt in der Hirnſchale. Er geht durch das ovale Loch des Keilbeins abwärts aus der Hirnſchale heraus, und theilt ſich alsbald in 8 Aeſte, die in 2 Bündeln liegen.

Das obere Bündel enthält 5 dünnere Nerven: 1) ramus masseterieus; 2) und 3) temporales profundi; 4) buccinatorius; 5) pterygoideus.

---

[1]) *Joh. Gottl. Haase*, (Prof. Lips.) progr. de nervo maxillari superiore s. de secundo ramo quinti paris nervorum cerebri. Lips. 1793. 4.

Digitized by Google

Das untere Bündel enthält 3 dickere Nerven: (6 alveolaris maxillae inferioris; 7) lingualis s. gustatorius; 8) auricularis [1]).

---

[1]) J. Arnold glaubt an der inneren Oberfläche des 3ten Aſtes des Trigeminus, unter dem Foramen ovale, nahe an der Stelle, wo er ſich in Zweige theilt, ein Ganglion, das er den Ohrknoten nennt, gefunden zu haben. (Diss. inaug. med. sistens observationes nonnullas neurologicas de parte cephalica nervi sympathici in homine. Heidelbergae 1826. 4. — Tiedemann und Treviranus, Zeitſchrift für die Phyſiologie. B. 2. S. 161. — 164. Ueber den Ohrenknoten eine anatomiſche phyſiologiſche Abhandlung, mit Abb. Heidelberg 1828. 4. und deſſelben neueſte Schrift: Der Kopftheil des vegetativen Nervensyſtems beim Menſchen in anatomiſcher und phyſiologiſcher Hinſicht bearbeitet. Mit 10 Kt. Heidelberg und Leipzig 1831. 4. p. 114. Arnold giebt an, dieſer Knoten liege an der Oberfläche des 3ten Aſtes, ſei 2 bis $2^1/_2$ Linien lang, ſtehe mittelſt mehrerer äußerſt kurzer Fäden mit der kleinen Portion jenes Aſtes in Verbindung. Der N. pterygoideus gehe durch ihn hindurch und nehme etwas von der Subſtanz des Knotens auf. In eine ſehr innige Beziehung zu dem Knoten trete ein ziemlich dünner Zweig des 3ten Aſtes, der ſich in den Spanner des weichen Gaumens ausbreite, und ſich durch eine röthliche Farbe auszeichne. Der Knoten ſtehe auch mit dem gewöhnlich nach Jacobſon benannten Aſte des Ganglion petrosum des N. glossopharyngeus durch einen Faden, der durch das ovale Loch oder durch das Stachelloch, oder durch ein Loch, das an der innern Seite des ovalen Lochs liege, in Verbindung. Außerdem entſpringe ein zum M. tensor tympani und ein zum N. temporalis superficialis gehendes Fädchen aus dem Knoten, und es hänge der Ohrknoten noch durch ein von ihm zur knieförmigen Beugung des N. facialis gehendes Fädchen, das von da zum Gehörnerven übergeht, mit den Gehörnerven zuſammen, welchen letzteren Faden manche Anatomen als einen vom N. facialis zum M. tensor tympani gehenden Zweig beſchrieben hätten.

Bock hat viel Mühe darauf verwendet, ſich von der Exiſtenz jenes Knotens zu überzeugen, allein vergebens. Nur zuweilen war beim Menſchen eine knotenartige Anſchwellung ſichtbar. An fein injicirten Köpfen fand er aber, daß das, was Arnold für einen Knoten gehalten hat, nur ein gefäßreiches Zellgewebe iſt, ferner daß der N. pterygoideus durch die Anſchwellung hindurchgeht, ohne ſich in Nervenfäden, die in den Knoten gingen, zu theilen oder Fäden aufzunehmen, und daß die von Arnold beſchriebenen feinen Nervenfäden Gefäße ſind. Eben ſo überzeugte er ſich auch an Köpfen, die nicht fein injicirt waren, davon, daß dieſe Anſchwellung kein Nervenknoten ſei, und daß ſie, den durch ſie hindurch gehenden Nervus pterygoideus abgerechnet, in gar keiner Nervenverbindung mit dem 3ten Aſte des Trigeminus ſtehe. Tiedemann hat zwar das Arnoldſche, in Weingeiſt aufbewahrte Präparat den bei der Verſammlung deutſcher Naturforſcher in Berlin anweſenden Anatomen gezeigt, indeſſen reichte natürlich die Betrachtung deſſelben nicht hin, um die Richtigkeit der Sache zu ergründen. Daſſelbe Reſultat, welches Bock, erhielt hier Aſſmann bei einer von ihm unternommenen Wiederholung der Arnoldſchen Unterſuchungen an Säugethieren. Gleichzeitig mit dieſen in Leipzig gemachten Unterſuchungen hat Prof. Schlemm in Berlin, ſowohl an Menſchen als an Säugethieren, Arnolds Zergliederungen wiederholt: (Bemerkungen über den angeblichen Ohrknoten, ganglion oticum, in Froriep's Notizen 1831 Jan. S. 637.) Er hat ihn beim Menſchen, Schafe, Hirſche, Pferde, Schweine, Hunde und bei der Katze aufgeſucht, aber das Reſultat ſtimmt mit dem ſo eben angeführten im Weſentlichen überein. Beim Menſchen fehlt nach ihm der knotenartige Körper gänzlich. Bei den genannten Wiederkäuern und einigen andern Thieren iſt er zwar vorhanden, indeſſen ſteht er mit dem 3ten Aſte des N. trigeminus nur durch Zellgewebe in Verbindung. Der N. pterygoideus internus, der N. ad tensorem tympani und der N. ad tensorem palati, welche D. Arnold als Aeſte des Ganglion oticum angiebt, entſpringen aus dem 3ten Aſte des N. trigeminus, und zwar der N. pterygoideus unmittelbar, die beiden letzteren aber als beſtändige Zweige des N. pterygoideus. Den knotenartigen Körper iſt Schlemm geneigt für eine Lymphdrüſe zu halten. G. Breſchet giebt im Repert. gén. d'Anatomie. Tom. VIII. 1829. p. 1. eine Ueberſetzung der Arnoldſchen Arbeit, und nimmt die Exiſtenz des Ganglion an. C. Rudolph Wagner hat zwar die knotenartige Anſchwellung einmal gefunden, ohne je

Digitized by Google

Dieſer 3te Aſt erhält die ganze kleinere Portion des N. trigeminus, welche ſich in das Ganglion Gasseri nicht einmiſcht; und vorzüglich geht dieſe Portion in den N. temporalis profundus internus und in den Buccinatorius [1]) über. Nach Ch. Bell [2]) bekommen alle Kaumuskeln, welche vom 3ten Aſte des 5ten Paares Nerven erhalten, auch Fäden von dieſer Portion, die ſich zum Theil den Aeſten der großen Portion beigeſellen.

1. Ramus massetericus.

Er giebt einen oder 2 ramulos articulares in die Gegend des Kinnbackengelenks, geht vor demſelben am M. pterygoideus externus auswärts und abwärts, zwiſchen dieſem Muskel und dem M. temporalis auswärts zwiſchen dem Processus condyloideus und coronoideus durch die Incisura sigmoidea hindurch zum oberen inneren Theile des Masseter. Im Vorbeigehen giebt er auch 1 oder 2 Aeſte dem M. temporalis.

2. Ramus temporalis profundus exterior.

Der äußere tiefe Schläfennerv macht anfangs entweder mit dem N. massetericus, oder dem Buccinatorius, oder dem Temporalis profundus interior ein gemeinſchaftliches Stämmchen aus; oder er entſpringt allein aus dem Stamme, krümmt ſich auswärts um den unteren Theil der Ala magna über dem M. pterygoideus externus zur äußeren Fläche der Schuppe des Schläfenbeines, und der Ala magna, hinauf, und vertheilt ſich in der inneren Lage des M. temporalis.

3. Ramus temporalis profundus interior.

Der innere tiefe Schläfennerv krümmt ſich auswärts um den unteren Theil der Ala magna über dem M. pterygoideus externus zur äußeren Fläche der Schuppe des Schläfenbeins, vor dem Exterior liegend, hinauf. In einigen verbindet er ſich nahe bei ſeinem Urſprunge mit dem N. buccinatorius, oder macht mit ihm anfangs einen Aſt aus. Er vertheilt ſich im vorderen Theile des M. temporalis und giebt auch dem M. pterygoideus externus einen Zweig.

Beide Nervi temporales profundi verbinden ſich bisweilen unter der Ala magna mit einander und trennen ſich wieder.

Wenn nur ein Nervus temporalis profundus da iſt, ſo fehlt meiſt der Exterior.

---

doch den Verbindungsfäden folgen zu können. Bei einer 2ten Leiche fehlt auch die knotenartige Anſchwellung. (Heuſingers Zeitſchrift für die organiſche Phyſik. B. 3. 359. 1828.)

[1]) *Joh. Baptist*, Paletta (Chirurg. Mediol.) de nervo crotaphitico (i. e. temporali) et buccinatorio. Mediol. 1784.

[2]) *Ch. Bell*, in the London medical gazette, April, May 1828. und in Magendie, Journal de physiologie expérimentale. 1830. Tom. p. 1. Pl. 1 u. 2.

Digitized by Google

4. Ramus buccinatorius.

Der Backennerv iſt der dickſte aller Aeſte des oberen Bündels, entſpringt gewöhnlich mit 2 Wurzeln, welche einen Aſt der A. meningea media umfaſſen, und iſt bisweilen der Stamm eines oder mehrerer von den 3 ſo eben beſchriebenen Nerven. Er umfaßt zuweilen mit 2 Bündeln die A. temporalis und geht durch den M. pterygoideus externus, oder zwiſchen ihm und dem M. pterygoideus internus hindurch und vorwärts hinab, giebt ihm und dem M. temporalis einige Aeſtchen, tritt zwiſchen dem M. pterygoideus externus und temporalis in das Fett, das den hier befindlichen Zwiſchenraum ausfüllt, giebt dem hinteren Theile des M. buccinator Aeſte, und endigt ſich dann im Geſichte in der Nähe des Mundwinkels. Zwei oder 3 Aeſte gehören dem Buccinator, dem Levator und Depressor des Mundwinkels und dem Orbicularis oris an, und haben mit dem N. facialis, auch mit dem Infraorbitalis Gemeinſchaft. An den Arteriis coronariis labiorum machen die Aeſte dieſes Nerven und des N. facialis Schlingen, welche dieſelben umgeben.

5. Ramus pterygoideus.

Dieſer iſt der dünnſte und kürzeſte Zweig. Er geht nämlich zwiſchen dem M. pterygoideus externus und dem Anfange des M. circumflexus palati von der Euſtachiſchen Röhre zum M. pterygoideus internus hinab, und vertheilt ſich in ihnen.

6. Ramus alveolaris maxillae inferioris.

Der Zahnnerv des Unterkiefers, oder der im engeren Sinne ſogenannte N. maxillaris inferior, iſt der dickſte Zweig des 3ten Aſtes, geht, anfangs mit dem N. lingualis verbunden, zwiſchen dem M. pterygoideus externus und dem Internus hinab; verläßt den N. lingualis, der mehr nach innen liegt; tritt zwiſchen dem Aſte der unteren Kinnbacke und dem M. pterygoideus internus in den Canal der unteren Kinnbacke. Bisweilen wird er mit dem N. lingualis durch einen Aſt verbunden.

Ehe er in den Canal tritt, giebt er einen dünnen Muskelaſt, den Nervus mylohyoideus ab, der nach Bell von der kleinen Portion des N. trigeminus herſtammt. Dieſer läuft in einer Furche an der inneren Seite der unteren Kinnbacke vorwärts, zur unteren Fläche des M. mylohyoideus und theilt ſich in 2 Aeſte. Einer derſelben geht zwiſchen dem M. mylohyoideus und dem vorderen Bauche des M. digastricus vorwärts, giebt beiden Aeſte, krümmt ſich zwiſchen den beiden Musculis digastricis zum Kinne hinauf und verliert ſich daſelbſt.

Digitized by Google

Der andere vertheilt ſich im vorderen Bauche des M. digastricus. Bisweilen erhält auch der M. hypoglossus und die Submarillardrüſe einen dünnen Zweig.

Der N. alveolaris ſelbſt geht im Canale der unteren Kinnlade bis zum Foramen mentale anterius fort, und giebt den Zähnen, unter deren Wurzeln er fortgeht, ihre Nerven. Am Foramen mentale theilt er ſich in 2 Aeſte.

1) Der **kleinere**, Ramus dentalis, geht unter den vorderen Zähnen bis zur Mitte fort, erhält verſchiedene Verbindungszweige vom Ramus mentalis, und giebt an jeden Zahn ſo viel Fäden, als derſelbe Wurzeln hat, und außerdem noch zwiſchen je 2 benachbarten Zähnen einen Faden zum Zahnfleiſche.

2) Der **größere**, Ramus mentalis, geht aus dem Foramen mentale auf die äußere Fläche der unteren Kinnbacke heraus, und theilt ſich, bedeckt vom Depressor anguli oris, in 3, bisweilen nur in 2 Aeſte. Zwei derſelben, rami inferiores, ſteigen zur Unterlippe, der mehr nach außen liegende auch zum Mundwinkel hinauf, vertheilen ſich im Depressor anguli oris, im M. quadratus menti, im unteren Theile des M. orbicularis oris, in der Haut, und haben mit dem N. facialis Verbindung. Der 3te geht über dem Rande der unteren Kinnbacke einwärts zum Kinne, vertheilt ſich im Depressor anguli, im M. quadratus, in der Haut, und hat Verbindungen mit dem N. facialis.

7. Ramus lingualis s. gustatorius.

Der **Geſchmacksnerv**, oder der **Zungenaſt** des Nervus maxillaris inferior, geht anfangs mit dem N. alveolaris inferior verbunden, dann von ihm nach innen abweichend, an der inneren Seite des Condylus der unteren Kinnbacke, hinter dem M. pterygoideus internus, wo er ein Aeſtchen giebt, einwärts hinab, giebt auch Aeſtchen an die Mandel und an den M. mylopharyngeus, lenkt ſich dann über der Glandula submaxillaris vorwärts, und geht an der äußeren Fläche des M. hypoglossus fort. Hier begleitet er den Ductus Whartonianus, der zwiſchen ihm und dem N. hypoglossus vorwärts geht, lenkt ſich im Vorwärtsgehen allmählig einwärts, unter dem Ductus weg, ſo daß er ſich dem N. hypoglossus nähert; hat durch einige Aeſtchen mit dem Hypoglossus Gemeinſchaft, giebt auch einige Aeſtchen in die Glandula sublingualis, und in das Zahnfleiſch; dann tritt er zwiſchen dem M. styloglossus und genioglossus in die **Zunge ſelbſt**, theilt ſich erſt in 2, hierauf in mehrere Aeſte, welche nach den Rändern und der Spitze der Zunge hingehen, und endlich, gleichſam wie Quaſten, in Fäſerchen geſpalten ſind und faſt bis in die Zungenwärzchen verfolgt werden können.

Digitized by Google

An ſeinem hinteren oberen Theile, unweit ſeines Abganges vom N. alveolaris, nimmt er von hinten einen aus der Fissura Glaseri zu ihm herabkommenden Nervenzweig, die Saite des Paukenfells, chorda tympani, unter einem nach oben ſehr ſpitzigen Winkel auf, und iſt dadurch in merkwürdiger Verbindung mit dem N. facialis, deſſen Aſt ſie iſt.

Indem er über der Glandula submaxillaris ſich vorwärts lenkt, giebt er 2 oder 3 Aeſte, oder zuweilen nur einen Aſt, welche ſich bisweilen in ein ovales Nervenknötchen, ganglion maxillare Meckelii [1]) begeben, das über der Glandula maxillaris liegt, und aus welchem 5 bis 6 Fäden divergirend in die gedachte Drüſe hinabgehen. Einer oder der andere dieſer Fäden geht über den M. hypoglossus vorwärts, kommt mit einem Aſte des N. hypoglossus zuſammen, und ſcheint zum M. genioglossus zu gelangen. Dieſes Knötchen liegt immer nahe am Nervenſtamme, denn jene Aeſte, aus denen es entſteht, ſind nur kurz. Bisweilen liegt es dicht an ihm.

8. Ramus auricularis s. temporalis superficialis.

Der oberflächliche Schläfennerv entſpringt mit einer doppelten Wurzel, einer oberen vom Stamme, und einer unteren vom Ramus alveolaris. Die obere geht vom Foramen ovale vor der A. meningea media ſchräg rückwärts hinab; die untere hinter derſelben auswärts hinauf; ſo wird die A. meningea media von ihnen umſchlungen [2]), und beide kommen an der äußeren Seite derſelben hinter dem Condylus der unteren Kinnbacke in den Stamm dieſes Nerven zuſammen. Dieſer Stamm geht hinter dem Processus condyloideus der unteren Kinnbacke, zwiſchen ihm und den Meatus auditorius auswärts und abwärts, und dann durch den oberen Theil der Parotis gegen das äußere Ohr hinauf.

Auf dieſem Wege giebt er 2 Aeſte, oder einen Aſt, der ſich in 2 theilt, welche hinter dem Condylus der unteren Kinnbacke rückwärts zum Gehörgange hinaufſteigen (rami meatus auditorii [3]). Der untere Gehörgangnerv geht durch die Parotis an der unteren Fläche des Gehörganges auswärts und rückwärts, tritt zwiſchen dem Knochen und dem Knorpel auf die inwendige Fläche des Gehörganges. Der obere hat zuweilen mit dem vorigen einen gemeinſchaftlichen Stamm,

---

[1]) Meckel entdeckte daſſelbe (de quinto pare. §. 100. p. 95.). Haller ſagt »defuisse vidi.« (Elem. phys. IV. p. 218.) und Wrisberg »minime in omnibus.« (De nervis art. venasque comit. §. 15.) Haaſe vermißte es in vielen. (Nervor. anat. p. 74.)

[2]) *Haller*, de nervor. in arterias imperio. §. 13.

[3]) *Meckel*, de quinto pare. §. 104.

geht auch durch die Parotis und an der vorderen Fläche des Gehörganges rückwärts, und ſpaltet ſich nach Bock in 2 Zweige, von welchen der eine Zweig zur Haut der Ohrmuſchel, der andere durch eine Spalte unter der oberen Wand des Gehörganges in die Paukenhöhle zum Trommelfelle kommt und ſich mit der Chorda tympani verbindet.

Hinter der A. temporalis giebt er 2 oder 3 dickere Aeſte (rami communicantes faciales). Einer derſelben geht unter dem Condylus der unteren Kinnbacke auswärts und vorwärts, und vereinigt ſich mit dem oberen Aſte des N. facialis unter einem ſehr ſpitzigen Winkel. Der andere tiefere geht hinter der A. temporalis an der hinteren Seite des Condylus der unteren Kinnbacke auswärts, dann, von der Parotis bedeckt, an der äußeren Fläche des Condylus vorwärts, theilt ſich in 2 oder 3 Aeſte, welche ſich mit den Aeſten des oberen Aſtes des N. facialis vereinigen. Bisweilen vereinigt er ſich auch ungetheilt mit demſelben. Beide Aeſte umſchlingen die A. temporalis.

Während ſeines Durchgangs durch die Parotis giebt die Fortſetzung des Nerven dieſer Drüſe einige Aeſte, und außerdem einen Ramus auricularis, welcher, durch die Parotis gehend, unter der A. temporalis hervorkommt, um dieſe und die Vena temporalis hinauf zum Tragus und zu dem vorderen Theile der Helix des Ohres geht [1]).

Nach der Abgabe dieſer Aeſte geht der N. auricularis unter der A. und dem N. temporalis zum äußeren Ohre hinauf, und theilt ſich in 2 Aeſte, von welchem ein hinterer Aſt, ramus auricularis mit der A. auricularis anterior zum Ohre hinaufſteigt, einen Aſt der Helix und dem M. auriculae anterior und einen anderen aufſteigenden dem M. attollens giebt, und ſich über dem Ohre in der Haut endigt. Ein vorderer Aſt, ramus temporalis subcutaneus, theilt ſich in viele Aeſte, welche auf der A. aponeurosis temporalis aufſteigen, und in der Haut derſelben, auf ſeiner Seite der Stirn und des Scheitels ſich vertheilen, und nach vorn mit den Aeſten des N. facialis, des Supraorbitalis und bisweilen mit einem Aſte, der durch die Vereinigung des Superficialis malae und des Lacrymalis entſteht, in Verbindung ſind.

VI. Nervus abducens, der äußere Augenmuskelnerv.

Der ſechſte Nerve, oder äußere Muskelnerv des Auges, N. abducens, s. indignatorius, s. sextus, kommt an der Furche zwiſchen der hinteren Grenze des Hirnknotens und den Corporibus pyramidalibus zum Vorſchein, und entſpringt ſo, daß er mehr von dem Corpus pyramidale, als vom Hirnknoten ſeinen Anfang zu nehmen ſcheint [2]).

[1]) Bisweilen fehlt dieſer Aſt, und wird aus dem Ramus auricularis des 3ten Halsnerven erſetzt. (Meckel §. 106.)

[2]) Sein Urſprung hat mancherlei Verſchiedenheiten. Auch iſt bisweilen der Urſprung des einen Nerven dieſes Paares von dem des anderen verſchieden. (S. Morgagni

Bisweilen ist eine kleine Wurzel desselben von dem übrigen Theile durch ein Blutgefäßchen abgesondert. Diese bleibt sogar in manchen Fällen von dem übrigen Theile auch beim Durchgange durch die harte Hirnhaut getrennt, so daß sie durch eine besondere Oeffnung derselben geht.

Anfangs, wo der Nerv noch platt ist, geht er unter der Protuberantia annularis vorwärts, dringt dann hinter und unter der Sattellehne in die harte Hirnhaut ein, geht an der Seite des Türkensattels vorbei und zwischen den Venen, die den Sinus cavernosus bilden, hindurch [1]), und wird durch Zellgewebe an die Carotis cerebralis, an deren äußerer Seite er vorbeigeht, angeheftet. Von hier tritt er durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle.

In der Augenhöhle ist er mit dem N. oculi motorius und dem nasalis in ein Bündel verbunden, und kommt zwischen den beiden Köpfen des M. rectus externus in den konischen Raum, der von den geraden Augenmuskeln umgeben wird, geht dann vorwärts auswärts zum M. rectus externus, und vertheilt sich in demselben mit mehreren Fäden, die in dessen inwendige Fläche treten. Auf dem beschriebenen Wege nimmt er da, wo er an der äußeren Seite der 3ten Beugung der Carotis cerebralis vorbeigeht, im Sinus cavernosus, 1 oder 2, oder auch 3 Fäden auf, die vom Geflechte des N. sympathicus an der Carotis cerebralis zu ihm aufsteigen, auf, oder wenn man sich lieber so ausdrücken will, so giebt er dieselben rückwärts ab. Daß er sie empfange, ist indessen deswegen wahrscheinlicher, weil der Winkel, den diese Fäden mit dem

epist. anat. XVI. §. 47. *Santorini* obss. anatt. p. 66. *Zinn* de oc. hum. p. 180. *Soemmerring*, de basi enceph. p. 141. Dess. Nervenlehre §. 242. 2te Ausg. §. 186.) Morgagni, Santorini und Meckel unterscheiden eine Wurzel des Nerven, welche sich zuweilen in die Brücke einpflanzt, von einer 2ten, welche sich mit der vorderen Pyramide verbindet. *Malacarne* (Neuroencefalotomia p. 193 u. p. 310) sagt: In que cerevelli umani nei quali e patentemente triplice da entrambe le parti l'origine di queste coppie di nervi, allora una lastra nasce dalla sommità delle fascie midollari coperte dal margine inferiore del ponte, e lo trafora. La seconda spicasi dalle fascie medesime tosto liberatasi dal ponte. E la terza dal fianco esteriore delle fascie e si mantiene separata dalle altre due sino al foro della dura madre; anzi tra questa e le altri passa ben soventi un rosso vasellino. Siehe *Rolando* a. a. O. p. 13. — Gall, indem er sich auf den Ursprung dieses Nerven bei den Säugethieren stützt, bei welchen die Brücke nicht so weit nach hinten reicht, sagt: die Nerven kämen nur von den Pyramiden, längs welcher sie sich weit verfolgen ließen. (Anat. und Physiol. des Nervensyst. B. I. 204.) — Eben so bildet ihn Langenbeck ab. (Icones anat. Tab. XX. c.) — *Rolando* (Recherches anatomiques sur la moëlle allongée p. 13) sah den Nerven gleichfalls längs den Pyramiden herabgehen, vermuthet aber, daß er von den vorderen Rückenmarkbündeln entspringe. Dem Serres gelang es nur zuweilen, den 6ten Hirnnerven an der inneren Seite der Oliven bis zu diesen Bündeln zu verfolgen, öfters gingen sie aber bis zur Basis der Pyramiden. Serres a. a. O. Tom. I. p. 340.

[1]) Nach *Gennari's* (de orig. nerv. intercostal. p. 21) Beobachtung wird er, indem er durch den Sinus cavernosus geht, von einer zarten Scheide, die eine Fortsetzung der harten Hirnhaut ist, begleitet, so daß er nicht unmittelbar vom Blute berührt wird.

Digitized by Google

hinteren Stücke des Stamms bilden, spitz ist, und weil der Nervus abducens, wie Winslow zuerst bemerkt hat, vor diesen Fäden, d. h. weiter nach vorn zu, also nach Erhaltung dieser Fäden etwas dicker ist, so daß er durch sie verstärkt zu werden scheint. Zuweilen sind es noch mehr als 3 Fäden, die auch manchmal netzförmig unter einander verflochten sind. Etwas weiter vorn bedeckt der Nerv den an der Carotis liegenden Zellknoten des sympathischen Nerven, und nimmt, nach Bock, auch von ihm ein Fädchen auf.

Uebrigens giebt er bis zu seiner Endigung in jenem Augenmuskel keinen Ast von sich ab, versorgt also bloß diesen. Warum er aber bloß diesen Muskel versorge, und warum also dieser Muskel einen besonderen ganzen Nervenstamm erhalte, das wissen wir eben so wenig, als warum bei dem 4ten Hirnnerven etwas Aehnliches Statt findet.

VII. Nervus facialis, der Antlitznerv.

Der Antlitznerv, nervus facialis, s. communicans faciei, kommt am hinteren Rande des Hirnknotens, wo derselbe mit dem verlängerten Marke zusammenstößt, zwischen dem der Mitte viel näher liegenden N. abducens und dem Gehörnerven, der weiter nach außen, aber dicht neben ihm liegt, zum Vorschein. Ehedem zählte man diesen Nerven und den N. acusticus für einen Nerven, weil beide dicht neben einander entspringen, einander begleiten, und zusammen in den Meatus auditorius internus treten; und nannte diesen, um ihn von jenem weicheren Sinnesnerven zu unterscheiden, portio dura nervi acustici. Allein er ist vom Anfange bis zu Ende so sehr von ihm unterschieden, und scheint so wenig Gemeinschaft durch communicirende Fäden mit ihm zu haben, daß ihn Sömmerring und die meisten Anatomen nach ihm als einen vom Gehörnerven verschiedenen Nerven ansehen.

Sömmerring [1]) konnte gar keine Verbindung des N. facialis und acusticus durch Nervenfäden entdecken. Die Fäden, welche vom N. facialis zu ihm, nach Bertin und Meckel [2]), in den Vorhof zu gehen scheinen, konnten Scarpa und er nicht auffinden [3]). Wrisberg hat zwar, wie wir sogleich weiter unten sehen werden, im Grunde des Gehörganges Fäden von dem Gehörnerven abtreten und sich an den Antlitznerven anschließen gesehen, allein diese Fäden entspringen, nach ihm, getrennt von der Wurzel des Acusticus und Facialis zwischen den Wurzeln dieser beiden Nerven, und können daher als Fäden desjenigen Nerven angesehen werden, mit dessen Stamme sie sich zuletzt vereinigen. Swan [4]) indessen fand beim Menschen und beim Schafe eine Verbindung des Gehör- und Antlitznerven am Ende des inneren Gehörganges. Auch nach Arnold [5]) findet daselbst eine doppelte Verbindung Statt, indem nach ihm auch ein Fädchen vom Knie des Antlitznerven zum Gehörnerven zurücklaufen soll, welches selbst zum Knie von dem von Arnold am 3ten Aste des 5ten Paars entdeckten Ohrknoten

[1]) Sömmerring, Abbildung des menschl. Gehörorgans. Frankf. 1806. Fol. p. 26, 71.

[2]) Siehe *Haller*, De part. c. h. praecip. fabrica VIII. 363.

[3]) *Scarpa*, disquisitiones de auditu et olfactu, p. 52, beruht aber vielleicht auf der Aeußerung Sömmerring's de basi encephali p. 152, die das hier Gesagte jedoch nicht enthält, sondern von der portio intermedia Wrisbergii handelt.

[4]) *J. Swan*, Medico-chirurgical Transactions etc. London 1818. B. IX. 422. sqq. und Joh. Swan's gekrönte Preisschrift über die Behandlung der Lokalkrankheiten des Nerven, aus dem Englischen übersetzt von Francke. Leipz. 1824. 8. S. 21.

[5]) Arnold, über den Ohrknoten. Heidelberg 1828. 4. S. 18.

Digitized by Google

gelangen soll. Uebrigens hatte schon Galen [1]) den Unterschied dieser beiden Nerven eingesehen.

Der **größere Theil** dieses Nerven entspringt zwischen dem Corpus restiforme und dem die Oliven einschließenden Rückenmarkbündel. Ein besonderer **kleinerer Theil** desselben (portio intermedia Wrisbergii [2]) entspringt neben ihm, weiter nach außen, zwischen ihm und dem N. acusticus, mit einzelnen Fäden, deren Anzahl verschieden ist, und vereinigt sich erst in ein Nervenstämmchen, und dann mit dem größeren Theile des Nerven. Diese Vereinigung geht bisweilen erst im Sinus acusticus vor sich. Einige Fasern der Wurzeln liegen unter der vorderen Oberfläche der 4ten Hirnhöhle, etwas tiefer als die des N. acusticus. Sie sind daselbst von dem grauweißen Ueberzuge der 4ten Hirnhöhle und von den Wurzeln der Hörnerven bedeckt. Langenbeck [3]) leitet die Fasern des Nerven von den vorderen Rückenmarkbündeln her, welche er crura medullae ad corpora quadrigemina nennt, und die an jener Oberfläche der 4ten Hirnhöhle von der Stelle an sichtbar werden, wo die Corpora restiformia aus einander weichen. Sie gehen nach ihm vor dem Corpus restiforme zwischen der Substanz der Medulla oblongata nach außen. J. F. Meckel leitet ihn zum Theil von den Fasern des Corpus restiforme ab

Der N. facialis geht in einer rinnenförmigen Vertiefung des Gehörnerven und durch Zellgewebe mit ihm zusammenhängend, auswärts abwärts, und tritt in den mit einer Fortsetzung der harten Hirnhaut ausgekleideten Meatus auditorius internus. Hier aber verläßt er den Gehörnerven, tritt in das obere Grübchen, und so in den Fallopischen Canal. In diesem geht er quer durch das Felsenbein nach vorn, nimmt da durch den Hiatus den Ramus superficialis des N. Vidianus auf [4]), macht eine knieförmige Beugung, an welcher er etwas angeschwollen ist, und geht nun in einem Canale, der sich in der Substanz der inneren Wand der Pauke befindet, und über dem oberen Rande der Fenestra ovalis weggeht, nach hinten, dann hinter der Pauke hinab, und zum Foramen stylomastoideum wieder hinaus.

Bei seinem Durchgange durch den Fallopischen Canal schickt der N. facialis ein Aestchen zum Tensor tympani, ein anderes zum M. stapedius, und endlich einen besonders merkwürdigen Nerven, die **Saite der Pauke**, chorda tympani, welche im absteigenden Theile des Canales vom Stamme des N. facialis unter einem, nach dem

---

[1]) *Galenus*, De nervor. dissect. c. VI. Ed. Froben. p. 106.

[2]) *Soemmerring*, de basi enceph. III. Sect. 7. p. 151. *Wrisberg*, not. 101. ad *Hall.* pr. lin. — *Rolando*, Mem. della reale academia delle scienze di Torino. Tom. 29.

[3]) *Langenbeck*, Icones anatomicae. Neurologia. Tab. XXXIII.

[4]) Nach Sömmerring (Nervenlehre §. 250.) nimmt er den Ramus petrosus nicht vom Vidianus auf, sondern er giebt ihn demselben, weil dieser wie ein absteigender Nerv gegen den 2ten Ast des Trigeminus hin dicker wird.

Digitized by Google

Fortgange des Stammes zu, sehr spitzigen Winkel entspringt, anfangs gemeinschaftlich mit dem Stamme abwärts geht, dann den Stamm, unweit des Ausganges desselben aus dem Foramen stylomastoideum, verläßt, durch ein besonderes Canälchen in die Paukenhöhle tritt, unter dem kurzen Schenkel des Amboßes weggeht, sich in den hinteren unteren Theil der Furche, in der das Paukenfell ausgespannt ist, begiebt, in einer kleinen Strecke mit dem Paukenfelle zusammenhängt, hierauf zwischen dem längeren Schenkel des Amboßes und dem Handgriffe des Hammers vorwärts geht [1]), sich neben dem M. mallei externus durch eine Oeffnung der Fissura Glaseri einwärts vorwärts hinabkrümmt, hier wahrscheinlich Aestchen den kleinen Muskeln des Hammers und des Steigbügels giebt [2]), und endlich vor dem Ursprunge des M. levator veli und des Circumflexus palati an der inneren Seite des N. alveolaris inferior schräg vorwärts zum Zungenaste des 5ten Nerven hinabgeht und sich mit ihm unter einem nach oben sehr spitzigen Winkel vereinigt.

In seinem Canale und in der Paukenhöhle ist dieser Nerv weich, beim Ausgange aber aus demselben erhält er eine harte Scheide und wird auch dadurch dicker.

Er ist als abgehend vom Antlitznerven, und als zukommend zum Zungennerven anzusehen, weil sein Winkel an jenem nach dem Fortgange desselben zu spitzig, an diesem nach dem Fortgange desselben zu stumpf ist.

Der Nutzen des sonderbaren Durchganges dieses Nerven durch die Pauke und seiner nachmaligen Verbindung mit dem Zungennerven ist nicht bekannt [3]).

---

[1]) *Meckel*, de quinto pare p. 92. fig. I. X.

[2]) *Caldani*, (de chordae tympani officio. In dess. commentationib. anat. Fascic. I. Gott. und Lips. 1799. n. I.), behauptet, Zweige der Chorda tympani in die Muskeln des Hammers und des Steigbügels verfolgt zu haben. *Langenbeck* (Icones anat. Neurologia Fasc. II. Tab. XXVII. c.) bildet einen zum M. mallei externus gehenden Zweig der Chorda tympani ab. Bock beschreibt eine Verbindung der Chorda tympani mit dem durch den äußeren Gehörgang in die Trommelhöhle eindringenden Zweige des N. temporalis superficialis aus dem 3ten Aste des Trigeminus. (Beschreibung des 5ten Nervenpaares, S. 49.) Hirzel erwähnt einen Ast der Chorda tympani zum M. tensor tympani (M. mallei internus). Arnold dagegen (Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie III. S. 157) sah niemals, daß die Chorda tympani innerhalb der Paukenhöhle einen Zweig abgegeben hätte.

[3]) Ribes, H. Cloquet und Hirzel haben den Ramus superficialis des N. Vidianus, die Chorda tympani und das vom N. lingualis des Trigeminus zum Ganglion der Unterkieferdrüse gehende Fädchen als ein und dasselbe Fädchen beschrieben. Nach *H. Cloquet* (traité d'anatomie descriptive. Paris 1822, 2me éd. p. 200) und nach Hirzel nämlich ist die Chorda tympani die Fortsetzung des Ramus superficialis N. Vidiani, welcher sich nur an den N. facialis anlegt und sich nicht mit ihm verbindet. Während seines Verlaufs vom Hiatus canalis Fallopii bis zum Uebergange in die Paukenhöhle soll dieser Nervenfaden, nach Hirzel, auf dem Promontorio ein Fädchen vom Plexus caroticus des N. sympathicus (aus der Jacobsonschen Nervenanastomose) aufnehmen. Nachdem weiterhin die Chorda tympani durch die Fissura Glaseri aus der Paukenhöhle getreten ist, tritt sie in die Scheide des N. lingualis des Trigeminus, vereinigt sich aber nach Ribes, Cloquet und Hirzel auch hier nicht mit ihm, sondern läßt sich bis zu der Stelle verfolgen, wo die Nerven der Glandula submaxillaris aus dem Nervus lingualis hervorkommen. Hier erst

Digitized by Google

Der Stamm des N. facialis giebt, nachdem er zum Foramen stylomastoideum aus dem Fallopischen Canale wieder herausgetreten ist, alsbald 2 Aeste ab.

Ramus auricularis posterior ist von ihnen der obere, steigt hinter dem äußeren Ohre hinauf, und vertheilt sich mit seinem vorderen Aste, ramus auricularis, am knorplichen Gehörgange, an der Ohrmuschel und an dem M. retrahens auriculae, mit seinem hinteren ramus occipitalis am Seitentheile des Hinterkopfs. Er hat mit dem Ramus occipitalis minor des dritten und dem N. occipitalis major des 2ten Halsnerven Gemeinschaft. Er giebt nach Bock dem M. occipitalis und zuweilen auch dem M. retrahens einen Zweig.

Ramus stylohyoideus et biventericus ist der untere von jenen beiden Zweigen. Er theilt sich selbst wieder in 2 Zweige, die bisweilen auch besonders entspringen, in den Ramus stylohyoideus, der dem M. stylohyoideus und styloglossus Aeste giebt, und in den Ramus biventericus. Dieser ist der hintere und größere, vertheilt sich im hinteren Bauche des M. biventer, und giebt zuweilen einen Ast durch denselben, welcher mit dem N. glossopharyngeus Gemeinschaft hat. Beide Nerven hängen, nach Bock, durch sehr dünne Fäden, welche an der A. occipitalis und auricularis posterior herabgehen, mit dem Plexus nervorum mollium des N. sympathicus zusammen. Außerdem kommen unbeständige Zweige aus dem N. facialis hervor, welche durch die Glandula parotis gehen und sich mit dem Parotidengeflechte, mit dem N. auricularis magnus des 3ten Halsnerven und mit dem Plexus nervorum mollium aus dem N. sympathicus verbinden.

Wenn der N. facialis diese beiden Aeste abgegeben hat, so geht er bedeckt von der Parotis vorwärts, und theilt sich hinter der A. temporalis in 2 oder 3 Aeste. Beide sind sogleich an der Spaltungsstell unter sich, zuweilen auch mit einem Aste des N. temporalis superficialis des trigeminus, verbunden. Zuweilen entstehen hier Schlingen, welche um das Ende der Carotis facialis herumgehen.

1) Der obere Ast, ramus superior, geht vorwärts, und theilt sich sehr bald wieder in 2 Aeste, welche sich unweit ihres Ursprunges unter einander bogenförmig verbinden, und nach Bock mit den die A. temporalis umschlingenden Verbindungszweigen des N. temporalis superficialis des trigeminus vereinigen, und auch noch zuweilen dünne Aeste vom Stamme des N. facialis und vom unteren Aste aufnehmen. Aus diesem Geflechte gehen kleinere Aeste durch die Glandula parotis hindurch zur Haut, und verbinden sich mit

---

geht die Fortsetzung der Chorda tympani, nach Cloquet, zu dem dieser Drüse gehörenden Knötchen, und nach Ribes und Hirzel geht wenigstens ein Faden derselben dahin, und ein Faden bleibt bei dem Nervus lingualis. Arnold (Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie, Bd. II. S. 169) konnte dagegen den Ramus superficialis nervi Vidiani vom Knie des N. facialis nur gewaltsam trennen. Er hält die Anschwellung des N. facialis an seinem Knie für einen Nervenknoten, und behauptet, daß die Chorda tympani weder allein die Fortsetzung jenes Ramus superficialis, noch allein ein Ast des N. facialis sei, sondern daß er von beiden Fäden erhalte.

Digitized by Google

Aeſten des N. auricularis magnus, andere kleine Zweige vereinigen ſich an den Aeſten der A. carotis facialis mit dem Gefäßgeflechte des ſympathiſchen Nerven.

Dann gehen 3 größere Aeſte, die Schläfennerven, rami temporales, von ihm aufwärts über dem Jochbogen zur Schläfe, und vereinigen ſich unter einander und mit benachbarten Nerven mit dem N. supraorbitalis, lacrymalis und subcutaneus malae und mit dem temporalis superficialis. Die Zweige gehen zur Haut, zum M. attollens auris, zu dem Orbicularis palpebrarum und zu dem M. frontalis.

Hierauf kommen aus jenem Geflechte 2 Wangenzweige, rami malares oder zygomatici, die vorwärts über den Jochbogen nach vorn gehen, und mit dem ſo eben erwähnten und den ſogleich zu beſchreibenden Aeſten verbunden ſind, und auch mit dem Subcutaneus malae anaſtomoſiren. Sie gehören dem Jochmuskel, dem Orbicularis palpebrarum und der Haut an.

Nun entſpringen ungefähr 3 oder 4 Aeſte, welche man Backennerven, rami buccales, nennt, die ſich ſelbſt wieder mannichfaltig theilen, ſich unter einander vereinigen und dicht über dem M. masseter und in dem Fette der Backe über und unter dem Stenonſchen Ausführungsgange der Parotis nach vorn gehen, und das Backengeflecht bilden.

Mit dieſem Geflechte hängen dünne Zweige des unteren Aſtes des N. facialis, welche durch die Parotis emporſteigen, ferner Aeſte des N. infraorbitalis und buccinatorius durch Anaſtomoſen zuſammen. Man vergleicht die Form dieſes Geflechtes mit den Umriſſen der durch die Schwimmhaut verbundenen Zehen eines Gänſefußes, pes anserinus, und nennt es deswegen plexus anserinus. Die Zweige dieſes Geflechts gehören der Haut der Wange, der Backe, der Oberlippe, des Mundwinkels, des unteren Augenlieds und der Naſe, ferner auch dem M. zygomaticus major und minor, dem Levator labii superioris und anguli oris, Levator labii superioris alaeque nasi und Depressor anguli oris an [1]).

2) Der untere Aſt, ramus inferior, geht, hinter dem Winkel des Unterkiefers, in der Parotis ſchief vorwärts und abwärts, giebt mehrere kleinere unbeſtimmte Aeſte zu dem Plexus anserinus und Verbindungszweige zu dem N. buccinatorius des trigeminus gegen das Kinn hin, außerdem aber Zweige zu dem im Geſichte liegenden Theile des M. platysma myoides, zu dem M. depressor oris, hinter welchem er hingeht, und zu dem M. quadratus menti, und vereinigt ſich mit dem Ramus mentalis des N. alveolaris inferior, und bildet dadurch das Mentalgeflecht. Endlich theilt er ſich in 2 größere Hautnerven.

a) Ramus subcutaneus maxillae inferioris, geht über dem Winkel des Unterkiefers aus der Parotis hervor, vor dem M. masseter hin, verbindet ſich mit den Backenäſten, und läuft am Rande der unteren Kinnlade als Ramus marginalis maxillae inferioris vorwärts.

b) Ramus subcutaneus colli theilt ſich in 2 oder in 3 Aeſte, die bisweilen ſchon getrennt vom Ramus inferior kommen. Dieſe gehen am oberen Theile der Seite des Halſes hinter dem Aſte der unteren

---

[1]) Nach *Scarpa* Anat. annotat. Lib. I. Mut. 1779. 8. c. II. p. 78. finden ſich an den Stellen, wo ſich der N. facialis mit den Aeſten des Trigeminus verbindet, im Geſichte verſchiedene zerſtreute Knötchen.

Digitized by Google

Kinnlade abwärts, den Ramis subcutaneis vom 3ten N. cervicalis entgegen, vereinigen sich mit ihnen, und dringen auch zum Theil in den M. platysma myoides.

Der N. facialis ist ein sehr wichtiger Nerv des Angesichts. Von ihm hängen, nach Bells [1]) Vermuthung, die mannichfaltigen, halb unwillkührlichen, mimischen Bewegungen der Gesichtsmuskeln beim Lachen, Weinen und anderen Gemüthsbewegungen ab. Diese Vermuthung wird sehr dadurch unterstützt, daß, wie schon Sömmerring, Shaw und Serres bemerkt haben, die in das Gesicht gehenden Aeste desselben bei den Säugethieren gar nicht in Proportion zur Größe des Gesichts stehen, sondern daß sie, die Affen abgerechnet, sehr klein sind. Das Mienenspiel ist auch bei den Säugethieren, wenn wir die Affen wegrechnen, sehr unvollkommen. Der Ohrzweig des Facialnerven ist dagegen, wie schon Cuvier bemerkt hat, bei den Thieren, deren äußeres Ohr sehr groß ist, sehr beträchtlich. Nach C. Bell verursacht die Verletzung desselben nicht den Verlust des Empfindungsvermögens, und nach Brughton soll die Verletzung desselben keinen Schmerz erregen.

VIII. Nervus acusticus, der Hörnerv.

Der Gehörnerv, nervus acusticus, oder auditorius, oder portio nervi paris septimi entspringt an der vorderen Wand der 4ten Hirnhöhle, und also von der concaven Oberfläche des Hirnknoten (pons). Er wird daselbst von dem grauweißen Ueberzuge der 4ten Hirnhöhle bedeckt [2]). Er lenkt sich um das verlängerte Mark hinab, von dem er

---

[1]) Siehe oben S. 361.

[2]) Piccolhomini und Sömmerring behaupteten, die weißen queren Streifen oder Markfäden, welche daselbst sehr sichtbar sind, gingen in die Gehörnerven über und wären die Wurzeln desselben. Sömmerring und Prochaska sahen zwar selbst, daß sich diese weißen Streifen oft mehr oberhalb oder unterhalb verlieren, und größtentheils nicht mit den Wurzeln des Gehörnerven zusammenhängen. Die Gebrüder Wenzel (de penitiori cerebri structura p. 183) zeigten, daß jene weißen Streifen nur bei dem Menschen, aber bei keinem Säugethiere sichtbar wären, und daß sie sich auch bei dem Menschen nicht zu den Gehörnerven begäben. Sie, Rudolphi und viele neuere Anatomen läugnen daher, daß dieselben für Wurzeln des Gehörnerven gehalten werden dürften, dagegen beschrieben sie graue Leisten, taeniae cinereae, am unteren Theile der vorderen Wand der 4ten Hirnhöhle, welche die Wurzeln des Hörnerven bildeten. Gall (Anatomie und Physiologie des Gehirns, Bd. I. S. 210.) leitet einige Fasern, durch welche der Hörnerv verstärkt werde, von diesen grauen Leisten ab. Er behauptet aber, daß der Hörnerv hauptsächlich von einer Querbinde entspringe, welche zwischen dem rechten und linken Hörnerven liege. Diese Querbinde werde bei dem Menschen von dem hinteren Theile der Querfasern der Brücke bedeckt; bei den Säugethieren dagegen, weil die Brücke bei ihnen schmal ist, liege sie frei. Es sei diese Binde dieselbe, welche schon *Willis* (Cerebri anatom. Amstelodami 1667. in 12. p. 27.) beobachtet hätte. Malacarne nannte diese Binde lastre midollare, G. R. Treviranus aber trapezium. Ihre Querfasern gehen auch, nach Treviranus (vermischte Schr. Bd. 3. 1820.), zur Gegend des Ursprungs des Hör- und Antlitznerven. Serres behauptet, daß ein eben so deutlicher Zusammenhang des Hörnerven mit jener Binde bei dem menschlichen Embryo, als bei allen andern Säugethieren sichtbar sei. (Anat. comp. du cerveau T. I. p. 433, 431.) Bei dem Erwachsenen aber scheine der Nerv von dem Corpus restiforme zum Vorschein zu kommen. Treviranus und Serres behaupten, daß die Größe der Taenia cinerea Wenzels bei verschiedenen Säugethieren nicht mit der Größe des Hörnerven übereinstimmten, und beide glauben daher, daß die Ansicht, daß einige von den weißen

Digitized by Google

Zuwachs erhält, tritt am hinteren Rande des Processus cerebelli ad protuberantiam annularem, zwiſchen ihm und dem verlängerten Marke zur Grundfläche des Gehirns hinab, wo er dann, neben dem N. facialis, weiter nach außen liegt. Er ſcheint hier noch Mark von der Protuberantia annularis zu empfangen, und wird dadurch ſo dick, daß er dem N. oculi motorius ziemlich gleich iſt.

Er iſt ſehr weich, jedoch nicht ſo ſehr als der Geruchsnerv. An der Seite, an welcher der N. facialis an ihm liegt, iſt er ſeiner Länge nach rinnenförmig vertieft, und in dieſer Vertiefung geht jener Nerv, der beträchtlich dünner als er iſt, fort.

Er geht alſo, vom N. facialis begleitet und durch Zellgewebe mit ihm verbunden, auswärts abwärts, und tritt in den mit einer Fortſetzung der harten Hirnhaut ausgekleideten Meatus auditorius internus.

Hier trennen ſich ſeine beiden Aeſte von einander, welche ſchon vorher verſchieden waren, aber neben einander lagen.

Der dickere Aſt, der Nerv für die Schnecke, nervus cochleae, dringt in die Löcherchen ein, welche in den Modiolus der Schnecke führen.

Der dünnere Aſt, nervus vestibuli, der Vorhofsnerv, geht durch kleine Löcherchen, von welchen viele an 2 Stellen im unteren Grübchen des Meatus auditorius internus, ein größeres im oberen Grübchen deſſelben befindlich ſind, in das Vestibulum.

Der Vorhofsnerv, N. vestibuli, theilt ſich nämlich in 3 Bündel, das dickſte von ihnen dringt in das obere Grübchen des Meatus auditorius internus, und von da durch kleinere Löcherchen zu den 2 Ampullen des oberen und äußeren halbcirkelförmigen Canals und zu dem Sacculus oblongus, das mittlere Bündel geht in dem unteren Grübchen des Meatus auditorus internus durch kleine Löcherchen zum Sacculus rotundus, das kleinſte und unterſte Bündel geht in dem unteren Grübchen des Meatus auditorius internus zu der Ampulla des hinteren halbcirkelförmigen Canals. Am Sacculus oblongus ſieht man, daß die Nervenzweige, wenn man ſie durch das Vergrößerungsglas betrachtet, noch deutlich aus unter einander verflochtenen Fädchen und Fäſerchen beſtehen; endlich ſcheinen ſie aber, wenn ſie in ſeine Haut eindringen, zu einem weißen Nervenbrei zu werden, an welchem kaum etwas Faſeriges deutlich mehr unterſchieden werden kann. Die zu den häutigen Ampullen der halbcirkelförmigen Canäle gehenden Zweige dringen in die Haut derſelben ein, laufen aber nicht längs der halb-

Querſtreifen zum Urſprunge des Hörnerven beitragen, noch nicht als widerlegt anzuſehen ſei. Rolando leitet die Wurzel des Hörnerven theils von einigen weißen, theils von den grauen Streifen her (a. a. O. p. 56.).

Digitized by Google

cirkelförmigen Canäle fort. An der Ampulle weichen die Fäden aus einander, und umfassen, in 2 Portionen getheilt, die Ampulle. Die Aeste des N. vestibuli sind nach Scarpa [1]) sehr weich. Sie endigen sich an der zwischen 2 Lagen Wasser schwebenden Haut der Säckchen und Ampullen des Labyrinths. Diese Stelle der Endigung scheint so eingerichtet zu sein, daß dem Gehörnerven die Erzitterungen von dem Wasser des Labyrinths mitgetheilt werden können.

Der dickere Ast des Gehörnerven, der Nerv der Schnecke, nervus cochleae, tritt nach vorn in die Spindel, modiolus, der Schnecke, ist etwas gewunden, und schickt durch die Gänge des Modiolus (tractus spiralis foraminulosus) erst dickere, dann dichter liegende und zugleich kleinere Fäden zwischen die Platten der Lamina spiralis und in die Spitze der Spindel [2]). Sie sind auch netzförmig unter einander verflochten, gelangen bis zum Umfange des knorpligen Theiles der Spiralplatte, und kommen daselbst vorzüglich an der der Scala zugekehrten Seite desselben zum Vorschein. Diese Aeste sind nicht so weich, als die des N. vestibuli, und lösen sich nicht in eine breiartige Nervensubstanz auf. Diese Art der Endigung an der Lamina spiralis, welche mit der Knochenmasse des Schädels ein Continuum bildet, macht es, wie ich an einem anderen Orte gezeigt habe, wahrscheinlich, daß hier dem N. cochleae Erzitterungen von einer festen Substanz mitgetheilt werden, und daß der Nerv der Schnecke vorzüglich geschickt sei, die Schwingungen zu empfinden, welche durch die Kopfknochen hindurch zu dem Gehörorgane fortgepflanzt werden und also unter andern auch die der eigenen Stimme.

Merkwürdig ist es übrigens, daß die 3 Empfindungsnerven des Geruchs, des Gesichts und des Gehörs mit keinem anderen Nerven eine zuverlässig bewiesene sichtbare Gemeinschaft haben, namentlich auch nicht mit dem N. sympathicus.

IX. Nervus glossopharyngeus, der Schlundzungennerv.

Der Schlundzungennerv oder Zungenschlundnerv, N. glossopharyngeus, wurde bis auf Andersch und Sömmerring als ein Theil des N. vagus betrachtet. Andersch nannte ihn den 8ten Hirnnerven. Er entspringt ungefähr mit 4 Fäden dicht neben dem N. vagus näher an der Brücke, und also zwischen ihm und dem N. facialis von den hinteren Bündeln (corporibus restiformibus) des verlängerten Markes, an der zwischen dem Corpus restiforme und den Oliven befindlichen Furche [3]). Er geht unter dem Plexus choroi-

[1]) *Anton Scarpa*, de nervo auditorio. In disquis. anatt. de auditu. Sect. II c. 3. Tab. VI. VII. VIII.

[2]) *A. Monro*, on the brain, the eye and the ear. Edinburgh 1797.

[3]) Girardi und Sömmerring leiteten einige Fädchen desselben aus dem 4ten Ventrikel ab.

Digitized by Google

deus des kleinen Gehirns, mit welchem er zusammenhängt, neben dem N. vagus zum Foramen jugulare, das durch die harte Hirnhaut großentheils verschlossen ist. Die harte Hirnhaut hat nämlich daselbst 2 kleine von einander getrennte Oeffnungen. Die vorderste oder oberste von ihnen dient dem N. glossopharyngeus, die größere hintere oder untere dient den 2 folgenden Nerven zum Durchgange. Eine von der Dura mater gebildete Scheidewand, und später die Vena jugularis trennt diese Nervenpaare vom Glossopharyngeus.

Nach Andersch [1]), Sömmerring und J. F. Meckel geht vom N. glossopharyngeus auf dem Wege zu diesem Loche ein Nervenfaden zum N. vagus hinüber.

Etwa 4 Linien weit von der Stelle, wo er durch die harte Hirnhaut durch die erwähnte Oeffnung hindurchgetreten ist, schwillt er in ein kleines, ovales, einige Linien langes Knötchen, ganglion petrosum glossopharyngei an, das mit dem N. vagus und mit dem Ganglion cervicale supremum des N. sympathicus in Verbindung steht, und mittelst eines durch das Felsenbein in die Paukenhöhle dringenden Fädchens mit dem Ramus superficialis des N. Vidianus und mit dem Geflechte des sympathischen Nerven zusammenhängt, und Zweige zur Haut der Paukenhöhle schickt [2]).

---

[1]) *Andersch*, descr. nerv. card.; recus. in *Ludwig*. script. neurolog. min. T. II. p. 114.

[2]) Diesen Knoten nebst dem in die Paukenhöhle dringenden Faden scheint Andersch zuerst beschrieben zu haben. Den in die Paukenhöhle tretenden Nervenfaden hat von seiner Verbindung aus, die er mit dem N. sympathicus im Canalis caroticus eingeht, *Jo. Gerold* (diss. inaug., qua quaedam de nervo intercostali notantur. Praesid. *Casim. Schmiedelio*. Erlangae 1754. 4. p. 6. u. 7.) beschrieben. Eben denselben Nervenfaden hat von dem N. glossopharyngeus aus, (der damals als Theil des N. vagus betrachtet wurde) *Dom. Cotunni* (de aquaeductibus auris humanae internae. Diss. anat. Viennae 1774. 8. §. 80. p. 145, siehe bei Kilian p. 40 wörtlich angeführt), in die Paukenhöhle verfolgt. Auch Ehrenritter (Salzburger medicinisch-chirurgische Zeitung 1790. B. 4. S. 319.) gab die Lage des Ganglion petrosum und des in die Paukenhöhle dringenden Astes desselben an. Indessen ist die allgemeine Aufmerksamkeit der Anatomen auf den Knoten und den erwähnten Ast desselben erst seitdem gelenkt worden, nachdem Ludwig Jacobson der Soc. reg. Hafniensis einen Aufsatz uber diesen Gegenstand vorlegte (Acta regia soc. med. Hafniensis Vol. I. p. 229. 1818. 8. Rosenmüller, Bock, Mutzer, H. Cloquet, Lobstein, Ehrmann, Hirzel, Langenbeck und Arnold haben im Wesentlichen die Richtigkeit der Jacobsonschen Beschreibung bestätigt. Nur Kilian hat die Aeste nicht finden können. Literarische Nachrichten und mehrere eigene Untersuchungen und Beschreibungen der gefundenen Varietäten enthält die Abhandlung von Hirzel in Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie, Bd. 1. S. 219 u. folg., und die Schrift von Arnold, Der Kopftheil des vegetativen Nervensystems. Heidelberg u. Leipzig 1831. 4.

In meiner Schrift (Anatomia comparata N. sympathici, cum Tab. aen. Lipsiae 1817. 1 Jahr früher, ehe Jacobsons Abhandlung erschien) habe ich, ohne von Jacobsons Arbeiten zu wissen, den Knoten des N. glossopharyngeus bei den Vögeln, und seine Verbindung mit dem N. sympathicus im Canalis caroticus, die mit dem N. facialis und endlich die mit dem N. vagus beschrieben. Es heißt daselbst p. 38: Nervus glossopharyngeus et vagus per duos canales osseos in diploë cranii reconditos exeunt, ibique ganglion cervicale supremum tegunt.

Digitized by Google

An dem vorderen Ende des Foramen jugulare, d. h. auf der zwischen dem Foramen jugulare und dem Canalis caroticus befindlichen Scheidewand befindet sich ein Loch, welches einen Nervenfaden des Ganglion petrosum zum hinteren Theile des Bodens der Paukenhöhle führt. Von hier gehen 2 Canäle aus, und in ihnen 2 Aeste jenes Nervenfadens. Der eine Canal geht über das Vorgebirge aufwärts und nach vorn, und führt einen Verbindungsfaden in den Fallopischen Canal zu der Stelle des oberflächlichen Astes des Vidianischen Nerven, wo er sich mit dem N. facialis zu vereinigen im Begriff ist. Auf diesem Wege giebt er ein Fädchen zur Haut der Fenestra ovalis. Der andere Canal geht unter dem Vorgebirge von hinten nach vorn, und führt einen Ast durch eine Oeffnung des Carotischen Canals zu einem Faden des Carotischen Geflechts des sympathischen Nerven, oder zu dem vom Ganglion cervicale supremum daselbst aufsteigenden Faden. Außerdem geht noch von der Stelle, von wo jene 2 Canälchen in der Paukenhöhle aus einander gehen, ein Fädchen des Nerven zur Haut des runden Fensters.

Nach Arnolds [1]) Untersuchungen giebt der in die Paukenhöhle getretene Ast, sogleich nach seinem Eintritte einen Zweig zur Membrana tympani secundaria, dann einen Zweig in den Canalis caroticus, hierauf ein Fädchen in die Tuba Eustachii, welches sich in den Schleimdrüsen derselben verliert, schickt nun ein Fädchen zur Haut des ovalen Lochs, und endlich die 2 letzten Fäden, welche sich so endigen, daß der eine zu dem kleinen Knoten geht, welchen Arnold am 3ten Ast des 5ten Paars entdeckt zu haben glaubt, und der andere in den Canalis caroticus zum tiefen Ast des Vidianischen Nerven gelangt. Langenbeck [2]) bildet in einem Falle 3 zu der Haut der Fenestra rotunda gehende Zweige, einen zur Haut des ovalen Fensters, einen zum M. mallei externus et internus, einen in den Canalis caroticus zum N. sympathicus, und endlich einen zum Ramus superficialis des N. Vidianus gehenden Zweig ab.

Außerdem beobachteten Andersch [3]) und neuerlich Hirzel (dreimal) einen aus dem Ganglion petrosum zum N. vagus gehenden Zweig, und Bock [4]), daß das Ganglion meistentheils einen Faden vom Ganglion cervicale supremum des N. sympathicus empfange, und unbestimmte Fädchen an den N. vagus und accessorius schicke.

Der Stamm des N. glossopharyngeus geht an der vorderen und äußeren Oberfläche der Carotis cerebralis, der er eine kleine Strecke hindurch ziemlich fest anhängt, herab, tritt hierauf an die Seite des M. stylopharyngeus und von da zu dem M. hyoglossus.

Aeste zum N. vagus, sympathicus und zum Plexus pharyngeus.

Schon oben, wo er an der Carotis cerebralis anliegt, giebt er meistentheils einen Zweig, welcher mit dem Ramus pharyngeus des N. vagus sich vereinigt, der bisweilen sogar stärker als dieser ist, und zum Schlundkopfgeflecht gelangt. Immer verbindet er sich auf irgend

---

Nervus glossopharyngeus in ganglion intumescit, quod ramo transversario satis crasso cum nervo vago conjunctum est. Ex eo, praeter primum ramum cum nervo vago conjunctum, bis alium ramum prodire vidi, qui in canalem caroticum intrans in hoc canali cum nervo sympathico et faciali conjungitur. Tertius ramus ad carotidem facialem descendens ramos ejus comitatur et speciem nervorum vasculosorum habet, etc.

[1]) Arnold in Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für die Physiologie, Bd. III. 1829. S. 150.

[2]) *Langenbeck*, Icones anatomicae. Neurologia Fasc. III. Tab. XVII. XVIII. XXV. bis XXVIII.

[3]) Andersch a. a. O. S. 116. Hirzel a. a. O. S. 251.

[4]) Bock. Handbuch der praktischen Anatomie. Bd. 1. S. 191.

Digitized by Google

eine Weiſe mit den an der Carotis externa liegenden Gefäßnerven, plexus nervorum mollium des Sympathicus. Zuweilen bildet ein an der Carotis herabgehender Aſt an demſelben einen platten Knoten, der aus einem ſehr dichten Nervengeflechte beſteht. Oft hängt auch der N. glossopharyngeus noch beſonders mit dem Stamme des N. vagus, bisweilen auch mit dem Ganglion cervicale supremum des ſympathiſchen Nerven, oder mit einem von den vor ihm aufſteigenden Aeſten zuſammen [1]). Dann giebt er noch einen mit dem Ramus pharyngeus des N. vagus ſich verbindenden ſehr beſtändigen Aſt, der vorzüglich das Schlundkopfgeflecht mitbilden hilft. Zur Bildung dieſes Schlundkopfgeflechtes tragen außer dem N. glossopharyngeus und dem N. vagus auch ein mit den Zweigen des N. vagus hinzukommendes Aeſtchen des N. accessorius und Aeſte des N. sympathicus bei, die entweder unmittelbar aus dem Ganglion cervicale supremum, oder mit den Arterien aus dem Plexus nervorum mollium abgehen.

Weil nun dieſe Aeſte der Zahl und der Ordnung nach, in welcher ſie abgehen, viele Verſchiedenheiten zeigen, und weil die zu der Zunge, zu den Schleimdrüſen derſelben und zur Mandel gehenden Aeſte vielfach mit jenen Aeſten zuſammenhängen, ſo läßt ſich die Lage derſelben nicht im Einzelnen beſchreiben [2]).

Der Zungenaſt.

Der zur Zunge gehende Aſt des N. glossopharyngeus iſt der größte Zweig deſſelben. Er geht nach vorn, und, wie ſchon erwähnt worden iſt, am M. stylopharyngeus herab. (Nach Anderſch durchbohren dieſen Muskel mehrere Zweige deſſelben, die zur Tonſille gelangen.) Nach mehreren Anatomen erhält auch der Muskel ſelbſt Zweige von ihm. Hierauf tritt er unter dem M. styloglossus und der Mandel zur Zunge, und verbreitet ſich an der Wurzel derſelben, giebt der Tonſille kleine Zweige, und bildet zwiſchen den auf dem Rücken der Zungenwurzel gelegenen Schleimdrüſen ein Netz. Anderſch und Sömmerring haben von hier aus Fäden zu den Papillis vallatis verfolgt, (welche Anderſch papillas erectas nennt), und außerdem ſahe Anderſch [2]) viele Aeſte durch das Fleiſch der Zunge zur Haut derſelben und zu den kleineren Papillen dringen, und zwar einige ſo weit davon, daß ſie nur noch ½ Zoll von der Spitze der Zunge entfernt waren. Auch Wrisberg hat ſeitwärts vom blinden Loche der Zunge Fäden in die Papillen derſelben verfolgt.

---

[1]) Bock fand auch einmal eine Verbindung mit dem 3ten Halsnerven a. a. O. S. 192.
[2]) Anderſch a. a. O. S. 120.

Digitized by Google

X. Nervus vagus, der Stimmnerv.

Ursprung des Nerven, seine Anschwellungen und sein Weg im Allgemeinen.

Der Stimmnerv oder der herumschweifende, oder der Lungenmagennerv, das zehnte Paar, das herumschweifende Paar, nervus vagus, s. pneumogastricus (nach Chaussier) entspringt dicht neben dem N. glossopharyngeus von der Seite der hinteren Schenkel (corpora restiformia) des verlängerten Markes, an der Furche zwischen diesem Schenkel und der Olive, mit vielen, meistens in einer Reihe dicht neben einander liegenden Fäden. Nach Sömmerring und J. F. Meckel d. J., lassen sich oft einige Fäden bis zur vorderen Wand des 4ten Ventrikels verfolgen, die jedoch Haller und Gall nicht finden konnten. Er geht durch die 2te weiter unten und hinten gelegene Oeffnung, welche die harte Hirnhaut an der Stelle bildet, wo sie das Foramen jugulare verschließt, hindurch, und liegt dann im Foramen jugulare in einem von der Dura mater gebildeten Canale von der Vena jugularis abgesondert. Sogleich bei seinem Austritte aus der Schädelhöhle schwillt der Nerv an und bildet nach dem Zeugniß mehrerer Anatomen ein kleines Ganglion, das nach Arnold mit dem N. accessorius in einem ähnlichen Verhältnisse steht, als die Ganglia spinalia zu den der vorderen Wurzeln der Rückenmarknerven stehen. Es ist immer mit dem Ganglion cervicale supremum, und oft oder nach Arnold immer mit dem Ganglion glossopharyngei durch ein Fädchen verbunden. Oft besitzt der N. vagus auch etwas tiefer da, wo er vor dem Ganglion cervicale supremum herabsteigt, eine 2te längliche Anschwellung, welche seine vielfach verflochtenen Bündel hervorbringen [1]), und welche mit einem dicken Aste des N. accessorius Willisii, oft auch mit dem Ganglion cervicale supremum, mit dem N. hypoglossus und mit der Nervenschlinge des 1sten und 2ten Halsnerven in Verbindung tritt,

---

[1]) Arnold in seiner Schrift: Der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen, in anatomischer Hinsicht bearbeitet. Heidelberg 1831. 4. p. 105, beschreibt außer den erwähnten Zweigen einen nach hinten zum N. facialis abgehenden Ast des Knotens, welcher sich theils zum Stamme, theils zu dem hinteren vom N. facialis entspringenden Ohrzweige desselben begiebt. Dieser Nervenast nimmt nach Arnold ein Fädchen vom Ganglion petrosum des N. glossopharyngeus auf, geht hierauf durch ein in der Grube des Foramen jugulare befindliches Loch in den Canalis Fallopii, und tritt in denselben ungefähr 1 oder $1\frac{1}{2}$ Linie über dem Foramen stylomastoideum ein. Hier verbindet er sich durch einen am Stamme des Nerven emporsteigenden und durch einen an ihm herabsteigenden Zweig mit dem N. facialis, und schickt noch ein 3tes Fädchen, das durch ein Canälchen des Processus mastoideus hindurchdringt und gespalten an der vorderen Seite des Processus mastoideus zum Ohrknorpel und zu dem R. auricularis posterior des N. facialis geht, mit welchem sich dieser letztere Faden verbindet.

Digitized by Google

und zuerst von Scarpa, und dann von Sömmerring als ein wirklicher Knoten anerkannt worden ist [1]). Das zwischen diesen 2 Anschwellungen befindliche, hinter der Carotis cerebralis gelegene Stück des Nerven liegt an dem N. hypoglossus so dicht an, daß beide Nerven daselbst in einer gemeinschaftlichen Scheide eingeschlossen zu sein scheinen.

Von nun an geht der N. vagus zwischen der Carotis communis und Vena jugularis interna am Halse herab, dann vor der A. subclavia in die Brusthöhle, und hierauf hinter der Lungenwurzel weg zur Speiseröhre. An dieser vereinigen sich beträchtliche Aeste des N. vagus der rechten und der linken Seite mit einander, und endlich gehen die Endzweige des Nerven mit der Speiseröhre durch's Zwerchfell zum Magen und zur Leber.

Uebersicht über die Zweige des Nervus vagus.

Seine wichtigsten Zweige sind 1) der über der 2ten Anschwellung des Nerven entspringende, einfache oder doppelte, mit Aesten des Accessorius, Glossopharyngeus und Sympathicus verbundene Nervus pharyngeus [2]); 2) der ein wenig tiefer aus der 2ten Anschwellung des Vagus, oder dicht unter ihr entspringende, mit dem N. sympathicus und mit dem Recurrens anastomosirende Nervus laryngeus superior; 3) der in der Brusthöhle entspringende, um die A. subclavia dextra,

---

[1]) Die Verbindung des N. vagus mit dem Ganglion cervicale des N. sympathicus haben Haller, Huber, Iwanoff, Girardi, Sömmerring, Bock, Cloquet und Hirzel beobachtet. Hirzel fand sie bei 4 Leichen jedesmal, und zwar an der oberen Anschwellung. (Tiedemann, Zeitschrift für Physiologie Bd. 1. S. 225. Auch Arnold, Bd. 3. S. 149, sah die Verbindung nie fehlen. Die unterhalb des Foramen jugulare gelegene tiefere Anschwellung wurde von Willis mit dem Namen plexus ganglioformis belegt, und von *Huber* (De nervo intercostali, de nervis octavi et noni paris deque accessorio, Gottingae 1744. p. 16) und von *Prochaska* (De structura nervorum. Tab. II. Fig. VII. c.) beschrieben. Auch Scarpa (Abhandl. der k. k. Joseph-Akademie, Bd. 1. Wien 1787. p. 401. Taf. X. und Sömmerring, vom Bau des menschl. Körpers, 2te Ausg. 1800. Bd. 5. S. 147, halten die Anschwellung des N. vagus da, wo er sich mit dem N. accessorius verbindet, für einen wahren Knoten. Wutzer giebt die Geschichte der Entdeckung dieses Knotens, und fand selbst eine obere und eine untere gangliöse Anschwellung des N. vagus (De c. h. gangliorum fabrica atque usu. Berolini 1817. p. 88.) Schon Ehrenritter beschrieb ein in dem Foramen jugulare liegendes Ganglion (nach einer Anzeige in der Salzburger med.-chirurg. Zeitung 1790. Bd. 4. S. 319), und neuerlich ist dasselbe, wie gesagt, von Arnold beständig gefunden worden. Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie, Bd. 3. 1829. S. 147. Es steht nach ihm nicht mit dem N. accessorius, der nur an ihm anliegt, wohl aber mit einem beständigen Zweige des Ganglion cervicale supremum des N. sympathicus und mit dem Ganglion petrosum des N. glossopharyngeus in Verbindung. Ich habe an dem Stamme des Vagus bei seinem Austritte aus dem Schädel bei den Fröschen beständig einen Knoten gesehen, bei manchen von den von mir untersuchten Fischen war er außerordentlich groß. Bei den Karpfen besitzen sogar die meisten von den von diesem Knoten ausgegangenen Aeste selbst wieder Knoten. Siehe Anatomia comparata nervi sympathici 1816, und Meckels Archiv 1824. Taf. IV. Fig. 26.

[2]) In dieser Gegend giebt der N. vagus bisweilen einen Ast, der in den Stamm des N. vagus wieder zurückläuft. (Sömmerring's Nervenlehre. §. 207. S. 231.)

Digitized by Google

oder um die Aorta auf der linken Seite herumgebogene, zwiſchen Kehlkopf und Speiſeröhre in die Höhe laufende Nervus recurrens oder Nervus laryngeus inferior; 4) ferner einige theils am Halſe, theils in der Bruſt von ihm entſpringende, mit dem Herzgeflechte des N. sympathicus verbundene unbeſtimmtere Fäden; 5) viele in der Bruſthöhle gegebene, mit der Arterie und den Luftröhrenäſten in die Lungen eindringende, mit einigen wenigen Fäden des N. sympathicus verbundene Lungennerven; 6) Speiſeröhr-, Magen- und Lebernerven.

Beſchreibung der Zweige des N. vagus im Einzelnen.

1) Der N. pharyngeus, der Schlundkopfzweig ſteigt an der Carotis cerebralis nach vorn herab, vereinigt ſich mit einem Zweige des N. glossopharyngeus, die aus dieſer Vereinigung hervorgehenden Aeſte bilden zuſammen und mit einem 2ten Aſte des N. glossopharyngeus ein Geflecht, plexus pharyngeus, in welchen auch Fäden des ſympathiſchen Nerven, die zuweilen vom Ganglion cervicale supremum direct kommen, zuweilen mit der A. pharyngea vom Plexus nervorum mollium hinzutreten. Der N. accessorius ſcheint inſofern Antheil an der Bildung dieſes Geflechtes zu haben, als er ſich oben mit dem Stamme des Vagus vereinigt. Die Fäden aus dieſem Geflechte begeben ſich zum mittleren und unteren Conſtrictor.

2) N. laryngeus superior, der obere Kehlkopfnerve, oder auch der Kehlkopfaſt, ramus laryngeus superior des N. vagus entſpringt etwas tiefer, doch höher, als wo der Kehlkopf liegt (bisweilen mit 2 Wurzeln), geht hinter der Carotis cerebralis ſchräg einwärts und abwärts und theilt ſich in den größeren und mehr quergehenden inneren Aſt und in den dünneren, mehr ſenkrecht herabgehenden äußeren Aſt. Er erhält bisweilen ein Fädchen vom N. sympathicus, tritt zwiſchen dem Zungenbeine und dem Schildknorpel hinein, und vertheilt ſich in der Haut des Kehlkopfs, des Kehldeckels und des Schlundes, auch in den inneren Muskeln des Kehlkopfs, kommt namentlich zu dem M. arytaenoideus, cricothyreoideus und thyreoarytaenoideus. Der äußere Aſt vereinigt ſich mit 1 oder 2 Fäden aus dem Ganglion cervicale supremum und vertheilt ſich dann im Constrictor infimus des Schlundes, im M. cricothyreoideus und in der Schilddrüſe. Bisweilen geht ein Aeſtchen des N. vagus an der Carotis cerebralis hinab und vertheilt ſich in ihrer Maſſe. Bisweilen vereinigt ſich ein Aeſtchen des Vagus mit dem N. hypoglossus oder mit dem Ramus descendens deſſelben, oder mit dem 1ſten Halsnerven.

Wenn der N. vagus dieſe Aeſte abgegeben hat, ſo geht er, wie ſchon geſagt worden, zwiſchen der A. carotis und Vena jugularis interna am Halſe hinab, und hinter der V. anonyma und vor der A. subcla-

Digitized by Google

via hindurch in die Bruſt. Er iſt bis hierher ein rundlicher Strang, der aber durch kleine Einſchnitte uneben und dadurch in mehrere ſich verkettende oder verflechtende Bündel getheilt iſt. An manchen Stellen wird er auch von netzförmig vereinigten Fäden umgeben [1]).

3) Auf dieſer ganz beträchtlichen Strecke giebt er keinen Aſt, ausgenommen am unteren Theile des Halſes, und im oberen Theile der Bruſt einen größeren, oder 2, 3, oder 4 kleinere unbeſtändige Fäden zu den großen Gefäßſtämmen.

4) Nervus laryngeus inferior [2]). Der rechte N. vagus giebt vor der Arteria subclavia dextra, der linke tiefer unten vor dem hinteren Theile des Bogens der Aorta, den zurückgehenden Aſt, oder unteren Kehlkopfsaſt, Ramus recurrens s. Laryngeus inferior [3]). Dieſer geht erſt unter einem ſpitzigen Winkel vom Stamme abwärts, dann ſchlägt er ſich an der rechten Seite unter der A. subclavia, auf der linken Seite viel tiefer unter dem Bogen der Aorta durch, nach hinten zu herum, und ſteigt wieder rückwärts und nach innen (an der linken Seite vor der Speiſeröhre) zum unteren Theile des Kehlkopfs hinauf. Auf dieſem Wege giebt er einen Aſt, der ſich mit dem N. vagus vereinigt, Aeſte zum Plexus cardiacus, zum Plexus pulmonalis anterior hinab, Aeſte zur Speiſeröhre, zur Luftröhre; endlich wenn er zum Kehlkopfe kommt, zur Schilddrüſe, zum Constrictor infimus des Schlundes, zu dem M. cricoarytaenoideus posticus und lateralis und zu dem M. thyreoarytaenoideus, und verbindet ſich innerhalb des Schildknorpels mit einem Aſte des N. laryngeus superior [4]).

5) Nervi pulmonales. Nachdem der N. vagus ſo weit herabge-

---

[1] *Prochaska*, de structura nervorum. Tab. II. fig. 7. p. 114. *Reil*, de structura nervorum. Tab. I. fig. 2 — 4.

[2]) Schon dem Galenus war dieſer Nerv bekannt (de us. part. VII. 14.)

[3]) Auf der rechten Seite wurde einmal ein 2ter N. recurrens minor gefunden. Siehe *Wrisberg*, not. 82. ad Hall. pr. lin. phys. und obss. de nerv. visc. abd. §. 12.

[4]) Magendie (Phyſiologie, überſetzt von Heuſinger 1820. I. S. 206.) behauptet, die Musculi thyreoarytaenoidei erhielten nur vom Laryngeus inferior, und der M. arytaenoideus nur vom N. laryngeus superior Zweige, daher entſtände nach der Durchſchneidung dieſer Nerven Stimmloſigkeit, denn das Zuſammenwirken dieſer Muskeln iſt nach Magendie zur Hervorbringung der wahren Stimme unentbehrlich. Nach H. Cloquet, der in der neueſten Ausgabe ſeiner Anatomie die von Rudolphi (Grundriß der Phyſiol. II. S. 374) widerlegte Angabe der Vertheilung der Kehlkopfsnerven verlaſſen hat, erhält im Gegentheile ſowohl der Arytaenoideus, als der Thyreoarytaenoideus ſeine Nerven vom oberen N. laryngeus. Traité d'anat. descr. Paris 1822. 2. éd. Tom. II. p. 126. 129. Nach Rudolphi, Schlemm und ihm bekommt auch der M. cricothyreoideus Zweige vom N. laryngeus inferior. Zukünftige Unterſuchungen müſſen noch erſt lehren, ob die Natur bei der Vertheilung dieſer Nervenäſte vom oberen oder unteren Kehlkopfsnerven einer einfachen Regel folge. Beim Pferde erhält nach J. G. Theile (Diss. de musculis nervisque laryngeis. Jenae 1825. 4. Tab. III. fig. 2.) der Arytaenoideus ſowohl vom oberen als vom unteren Kehlkopfsnerven Aeſte.

Digitized by Google

kommen, lenkt er sich hinter dem Aste der A. pulmonalis und dem Bronchus schräg rückwärts hinab, und giebt die Nerven der Lunge seiner Seite, welche von allen Seiten mit den Aesten der A. pulmonalis (vorzüglich aber an der hinteren Seite, am wenigsten von vorn) in die Lungen eindringen, sich unter einander verbinden und den Plexus pulmonalis bilden.

Wrisberg sah einen Ast, der aus dem rechten N. vagus nach dem Abgange des N. recurrens entspringt, zwischen der A. anonyma und dem rechten Bronchus vorwärts durchging und sich in 2 Aestchen theilte, deren einer ein N. cardiacus wurde, der andere zur Lunge hinabging, und mit einem anderen Aste des N. vagus ein Ganglion pulmonare zusammensetzte, welches hinter der Endigung der V. azyga in die V. cava lag, und seine Fäden zur Lunge schickte [1]).

Aus diesen Plexubus, und von den einzelnen Lungenästen des N. vagus gehen Aestchen in die Substanz der Lunge, und vertheilen sich theils in den Luftröhrenzweigen, theils auch in den Aesten der A. pulmonalis und in denen der Vena pulmonalis.

6) Rami oesophagei. So kommen beide nervi vagi sich einander näher, indem sie im cavum mediastini posticum rückwärts einwärts zur Speiseröhre und an derselben hinabgehen. Der linke lenkt sich mehr vorwärts, der rechte mehr rückwärts. Sie theilen sich auf diesem Wege in Aeste, welche sich hier und da von beiden Seiten her mit einander verbinden und so die Plexus oesophageos ausmachen, deren Aestchen sich in der Wand der Speiseröhre verbreiten, theils auch zur Aorta gehen. Der Plexus anterior gehört mehr dem linken, der Posterior mehr dem rechten Nerven an.

7) Rami gastrici, hepatici, coeliaci etc. Endlich kommen beide nervi vagi, nämlich die Plexus oesophagei, mit der Speiseröhre durch das Foramen oesophageum des Zwerchfelles in die Bauchhöhle.

Der Plexus oesophageus anterior giebt einige Aeste rechts zum concaven Bogen des Magens, welche sich meist auf der vorderen Fläche desselben, bis zum Pylorus hin vertheilen, und sich auch mit den Leberästen der Ganglia coeliaca verbinden, und dann vorzüglich zu dem linken Lappen der Leber gehen. Einige Fäden dieses Plexus gehen auch zum Magen hin.

Der Plexus posterior umgiebt das Ostium oesophageum und theilt sich in viele Aeste, deren einige am concaven Bogen rechts zum Pylorus gehen, und sich vorwärts und rückwärts am Magen vertheilen; andere an der A. coronaria sinistra des Magens zur A. coeliaca hinaufgehen und sich mit den Gangliis coeliacis vermischen; andere endlich an der A. hepatica theils zum Pankreas, theils mit der A.

---

[1]) *Wrisberg*, not. 75. ad Hall. pr. lin.

Digitized by Google

gastro-epiploica zum unteren Theile des Magens, zum Zwölffingerdarme, zum rechten Lappen der Leber und zur Gallenblase kommen.

Nach Broughtons [1]) Versuchen soll der N. vagus, wenn er gestochen oder gekniffen wird, keinen Schmerz, der sich durch Zucken oder Auffahren zu erkennen gäbe, verursachen, sondern es soll auf eine solche Verletzung nur ein Keuchen wie beim gehemmten Athmen folgen. Dergleichen Versuche scheinen mir aber schwerlich sichere Resultate zu geben.

XI. Nervus accessorius, der Beinerv.

Der Beinerv, nervus accessorius Willisii [2]) entspringt vom oberen Theile des Rückenmarks an seiner Seite desselben, zwischen den vorderen und den hinteren Wurzeln bis zum 4ten, 5ten, 6ten, bisweilen bis zum 7ten Halsnerven hinab. In dem Zwischenraume zwischen je 2 Nerven erhält er immer einen vom hinteren Strange des Rückenmarks (d. h. von der hinteren Hälfte des Seitenstranges, nach Bellingeri) entspringenden Faden. Er liegt auch dem hinteren Strange des Rückenmarks näher als dem vorderen, denn er liegt zwischen dem Ligamentum denticulatum und den hinteren Wurzeln. Je weniger tief er am Rückenmarke hinabreicht, desto dicker sind die Fäden, die seine Wurzeln bilden. Sehr oft, jedoch nicht immer, vereinigt er sich mit der hinteren Wurzel des 1sten Halsnerven, und ist an dieser Stelle ein wenig dicker. (Siehe die Beschreibung des 1sten Halsnerven). Selten vereinigt er sich auch mit der des 2ten Halsnerven. Am verlängerten Marke erhält er etwa noch 4 längere Fasern, welche nicht einfach, sondern mit mehreren wiederholt getheilten Fäden entspringen. Diese Form kommt den vom Rückenmarke entspringenden Fäden nicht zu [3]).

An der Stelle, wo der Stimmnerv die harte Hirnhaut zu durchbohren im Begriff steht, gesellt er sich zu ihm, geht meistens eine Strecke zwischen den Blättern der harten Hirnhaut hin, ohne eine eigenthümliche Scheide von ihr zu bekommen, und wird dann im Foramen jugulare in die dem N. vagus gehörende Scheide mit aufgenommen, so daß er mit ihm fast einen Nerven ausmacht. In jedem Falle legt er sich wenigstens sehr dicht an den Vagus an, und ist von einer gemeinschaftli-

[1]) London medical and physical Journal, Jun. 1823.

[2]) *Willis* nervor. descr. cap. 23. p. 120.

[3]) Nach Rolando (Recherches anatomiques sur la moëlle allongée, Memorie della reale Acad. d. sc. di Torino. Tom. XXIX, besonderer Abdruck. S. 24.) entspringen diese zusammengesetzten Wurzeln von den hinteren Strängen des verlängerten Marks (corpora restiformia), die etwas tieferen einfachen aber von der hinteren Seite der vorderen Stränge. Ueberhaupt glaubt er mit Gewißheit behaupten zu können, daß wenigstens einige Wurzeln, sowohl von denen, die aus dem Rückenmarke kommen, als von denen, welche von der medulla oblongata entspringen, von den hinteren Strängen ihren Anfang nehmen. Bellingeri hatte behauptet, daß sie nur von den mittleren großen Seitensträngen des Rückenmarks ihren Anfang nähmen.

Digitized by Google

chen Hülle umgeben; nimmt jedoch an der Bildung des im Foramen jugulare liegenden Knotens des N. vagus keinen Antheil. Der N. accessorius geht folglich am Rückenmarke, zum großen Loche des Hinterkopfs hinauf, durch daſſelbe in die Hirnſchale, tritt an den Nervus vagus, und geht mit ihm zum Foramen jugulare wieder aus der Hirnſchale heraus. Er hat alſo einen ſehr ſonderbaren Gang, und iſt weder ganz als Nervus encephali, noch ganz als Nervus spinalis anzuſehen [1]).

Beim Ausgange aus dem Foramen jugulare ſpaltet er ſich in einen kleineren inneren, und in einen größeren äußeren Aſt.

1) Der innere Aſt, ramus internus, giebt ſelbſt wieder einen oder 2 Zweige, welche über den N. vagus vorwärts gehen, ſich mit einander vereinigen und mit einem Aſte des N. vagus zum Ramus pharyngeus kommen, und einen anderen Aſt, der an der hinteren Seite des N. vagus zu dem unteren Knoten deſſelben hinab geht, und ſich daſelbſt in mehrere Fäden theilt, die ſich mit dem N. vagus vermiſchen. Die Aeſte des N. vagus ſind daher zum Theil von dieſem N. accessorius herzuleiten.

2) Der dickere äußere Aſt, ramus externus, deſſelben geht hinter und an dem Ramus cerebralis der Vena jugularis interna und hinter dem N. hypoglossus, mit ihm eine kurze Strecke hindurch durch Zellgewebe verbunden, hinab, dann ſchräg rückwärts abwärts zu dem M. sternocleidomastoideus, den er entweder durchbohrt, oder an deſſen inneren Seite er nach hinten geht. Er giebt demſelben Aeſte, die mit den Aeſten des 3ten Halsnerven Gemeinſchaft haben, wird durch einen Zweig, der von dem 3ten Halsnerven und von dem 2ten Halsnerven, oder von dem beide Halsnerven verbindenden Bogen kommt, verſtärkt, gelangt zur inneren Fläche des M. cucullaris, in welchem er ſich zertheilt, und ſich zuweilen mit einem vom 4ten und 5ten Halsner-

---

[1]) Hauſe beſchreibt ihn daher mit Recht unter den gemiſchten Nerven (nervor. anat. Sect. IV. p. 115.), welche Wrisberg unterſcheidet. (Not. 99. ad Hall. pr. lin.) Hildebrandt beſchrieb ihn hier wegen ſeiner genauen Verbindung mit dem N. vagus; auch weil er gemeiniglich als ein Theil des 8ten Nerven beſchrieben wurde.

Scarpa und Arnold nehmen an, daß er ſich zum N. vagus ſo verhalte, wie die kleine Portion des N. trigeminus zur großen, und wie die vordere Wurzel jedes Rückenmarksnerven zur hinteren. Sie glauben daher, daß er nur ein Bewegungsnerv, der N. vagus aber ein Empfindungsnerv ſei. Ob mit dieſer Anſicht nicht die Verbindung, die der N. accessorius Willisii ſo häufig mit dem Ganglion spinale des erſten Rückenmarksnerven eingeht, und die Behauptung Rolando's, daß er zuverläſſig auch Fäden von den hinteren Rückenmarkbündeln erhalte, im Widerſpruche ſtehen, müſſen ſpätere Unterſuchungen lehren. Ueber dieſen Nerven ſehe man vorzüglich nach:

Joh. Friedr. Lobstein de nervo spinali ad par vagum accessorio. Argent. 1760. 4. und

Anton Scarpa de nervo spinali ad octavum accessorium. In actis med. chir. Vindob. I. Tab. X.

Digitized by Google

ven kommenden Faden vereinigt. Dieser Nerv dient also zur Bewegung des M. cucullaris, des M. sternocleidomastoideus, und zur Verstärkung des N. vagus. Warum er einen so sonderbaren Gang habe, ist nicht bekannt. Er ist der einzige Gehirnnerv, welcher zu Muskeln des Rumpfes geht, die sonst nur vom Rückenmarke ihre Nerven erhalten. Nach den Versuchen von Ch. Bell [1]) werden, wenn man den N. accessorius bei Thieren durchschneidet, diejenigen Bewegungen der genannten Muskeln unterbrochen, welche beim Athmen mitwirken. Nach Bellingeri [2]) bringt er die mimischen Bewegungen hervor, durch welche man Geduld und Unterwürfigkeit zeigt, indem man den Kopf nach hinten, die Schultern aber in die Höhe zieht. Der vordere mit dem Knoten des N. vagus verbundene Ast hat nach ihm vielleicht unwillkührliche Verrichtungen, nach Scarpa's und Arnolds Vermuthung dient er zur Hervorbringung der Bewegung und trägt zur Bildung derjenigen Nervenäste bei, die der N. vagus zu den Muskeln des Pharynx und Larynx schickt.

XII. Nervus hypoglossus, der Zungenfleischnerv.

Der Zungenfleischnerv, oder das zwölfte Paar, nervus hypoglossus s. loquens, [3]) entspringt mit verschiedenen von einander entfernten Wurzeln vom vorderen Theile seiner Hälfte des verlängerten Markes, theils höher, aus der Furche zwischen dem Corpus pyramidale und dem Corpus olivare, theils tiefer, und sogar noch unweit des Hinterhauptlochs. Die einander nahen Wurzeln verbinden sich in Bündelchen, diese Bündelchen ferner in noch größere Bündel, und diese convergirend in einen Nervenstamm, der bisweilen bei seinem Ausgange aus dem Schädel in 2 bis 3 Bündel getheilt ist, und dann also durch 2 oder 3 Löcher der harten Hirnhaut geht.

Die Bündelchen dieses Nerven gehen vor der A. vertebralis zum Foramen condyloideum anterius nach außen, oder umfassen sie auch zum Theil schlingenartig. Nach seinem Ausgange krümmt er sich abwärts, lenkt sich um den N. vagus an der äußeren Seite, zwischen ihm und dem N. accessorius, vorwärts hinab, geht an der äußeren Seite der Carotis cerebralis und der Carotis facialis vorbei, und liegt sowohl hinten, als vorn an der inneren Seite des hinteren Bauchs des M. digastricus, bildet einen nach unten gekehrten Bogen, kommt so zur äußeren Fläche des M. hyoglossus, und dringt am M. genioglossus in das Fleisch der Zunge ein.

Da, wo er am N. vagus vorbeigeht, wird er eine kleine Strecke hindurch durch Zellgewebe mit ihm sehr genau verbunden; auch steht er durch einen oder durch einige Fäden mit dem Knoten und mit dem

[1]) Ch. Bell. Siehe *Magendie* Journal de Physiologie. p. T. 1. p. 189.

[2]) *C. F. Bellingeri*, De medulla spinali nervisque ex ea prodeuntibus. Augustae Taurinorum. 1825. 4. p. 116.

[3]) Ehemals wurde er nervus nonus genannt. Haller gab ihm den Namen lingualis medius. Die schicklichen Namen Zungenfleischnerv und loquens rühren von Sömmerring her.

Digitized by Google

Stamme des N. vagus, und mittelſt dieſes Knotens, auch mit dem N. accessorius, mit dem hinteren Aſte des 1ſten Halsnerven und mit dem Ganglion cervicale supremum des ſympathiſchen Nerven in Verbindung.

Nachdem er vom N. vagus vorwärts abgewichen, giebt er am Anfange des Bogens, den er nun bildet, den **abſteigenden Aſt**, Ramus descendens n. hypoglossi s. N. descendens colli internus, der bisweilen aus 2 mit einander ſich vereinigenden Fäden zuſammengeſetzt wird.

Dieſer Nerv geht zuweilen aus dem Knoten des N. vagus hervor, oder nimmt auch in manchen Fällen aus dem Stamme des N. vagus, oder aus deſſen Knoten, oder vom N. sympathicus, oder endlich vom 1ſten Halsnerven einen Faden, oder 2 Fäden auf, und giebt dem Omohyoideus, dem Sternohyoideus und dem Sternothyreoideus Zweige, und bisweilen auch einen Aſt zu dem an der A. subclavia befindlichen Geflechte des N. sympathicus.

Indem er über dem M. mylohyoideus am Hyoglossus hingeht, liegt er weiter nach innen, als der Ramus lingualis vom fünften Nervenpaare, hat mit demſelben durch Aeſtchen Gemeinſchaft, giebt Aeſte dem M. mylohyoideus, dem Geniohyoideus, dem Styloglossus, und vertheilt ſich endlich im Genioglossus.

Dieſer Nerve verſorgt alſo das **Fleiſch der Zunge**, und die den Kehlkopf und das Zungenbein von der Stelle bewegenden Muskeln, und dient mithin unter andern beim Sprechen.

Beſchreibung der Rückenmarksnerven.

Der Rückenmarksnerven ſind **dreißig** bis ein und dreißig Paare, nämlich:

1) **Acht Halsnerven** (nervi cervicales).
2) **Zwölf Rückennerven** oder **Rippennerven** (nervi dorsales s. intercostales).
3) **Fünf** (oder ſechs) **Lendennerven** oder **Bauchnerven** (nervi lumbares).
4) **Fünf** oder **ſechs Kreuzbeinnerven** (nervi sacrales).

Die Nervi lumbares und die oberſten Nervi sacrales ſind die dickſten; dann folgen die Cervicales. Die mittleren Nervi dorsales dagegen ſind die dünnſten. Will man bei dieſer Vergleichung noch mehr ins

Digitized by Google

Einzelne eingehen, so muß man die Nerven in folgender Ordnung zusammenstellen: Die dicksten Rückenmarksnerven sind die beiden untersten Nervi lumbares und der oberste Nervus sacralis, dann folgen der 3te, 2te und 1ste Nervus lumbaris, dann der 2te und 3te sacralis; hierauf die 4 unteren Nervi cervicales, der 1ste dorsalis, dann der 4te, der 3te und 2te cervicalis, dann die übrigen dorsales und endlich der oberste cervicalis, und die 2 untersten sacrales. Diese letzteren sind die dünnsten.

Der Stamm, der durch die Vereinigung der vorderen und der hinteren Wurzeln jedes Rückenmarksnerven an dem vorderen Ende jedes Ganglion spinale entsteht, (Siehe S 378.) ist dicker als die Wurzeln vor der Bildung des Ganglion spinale waren, und theilt sich jeder Zeit in einen hinteren Zweig, der hinter der Wirbelsäule, meistentheils zu den zwischen den Processibus spinosis und transversis gelegenen Muskeln und zur Haut geht, und in einen vorderen Zweig, der, mit Ausnahme der 2 ersten Rückenmarksnerven, der größere ist, und immer einen Ast zu dem sympathischen Nerven schickt. Sowohl dieser Ast als die übrigen Aeste bekommen nach Scarpa [1]) und Wutzer aus beiden Wurzeln der Rückenmarksnerven Fäden. Die benachbarten vorderen Aeste der Hals-, Lenden- und Kreuzbeinnerven vereinigen sich fast immer durch gewisse Zweige gegenseitig zu Bogen oder zu Zweigen, die sich oft von neuem theilen und vereinigen. Hierdurch entstehen Schlingen und Geflechte, aus welchen Nerven, die einen bestimmten Namen erhalten, ihren Anfang nehmen. Das Geflecht, welches die 4 obersten Halsnerven hierdurch bilden, heißt plexus cervicalis; das, welches die 4 unteren Halsnerven und der 1ste Rückennerv bilden, heißt plexus brachialis, weil aus ihm die Nerven des Arms entspringen; das Geflecht, welches die 5 Lendennerven und die 6 Kreuznerven bilden, heißt plexus lumbalis und sacralis. Bei den Rückennerven fehlt diese Vereinigung meistentheils, und an den hinteren Aesten der Hals-, Lenden- und Kreuzbeinnerven findet sie nur auf eine unbeständige Weise Statt.

Nervi cervicales, die Halsnerven.

Es giebt 8 Halsnervenpaare. Das erste geht zwischen dem Hinterhauptbeine und dem Atlas heraus; die folgenden 7 zwischen den Halswirbeln, also das 2te zwischen dem 1sten und 2ten, u. s. w., das 8te zwischen dem 7ten Halswirbel und dem 1sten Rückenwirbel.

[1]) *Scarpa*, Anatomicarum annotationum, Lib. I. p. 23.
Neuerlich glaubt aber Scarpa beobachtet zu haben, daß die Fäden, welche von den Rückenmarksnerven zum dem N. sympathicus gehen, nur von der hinteren Wurzel entspringen. (De Gangliis nervorum, deque origine et essentia Nervi intercostalis. Milano 1831. p. 11.)

Digitized by Google

Die vier oberen Halsnerven zusammengenommen betrachtet.

Zwischen den Fäden, aus welchen die Wurzeln der 4 oberen Halsnerven bestehen, kommen häufiger Verbindungen vor, als zwischen den der 4 unteren Halsnerven.

Vordere Aeste.

Die vorderen Aeste der 4 oberen Halsnerven sind viel dünner als die der 4 unteren, und die anastomosirenden Zweige, durch welche sie unter einander in Verbindung stehen, bilden Bogen. Zwischen den vorderen Aesten des 2ten und 3ten, des 3ten und 4ten, und endlich des 4ten und 5ten Halsnerven giebt es außer den erwähnten anastomosirenden Zweigen zuweilen noch kleinere, weniger constante Verbindungsfäden.

Verbindungsfäden, die zu dem N. sympathicus gehen.

Aus den bogenförmigen Verbindungsästen, oder auch zuweilen unmittelbar aus den vorderen Aesten entspringen Nervenfäden, welche in die am Halse gelegenen Knoten des sympathischen Nerven übergehen. Die von den 2 oder 3 obersten Verbindungsbogen gehen meistens in das Ganglion cervicale supremum, die vom 4ten kommen meistens zum Ganglion cervicale medium, wenn es überhaupt vorhanden ist. Zuweilen jedoch geht nach Bock ein solcher Verbindungsfaden vom 4ten Verbindungsbogen, auf einem ziemlich verborgenen Wege, durch den Canalis vertebralis, längs der A. vertebralis zum Ganglion cervicale infimum.

Verbindungsfäden, die zu Gehirnnerven gehen.

Es gehen auch einige Verbindungsfäden von den vorderen Aesten der 2 bis 3 obersten Halsnerven oder von ihren Verbindungsbogen zu dem Ramus descendens des N. hypoglossus, ferner von dem obersten Verbindungsbogen zwischen dem 1sten und 2ten Halsnerven zu dem N. vagus oder auch zuweilen zum Stamme des Hypoglossus, und endlich von dem 2ten Verbindungsbogen ein oder mehrere Aeste zu dem N. accessorius Willisii.

Hautnerven.

Außerdem entspringen von den vorderen Aesten des 2ten, des 3ten und des 4ten Halsnerven Hautnerven: namentlich vom 2ten Verbindungsbogen, oder vom 3ten Halsnerven allein, der hinter dem Ohre am Hinterhaupte emporsteigende, zum Theil auch dem Ohre angehörende N. occipitalis minor, der kleine Hinterhauptnerv, zuweilen von eben daher noch ein 2ter sich gleichfalls am Hinterhaupte und am Nacken verbreitender Hautnerv, ferner vom 3ten Verbindungsbogen,

Digitized by Google

oder vom 3ten Halsnerven allein, der zum Ohre gehende N. auricularis magnus, der große Ohrnerv, dann der ebenda entspringende N. subcutaneus colli, der Hautnerv des Halses, der mit einem Zweige zum mittleren Theile des Halses mit einem 2ten Zweige zur Gegend der unteren Kinnlade geht, und sich um den äußeren Rand des M. sternocleidomastoideus herum beugt. Zuweilen entsteht auch vom 4ten Halsnerven ein veränderlicher, mit den vorigen beiden verbundener Hautnerv für den Hals. Endlich geht von dem 4ten Halsnerven oder von dem zu dem 5ten Halsnerven gehenden Verbindungsbogen ein vorderer, ein mittlerer und ein hinterer Oberschlüsselbeinnerv oder Supraclavicularnerv, N. supraclavicularis, ab. Die vorderen von diesen Nerven gehen über das Schlüsselbein, der hintere geht über das Schulterblatt zur Haut der Brust und der Schulter. Zuweilen sind 4 solche Nerven da. Zuweilen entspringen alle diese 3 Nerven aus einem, öfter jedoch aus mehreren Stämmchen [1]).

Uebersicht über die Muskeln, welche von den vier oberen Halsnerven Zweige bekommen.

Hierher gehören erstlich: die Seitenmuskeln, nämlich die M. intertransversales colli, der Obliquus capitis inferior, der Scalenus medius, und der Levator anguli scapulae [2]). Ferner die vorderen Muskeln, nämlich der M. rectus capitis anticus minor und major, und der Longus colli. Außer ihnen erhalten die zwischen dem Zungenbeine und der Brust gelegenen Muskeln, welche vom Ramus descendens N. hypoglossi Fäden empfangen, mittelbar Zweige von den Halsnerven, denn der N. hypoglossus nimmt, wie wir gesehen haben, Verbindungsfäden von mehreren oberen Halsnerven auf. Endlich erhält auch das Zwerchfell vom 4ten und 5ten Verbindungsbogen Nervenfäden. Die Hauptwurzel des Zwerchfellnervens, N. phrenicus, entspringt vom 4ten Halsnerven [3]).

---

[1]) Bock fand einmal, daß einer dieser Nerven das Schlüsselbein durchbohrte und dann zur Haut der Brust ging. (Die Rückenmarksnerven S. 39.)

[2]) Nach Bock bekommen auch der M. occipitalis, der Attollens auris, die Retrahentes, der Tragicus und Antitragicus Nerven vom N. occipitalis minor und vom N. auricularis magnus, und nach eben demselben empfängt der M. platysma myoides Nerven vom N. subcutaneus colli. Dagegen erhält nach ihm der Sternocleidomastoideus von diesen Nerven keine Zweige.

[3]) Nach Chr. Jac. Baur in seiner trefflichen Schrift (Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani. Tubingae 1818. 4. p. 14.) schickt der 4te Halsnerv auch Aeste zu den M. subclavius und omohyoideus und außerdem kleine Zweige zu den die A. subclavia umgebenden Nervengeflechten. Von diesen letztern sagt er: „Sed et subtiliora filamenta arteriam subclaviam adeunt, ubi cum filis nervi sympathici, qui a ganglio cervicali infimo aut thoracico primo proficisci solent, conjunguntur, nec non cum ramulis noviter accedentibus nervorum cervicalium inferiorum, haud raro etiam cum filamento rami descendentis nervi hypoglossi.... In hac arteria plexus itaque formatur, e quo filamenta tanquam radices profundiores nervi phrenici saepissime exeunt, nec non ramuli in arteria subclavia tam ad cor, quam ad brachium proficiscuntur, et porro cum ramis arteriae subclaviae divagantur, nominatim cum A. thyreoidea inferiore et mammaria interna. Hi nervuli hac in arteria versus interiora ac deorsum deducuntur in cavum pectoris cum ramis, qui a nervis dorsalibus ac-

Digitized by Google

Hintere Aeste.

Die hinteren Aeste der 3 oberen Halsnerven sind durch Verbindungsfäden vereinigt. Ein wichtiger, von ihnen entspringender Hautnerv ist der am Hinterhaupte zunächst der Mittellinie desselben verbreitete, vom 2ten Halsnerven entspringende **große Hinterhauptnerv**, N. occipitalis magnus, ferner ein vom 3ten Halsnerven kommender kleiner an der hinteren Seite des Halses emporsteigender Hautnerv, der die Nackenmuskeln durchbohrt, zuweilen kommt noch ein kleinerer mehr querlaufender Hautnerv vom 4ten Halsnerven, der hinten an der Mitte des Halses liegt.

Zu bemerken ist übrigens, daß die größeren Hautnerven wie der Occipitalis magnus, minor und der Auricularis magnus zuweilen aus Bündeln, die von mehreren Halsnerven kommen, ihren Anfang nehmen, und daß jeder von ihnen auch meistentheils einige Muskelzweige abgiebt.

Uebersicht über die Muskeln, welche von den hinteren Aesten der vier oberen Halsnerven Zweige bekommen.

Solche Zweige bekommen der Rectus capitis posticus minor und major, der Obliquus superior und inferior, der Multifidus spinae, die Intertransversales, zuweilen auch der Rectus capitis lateralis, ferner der Transversalis cervicis, Trachelomastoideus, Splenius capitis, Semispinalis colli und der Cucullaris (vom 3ten Halsnerven).

Die vier obersten Halsnerven im Einzelnen.

Nervus cervicalis primus.

Der **erste Halsnerve** [1]) ist mit den 2 untersten Kreuzbeinnerven der dünnste unter allen Rückenmarksnerven. Dieser Nerv entspringt zuweilen nur mit einer Wurzel, und ist dadurch den Gehirnnerven ähnlich. Diese kommt wie die des N. hypoglossus vom vorderen Bündel des Rückenmarkes. Immer ist die vordere Wurzel dicker als die hintere. Sehr oft ist die hintere Wurzel durch einen Nervenfaden mit dem Accessorius Willisii verbunden, zuweilen geht sie ganz und gar in ihn über, zuweilen hängt sie nur mit demselben zusammen. An dieser Stelle des Zusammenhanges bildet sie zuweilen ein Geflecht [2]). Er geht durch

---

cedunt, junguntur, comitantque arteriam thymicam ortam a mammaria interna in cavum mediastini anticum, ubi vero ulterior disquisitio adipis copia impeditur.“

Auch Sömmerring und Peipers sahen Aeste des 4ten Cervicalnerven zu der Arteria subclavia gehen (Sömmerring in seiner Schrift vom Baue des menschlichen Körpers. Th. 5. S. 270. und Peipers in *Ludwig* scriptores neurol. minsel. T. IV. p. 44.)

[1]) Winslow nennt ihn infra-occipitalis. (Expos. anat. III. Nerves. n. 154.)

[2]) *Morgagni*, Epist. anat. XVI. 8. Ferner auch *Vicq d'Azyr*, Mém. de l'ac. de Paris 1781. p. 596. Siehe J. F. Meckel. Handb. d. menschl. Anat. III. 664.

die Lücke zwischen dem Atlas und dem Hinterhauptbeine unter der A. vertebralis (bisweilen auch über ihr) heraus, giebt vielleicht dieser einige Aestchen [1]), und theilt sich in 2 Zweige.

1) Der vordere Ast ist dünner, geht an der inneren Seite der A. vertebralis über dem Querfortsatze vorwärts, giebt kleine Aeste zum M. rectus lateralis und zum Rectus anticus minor und major, geht dann vor dem Querfortsatze abwärts, und vereinigt sich mit dem vorderen Aste des 2ten Halsnerven in einem Bogen. Aus diesem Bogen gehen ein Ast zum N. vagus, ein Ast oder 2 Aeste zum Nervus hypoglossus, und ein Ast oder 2 Aeste zum Ganglion cervicale supremum; bisweilen geht auch ein Ast zum Ramus descendens des N. hypoglossus, oder es fehlen auch die Verbindungszweige, die unmittelbar zum N. hypoglossus gehen, ganz, wo dann diese Verbindung mittelbar durch den zum N. vagus gehenden Zweig bewirkt wird. Winslow und Sabatier [2]) beschrieben auch einen Nervenzweig des 1sten Halsnerven, welcher sich in den Wirbelcanal zu der A. vertebralis begiebt und sich mit einem Aste des 2ten Halsnerven verbindet [3]). Nach J. F. Meckel d. j. dringt ein kleiner Zweig in den Processus mastoideus.

2) Der hintere Ast geht aufwärts rückwärts in den dreieckigen Raum zwischen den beiden M. M. obliquis und dem M. rectus posticus major, giebt einen hinabgehenden Ast, der den M. obliquus inferior durchbohrt, und mit dem hinteren Aste des 2ten Halsnerven sich vereinigt; einen, der sich im M. rectus posticus major und minor vertheilt; einen zum M. complexus; und einen zum M. obliquus superior.

Der erste Halsnerv zeichnet sich dadurch aus, daß sein vorderer Ast kleiner ist als sein hinterer, daß er zuweilen nur eine vordere Wurzel hat, und endlich, daß er keinen einzigen Ast zur Haut schickt.

Nervus cervicalis secundus.

1) Der vordere Ast geht unter dem unteren schiefen Kopfmuskel vorwärts, und vereinigt sich, wie schon gesagt, durch einen Zweig mit dem vorderen Aste des ersten Halsnerven, und durch einen 2ten abwärtssteigenden Zweig mit dem des 3ten Halsnerven in einem Bogen. Die Nerven, welche aus dem ersteren Bogen entspringen, sind schon erwähnt worden; aus dem 2ten Bogen entspringt oft ein Faden, der sich zum Ramus descendens des Hypoglossus begiebt, ferner kommen aus ihm meistens einige Fäden, die sich mit dem Accessorius Willisi vereinigen. Auch communiciren die vorderen Aeste des 2ten und 3ten Halsnerven, oft auch noch mehrere kleinere Zweige, und bisweilen geht von ihnen ein Faden zum Ganglion cervicale supremum des sympathischen Nerven.

2) Der hintere Ast, welcher gegen die Regel dicker ist, als der vordere, giebt einen Ast aufwärts, der mit dem hinteren Aste des ersten Halsnerven zusammenkommt, und schickt dann einen Zweig abwärts, der sich mit dem hinteren Aste des dritten Halsnerven vereinigt. Hierauf giebt er einige Zweige zu den Nackenmuskeln, geht an der auswendigen Seite des M. obliquus inferior und des M. rectus posticus major, an der inwendigen Seite des M. complexus hinauf, giebt Aeste bisweilen dem M. multifidus, ferner dem Biventer, Complexus und dem Splenius, verbindet sich mit dem Beinerven, durchbohrt den M. biventer und cucullaris, und heißt nun Nervus occipitalis major. Er geht hierauf hinter dem Ramus occipitalis des 3ten Halsnerven am Hinterkopfe bis zum Scheitel hinauf, und theilt sich erst in 2, und dann in viele Aeste, welche mit den Aesten des ebengenannten Ramus occipitalis vom 3ten Halsnerven Gemeinschaft haben. Eine Verbindung desselben mit dem Facialis supraorbitalis und Temporalis superficialis konnte Bock nicht darstellen [4]).

---

[1]) *Wrisberg*, de nervis arterias venasque comitantib. §. 30. In syll. p. 66. Diese Fäden hat Wrisberg bis auf die Basilararterie verfolgt. Bock konnte sie nicht finden, sahe aber Fäden zu dem Halsgeflechte gehen. *Bock*, die Rückenmarksnerven etc. Leipzig 1827. 8. S. 20.

[2]) *Sabatier*, sur les nerfs de la dixième paire; in Mém. prés. à l'ac. des sc. de Paris. T. VII. abgedruckt in dessen Traité d'anat. T. III.

[3]) Handbuch der menschl. Anat. III. 667.

[4]) Sömmerring führt den *Murray* Diss. de sensibilitate ossium morbosa an, nach

Nervus cervicalis tertius.

1) Der vordere Ast giebt einen Ast zum N. sympathicus; einen Verbindungszweig an der V. jugularis interna hinab, welcher mit dem Ramus descendens des N. hypoglossus zusammenkommt; einen Verbindungszweig rückwärts hinab, der sich mit einem Aste vom hinteren Aste des 4ten Halsnerven verbindet, und Aeste dem M. splenius, complexus, levator anguli scapulae schickt. Hierauf vereinigt sich der vordere Ast mit einem herabgehenden Aste vom vorderen Aste des 2ten Halsnerven und mit dem N. accessorius Willisii, und giebt endlich den Nervus occipitalis minor. Dieser erhält vom hinteren Aste des 2ten Halsnerven einen herabkommenden Ast, schickt zuweilen selbst einen Ast zum N. accessorius, geht hinter dem M. splenius fort, durchbohrt ihn und den M. cucullaris, giebt beiden Aeste, steigt zum Seitentheile des Hinterkopfs, hinter dem äußern Ohre und vor dem N. occipitalis major hinauf, und vertheilt sich daselbst, in Gemeinschaft mit diesem und dem Auricularis. Bisweilen verbindet er sich mit dem N. occipitalis magnus.

Wenn der vordere Ast des 3ten Halsnerven diesen Ramus occipitalis abgegeben hat, so giebt er einen absteigenden Ast, der sich mit dem vorderen Aste des 4ten vereiniget, krümmt sich hierauf zur inwendigen Fläche des M. sternocleidomastoideus, und theilt sich in 2 Aeste. Nämlich

a. in den Nervus auricularis magnus. Er geht um den äußern Rand des M. sternocleidomastoideus herum, tritt auf dessen äußere Fläche, und dann zum Ohre schräg vorwärts hinauf, wo er sich in 2 Aeste theilt. Der vordere geht gegen den vorderen Rand des M. sternocleidomastoideus, giebt ein Fädchen zum folgenden Ramus subcutaneus colli, und vertheilt sich am äußern Ohre in Gemeinschaft mit dem N. facialis. Der hintere geht gegen den hinteren Rand des M. sternocleidomastoideus hinauf, zu den M. M. retrahentibus des Ohrs.

b. Ramus subcutaneus colli. Er geht auch, weiter unten liegend, als jener, um den äußern Rand des M. sternocleidomastoideus herum, tritt auf dessen äußere Fläche, und theilt sich in einen oberen Ast, welcher sich mit den ihm entgegenkommenden Ramis subcutaneis und massetericis des N. facialis vereinigt, und sich auch am obersten Theile des Halses, und an der unteren Kinnbacke vertheilt, und in einen unteren Ast, der sich abwärts an der Seite des Halses bis gegen die Mitte hin verbreitet.

2) Der hintere Ast hat Gemeinschaft mit dem Nervus occipitalis major und mit dem hinteren Aste des 2ten Halsnerven, giebt Aeste dem M. complexus splenius, multifidus, dem Cucullaris und anderen Muskeln des Nackens, schickt auch einen Zweig zur Haut am oberen Theile des Halses.

Nervus cervicalis quartus.

Der vierte Halsnerv giebt oft einen in den Vertebralcanal gehenden und von da zum unteren Halsknoten des sympathischen Nerven gehenden Zweig, und theilt sich dann in den vorderen und in den hinteren Ast.

1) Der vordere Ast nimmt einen vom vorderen Aste des 3ten Halsnerven zu ihm herabkommenden Ast auf, und giebt dann die Hauptwurzel des Nervus phrenicus, welche oft aus dem 4ten Nervenbogen hervorkommt.

Außerdem ist der vordere Ast durch 1 oder 2 Fäden mit dem Stamme, oder mit dem obersten, oder mit dem mittleren Halsknoten des sympathischen Nerven verbunden. Zuweilen durchbohrt ein solcher Verbindungszweig den M. longus colli. Der Nerv verbindet sich nun oft durch einen Faden mit dem 5ten Halsnerven, und giebt 2 bis 4 Oberschlüsselbeinnerven, Nervi supraclaviculares, welche über dem inneren, mittleren und äußeren Theile des Schlüsselbeins zur Haut der Brust, der Achsel und des Rückens hinabgehen.

2) Der hintere Ast giebt einen Ast rückwärts, der sich mit einem auch hinabgehenden Zweige des vorderen Astes des 3ten Halsnerven vereinigt, und vertheilt sich im M. multifidus, und in den benachbarten Nackenmuskeln.

---

welchem sich auch Fäden dieses Nerven bis in die Substanz des Hinterhauptbeins auf der Protuberantia begeben sollen. Bock konnte sie gleichfalls nicht finden.

Digitized by Google

Die vier unteren Halsnerven zusammengenommen betrachtet.

Der oberste von ihnen hängt nicht immer durch einen Communicationszweig mit dem vierten Halsnerven zusammen. Auch communiciren die vier unteren Halsnerven nicht durch bogenförmig sich vereinigende Nervenfäden, sondern indem die Nervenfäden benachbarter Nerven unter einem spitzen Winkel zusammenkommen und sich zu größeren Stämmen verbinden. Ehe sie sich in einen hinteren und in einen vorderen Ast theilen, geben sie oft einen oder 2 Nervenfäden zu dem untersten Halsknoten oder zu dem obersten Rückenknoten des sympathischen Nerven ab, welche durch den Canalis vertebralis hinabsteigen.

Vordere Aeste.

Sie sind ausgezeichnet dick, und helfen vorzüglich die Armnerven bilden. Sie treten zwischen den Musculis intertransversalibus colli und zwischen dem Scalenus anterior und medius hervor.

Mehrere von ihnen geben Fäden für den mit vielen Wurzeln entspringenden N. phrenicus, den Zwerchfellnerven, ab, ferner einen Verbindungszweig zum mittleren oder unteren Halsknoten des sympathischen Nerven.

Der 5te und 6te, zuweilen auch der 7te Halsnerv giebt einen Faden zu einem mit mehreren Wurzeln entspringenden und also zusammengesetzten Muskelnerven zu dem N. thoracicus posterior. Außerdem schickt der 5te Halsnerv noch einen Muskelnerven, den N. dorsalis scapulae. Beide Nerven betrachtet C. Bell als einen hinteren Athmungsnerven. Von diesen größeren Muskelnerven soll, wenn die hinteren Aeste der 4 unteren Halsnerven beschrieben worden sind, die Rede sein.

Hintere Aeste.

Die hinteren Aeste aller 4 unteren Halsnerven schicken zu den hinteren Nackenmuskeln Zweige, und der des 7ten und 8ten Halsnerven giebt einen Zweig zur Haut des Nackens und der Schulter ab.

Uebersicht über die Muskeln, welche von den vorderen Aesten der vier unteren Halsnerven Zweige bekommen.

Sie gehen theils zu Muskeln, welche hinten und an der Seite gelegen sind, namentlich zu den Musculis intertransversalibus anterioribus, zu dem M. serratus anticus major, levator scapulae, rhomboideus major und minor, scalenus posterior medius und anterior, theils zu vorderen Muskeln des Halses, namentlich zu dem M. longus colli, rectus capitis anticus major und minor, und zum Zwerchfelle.

Digitized by Google

Ueberſicht über die Muskeln, welche von den hinteren Aeſten der vier unteren Halsnerven Zweige bekommen.

Solche Zweige bekommen die Musculi interspinales, der M. multifidus spinae, der semispinalis, die Musculi intertransversales posteriores, der M. transversalis cervicis, der M. splenius capitis und colli, der M. biventer cervicis, der M. complexus, cervicalis descendens, trachelomastoideus und cervicalis.

Nervus phrenicus.

Der Zwerchfellnerv, nervus phrenicus, oder diaphragmaticus, entſpringt beſtändig vom vorderen Aſte des 4ten Halsnerven, erhält aber auch oft vom 3ten Halsnerven meiſtens auch vom 5ten oder vom 6ten und 7ten Halsnerven, bisweilen endlich von den beiden oberſten Nerven des Plexus brachialis Fäden. Die oberſte Wurzel deſſelben geht nicht ſelten von dem zwiſchen dem 3ten und 4ten Halsnerven befindlichen Verbindungsbogen aus.

Mit dem Ganglion cervicale medium und infimum ſteht er nach Bock unmittelbar in Verbindung, weil er oft mit den Fäden verbunden iſt, welche von den Halsnerven zu dem N. sympathicus gehen. Niemals ſah ihn Bock mit dem N. hypoglossus mit dem N. vagus und mit dem 2ten Halsnerven verbunden, und eben ſo wenig fand er Zweige, welche der Nerv an den M. rectus anticus major, scalenus, an die Thymusdrüſe, an die obere Hohlvene, oder endlich an den Herzbeutel gegeben hätte.

Indeſſen haben Haller, Wrisberg, Ephr. Krüger [1]) und Chr. Jac. Baur eine Verbindung des N. phrenicus mit dem Ganglion cervicale infimum oder mit dem thoracicum primum zuweilen geſehen. Haller und Wrisberg ſahen auch zuweilen eine Verbindung des N. phrenicus mit dem Ramus descendens des N. hypoglossus. Chr. Jac. Baur [2]) endlich behauptet nach eigenen Beobachtungen, daß der N. phrenicus dem Herzbeutel, da wo er mit ihm durch lockeres Zellgewebe verbunden iſt, mehrere Aeſte zu geben pflege. Dieſes ſei öfters auf der rechten als auf der linken Seite der Fall. Daſſelbe ſagte ſchon vor ihm G. Coopmann [3]). Wrisberg [4]) dagegen konnte niemals ſolche Aeſte finden.

Der Nervus phrenicus geht von ſeinem Urſprunge an dem äußeren Rande des M. rectus anticus major vor dem obern Ende des M. scalenus anticus, vor dem Plexus brachialis, dann vor der A. subclavia, hinter der V. subclavia, ſchräg einwärts abwärts in die Bruſt, ferner vor den Vasis pulmonalibus, zwiſchen dem Herzbeutel und der Bruſthaut zur obern Fläche des Zwerchfells hinab.

Der rechte Zwerchfellnerv liegt während ſeines Durchgangs durch die Bruſt weiter vorn, als der linke, und geht an der rechten Seite der Vena cava superior vorbei.

---

[1]) *Haller*, Elem. phys. III. p. 89. — *Wrisberg*, de nervis viscerum abdominalium. Sect. I. §. 7. (fand dieſe Verbindung mit dem N. hypoglossus in 37 Fällen 5 mal). — *Ephr. Krüger*, De nervo phrenico. Lipsiae 1759. §. 10.

[2]) *Chr. Jac. Baur*, Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani thoracis praesertim abdominisque. Tubingae 1818. 4. p. 18.

[3]) *G. Coopmann*, Neurologia p. 419.

[4]) *Wrisberg*, a. a. O. Sect. I.

Digitized by Google

Auf der obern Fläche des Zwerchfells theilt er sich in mehrere Aeste, welche, nach Bock nicht durch Querfäden mit einander verbunden, sich in kleinere Aeste vertheilen, die sich in dem fleischigen Theile des Zwerchfelles verbreiten, so daß die dickern Aeste rückwärts, die dünnern vorwärts gehen.

Auf der rechten Seite durchbohrt ein hinterer größerer Zweig, ramus phrenico-abdominalis, das Zwerchfell, indem er entweder durch das Loch der Hohlvene, oder nahe neben demselben zur untern Seite des Zwerchfells übergeht, dem Lendentheile desselben Fäden giebt, und sich mit den Fäden verbindet, welche als Plexus phrenicus neben der A. phrenica vom Plexus coeliacus des sympathischen Nerven heraufsteigen. An dieser Stelle entsteht ein Ganglion, Ganglion phrenicum. Der linke Zwerchfellnerv liegt etwas weiter nach hinten, ist etwas länger als der rechte, weil er sich um die Spitze des Herzens herumbeugen muß. Der Zweig, welcher von ihm zur unteren Seite des Zwerchfells übergeht, durchbohrt das Zwerchfell, geht aber auch zuweilen durch das Foramen oesophageum, und steht durch viel dünnere Zweige mit dem sympathischen Nerven in Verbindung. Knoten finden sich nach Bock gewöhnlich nicht an ihm, und wenn sie in seltenen Fällen da sind, so sind sie doch sehr klein.

Der hintere Schulterblattnerv. Nervus dorsalis scapulae.

Er entspringt vom 5ten Halsnerven, begleitet die A. dorsalis scapulae, mit welcher er an der innern Oberfläche des M. rhomboideus minor und major herabgeht. Er hängt mit dem hinteren Brustnerven durch einen Zweig zusammen, und giebt dem Serratus anticus major, dem Levator scapulae und den Rhomboideis Aeste.

Hinterer Brustnerv. Nervus thoracicus posterior [1]).

Dieser Nerv entspringt nach Bock vom vorderen Aste des 5ten, 6ten und 7ten Halsnerven. Die von diesen Nerven kommenden, ihn zusammensetzenden Nervenfäden durchbohren nämlich den M. scalenus medius und vereinigen sich nahe über dem vorderen Rande des M. serratus anticus major. Der hierdurch entstandene Stamm geht an der äußeren Oberfläche des Muskels gerade herab, und giebt demselben an vielen Stellen Zweige.

---

[1]) Diesen Nerven und den vorhergehenden, mit welchem er häufig zusammenhängt, nennt Bell den äußeren Athmungsnerven.

Digitized by Google

Das Armgeflecht, plexus brachialis.

Die Nerven des Armes entstehen aus einem Geflechte, Plexus brachialis, in welches 5 Nerven des Rückenmarks, nämlich die 4 unteren Halsnerven und der oberste Rückennerv sich vereinigen, unter denen gemeiniglich der 6te und 7te Halsnerv die dicksten sind.

Alle Nerven dieses ganzen Geflechtes gehen über der A. subclavia zwischen dem M. scalenus anticus und medius durch, geben kleinere Aeste diesen Muskeln, und den nahen Nackenmuskeln bisweilen auch Fäden zum N. sympathicus magnus und zum phrenicus. Sie vereinigen sich hierauf zum Armgeflechte, theils ehe sie zwischen jenen beiden Muskeln heraustreten, theils nachdem sie herausgetreten sind. Dieses Geflecht reicht von den Halswirbeln bis zu der Stelle der Achselhöhle, welche in gleicher Höhe mit der 2ten und 3ten Rippe liegt. Die Zahl, Lage und Verflechtungsart der Bündel, in welche sich hier die genannten Nerven spalten, ist veränderlich, und auf beiden Seiten nicht übereinstimmend. Nachdem aus diesem Geflechte eine Anzahl Nerven für den Arm hervorgegangen sind, verflechten sich zwar die Hauptstämme nicht mehr, wohl aber die in jedem derselben eingeschlossenen Bündel, und so wird, wie Monro bewiesen hat, ein solcher Austausch von Nervenbündeln bewirkt, daß zuletzt jeder beträchtliche Nervenzweig Fäden von fast allen den Rückenmarksnerven zu enthalten scheint, welche den Plexus brachialis zusammensetzen, und welche zur Bildung der Hauptstämme beitrugen.

Die Arteria axillaris, welche anfangs auf der der Brust zugekehrten Seite des Plexus brachialis liegt, geht unten so durch ihn hindurch, daß sie an der dem Arme zugekehrten Seite der Nerven zu liegen kommt.

Nachdem die zu dem Plexus brachialis gehörenden Nerven zwischen dem Scalenus anterior und medius herausgetreten sind, geben sie die Nervos thoracicos anteriores, den Nervus suprascapularis, und die Nervos subscapulares.

Nervi thoracici anteriores.

Die äußeren Brustnerven sind von unbeständiger Anzahl (2 bis 3), kommen vom gemeinschaftlichen Stamme des N. medianus und des Musculo-cutaneus, oder von der Vereinigung des 5ten und 6ten, und des 7ten und 8ten Halsnerven, gehen an der Brust hinab, und vertheilen sich zum M. pectoralis major und minor. Sie begleiten die Arterias thoracicas anteriores, und ein Faden scheint zum Acromialgelenke des Schlüsselbeins zu gelangen.

Digitized by Google

Nervus suprascapularis.

Der Oberschulterblattnerv kommt vom 5ten, zuweilen auch vom 6ten Halsnerven, oder vom 5ten und 7ten, geht rückwärts durch die Incisura suprascapularis des Schulterblatts, und vertheilt sich in den Muskeln des Schulterblattes, dem M. supraspinatus, infraspinatus, teres minor und subscapularis, und begleitet also die A. transversa scapulae.

Nervi subscapulares.

Die Unterschulterblattnerven entstehen vorzüglich von den aus den 4 unteren Halsnerven hervorgegangenen Stämmen. Ihre Zahl ist nicht bestimmt. Es sind ihrer ungefähr 3. Nicht selten entspringt einer von ihnen vom N. axillaris. Einer von ihnen, der lange Unterschulterblattnerv, N. subscapularis longus geht zwischen dem Serratus anticus major und dem Subscapularis herab zum vorderen dicken Theile des Latissimus dorsi, in welchem allein er sich endigt. Dieser Nerv ist zuweilen ein Ast des N. radialis [1]).

Nervenstämme des Arms.

Ihrer sind, wenn man den Hautnerven hinwegrechnet, welcher vom Intercostalaste des 2ten Brustnerven zu entspringen pflegt, sieben. Die 2 ersten sind nur Hautnerven, die übrigen Muskel- und Hautnerven zugleich. Die 3 letzten durchlaufen die ganze Länge des Arms, und endigen sich als Hautnerven in den Fingerspitzen. Ihnen muß man folglich den in den Fingerspitzen so sehr ausgebildeten Tastsinn zuschreiben. Die hier zu beschreibenden Nerven des Arms will ich sogleich aufzählen und dabei die Zahl der Halsnerven oder derjenigen Rückenmarksnerven beifügen, von welchen sie entspringen [2]).

1) Nervus cutaneus internus minor, welcher oft ganz fehlt und in seinem Ursprunge unbestimmt ist.

2) Nervus cutaneus internus major oder cutaneus medius . . . . . 8. 1.

---

[1]) Nach Baur gehört er sowohl dem M. serratus anticus major als dem Latissimus dorsi an, und verbindet sich auch mit den an der Seite der Brust zwischen den Muskeln hervordringenden Zweigen der Intercostalnerven. (Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani thoracis praesertim abdominisque. Tubingae 1818. 4. p. 17 et 23. Er nennt diesen Nerv N. thoracicus longus.

[2]) Ich setze hier die Zahlen her, wie sie von Anton Scarpa (Anatomicarum annotationum Lib. I. De nervorum gangliis et plexibus p. 94) angegeben worden sind, bemerke aber, daß die Natur hinsichtlich dieser Zahlen keine bestimmte Regel beibehält, was auch Scarpa selbst sagt.

Digitized by Google

3) Nervus musculo-cutaneus	5. 6. 7.
4) Nervus axillaris	5. 6. 7.
5) Nervus medianus	5. 6. 7. 8.
6) Nervus radialis	6. 7. 8.
7) Nervus ulnaris	7. 8. 1.

1. Nervus cutaneus internus minor.

Der innere Hautnerv, nervus cutaneus internus [1]) liegt dicht an der Arteria axillaris, geht an der innern Seite des Oberarms unter der Haut herab, vereinigt ſich mit dem hinteren inneren Hautnerven, und theilt ſich in einen Aſt, der ſich in der Haut, die den M. triceps bedeckt, in Zweige theilt und in einen zur Gegend des Olecranon herabgehenden Aſt. Dieſer Nerv fehlt bisweilen ganz, und wird von Scarpa nicht mit unter den aus dem Plexus brachialis entſpringenden Nerven aufgezählt.

2. Nervus cutaneus medius oder internus major.

Der mittlere Hautnerv, nervus cutaneus internus major s. medius, geht an der innern vordern Seite des Oberarms in der Gegend des N. medianus, dicht unter der Fascia herab, giebt einen oder 2 Hautzweige, die ſich über der Fascia zu der den Biceps bedeckenden Haut begeben, durchbohrt etwa in der Mitte am Oberarme die Fascia, ſchickt einige Aeſte über die V. mediana am Ellenbogen herab, und andere zur Haut am Condylus internus, und theilt ſich am Ellenbogengelenke in 2 Aeſte.

1) Ramus cutaneus ulnaris geht über die Vena basilica hin, giebt Aeſte zur Haut unterhalb des Olecranon Aeſte, welche die V. mediana umſchlingen, geht dann längs der Ulna zur Hand hinab, und verbreitet ſich in der Haut.

2) Ramus cutaneus palmaris geht vor oder hinter dem Ende der Medianvene zur Beugeſeite des Unterarms und dicht unter der Haut hinab, und endigt ſich in der Gegend des Os pisiforme, wo er ſich mit dem Handrückenaſte des Ulnarnerven verbindet.

3. Nervus musculo-cutaneus, oder cutaneus externus.

Der äußere Muskelhautnerv, oder der äußere Hautnerv, nervus cutaneus externus oder perforans Casseri, geht, vom N. medianus abweichend, an der innern Seite des M. coracobrachialis hinab, durchbohrt denſelben meiſtentheils unter einem ſehr ſpitzigen Winkel, ſo, daß er an die äußere Seite deſſelben gelangt, und liegt nun

[1]) *Klint*, Cap. V. p. 35. sqq.

Digitized by Google

nachdem er beiden Aeste abgegeben hat, zwischen ihm und dem M. biceps [1]).

Dann geht er am Oberarme zwischen dem M. biceps und dem M. brachialis internus hinab, durchbohrt hinter der Sehne des Biceps die Fascia, giebt kleine Hautzweige, und theilt sich, höher oder tiefer, in 2 größere Hautäste.

Der innere ist dünner, und geht vor dem Supinator longus an der inneren Seite des Radius bis zur Handwurzel.

Der äußere Ast, der an der innern Seite des Latus radiale bis zur Hand hinabgeht, und sich nach und nach in der Haut vertheilt, geht oben unter der V. mediana hinweg. In der Gegend des Flexor radialis und M. palmaris longus, theilt er sich nach und nach in Aeste, welche in die Haut gehen. Am Vorderarme begleitet dieser Ast die Vena cephalica, und in der Ellenbogenbuge schlagen sich gemeiniglich einige Aeste desselben über diese Vene hinüber.

4. Nervus axillaris.

Der Achselnerv, nervus axillaris s. articularis, giebt Aeste zur Haut und den Drüsen der Achsel, geht zum untern Rande des Schulterblatts hinab, giebt zuweilen Aeste zum M. teres major und subscapularis, schlägt sich dann zwischen jenen 2 Muskeln und dem M. triceps um das Schulterblattgelenk rückwärts herum, begleitet also die A. circumflexa scapulae, und giebt einen Hautnerven, der sich um den hinteren Rand des Deltamuskels herumwendet.

Die Fortsetzung desselben geht mit der A. circumflexa humeri posterior in den Teres minor zur Haut und in den Deltamuskel.

5. Nervus medianus.

Der Mittelnerv, nervus medianus, ist nächst dem N. radialis der dickste Nerv des Arms, umfaßt gemeiniglich, indem er sich spaltet, oder aus 2 Wurzeln entsteht, die Arteria axillaris, giebt Fäden zum Stamme des Nervus cubitalis und cutaneus internus ab, meist auch einen Ramus cutaneus, der seltner aus jenem Stamme kommt, und geht dann an der innern Seite des Oberarms, auf der Arteria brachialis, und weiter unten an ihrer inneren Seite bis in das Interstitium cubiti. Er liegt hierauf zwischen dem Pronator teres und dem Supinator longus, und wird unter der Aponeurosis des M. biceps verborgen. Die Arterie selbst erhält auf diesem Wege von ihm kleine Zweige.

[1]) Ein kleiner Ast dringt nach Klint mit einer A. nutritia in den Oberarmknochen. (Klint §. 3.)

Digitized by Google

Größere Zweige giebt er aber bis hieher meiſtentheils nicht. Nur zuweilen verbindet er ſich hinter dem Biceps durch einen Querzweig mit dem N. musculo-cutaneus.

Im Interstitium cubiti durchbohrt er entweder den M. pronator teres, oder geht unter ihm weg, giebt einen Aſt zum Pronator teres, der einen Zweig durch den Muskel zur Haut ſchickt, ferner einen Zweig zum Flexor radialis, und kleinere Zweige zum Flexor sublimis.

Außerdem entſpringt hier der wichtige Nervus interosseus volaris, den manche Anatomen auch den tiefen Aſt des N. medianus nennen, (der bisweilen von einem Faden des Nervus radialis, welcher das Ligamentum interosseum durchbohrt, verſtärkt wird.) Er giebt Aeſte dem Flexor longus pollicis, dem Flexor profundus, dann geht er die Vasa interossea begleitend hinab, und ſchickt dem Flexor profundus, dem Flexor pollicis longus, und dem Pronator quadratus Aeſte.

Die Fortſetzung des Stammes des Nervus medianus oder ſein oberflächlicher Zweig geht zwiſchen dem Flexor sublimis und dem Flexor profundus hinab, giebt unterweges einen Aſt dem Flexor sublimis, und einen langen Hautnerven für die Hohlhand [1]).

Nun theilt er ſich erſt in 2 Aeſte, geht mit den Beugeſlechſen unter dem Ligamentum carpi proprium durch (oder theilt ſich erſt unter dieſem). Während dieſes Durchgangs giebt er einen Aſt zum Abductor pollicis, und einen Ramus communicans zum Ramus volaris des N. ulnaris, und ſpaltet ſich hierauf von neuem, ſo daß 4 Zweige entſtehen.

Seine Rami digitales volares gehen unter der Aponeurosis palmaris an den Beugeſlechſen des M. sublimis hinab zu den Fingern, für welche ſie beſtimmt ſind. Dieſe Aeſte ſind: ein Aſt für die Radialſeite des Daumens; ein Aſt für die 2 einander zugekehrten Seiten des Daumens und des Zeigefingers; ein Aſt für die einander zugekehrten Seiten des Zeigefingers und des Mittelfingers, und endlich ein Aſt für die einander zugekehrten Seiten des Mittelfingers und des 4ten Fingers. Mehrere dieſer Zweige geben Aeſte zur Haut und zu einigen Lumbricalmuskeln.

6. Nervus radialis.

Der Speichennerv, nervus radialis, iſt der dickſte aller Nerven des Arms, liegt anfangs zwiſchen der A. axillaris und dem N. cubi-

[1]) Dieſer die Fascia des Vorderarms durchbohrende Hautnerv entſpringt zuweilen aus der Vereinigung des Musculo-cutaneus und des Ramus dorsalis des N. radialis.

Digitized by Google

talis, begleitet dann die A. profunda brachii, giebt einen Hautzweig zu dem Theile der Haut, welcher den Anconaeus longus bedeckt; einen Aſt zu dem Anconaeus longus ſelbſt, und Aeſte zum Anconaeus internus und externus. Vor dem zu dem Anconaeus internus gehenden Zweige kommt, nach Bock, ein langer Faden, welcher neben der A. collateralis ulnaris zur Kapſel des Ellenbogengelenks geht.

Nun geht der Nerv in dem Zwiſchenraume zwiſchen den 3 Köpfen des Triceps hinter dem Oberarmknochen herum, und giebt den oberen äußeren Hautnerven des Arms, der zwiſchen dem Brachialis internus und Supinator die Fascia durchbohrt, und ſich auf der Streckſeite des Unterarms zuweilen bis zur Hand herab verbreitet. Der N. radialis ſchickt nun einen Aſt zum Flexor radialis, einige zum Supinator longus und brevis, und theilt ſich dann in den Ramus superficialis und profundus.

Der tiefe Aſt, ramus profundus, könnte auch N. interosseus dorsalis heißen, denn er geht zu den nämlichen Theilen als die A. interossea dorsalis, mit dem Unterſchiede jedoch, daß er nicht das Ligamentum interosseum durchbohrt, ſondern um den Radius herum zur Rückenſeite des Vorderarms geht, indem er meiſtens den Supinator brevis durchbohrt, bisweilen um ihn herumgeht. Er gehört den am Rücken des Vorderarms liegenden Streckmuskeln an, und erſtreckt ſich auch zur Kapſel des Handgelenks.

Der oberflächliche Aſt, ramus superficialis, giebt Aeſte den Extensoribus radialibus, und geht neben der A. radialis hinab.

Der vordere Aſt deſſelben hat Gemeinſchaft mit dem N. musculocutaneus, giebt Aeſte dem Abductor brevis, dem Opponens, und wird dann Ramus dorsalis radialis Pollicis.

Der hintere Aſt geht zwiſchen dem Os metacarpi pollicis und indicis gegen den Handrücken hinab, giebt Hautzweige zur Haut der Handwurzel und der Mittelhand, und ſpaltet ſich wieder in 2 Aeſte: Der eine Aſt, nachdem er kleine Zweige zur Haut gegeben, und einen zwiſchen den Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigefingers eindringenden Faden abgegeben hat, ſpaltet ſich gabelförmig in den N. dorsalis ulnaris pollicis und in den N. radialis indicis.

Der andere Aſt, nachdem er kleine Hautzweige zur Mittelhand gegeben hat, ſpaltet ſich in den N. dorsalis ulnaris indicis und in den N. radialis digiti medii. Oft ſpaltet ſich dieſer letztere Aſt nochmals, und ſchickt alſo einen Zweig, der den einander zugewendeten Rändern des Mittel- und Ringfingers Aeſte giebt. Bisweilen kommen auch dieſe letzteren Aeſte aus einer Verbindung des Radial- und Ulnarnerven auf den Handrücken.

Digitized by Google

7. Nervus ulnaris.

Der **Ellenbogennerv**, nervus ulnaris s. cubitalis, welcher durch einen Faden mit dem N. radialis Gemeinschaft hat, liegt anfangs hinter den Vasis axillaribus, geht an der innern Seite des Oberarms hinab, und giebt bisweilen einen innern Hautnerven des Oberarms, der sich in der Haut am Olecranon etwas tiefer herab vertheilt; der Ulnarnerv erreicht nun die Vertiefung am Condylus internus, und geht durch dieselbe [1]) zum Unterarme, wo er am Latus ulnare liegt.

Noch in jener Vertiefung giebt er einen Ast dem Flexor ulnaris, geht dann neben der Arteria ulnaris längs der Ulna zwischen dem Flexor ulnaris und dem Sublimis hinab, giebt unterweges einen oder 2 Aeste dem Flexor profundus; einen langen Ast, der sich um die A. ulnaris herumkrümmt, und zur Haut der Vola hinabgeht, und theilt sich an der Handwurzel in 2 Aeste:

Der **Handrückenast**, ramus dorsalis, kommt zwischen dem Flexor ulnaris und der Ulna auf den Rücken der Hand und zugleich durch die Fascia, giebt Ramos cutaneos zu dem benachbarten Theile der Haut der Hand, schickt ferner einen Ramus carpeus dorsalis, und theilt sich dann in Ramos digitales dorsales, nämlich in den Ramus ulnaris digiti minimi, und in 2 Zweige, von welchen **der eine** den 2 einander zugewendeten Seiten des 5ten und 4ten Fingers, **der andere** den einander zugewendeten Seiten des 4ten und des 3ten Fingers bestimmt ist. Der letztere Zweig verbindet sich mit dem Rückenzweige des Speichennerven, und ist zuweilen so dünn, daß er nur die Verbindung bewirkt, und daß die 2 zuletzt genannten Seiten der Finger vom Radialnerven ihre Nervenfäden erhalten, oder daß wenigstens die Ulnarseite des 3ten Fingers noch vom Radialnerven ihre Nerven erhält.

Der **Hohlhandast**, ramus volaris, ist die Fortsetzung des Stammes. Er lenkt sich zwischen dem Os pisiforme und dem Ligamentum carpi volare proprium auf die Hohlhandseite der Handwurzel, giebt einen Ast zum Abductor digiti minimi, schickt die beiden Ramos volares digiti minimi, und den Ramus volaris ulnaris digiti quarti, welcher sich mit einem Aste des Mediannerven vereinigt, und einen Ramus profundus, der sich so, wie der Arcus profundus der A. ulnaris unter den Beugesehnen verbirgt und gegen das Latus radiale der Hand hinkrümmt, und den M. M. lumbricalibus und interosseis Aeste giebt.

---

[1]) Wenn man sich an diese Stelle stößt, so fühlt man einen empfindlichen Schmerz, wie von einem elektrischen Stoße, der sich bis in den kleinen Finger hinab erstreckt.

Digitized by Google

Verbreitung der Nerven an den Fingern.

Jeder Finger hat 2 größere Hohlhandzweige, die an ſeinen 2 Rändern fortgehen und 2 dünne Rückennerven, welche an den 2 Rändern jedes Fingers bis an das 2te Gelenk gehen. Nur bei dem Daumen erſtrecken ſich die Rückenzweige bis zur Nagelwurzel.

Sowohl jene als dieſe geben längs den Fingern Aeſtchen zur Haut derſelben.

Der Hohlhandnerv jedes Fingers giebt nach Bock in der Nähe des erſten Fingergelenks einen anſehnlichen Aſt zum Rücken des Fingers, der ſich am erſten Gelenke mit Zweigen des Rückennerven verbindet, und ſich dann zur Haut des Rückens des 3ten Gliedes begiebt. Jeder Rückennerv und Hohlhandnerv der Finger giebt eine Menge kurzer Zweige zur Haut. Dieſe Zweige vereinigen ſich, nach Bock, nicht an der Mittellinie jedes Fingers und eben ſo wenig an der Spitze, wo ſich die Endäſte auf jeder Seite mehrfach ſpalten. Einige Zweige dringen aber nahe am Knochenrande durch die Flechſenſcheide, und gehen in die Kapſeln der Fingergelenke über.

Es iſt ſehr merkwürdig, daß die Anaſtomoſen, welche an den Geſichtsnerven und an den Rückenmarksnerven in der Nähe der Wirbelſäule ſo häufig ſind, nach den Enden der Extremitäten hin immer ſeltener werden. Beſtändig ſind hier nur die Verbindungen zwiſchen dem Endaſte des Musculo-cutaneus und dem Rückenaſte des N. radialis, des Cutaneus medius und dem Rückenaſte des N. ulnaris, des N. radialis und des Ramus dorsalis nervi ulnaris, endlich die des N. medianus und des Ramus volaris n. ulnaris [1]).

Ueberſicht über die Haut- und Muskelnerven, welche von den vier unteren Halsnerven und vom Verbindungszweige des erſten Bruſtnerven entſpringen.

Zuerſt wollen wir die am Halſe, dann die an der Schulter und an dem Oberarme, und endlich die am Oberarme, Vorderarme und an der Hand gelegenen Muskeln nennen, welche von den 4 unteren Halsnerven Aeſte erhalten. Die Muskeln am Halſe wollen wir ſelbſt wieder in hintere Muskeln, Seitenmuskeln und vordere Muskeln unterſcheiden. Eben ſo wollen wir zuerſt die Hautnerven am Halſe und dann die am Arme aufzählen.

---

[1]) Siehe A. Bock in ſeinem werthvollen Werke: Die Rückenmarksnerven nach ihren ganzen Verlaufe, Vertheilungen und Verbindungen, nebſt Abbildungen derſelben auf 6 K. Leipzig 1827. S. 78.

Digitized by Google

Ueberſicht über die Halsmuskeln, welche von den vier unteren Halsnerven Zweige erhalten.

Von den hinteren Aeſten derſelben erhalten Zweige die Musculi interspinales und intertransversales posteriores, der M. multifidus spinae, semispinalis cervicis, splenius capitis und colli, biventer cervicis, complexus, cervicalis descendens, trachelomastoideus und cucullaris.

Von den vorderen Aeſten derſelben erhalten Zweige theils die Seitenmuskeln, namentlich die Musculi intertransversales anteriores, der M. serratus anticus major, levator scapulae, rhomboideus major und minor, scalenus posterior, medius und anterior, theils die vorderen Muskeln, namentlich der M. longus colli, rectus capitis anticus major und minor, und das Zwerchfell.

Ueberſicht über die Schulter- und Armmuskeln, welche Nerven aus dem Plexus brachialis bekommen [1]).

Der M. supraspinatus und infraspinatus erhält ſeine Nerven von dem N. suprascapularis, der M. pectoralis major und minor bekommt ſie von den Nervis thoracicis externis, der M. subscapularis, teres major, latissimus dorsi, teres minor, und deltoideus empfangen ſie aus den Subſcapularnerven und Achſelnerven.

Ueberſicht über die Muskeln des Oberarms, Unterarms und der Hand, die ihre Nerven von den Stämmen der Armnerven erhalten.

Die Beugemuskeln des Oberarms und des Vorderarms, namentlich der M. coraco-brachialis biceps und brachialis internus bekommen ihre Nerven vom N. musculo-cutaneus.

Die Streckmuskeln des Oberarms und des Vorderarms, namentlich die 3 Köpfe des M. triceps, erhalten ihre Nerven von dem N. radialis.

Die auf dem Rücken des Vorderarms gelegenen Supinatoren und die Streckmuskeln der Hand und der Finger bekommen ihre Nerven vom N. radialis, die ſehr tiefliegenden Streckmuskeln der Hand und der Finger von einem Aſte deſſelben, von dem N. interosseus dorsalis.

Die Pronatoren, die Beugemuskeln der Hand und der Finger, namentlich der M. flexor carpi radialis, der M. palmaris longus, der M. flexor digitorum communis sublimis und profundus, bekommen ihre Nerven vom N. medianus, und zwar die tiefgelegenen Muskeln vom Ramus interosseus volaris deſſelben.

Der N. ulnaris giebt nur einigen Beugemuskeln Aeſte, namentlich dem Flexor digitorum profundus und dem Flexor carpi ulnaris.

Die kurzen an der Hand gelegenen Muskeln erhalten ihre Nerven vom N. medianus und ulnaris, nicht vom N. radialis und zwar alle dieſe Muskeln erhalten ſie von der Hohlhand aus, namentlich der M. palmaris brevis die kurzen Muskeln am Ballen des kleinen Fingers und die M. interossei interni und externi ſämmtlicher 4 kleineren Finger vom N. ulnaris, vorzüglich vom Ramus profundus deſſelben, der in der Hohlhand neben dem Arcus profundus der Arterien liegt. Die meiſten Lumbricalmuskeln (Beuger des erſten Gliedes der Finger) und die kleinen Muskeln am Ballen des Daumens erhalten ihre Nerven vom N. medianus.

Ueberſicht über die Hautnerven am Halſe.

Die von den hinteren Aeſten entſpringenden Hautnerven ſchlagen ſich theils wie der N. occipitalis magnus hinten am Kopfe bis zum Scheitel hinauf, theils gehen einige derſelben, die aber nicht immer vorhanden ſind, am mittleren und unteren Theile des Nackens nach hinten.

---

[1]) Bock (a. a. O.) in der Vorrede, hat gezeigt, daß der M. teres minor und subscapularis ihre Nerven nicht vom N. suprascapularis, wie Hildebrandt (ſiehe oben S. 495) und die meiſten anderen Anatomen annahmen, erhalte, ſondern von den Subſcapular- und Achſelnerven. Nach ihm ſchicken auch die Nervi thoracici anteriores gar keine Hautnerven und keine Nerven für die Mamma ab.

Digitized by Google

Die von den vorderen Aeſten entſpringenden Hautnerven beugen ſich nicht wie an der Bruſt bogenförmig um den Hals nach vorn herum, ſondern verhalten ſich wie die an der Bruſt befindlichen Seitenäſte der vorderen Hautnerven. Sie ſchlagen ſich zum Theil am Kopfe hinauf, zum Theil an der Bruſt und Schulter hinab. Der 3te, 4te und 5te Halsnerv ſind der Mittelpunct, von welchem dieſe Nerven ausgehen. Vom 3ten Halsnerven geht nämlich an der Seite des Kopfs hinauf der N. occipitalis minor und auricularis magnus, an der Seite des Halſes um den M. sternocleido-mastoideus nach vorn herum läuft, der vom 3ten Halsnerven entſpringende, mit dem N. facialis communicirende mittlere Hautnerv des Halſes, und zuweilen noch einer aus dem 4ten. Endlich kommen aus ihnen die über die Schulter und an der Bruſt eine kleine Strecke herabgehenden Supraclavicularnerven. Beſondere vordere Hautnerven giebt es am Halſe nicht.

Ueberſicht über die Hautnerven des Arms.

Der N. phrenicus, der N. dorsalis scapulae, der N. thoracicus posterior, der N. suprascapularis, die Nervi subscapulares, und die Nervi thoracici externi ſind Muskelnerven, und ſcheinen keine Hautnerven abzugeben. Der N. cutaneus medius und der Cutaneus internus dagegen ſind nur Hautnerven.

Ein oberer Hautnerv des Arms, der zu dem den Deltoideus bedeckenden Theile der Haut geht, und ſich hinten um dieſen Muskel herumkrümmt, entſpringt vom N. axillaris, (die übrigen Hautnerven der Schulter kommen von den Supraclavicularnerven).

Die hinteren Hautnerven am Oberarme, die zu dem den Triceps bedeckenden Theile der Haut gehen, entſpringen vom N. cutaneus internus, und von einem aus dem 2ten Rückennerven abgehenden Hautaſte.

Die Hautnerven für den Rücken des Vorderarms entſpringen von dem zwiſchen dem M. brachialis internus und M. triceps hervorkommenden Hautaſte des Radialnerven.

Die Hautnerven für die innere Seite des Oberarms kommen vom N. radialis und cutaneus medius, die für den Rücken und für die Volarſeite des Vorderarms in der Nähe der Ulna kommen aus dem Cutaneus medius. Dieſe Hautnerven reichen meiſtens bis an die Hand herab.

Die Hautnerven für die Rücken- und Volarſeite des Vorderarms in der Nähe des Radius entſpringen vom N. musculo-cutaneus, und reichen meiſtens bis zur Haut der Hand hinab.

Die Hohlhand bekommt einen beſondern beträchtlichen Hautnerven vom Medianus, und einen nicht unbeträchtlichen Hautnerven vom Ulnaris.

Der Handrücken erhält dagegen nur kleinere Aeſte vom N. radialis und N. ulnaris.

Nervi pectorales, die Bruſt- oder Rückennerven.

Ihrer ſind in der Regel 12 auf jeder Seite. Der erſte liegt zwiſchen dem 1ſten und dem 2ten Bruſtwirbel, der letzte zwiſchen dem 12ten Bruſtwirbel und dem erſten Lendenwirbel. (Haller nahm nur 11 Bruſtnerven an und zählte den 12ten zu den Lendennerven.)

Rechnet man den 1ſten Bruſtnerven hinweg, ſo ſind die übrigen, mit den 4 unteren Halsnerven und mit den Lendennerven verglichen, ſehr dünn. Häufig verbinden ſie ſich innerhalb des Wirbelcanals durch Fäden, welche von der Wurzel des einen zur Wurzel des anderen Nerven herübergehen. Bei den 2 erſten iſt dieſe Verbindung am beſtändigſten. Dagegen vereinigen ſich, wie Bock bewieſen hat, die vordern

Digitized by Google

und hintern Aeste der Rückenmarksnerven nicht durch constante und in der Regel vorhandene anastomosirende Zweige. Nahe am Zwischenwirbelloche spaltet sich jeder Nerv in den größeren vorderen und in den kleineren hinteren Ast.

Vordere Aeste der Brustnerven, oder die Zwischenrippennerven. Nervi intercostales.

Jeder vordere Ast verbindet sich durch einen oder 2 Fäden mit dem benachbarten Knoten des sympathischen Nerven, oder mit dem Grenzstrange desselben. Anfangs liegen die vorderen Aeste in der Rinne am unteren Rande der Rippen über dem M. intercostalis, und sind unter den Sehnenfasern der innern Intercostalmuskeln verborgen. Hierauf verlassen sie diese Rinne, und liegen unter dem unteren Rande der Rippen. Die 3 obersten Intercostalnerven liegen indessen nach Baur zuweilen in der Mitte des Zwischenrippenraums, oder neben dem oberen Rande der tieferen Rippe, welche diesen Raum einschließen hilft. Alle Zwischenrippennerven, mit Ausnahme der oberen, gehen nach Baur zwischen den äußeren und inneren Intercostalmuskeln hin. Nur die oberen fand er oft zwischen der Pleura und den Intercostalmuskeln liegend.

Die Aeste benachbarter Intercostalnerven vereinigen sich nach Bock zuweilen, indem dieser oder jener Ast über die benachbarte Rippe zu dem nächsten Zwischenrippenraume herab oder hinauf geht.

Jeder Intercostalnerv giebt mehrere kleinere Aeste, an die Intercostalmuskeln, zu dem M. serratus posticus superior oder zu dem inferior, dann 2 größere Aeste zu den Intercostalmuskeln, einen nämlich hinten und einen zweiten etwas weiter vorn. Dieser letztere geht zwischen dem M. intercostalis externus und internus am oberen Rande der nächst tieferen Rippe vorwärts, und gehört dem M. intercostalis internus an. Zuweilen sind an seiner Statt 2 kleinere Aeste vorhanden.

Nur sehr kleine und unbestimmte Nervenfäden gehen zum Serratus anticus major.

Außer diesen Muskelästen giebt jeder Intercostalnerv vom 2ten Brustnerven an, nach Baur und Bock ungefähr auf der Hälfte seines Wegs, einen Hautnerven für die Seite der Brust oder des Bauchs, den man den äußeren Hautnerven nennt.

Der vom 2ten bis 7ten Brustnerven entspringende äußere Hautnerv tritt zwischen den Zacken des Serratus anticus major, der vom 8ten bis 11ten Brustnerven kommende tritt zwischen den Zacken des Obliquus externus hervor zur Haut. Jeder ist schon da, wo er noch zwischen diesen Muskeln verborgen liegt in 2 Zweige gespalten, von welchem der eine sich nach Bock quer nach vorn, der andere quer nach hinten um die Brust oder um den Bauch herumschlägt.

Digitized by Google

Jene vorderen Zweige der äußeren Hautnerven sind dicker, zumal die, welche vom 8ten bis 11ten Unterrippennerven entspringen, denn diese übertreffen noch die nämlichen Aeste an Umfang, welche vom 2ten bis 7ten Unterrippennerven abgegeben werden. Sie gehören der Haut an, sind indessen nicht überall nur der Haut bestimmt, sondern die vom 8ten bis 11ten Unterrippennerven entspringenden geben auch einen Faden an den M. obliquus externus. Unstreitig sind sie eben deswegen etwas dicker.

Die hinteren Zweige der äußeren Hautnerven sind im Allgemeinen kleiner, schlagen sich nach hinten herum, und verbreiten sich in der Haut der Seite und in der des Rückens, welche den Latissimus dorsi bedeckt.

Die Fortsetzung des Stamms der Intercostalnerven geht bei dem 2ten bis 7ten Intercostalnerven an den Rippen und Rippenknorpeln bogenförmig nach vorn. Sie bringt, nachdem sie kleine Zweige zu den Intercostalmuskeln und hier und da zu dem M. triangularis sterni gegeben hat, an dem Rande des Brustbeins durch den großen Brustmuskel, jedoch nach Bock, ohne ihm Zweige zu geben, verbreitet sich daselbst, bildet die vordersten Hautnerven der Brust, und gehet mit einem Aste den äußeren Hautnerven entgegen.

Nach Baur sollen auch von diesen vorderen Enden der 6 oberen Intercostalnerven Aeste zum M. triangularis sterni gehen, auch sollen dünne Zweige zur A. mammaria interna gelangen. Da, wo diese Arterie die A. pericardiaco-phrenica abgiebt, kommt nach ihm ein sehr dünner Zweig zu dem pericardium um zum Zwerchfelle; auch begleiten, wie er behauptet, kleine Aestchen des 5ten, 6ten und 7ten Intercostalnerven die anderen Aeste der A. mammaria interna, vorzüglich den Ramus epigastricus derselben. Einmal glaubt er sogar ein Fädchen zur Pleura verfolgt zu haben [1]).

Die Fortsetzung des Stammes des 8ten bis 11ten Brustnerven ist stärker als die der höher oben gelegenen Brustnerven. Diese Nerven treten, nachdem sie auch kleine Zweige zu den Intercostalmuskeln gegeben haben, hinter den Knorpeln der falschen Rippen (der Bauchrippen) und zwischen den Zacken des Zwerchfells [2]), und dann zwischen dem M. obliquus internus und transversus in ziemlich querer Richtung vorwärts, und zugleich etwas abwärts, geben diesen 2 Muskeln Zweige, verbinden sich hier und da unter einander [3]), treten dann in die

---

1) *Chr. Jac. Baur*, Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani, thoracis praesertim abdominisque. Tubingae 1818. 4. p. 23, 24. Auch *Vieussens* (Neurographia univers. Francof. 1690. p. 440) und *Frotscher* (Descriptio medullae spinalis ejusque nervorum p. 16) erwähnten Aeste die zum Mediastino anteriori gehen.

2) An dieser Stelle sollen sie nach Baur mehrere Nervenzweige dem Zwerchfelle abgeben, die aber Bock nicht gefunden hat.

3) Nach Baur entstehen durch Theilung jener Nervenzweige 8 bis 10 Nerven, welche in querer Richtung verlaufen und sich alle regelmäßig unter einander verbinden, so daß alle diese, vom 1sten bis zu dem 12ten Brustnerven entspringenden, Nerven sich unter einander vereinigen. Der vom 12ten Brustnerven entspringende Zweig vereinigt sich aber selbst wieder mit dem vom 1sten Lendennerven kommenden.

Digitized by Google

Scheide des Rectus abdominis, liegen an dessen hinterer Oberfläche und geben ihm selbst Zweige, schicken aber auch einige durch ihn hindurchgehende Aeste zur Haut des Bauchs, welche den äußeren Hautnerven des Bauchs entgegen gehen [1]).

Uebersicht über die Muskeln, welche von den vorderen Aesten der Brustnerven Zweige erhalten.

Hierher gehören erstlich die Seitenmuskeln, namentlich der Serratus posticus superior und inferior, der Serratus anticus major und die Musculi intercostales externi und interni. Ferner die vordern Muskeln, namentlich der Triangularis sterni, Rectus abdominis, Obliquus externus, Obliquus internus, Transversus und der Pyramidalis.

Hintere Aeste der Brust- oder Rückennerven.

Sie sind kleiner als die vorderen, und theilen sich zwischen den Processibus transversis der Wirbel in einen inneren und in einen äußeren Ast.

Die äußeren Zweige sind nicht bei allen hinteren Aesten der Rückennerven gleich groß.

Die von dem 1sten bis zu dem 7ten Rückennerven entspringenden äußeren Zweige sind kleiner. Diese dringen zwischen dem M. longissimus dorsi und sacro-lumbalis hervor, geben diesen Muskeln, dem Transversalis cervicis, und den Levatoribus costarum Aeste und schicken nur hier und da kleine Aeste, welche den Latissimus dorsi (ohne ihm Zweige zu geben) durchbohren, zur Haut.

Vom 8ten oder 9ten Rückennerven an sind diese äußeren Zweige der hinteren Aeste dicker. Sie durchbohren da die Sehne des Serratus posticus inferior und des Latissimus dorsi, und geben nur zur Haut, an der sie bis zur Hüftgegend herab und noch weiter verfolgt werden können.

---

[1]) Nach Baur bilden der 7te, 8te und der 9te Intercostalnerv, indem sie sich unter einander vereinigen, einen Nervenstamm oder 2 Nervenstämme, welche an der Grenze der an einander stoßenden Rippenknorpel vorwärts gehen, dann zwischen die oberen Insertionen des M. rectus eindringen und bis zur Haut der Herzgrube fortgehen. Die Aeste des 10ten und 11ten und des 12ten dagegen durchbohren die Scheide des M. rectus, da wo die Sehne des M. obliquus internus sich in 2 Platten spaltet. Von diesen letzteren Nerven, welche sich sehr oft unter einander vereinigen, gehen nach oben mehrere Aeste zur A. epigastrica. Zu beiden Seiten dieser Arterien findet man immer 2 Nervenäste, welche an der Stelle, wo sich die Sehnenhaut des Obliquus internus und des Transversus vereinigt, dieselbe durchbohrt, und zwischen ihr und der Bauchhaut zum Nabel geht, und zur Vena umbilicalis und zu den Arteriis umbilicalibus mit großer Mühe verfolgt werden können. Die an den Arteriis umbilicalibus befindlichen Fäden gehen an ihnen nach dem Becken zu, die an der Vena umbilicalis gehen aufwärts nach der Leber zu, zum Nabelstrange kann man sie bei Embryonen nicht verfolgen. Rieke sah, daß diese 4 Nerven bei dem Kaltblüter ein Netz bildeten. (Diss. inaug. qua investigatur, utrum funiculus umbilicalis nervis polleat, an careat. Tubingae 1817. p. 22.)

Digitized by Google

Die der Mittellinie näheren inneren Zweige der hinteren Rückennervenäste sind auch nicht von gleicher Dicke. Aber hier sind umgekehrt die der oberen Rückennerven (bis zum 7ten) die dickeren. Diese gelangen an die Oberfläche des Multifidus spinae, verbinden sich daselbst hier und da vorzüglich oben mit einander, geben dem M. multifidus spinae, semispinalis colli und dorsi, dem M. spinalis und den Musculis interspinalibus Zweige, durchbohren dann nahe an den Dornfortsätzen die oberflächlicheren Lagen der Rückenmuskeln (den M. splenius, rhomboideus inferior und den M. cucullaris, oder den M. latissimus dorsi), ohne denselben Zweige zu geben, kommen in ziemlich regelmäßigen Abständen zur Haut des Rückens und gehen den hinteren Aesten der äußeren Hautnerven der Brust und des Bauchs entgegen. Bisweilen vereinigen sich einige dieser benachbarten Zweige unter einander.

Die inneren Zweige der hinteren Aeste der Rückennerven vom 8ten an sind kleiner, und gehen zum Multifidus spinae, ohne beträchtliche Hautzweige zu geben.

Besondere Beschreibung einzelner Rückennerven.

Der erste und der letzte Rückennerv sind die beiden größten Rückennerven.

Der vordere Ast des 1sten und 2ten Rückennerven unterscheidet sich dadurch von dem der übrigen Rückennerven, daß er keinen äußern Hautnerven der Brust abgiebt, sondern statt desselben einen Nerven zum Arme schickt, der erste Rückennerv nämlich einen sehr dicken Ast zum Plexus brachialis, der sich mit dem 8ten Halsnerven alsbald verbindet, der 2te Rückennerv einen viel dünneren Hautast zum hinteren und inneren Theile des Oberarms.

Der vordere Ast des 1sten Rückennerven giebt zwar keinen Hautnerven für den Arm, sondern einen sehr großen äußeren Hautnerven für die Brust, indessen verbindet derselbe sich doch mit dem von dem vorhergehenden gegebenen Hautnerven für den Arm durch einen Zweig.

Der 12te Rückennerv zeichnet sich dadurch aus, daß sein vorderer Ast meistens sogleich anfangs mit dem des 1sten Lendennerven durch einen dicken Communicationszweig verbunden wird. Nicht selten giebt er einen langen Zweig, welcher zugleich mit der Fortsetzung des Astes zwischen der letzten Zacke und dem äußeren Schenkel des Zwerchfells an die Wand der Bauchhöhle tritt, vor der hintern Sehne des Transversus abdominis herabsteigt, und zum M. transversus und obliquus internus gelangt, auch sich mit Aesten der Lendennerven vereinigt.

Digitized by Google

Die Fortſetzung des vorderen Aſtes durchbohrt die Sehne des Transversus, und giebt zwiſchen ihm und dem Obliquus internus (zuweilen auch früher) den Aſt, welcher dem äußeren Hautaſte der andern Bruſtnerven entſpricht, und der den Obliquus externus (welchem er Zweige giebt) durchbohrt und zum Geſäße herabſteigt. Hierauf endigt ſich der vordere Aſt mit dem nach vorn und abwärts gehenden Muskelzweige. Dieſer liegt zwiſchen dem M. transversus und dem Obliquus internus, und gelangt zu dem unterſten Theile dieſer Muskeln und zu dem Pyramidalis, verbindet ſich mit Aeſten des 11ten Rückennerven und des 1ſten Lendennerven, und iſt ſehr lang, wenn der oben erwähnte lange Zweig fehlt, denn er erſetzt ihn dann. Er verbindet ſich auch mit Zweigen der 1ſten Lendennerven, welche ſich am Leiſtenringe verbreiten.

Zuweilen giebt er auch einige Hautzweige, die vorzüglich dann ſehr groß ſind, wenn jener lange Aſt fehlt.

Ueberſicht über die Hautzweige der Bruſtnerven im Allgemeinen.

Faßt man das Geſagte zuſammen, ſo ſieht man, daß die Hautnerven der Bruſt und des Bauchs auf jeder Seite in 4 Reihen zwiſchen den Muskeln hervorkommen, 2 Reihen von den vordern, 2 Reihen von den hinteren Aeſten. Die 2 vorderen Reihen ſtehen weiter von einander ab, und beſtehen aus größeren Nerven. Die 2 hinteren Reihen liegen dicht neben einander.

Die vorderſte Reihe der Hautnerven oder die vorderen Hautnerven kommen neben dem Bruſtbeine, und tiefer auch an einzelnen Stellen des Rectus abdominis neben der Linea alba zum Vorſchein, und ſchlagen ſich vorzüglich nach hinten zu herum.

Die 2te Reihe der Hautnerven, die mittleren oder äußeren Hautnerven kommen oben durch den Serratus anticus, unten durch den Obliquus externus hindurch, und liegen alſo genau an der Seite des Rumpfs. Von ihnen aus geht eine Reihe Zweige nach vorn zu, und eine 2te Reihe Zweige nach hinten zu.

Die von den hinteren Aeſten entſpringenden Hautnerven der 3ten Hauptreihe durchbohren an den Spitzen der Querfortſätze die oberflächliche Lage der Rückenmuskeln und nehmen vorzüglich ihre Richtung nach vorn zu.

Die gleichfalls von den hinteren Aeſten entſpringenden Hautnerven der 4ten Reihe ſind ſehr klein, gelangen neben den Processibus spinosis zur Haut, und wenden ſich vorzüglich nach vorn herum.

Bei den 2 oberſten Rückennerven werden die Aeſte, die den Aeſten

Digitized by Google

der 2ten Reihe, d. h. den äußeren Hautnerven, entſprechen, in Armnerven verwandelt.

Ueberſicht über die Muskeln, welche von den Rückennerven Zweige erhalten.

Was die Muskeln anlangt, welche von den Rückennerven Zweige erhalten, ſo iſt es bemerkenswerth, daß es nur die Musculi intercostales, der Triangularis sterni, alle Serrati und die Bauchmuskeln, namentlich der Obliquus externus, internus, transversus, rectus und pyramidalis ſind, welche von ihnen Zweige erhalten. Dagegen die zum Arme und zur Schulter gehenden oberflächlichen Rückenmuskeln keine Zweige von ihnen erhalten. Wohl aber werden alle am Rücken liegenden tiefen Muskeln von ihnen mit Zweigen verſehen.

Es verdient ferner mit Baur und Bock bemerkt zu werden, daß die Bauchmuskelnerven nicht von den Lendennerven, ſondern von den Rumpfnerven, welche oben wie die Stücke eines Ringes den Rumpf umgeben, nach unten mehr und mehr eine ſchiefe Lage annehmen, und endlich bei den Lendennerven ſehr gerade herabſteigen, kommen, und daß daher die unterſten Intercoſtalnerven Aeſte hergeben, welche das für den Bauch ſind, was die vorderen Aeſte der höheren Intercoſtalnerven für die Bruſt ſind.

Nervi lumbales, Lendennerven.

Ihre von der unteren Anſchwellung des Rückenmarkes entſpringenden Wurzeln liegen dicht an einander, aber es findet innerhalb des Rückgratcanales kein Uebergang von Fäden aus der Wurzel des einen in die des andern Nerven Statt.

Der erſte tritt durch das Intervertebralloch zwiſchen dem 1ſten und 2ten Lendenwirbel, der letzte durch das zwiſchen dem letzten Lendenwirbel und dem Kreuzbeine befindliche Loch hervor.

Die vorderen Aeſte.

Die vorderen Aeſte ſind deſto größer, je weiter unten ſie von einem Lendennerven entſpringen. Sie verbinden ſich mit den Knoten oder mit dem Grenzſtrange des ſympathiſchen Nerven meiſtens durch doppelte Verbindungsfäden. Ein dünnerer Verbindungsfaden durchbohrt nämlich meiſtens den M. psoas, und kommt entfernter von der Wirbelſäule ver-

Digitized by Google

laufend zu dem sympathetischen Nerven, ein dickerer geht dicht an den Lendenwirbelkörpern vorwärts und ist von Sehnenfasern bedeckt.

Die vorderen Aeste dringen selbst in den Psoas ein, geben ihm und dem Quadratus lumborum Zweige, und verbinden sich vor den Querfortsätzen unter einander durch Communicationszweige. Hierdurch entsteht das Lendengeflecht, plexus lumbalis. Aus diesem gehen, wie Schmidt, Baur und Bock gezeigt haben, kleinere Aeste zur Inguinalgegend und zur Haut der Hüfte und des Schenkels hin. Diese letzteren Aeste können vielleicht mit der vorderen Fortsetzung der Intercostalnerven verglichen werden.

Viel dickerere Aeste vereinigen sich zu dem N. cruralis und obturatorius, und indem sich die von den 2 untersten Lendennerven kommenden Aeste mit den Kreuznerven verbinden, entsteht der Nervus ischiadicus. Sie können vielleicht mit den Seitenästen der Intercostalnerven erglichen werden.

Die hinteren Aeste.

Die hinteren Aeste der Lendennerven verhalten sich im wesentlichen wie die der Rückennerven. Jeder theilt sich in einen inneren und in einen äußeren Zweig. Die inneren Zweige gehen zwischen den Querfortsätzen dicht am Bogen der Wirbel nach hinten, sind von Sehnenfasern bedeckt und gehören dem M. multifidus spinae und den Musculis interspinalibus an. Der des letzten Lendennerven verbindet sich mit einem ähnlichen Aste des 1sten Kreuznerven. Die äußeren Zweige gehören den Musculis intertransversalibus und dem gemeinschaftlichen Bauche des M. longissimus dorsi und sacrolumbalis an. Dünne Zweige derselben verbinden sich unter einander, und endlich geben sie Hautzweige, welche jenen großen Muskelbauch und den Latissimus dorsi dicht über den Crista ilei durchbohren, zu der die Glutaeos bedeckenden Haut des Gesäßes herabgehen, und verbinden sich auch durch Nebenzweige unter einander.

Einige kleinere Zweige der vorderen Aeste der Lendennerven im Einzelnen.

1) Des ersten Lendennerven.

Vom 1sten Lendennerven entspringen 2 Aeste, welche mit der vorderen Fortsetzung der Intercostalnerven verglichen werden können, der eine, N. ileo-hypogastricus nach Schmidt, liegt erst hinter dem Psoas, giebt ihm und dem Quadratus lumborum Zweige, durchbohrt dann den Psoas, geht über dem Quadratus lumborum nach außen gegen den Hüftkamm, dringt durch den M. transversus, und giebt zuweilen einen den M.

Digitized by Google

transversus durchbohrenden kleinen Hautaſt zur Haut des Schenkels, welche den Tensor fasciae bedeckt, hierauf läuft er zwiſchen dem Transversus und Obliquus internus nach vorn und verbindet ſich einerſeits mit dem vorderen Aſte des letzten Intercoſtalnerven, anderer Seits mit dem N. ileo-inguinalis. Bisweilen iſt er ſo lang, daß er durch den Inguinalcanal geht, durch den Bauchring hervordringt, und ſich daſelbſt wie der N. ileo-inguinalis verbreitet.

Der andere Aſt, der N. ileo-inguinalis nach Schmidt, iſt hinſichtlich ſeines Urſprungs veränderlich. Meiſtens entſpringt er vom 1ſten Lendennerven, durchbohrt den M. psoas, geht über den M. quadratus lumborum und iliacus internus hinweg, durchbohrt dann nicht weit von der Spina anterior superior ossis ilei den M. transversus und obliquus internus, geht durch den Canalis inguinalis und den Bauchring herab, und giebt dem Schaamberge, dem vorderen Theile des Hodenſackes, oder bei dem weiblichen Geſchlechte der äußeren Schaamlippe Aeſte. Dieſer Nerv iſt nicht ſelten, und zwar öfterer auf der linken als auf der rechten Seite, ein Aſt des N. obturatorius.

2) Des erſten und zweiten Lendennerven.

Der Nervus spermaticus externus entſpringt zuweilen auch nur vom Communicationszweige zwiſchen beiden Lendennerven oder vom 2ten allein. Er geht durch den M. psoas hindurch und ſpaltet ſich vor ihm. Der äußere Aſt gelangt in 2 Aeſte geſpalten mit der Arteria cruralis und vor dem M. iliacus zur Haut des Schenkels. Zuweilen entſpringt dieſer Aſt als ein beſonderer Nerv aus dem 2ten Lendennerven und verbindet ſich mit dem Nervus ileo-inguinalis. Der dickere innere Aſt giebt kleine Zweige zur Gegend des Annulus cruralis und zur A. epigastrica, dringt beim Manne durch die hintere Oeffnung oder neben derſelben in den Canalis inguinalis, begleitet den Funiculus spermaticus und ſchickt zum Cremaster, zum Kopfe des Nebenhoden und bisweilen auch zum Hodenſacke Zweige. Beim Weibe begleitet er das Ligamentum uteri rotundum zum Schaamberge.

Der Nervus cutaneus anterior externus, der vordere äußere Hautnerv des Schenkels entſpringt aus dem Communicationsſtrange des 2ten und 3ten Lendennerven oder noch mit einer 2ten Wurzel vom 2ten Lendennerven, d. h. von dem Verbindungsſtrange, durch den der 2te Lendennerv mit dem 1ſten zuſammenhängt. Er geht auf dem M. iliacus vorwärts und tritt unter der Spina anterior superior, d. h. unter dem äußerſten Theile des Poupartiſchen Bandes, zum Schenkel. Ein kleiner nach innen gehender Zweig vereinigt ihn nun hinter der Schenkelbinde mit dem mittleren vorderen Hautnerven. Er theilt ſich außerdem in mehrere Aeſte, von denen ſich einige äußerlich nach der hinteren Seite des Schenkels hinkrümmen, der längſte reicht vorn bis zur Haut in geringer Entfernung über der Knieſcheibe.

Digitized by Google

Ueberſicht über die Muskeln am Bauche, welche von den vorderen Aeſten der Lendennerven Zweige erhalten.

Von den vorderen Aeſten der Lendennerven erhalten unter den Seitenmuskeln der Psoas und Quadratus lumborum, unter den vorderen Muskeln nur der Cremaster und vielleicht der Obliquus internus und der Transversus in der Nähe ihres Zuſammenhangs mit dem Cremaster Zweige.

Kreuznerven.

Ihrer ſind, wo 5 Kreuzwirbel vorhanden ſind, 5 bis 6. Nach Bock findet man in der Regel 6 Kreuznerven auch da, wo nur 5 Kreuzwirbel vorhanden ſind.

Sie entſtehen, mit Ausnahme der 2 letztern Kreuznerven, welche durch den Hiatus canalis sacralis hervortreten, dicht neben einander von der unteren Anſchwellung des Rückenmarks. Die 2 letzten Nerven aber entſpringen von der Seite und von der Spitze des kugelförmigen Endes des Rückenmarkes. Der Spinalknoten liegt bei den Kreuznerven noch innerhalb des Kanales des Kreuzbeins. Der Theil der Wurzeln derſelben, welcher zwiſchen der Oberfläche des Rückenmarks und den Spinalknoten liegt, iſt bei ihnen länger als bei andern Rückenmarksnerven. Die vorderen Aeſte der 4 oberen Kreuznerven treten durch die vorderen, die hinteren durch die hinteren Oeffnungen des Kreuzbeins heraus, die 2 letzten Kreuznerven treten nicht durch die Foramina sacralia, ſondern durch die Lücke, welche zwiſchen den Hörnern des Schwanz- und Kreuzbeins hinten übrig bleibt, hervor, und haben keine Knoten.

Die vorderen Aeſte.

Die vorderen Aeſte nehmen vom 1ſten, noch mehr aber vom 2ten Kreuznerven an ſehr an Dicke ab, und nachdem ſie durch die vorderen Sacrallöcher hervorgetreten ſind, verbinden ſie ſich gewöhnlich durch 2 kurze Zweige mit den Kreuzknoten des ſympathiſchen Nerven.

Kleine Aeſte der 3 oberen Kreuznerven gehen zu dem M. piriformis, andere (2 bis 4) kleine Zweige kommen vom 3ten und 4ten Kreuznerven zu dem Maſtdarme, zu dem Halſe der Harnblaſe und zu dem Plexus hypogastricus des N. sympathicus, und beim Weibe außerdem noch zur Scheide. Sie bilden namentlich die mittleren Maſtdarmnerven und die unteren Harnblaſennerven. Manche Fäden gelangen zu dieſen Theilen, ohne durch Ganglien des

Digitized by Google

sympathischen Nerven hindurchgegangen zu sein. Die vorderen Aeste des 3ten und 4ten Lendennerven und alle Kreuznerven sind unter einander durch Verbindungsstränge vereinigt; aus den sich verflechtenden Bündeln dieser Stränge und aus der Fortsetzung der vorderen Aeste selbst entsteht der Plexus ischiadicus oder sacralis. Er geht durch die Incisura ischiadica major hinten hervor.

Aus dem 4ten Kreuznerven und aus dem in den Plexus ischiadicus eingetretenen 3ten Kreuznerven entspringt der Nervus pudendus, der große Schaamnerv. Er liegt unter dem M. piriformis im unteren Theile der Incisura ischiadica major, geht durch diese Incisur aus der Höhle des kleinen Beckens hervor und durch die Incisura ischiadica minor, zwischen dem Ligamentum tuberoso-sacrum und spinoso-sacrum, zur Mittelfleischgegend (regio perinaei), d. h. zu der unteren Seite der fleischigen Wand, welche den Boden des kleinen Beckens bilden hilft.

Der untere Ast gehört den Muskeln und der Haut des Perinaeum, der Haut des Hodensackes und dem After an. Denn er giebt einen Zweig zum M. ischio-cavernosus, vereinigt sich mit dem von dem 3ten und 4ten Kreuznerven gegebenen unteren Mastdarmnerven. Einer von den von ihm entsprungenen Hautnerven der Regio perinaei vereiniget sich mit dem vom N. ischiadicus gegebenen gemeinschaftlichen Hautnerven des Oberschenkels.

Mehrere tiefere Zweige geben Aeste zum M. sphincter ani externus, M. transversus perinaei superficialis und profundus, beim Manne zum M. bulbocavernosus, zur Harnröhre und zum hinteren Theile des Hodensackes, beim Weibe zu dem Constrictor cunni, zu dem vordersten Theile der Scheide, zur äußeren und inneren Schaamlippe und sogar bis an den Schaamberg, und vereinigen sich auch mit den gemeinschaftlichen Hautnerven des Oberschenkels.

Der obere Ast ist der Nervus dorsalis penis oder clitoridis. Er geht in einem Bogen dicht am M. obturator internus und an der inneren Seite des Sitz- und Schaambeins zur Schaambeinvereinigung, und neben dem Aufhängebande des Penis oder der Clitoris zum Rücken des Gliedes. Die größten und längsten Zweige desselben gehen zu beiden Seiten neben der V. dorsalis penis auf der sehnigen Haut des Corpus cavernosum bis zur Eichel und endigen sich in der Haut derselben.

Andere kleinere Zweige umgeben die Vena dorsalis penis, noch andere gehen zur Haut. Viele dringen auch durch die fibröse Haut in die Corpora cavernosa penis ein [1]).

Der Nervus dorsalis clitoridis verhält sich ziemlich ebenso, wie der des Penis. Aber er ist viel kleiner.

---

[1]) Vorzüglich gut abgebildet sind diese Nerven von Langenbeck, icones anat. Neurolog. Tab. IX — XII. An einigen Stellen dieser Abbildungen scheinen sich die Aeste des N. dorsalis penis der rechten und der linken Seite unter einander zu vereinigen. Nach den Untersuchungen von Bock aber findet eine solche Vereinigung bei Nervenfäden, die noch deutlich sichtbar sind, nicht Statt.

Hintere Aeste.

Die hinteren Aeste der Kreuznerven sind bei weitem kleiner als die vorderen. Sie vereinigen sich meistentheils unter einander und mit den unteren Lendennerven durch Verbindungszweige. Aus diesen Verbindungen entspringen Aeste für die Haut des Gesäßes.

Nerven des Schenkels.

Aus dem Lenden- und Kreuzgeflechte entspringen 3 Nerven für den Schenkel. Der unter dem Ligamentum Poupartii weggehende Schenkelnerv, N. cruralis, liegt vorn, der durch das Foramen obturatorium hindurchgehende Hüftlochnerv, N. obturatorius, verzweigt sich in der Mitte zwischen dem oberen Theile der Schenkelmuskeln, der durch den Hüftausschnitt, incisura ischiadica major, hindurchgehende Hüftnerv, N. ischiadicus, liegt am Schenkel hinten.

Der N. cruralis und obturatorius gehen nicht zu Muskeln, die am Unterschenkel, sondern nur zu denen, die am Oberschenkel liegen. Der N. cruralis nämlich geht zu den Muskeln, welche den Unterschenkel und den Oberschenkel nach vorn ziehen und heben, (Psoas, Iliacus, Pectinaeus, Sartorius, Rectus, Cruralis, Vastus externus und internus), der N. obturatorius zu den Muskeln, die den Schenkel nach innen ziehen und erheben (Adductores und Gracilis) außerdem aber zu dem M. obturator externus.

Der N. ischiadicus nebst den kleinen aus dem Plexus ischiadicus entspringenden Nerven geht sowohl zu Muskeln des Oberschenkels als zu denen des Unterschenkels, und zwar zu denjenigen Muskeln des Oberschenkels, welche ihn nach hinten ziehen und erheben, und zu denen, welche ihn rollen (um die Längenaxe drehen). Diese Angabe der Vertheilung trifft völlig zu, mit der einzigen Ausnahme, daß der M. obturator externus von dem N. obturatorius und der hintere Theil des Adductor magnus vom N. ischiadicus Zweige erhält.

Der Schenkelnerv.

Der Schenkelnerv, Nervus cruralis, wird von Bündeln zusammengesetzt, die vom 1sten bis zum 4ten Lendennerven ihren Ursprung

Digitized by Google

nehmen. Die Verbindungsstränge zwischen den Lendennerven werden nämlich bis zum 4ten Lendennerven immer dicker, an diesem entspringt der N. cruralis, und nimmt einen großen Theil der Bündel auf, aus welchen der Verbindungsstrang zwischen dem 3ten und 4ten Lendennerven besteht. Daher ist der Verbindungsstrang, der den 5ten und 4ten Lendennerven verbindet, viel dünner, als der zwischen dem 4ten und 3ten Lendennerven. Gewöhnlich gehen seine Bündel in einen Nerven vereinigt zwischen dem M. psoas und dem Iliacus internus hervor, zuweilen wird er jedoch in 2 Fascikel gespalten, welche sich unter dem Ligamentum Poupartii wieder vereinigen.

Er geht in einer Rinne des M. iliacus und von der Aponeurose desselben bedeckt, und durch diese von der A. cruralis geschieden unter dem Poupartischen Bande durch den Schenkelring herab, und liegt hier neben der Arterie nach außen. Auf diesem Wege giebt er etwa 2 innere vordere Hautnerven, von welchen sich der eine bis an die innere Seite des Knies, erstreckt und sich bisweilen daselbst mit dem N. saphenus und mit dem langen Hautzweige des N. ischiadicus verbindet. Auch schickt er einen oder einige Nerven zur A. cruralis.

Die auf diesem Wege vom N. cruralis entspringenden Muskelzweige gehören dem M. psoas, iliacus und dem pectinaeus. Hierauf theilt sich der N. cruralis in einen vorderen und in einen hinteren Zweig.

Der hintere Zweig gehört allen den Muskeln an, deren gemeinschaftliche Sehne über die Kniescheibe weggeht, dem M. rectus, cruralis, vastus externus, vastus internus und subcruraeus. Zugleich gelangt ein, zwischen diesen Muskeln hingehender, Nervenfaden zur Kapsel des Knies, und ein wichtiger, nachher zu beschreibender Hautnerv, der Nervus saphenus, geht an der inneren Seite des Knies vorbei.

Der vordere Zweig des Schenkelnerven giebt dem vorderen mittleren Hautnerven des Oberschenkels und dem Sartorius Aeste. Dieser Hautnerv geht in 2 Zweige gespalten durch den Sartorius hindurch zur Haut, von der Mitte des Schenkels an bis zur inneren Seite des Knies. Er verbindet sich oben oft mit einem Aste des N. spermaticus externus.

Der Nervus saphenus, der große innere Hautnerv des Schenkels, ist meistens die Fortsetzung des hinteren Zweiges des Schenkelnerven, geht an der äußeren Seite der A. cruralis herab. Wo diese durch den M. adductor magnus in die Kniekehle tritt, verläßt er sie, und giebt einen Hautast, der sich zuweilen mit einem Aste des N. obturatorius vereinigt und um den Sartorius herum zur inneren Seite des Knies begiebt. Der Sartorius erhält hier oft selbst einen Zweig. Die Fortsetzung desselben geht hinter dem Sartorius, zuweilen durch ihn

Digitized by Google

hindurch, an der inneren Seite des Unterschenkels und an der Vena saphena herab, und verbreitet sich in der vor dem Schienbeine und in der an der inneren Seite der Wade gelegenen Haut, und reicht bis zur Haut am inneren Knöchel und bis zur inneren Seite des Fußrückens herab.

Der Hüftlochnerv.

Der Hüftlochnerv, nervus obturatorius, geht auch vom 4ten, oder vom 4ten und 3ten Lendennerven ab, nimmt aber auch aus den die Lendennerven verbindenden Verbindungssträngen Fäden auf, so daß man annehmen kann, er entspringe vom 2ten, 3ten und 4ten Lendennerven. Er geht hinter dem M. psoas und mit der A. und V. obturatoria unter der Linea arcuata des Beckens zum Hüftloche hin. Durch die oben befindliche Lücke des Ligamentum obturatorium.

Er giebt einen Ast zum M. obturator externus, und theilt sich in einen vorderen, für den M. adductor brevis und longus, und für den M. gracilis bestimmten Ast, der auch noch einen zwischen den beiden Anziehern hervortretenden Hautzweig für die Haut des Oberschenkels, und, wenn er sehr lang ist, auch für die innere Seite des Unterschenkels abgiebt, und in einen hinteren Zweig. Dieser dringt durch die obere Portion des M. obturator externus, giebt ihr Zweige, und gehört ganz dem Adductor magnus an.

Kleinere Nerven des Hüftgeflechtes.

Aus diesem Geflechte, welches durch die Vereinigung des vorderen Astes des 4ten und 5ten Lendennerven, sowie auch aus dem der 3 oberen Kreuznerven gebildet wird, entspringen folgende kleinere Nerven:

Der obere Gesäßnerv, N. glutaeus superior, geht über dem M. piriformis zur Incisura ischiadica major aus dem Becken hervor, schickt dem Piriformis, den 3 Musculis glutaeis und dem M. tensor fasciae Aeste, giebt ferner den unteren Gesäßnerven, Nervus glutaeus inferior, der meistens unter dem Piriformis (zuweilen über ihm) aus der Incisura ischiadica major hervorgeht und dem M. glutaeus magnus angehört. Zuweilen verbindet er sich mittelst eines tiefen Zweigs mit dem N. ischiadicus, oder mit dem gemeinschaftlichen Hautnerven des Oberschenkels, oder mit beiden zugleich.

Digitized by Google

Endlich entspringt aus dem Plexus ischiadicus der große hintere Hautnerv des Oberschenkels, welcher mit 2 bis 3 Wurzeln aus dem Plexus ischiadicus anfängt, mit der A. ischiadica an der inneren Fläche des Glutaeus maximus zur Gegend des Tuber ischii und des Trochanter major herabsteigt, und Hautäste zum Gesäße giebt, welche sich um den unteren Rand des M. glutaeus maximus aufwärts herumschlagen. Ein oder 2 Hautzweige desselben kommen unter dem M. glutaeus hervor, und schlagen sich unter dem Sitzhöcker auf der Schenkelbinde nach innen zur Haut des Dammes des Hodensackes, beim Weibe bis zur äußeren Schaamlippe und bis an den Mons Veneris. Ein Aestchen derselben verbindet sich mit dem N. pudendus. Zwei bis 3 kürzere und 1 langer Zweig kommen unter dem M. glutaeus maximus hervor, und gehen am Oberschenkel herab. Der längste Zweig (die Fortsetzung des Stammes) steigt auf der Mitte der hinteren Oberfläche des Schenkels, auf der Schenkelbinde meistens bis zur Kniekehle und weiter, zuweilen bis unter die Wade, herab, und giebt rechts und links Zweige zur Haut. Wenn dieser Nerv sehr lang ist, so ersetzt er oft den mittleren Hautnerven des Unterschenkels.

Nervus ischiadicus, der Hüftnerv.

Der Hüftnerv, der größte Nerv des ganzen Körpers, ist die Fortsetzung des Plexus ischiadicus. Seine Nervenfäden rühren vorzüglich von den 2 letzten Lendennerven und von den 3 ersten Kreuznerven her.

Er kommt unter dem M. piriformis hervor, geht dann zwischen den Musculis gemellis, dem Quadratus femoris und dem M. glutaeus maximus in dem Zwischenraume zwischen dem Tuber ischii und Trochanter major herab, wird dann vom langen Kopfe des M. biceps von hinten her bedeckt, und gelangt endlich zwischen dem M. biceps und dem M. semitendinosus und semimembranosus in den obersten Theil der Kniekehle, und theilt sich daselbst bald höher oben, bald tiefer unten in den kleineren Ast, den Wadenbeinnerven, N. peronaeus, und in den größeren Ast, den Schienbeinnerven, N. tibialis. Genau genommen ist er immer schon hoch oben nahe an der Incisura ischiadica gespalten, aber die beiden genannten Aeste liegen eine nicht unbeträchtliche Strecke hindurch durch lockeres Zellgewebe mit einander verbunden.

Der Wadenbeinnerv ist für die Haut an der vorderen Seite des Unterschenkels und am Fußrücken, und für die Muskeln, welche vorn in

dem Zwiſchenraume zwiſchen der Tibia und der Fibula und am Fußrücken liegen, beſtimmt. Er geht aber nicht wie die A. tibialis antica, die die nämliche Beſtimmung hat, zwiſchen der Tibia und der Fibula durch das Ligamentum interosseum von der hinteren Seite auf die vordere Seite des Unterſchenkels über, ſondern äußerlich um das Wadenbein herum.

Der Schienbeinnerve iſt dem hinteren Theile des Unterſchenkels und der Fußſohle beſtimmt, zu der er unter dem Malleolus internus übergeht.

Auf dem oben beſchriebenen Wege des N. ischiadicus erhält der M. obturator internus einen kleineren, die Musculi gemini, der Quadratus femoris einen größeren gemeinſchaftlichen Zweig. Dieſe Aeſte nehmen jedoch zuweilen nicht vom Stamme des Nerven, ſondern von dem Plexus ischiadicus ihren Anfang. Der N. ischiadicus iſt auf dieſe oder auf jene Weiſe mit dem N. glutaeus inferior, oder mit dem hinteren Hautnerven verbunden, ſchickt hierauf kurze Zweige zum langen Kopfe des M. biceps, und einen langen Zweig zum M. semimembranosus, semitendinosus und adductor magnus, einen gleichfalls langen Zweig zum langen Kopfe des Biceps, und endlich einen Zweig zum kurzen Kopfe deſſelben.

Der Wadenbeinnerv.

Der Wadenbeinnerv, Nervus peronaeus s. poplitaeus externus, iſt der äußere Aſt des N. ischiadicus, lenkt ſich im Hinabgehen auswärts gegen den Condylus externus des Schenkelbeins, giebt einen Aſt zum kurzen Kopfe des M. biceps, und einen Hautnerven, den ſogenannten Ramus communicans.

Dieſer Ramus communicans geht hinter dem kurzen Kopfe des M. biceps, dann hinter dem Condylus externus des Schenkels, und hinter dem äußern Kopfe des M. gastrocnemius hinab, und verbindet ſich meiſtens tiefer unten oder höher oben, oder an beiden Stellen mit dem Ramus communicans des N. tibialis; giebt Aeſte der Haut, welche die Achillesflechſe deckt, lenkt ſich dann auf den äußern Theil des Rückens des Fußes und vertheilt ſich in der Haut. Ein zur Mitte der hinteren Seite des Unterſchenkels gehender Hautzweig, der von ihm zuweilen entſpringt, kommt auch oft vom N. peronaeus ſelbſt, oder vom N. tibialis. Er giebt dicht über dem Kopfe des Wadenbeins einen Aſt zum M. peronaeus longus und zur Kapſel des Wadenbeins.

Der Stamm des Nervus peronaeus lenkt ſich um das Wadenbein äußerlich herum, bringt nun in den M. peronaeus longus ein, und theilt ſich zugleich in einen Ramus profundus und superficialis.

Der oberflächliche Aſt oder der Hautaſt, ramus superficialis, durchbohrt den M. peronaeus longus vollends, geht an der äußern Seite

Digitized by Google

des Kniegelenks und des Unterschenkels, von der flechsigen Scheide eingeschlossen, hinab, durchbohrt dieselbe hierauf, geht in der Haut vor den Flechsen des Extensor pollicis longus und des Extensor digitorum communis longus auf den Rücken des Fußes und theilt sich über dem Fußgelenke in 2 Aeste, in den mittleren und in den inneren Fußrückennerven. Durch eine abermalige Theilung jener 2 Aeste entstehen in der Regel 4 Zweige, welche zu den Zwischenräumen der Zehen hingehen. Jeder theilt sich für die einander zugekehrten Ränder je zweier Zehen in 2 Nerven, welche an den Rändern der Zehen hingehen und Nervi digitales dorsales heißen. Außer diesen werden mehrere Aeste zur Haut des Fußrückens abgegeben. Sehr oft verbindet sich der äußere Ast (oder der mittlere Fußrückennerv) mit dem N. communicans tibialis et fibularis (dem äußeren Fußrückennerven).

Der tiefe Ast, ramus profundus, giebt erst Aeste zum M. tibialis anticus ꝛc., geht dann zwischen diesem Muskel und dem Extensor digitorum communis, hierauf zwischen ihm und dem Extensor hallucis longus mit der A. tibialis antica vor dem Ligamentum interosseum hinab, giebt Aeste dem M. tibialis anticus, Extensor digitorum longus und Extensor pollicis longus; kommt unter der Flechse dieses letzteren hervor auf den Rücken des Fußes, giebt Aeste den Extensoribus brevibus, den Musculis interosseis dorsalibus, geht unter dem Extensor pollicis brevis durch, zwischen den Mittelfußknochen der großen und zweiten Zehe vorwärts, und verbindet sich so mit dem inneren Aste des Ramus superficialis, so daß der Ramus dorsalis externus pollicis der großen, und der dorsalis internus digiti secundi mehr ihm, als dem Aste des Ramus superficialis gehören. Seltener werden die Zehennerven bis zur inneren Seite der 3ten Zehe vom Ramus profundus des N. peronaeus gegeben. Der äußere Nerv für die kleine Zehe entsteht aus dem Ramus communicans des N. tibialis und N. peronaeus. Bisweilen giebt auch dieser Zweig mehrere Zehennerven, die in der Regel vom Peronaeus entspringen.

Der Schienbeinnerv.

Der Schienbeinnerv ist der innere stärkere Ast des Hüftnerven, welcher in der geraden Richtung des Stammes an der hinteren Seite der Kniekehlengefäße durch das Fett der Kniekehle herabgeht.

Bisweilen giebt er noch über der Kniekehle den mittleren Hautnerven des Unterschenkels, welcher gewöhnlich ein Ast des N. peronaeus ist, oder auch ganz fehlt, wenn er nämlich durch den Endzweig des gemeinschaftlichen Hautnerven des Oberschenkels ersetzt wird.

Digitized by Google

Hierauf entspringt aus dem N. tibialis gewöhnlich der **lange Hautnerv des Unterschenkels und Fußes**, den man auch Ramus communicans tibialis nennt, weil er sich mit einem ähnlichen, vom N. peronaeus entspringenden Hautnerven zu verbinden pflegt. Dieser lenkt sich in der Kniekehle vor die MM. gastrocnemios, geht unter der Fascia bis zur Achillessehne herab, durchbohrt die Fascia hier oder zuweilen auch schon höher oben, und vereinigt sich in der Regel hier, oder auch schon höher oben, oder an beiden Stellen mit dem Ramus communicans des N. peronaeus, und hilft dadurch den äußeren Fußrückennerven, N. externus dorsi pedis, mit bilden. Bisweilen bildet er allein den **äußeren Fußrückennerven** und ist nur durch einen kleinen Zweig mit dem N. peronaeus verbunden. Der äußere Fußrückennerv geht am äußeren Rande der Achillessehne und unter dem äußeren Knöchel neben der V. saphena parva nach vorn, giebt verschiedene Zweige, welche sich unter dem äußeren Knöchel zur Haut des Fußrückens und der Ferse begeben. Dann theilt er sich in einen **inneren Ast**, welcher sich mit dem **mittleren Fußrückennerven** (aus dem N. peronaeus) vereinigt. Aus dem hierdurch entstehenden Nerven kommen die Aeste, die zu den einander zugekehrten Rändern der 3ten und 4ten, und der 4ten und 5ten Zehe gelangen. Zuweilen ist er sehr dick, und vertritt allein die Stelle des mittleren Fußrückennerven, zuweilen fehlt dagegen der innere Ast des äußeren Fußrückennerven, und jene Zehennerven kommen vom N. peronaeus. **Der äußere Ast des äußeren Fußrückennerven**, welcher gewöhnlich etwas stärker ist, geht am äußeren Rande des Fußrückens vorwärts, giebt kleine Hautzweige und endigt sich an der kleinen Zehe als äußerer Rückennerv derselben. Zuweilen aber kommen aus der Verbindung des äußeren und des mittleren Fußrückennerven nur die Nerven für die einander zugekehrten Ränder der 5ten und der 4ten Zehe.

Der **Schienbeinnerv** giebt in der Kniekehle 2 oder mehrere dicke Aeste für die 2 MM. gastrocnemios, einen für den M. soleus, einen für den M. plantaris, und für den M. poplitaeus, von welchem letzteren ein Faden zur Tibialarterie überzugehen pflegt. Zarte Zweige, welche aus einigen von diesen Aesten, oder vom Stamme unmittelbar entspringen, kommen unter andern mit der mittleren und mit der oberen inneren Gelenkarterie zur Kapsel des Knies. Der Stamm des N. tibialis liegt nun zwischen dem unteren Rande des M. poplitaeus und dem Soleus, geht dann dicht an der hinteren Tibialarterie zwischen dem M. soleus, dem Flexor longus hallucis und dem Tibialis posticus, denen er meistens schon höher oben Nervenzweige gegeben hat, zur inneren Kapsel herab zwischen dem Knöchel und dem M. soleus wird er nur von der Fascia bedeckt. Noch ehe er zum Knöchel kommt, gehen Hautzweige zur inneren Seite der Ferse und zum Hohlfuße, die der Zahl und Größe nach verschieden sind. Je weniger es sind, desto größer

Digitized by Google

ſind ſie. Zuweilen iſt es ein ziemlich großer Sohlennerv, welcher hier entſpringt; von welchem auch zuweilen der Abductor hallucis einen Aſt bekommt.

Indem der Tibialnerv über dem Abductor hallucis in die Fußſohle zu treten im Begriffe iſt, theilt er ſich in einen dünneren Aſt, den äußeren, und in einen dickeren Aſt, den inneren Sohlennerven.

Der innere Sohlennerv, N. plantaris internus, geht über dem M. abductor hallucis, und dann zwiſchen ihm und dem M. flexor digitorum brevis vorwärts, giebt ihnen Zweige und theilt ſich in einen inneren Aſt, der am inneren Rande der Fußſohle und der großen Zehe fortgeht, und dem Abductor und Flexor brevis hallucis Aeſte, zum Zehengelenke ein Fädchen, vorzüglich aber der Haut Zweige giebt. Der äußere Aſt des inneren Sohlennerven ſpaltet ſich auch wiederholt in Zweige und ſchickt den Lumbricalmuskeln und den einander zugewendeten Rändern der großen und der 2ten, der 2ten und der 3ten, der 3ten und der 4ten Zehe Nervenzweige, die zwiſchen den Schenkeln der Aponeurosis plantaris und den Sehnen der Beugemuskeln zur Haut übergehen.

Der äußere Sohlennerv, N. plantaris externus, wendet ſich gegen den äußeren Fußrand, giebt der Caro quadrata, dem Abductor digiti minimi und dem Flexor digitorum brevis Zweige, geht zwiſchen den 2 letzteren Muskeln nach vorn und ſpaltet ſich in 2 Aeſte. Der oberflächliche Aſt deſſelben giebt der Fußſohle und den einander zugekehrten Rändern der 4ten und der 5ten Zehe, ſowie auch dem äußeren Rande der 5ten Zehe Zweige. Der tiefe Aſt begleitet den Arcus plantaris in die Tiefe und gehört dem M. flexor digiti minimi, dem Transversus und Adductor hallucis und den MM. interosseis an.

Zuweilen verbindet ſich der oberflächliche Zweig mit dem inneren Sohlennerven, wo dann die Nerven für die einander zugekehrten Ränder der 3ten und 4ten Zehe aus dem Aſte, der durch dieſe Vereinigung entſteht, hervorkommen.

Jede Zehe hat an ihren 2 Rändern einen dünnen Rücken-, und einen dicken Sohlennerven, der Sohlennerv derſelben giebt Zweige zur Rückenſeite hinüber, durch die er ſich mit den Rückennerven vereinigt. Aber in der Mittellinie der Zehen hängen weder die Sohlennerven, noch die Rückennerven der beiden Ränder der Zehen durch deutlich ſichtbare Anaſtomoſen zuſammen.

Ueberſicht über die Hautnerven des Schenkels.

Die vorderen Hautnerven des Schenkels, welche unter dem Ligamentum Poupartii hervorkommen und über der Fascia zur Haut gehen, ſind der N. cutaneus anterior externus, der größte unter ihnen, welcher dicht unter der Spina anterior superior ossis ilei zum Vorſchein kommt, und äußerlich bis zum Knie oder ſogar bis unter das Knie herabreicht. Außer ihm kommen etwa noch 3 andere kleinere Hautzweige unter dem Ligamentum Poupartii zur Haut, welche vom N. spermaticus externus entſpringen. Derjenige von ihnen, welcher dem Cutaneus

Digitized by Google

anterior am nächſten iſt, iſt oft ein Aſt von dieſem. Tiefer unten in einiger Entfernung vom Ligamentum Poupartii, in der Gegend des M. sartorius, liegt der mittlere Hautnerv, N. cutaneus anterior medius, ein Zweig des N. cruralis, und ein innerer Hautnerv des Oberſchenkels oder 2 vom N. cruralis.

Zur Haut des Geſäßes gehen von oben aus über die Crista ilei Zweige der vorderen Aeſte der Lendennerven herab, von hinten her Zweige der hinteren Aeſte der Kreuznerven, und von unten um den Glutaeus maximus herum, Aeſte des Plexus ischiadicus und des großen hinteren Hautnerven hinauf.

Hinten ſteigt an der Haut, welche den M. biceps und semitendinosus bedeckt, der große hintere Hautnerv bis zur Kniekehle herab, die Haut des Perinaei und der Geſchlechtsorgane erhält vom N. spermaticus externus (des 2ten Lendennerven) vom N. ileo-inguinalis und ileo-hypogastricus des 1ſten Lendennerven, Zweige, welche durch den Bauchring, oder zum Theil bisweilen durch die Sehnenhaut in der Nähe des Bauchrings zu der Haut der Geſchlechtstheile gehen. Hauptſächlich wird ſie aber vom N. pudendus mit Zweigen verſehen. Endlich bekommt ſie auch einige Zweige vom gemeinſchaftlichen hinteren Hautnerven des Schenkels aus dem Plexus ischiadicus.

An der äußeren Seite des Knies und nach hinten kommt in der Kniekehle neben dem M. biceps der N. communicans peronaei, an der inneren Seite deſſelben nach innen an dem M. semitendinosus der N. communicans tibialis zum Vorſchein. Beide laufen an der die M. gastrocnemios bedeckenden Haut herab. Zwiſchen ihnen liegt oft ein mittlerer Hautnerv für die hintere Seite des Unterſchenkels, der von dem N. peronaeus oder tibialis entſpringt.

Vorn an der inneren Seite des Knies dringt unter oder durch den Sartorius der N. saphenus, ein Aſt des N. cruralis, hervor, und läuft neben der V. saphena an der inneren Seite des Unterſchenkels herab.

Ungefähr in der Mitte des Unterſchenkels nach außen kommt der Ramus superficialis des N. peronaeus zum Vorſchein, und geht in 2 Zweige getheilt auf der Mitte der Beugeſeite des Fußgelenks zum Rücken des Fußes über.

Der Fußrücken erhält an ſeiner inneren Seite und in ſeiner Mitte Zweige von dieſen beiden Aeſten, an ſeinem äußeren Rande aber endigt ſich die Fortſetzung des N. communicans tibialis und peronaei.

Der hintere Theil der Fußſohle wird von kleinen Zweigen des Nervus tibialis, der übrige Theil derſelben vom N. plantaris externus und internus mit Zweigen verſehen.

Der ſympathiſche Nerv, Nervus sympathicus, oder das Ganglienſyſtem, Systema gangliosum.

An allen Rückenmarksnerven, mit Ausnahme des unterſten oder der 2 unterſten befinden ſich an der Stelle, wo ſie durch die Intervertebrallöcher hindurch dringen oder hindurch zu dringen im Begriffe ſtehen, und kurz vor der Stelle, wo ſich die vorderen und hinteren Wurzeln unter einander vereinigen, Nervenknoten, Ganglia spinalia.

Ein ähnlicher Knoten, Ganglion Gasseri, liegt an dem 5ten Gehirnnervenpaare, N. trigeminus, da, wo er im Begriffe iſt, aus dem Schädel herauszugehen, und ſeine kleine Wurzel an den 3ten Aſt der großen ſich anzuſchließen anfängt; ein ähnliches, nur ſehr ſelten fehlendes Knötchen, Ganglion petrosum, ſieht man an dem 9ten Hirn-

Digitized by Google

nervenpaare, N. glossopharyngeus, da, wo es durch das Foramen jugulare hervortritt, einen ähnlichen, ziemlich beſtändigen Knoten am 10ten Hirnnervenpaare, N. vagus, da, wo es noch im Foramen jugulare liegt, und ein wenig tiefer ein 2tes, da, wo der Nerv ſchon aus dem Foramen jugulare ausgetreten iſt. Hierher gehört auch vielleicht die Anſchwellung des N. facialis an ſeiner knieförmigen Beugung, da, wo er den Ramus superficialis des N. Vidianus aufnimmt.

Auch an einigen Aeſten der Gehirnnerven kommen Knoten vor. Das beſtändigſte unter ihnen, der Augenknoten, ganglion ophthalmicum, oder ciliare, nahe am unteren Aſte des 3ten Nervenpaars, N. oculi motorius, an der äußeren Seite des Sehnerven in der Augenhöhle, ferner das weniger beſtändige Ganglion sphenopalatinum am Ramus sphenopalatinus des 2ten Aſtes des Trigeminus in der Nähe der unteren Augenhöhlenſpalte, und das noch von Manchem in Zweifel gezogene Ganglion nasopalatinum im Foramen incisivum, endlich das häufig fehlende Ganglion submaxillare an den aus dem Zungenaſte des N. trigeminus in die Submaxillardrüſe eindringenden Fäden.

Die Nervenſtämme, oder die Nervenzweige, an welchen ſich dieſe Knoten befinden, und viele von den übrigen Nervenſtämmen, an welchen keine ſolche Knoten ſind, ſtehen durch Nervenfäden mit einer mittleren Reihe von Nervenknoten in Verbindung, welche zu beiden Seiten des Grundtheiles des Schädels und der Körper aller Wirbel der Wirbelſäule liegt, und hängen auf jeder Seite unter einander durch Nervenſtränge zuſammen, welche von einem Ganglion dieſer mittleren Reihe immer zu dem nächſten gehen, und bald dick, bald dünn, bald einfach, bald doppelt oder mehrfach ſind. Dieſe der Länge des Rumpfs nach und neben ſeinen Grundtheilen verlaufenden 2 Knotenſtränge nannte man ehemahls, und zum Theil thut man es noch, den Stamm des Nervus sympathicus, oder den Hauptſtrang oder den Grenzſtrang des ſympathiſchen Nerven.

Die von den Gehirn- und Rückenmarksnerven zu dieſem Knotenſtrange hinzutretenden Nervenfäden kommen, wie Scarpa, Wutzer und Andere gelehrt haben, theils von derjenigen Portion dieſer Nerven, die in ein Ganglion anſchwillt, theils aber auch von der, die an der Bildung der Knoten der 1ſten Reihe keinen Antheil nimmt, und folglich kommen ſowohl von den hinteren als von den vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven Fäden zu dem Stamme des ſympathiſchen Nerven, und dieſe Fäden vereinigen ſich gewöhnlich an einer ſolchen Stelle mit dieſem Knotenſtrange, an welcher ein Knoten liegt. Bisweilen geht indeſſen auch ein oder der andere dieſer Fäden in den zwiſchen 2 Knoten der mittleren Reihe gelegenen Verbindungsſtrang über, wo dann aber der hinzukommende Faden ſich vielleicht doch nur an jenen Strang anlegt, mit ihm zum nächſten Knoten geht, und ſich erſt da mit dem Hauptſtrange des ſympathiſchen Nerven innig verbindet.

Digitized by Google

Von diesem Hauptstrange des sympathischen Nerven gehen nun auch anderntheils Nervenfäden zu den am Halse, vorzüglich aber an der Brust und Bauchhöhle, zum Theil auch zu den neben der Bauchhöhle im Hodensacke gelegenen Absonderungs-, und der Willkühr entzogenen Bewegungsorganen, welche sich vielfach unter einander vereinigen, häufig den Arterien dieser Theile folgen und oft in eine 3te Classe von Nervenknoten eintreten, die ihrer Form, Zahl, Lage und Größe nach noch unbestimmter und veränderlicher sind als die 2te Reihe von Knoten, oder vollends als die 1ste Reihe derselben, und die sich dadurch auszeichnen, daß die größten und beständigsten nahe an oder in der mittleren Ebene liegen, durch welche man sich den Körper in eine rechte und linke Hälfte getheilt denken kann, und welche also oft selbst unpaar sind, oder wenigstens mit den Knoten und Geflechten des sympathischen Nerven der entgegengesetzten Seite in einer sehr nahen Verbindung stehen.

Auch diese Fäden gehen am häufigsten aus den Knoten des Hauptstranges. Seltener aus den die Knoten desselben verbindenden Strängen ab, und auch in diesem letzteren Falle stehen sie mit den Strängen, von welchen sie abgehen, in keiner so innigen Verbindung, als mit einem der nächsten Knoten; denn sie lassen sich deutlich in diesem Strange weiter bis zu einem benachbarten Knoten verfolgen, mit welchem sie aber dann inniger vereinigt sind.

Man darf daher nicht glauben, daß der Hauptstrang des sympathischen Nerven nur aus Fäden bestehe, die den Zweck hätten, die Verbindung der auf jeder Seite in einer Reihe liegenden Knoten der 2ten Classe zu bewirken, sondern er schließt auch an vielen Stellen Fäden ein, welche schon von diesen Knoten abgegeben worden sind, und zu gewissen absondernden, oder ohne Zuthun der Seele sich bewegenden Organen gehen, welche aber noch eine Zeit lang mit den die Verbindung der Knoten bewirkenden Fäden verbunden bleiben. Daher kommt es denn, daß der die Knoten verbindende Strang, wenn lange kein beträchtlicher Nerv zu jenen Organen abgegeben worden ist, von Knoten zu Knoten an Dicke zunimmt, weil nämlich nur scheinbar von den Knoten keine Fäden abgehen, indem die wirklich von ihnen abgehenden Fäden nur nicht sogleich sichtbar werden, weil sie eine Strecke hindurch mit dem Knotenstrange in Verbindung bleiben, und daher erklärt es sich auch, warum, wenn an einer Stelle von einem Knoten oder von einem Stücke des die Knoten verbindenden Stranges ein sehr dicker Nerv zu den oben näher bezeichneten Organen abgeht, immer der zu dem nächst tieferen Knoten gehende Verbindungsstrang plötzlich viel dünner wird.

Daß der Knotenstrang des sympathischen Nerven längs der Wirbelsäule liegt, scheint mit dem Zwecke zusammen zu hängen, daß alle Fä-

Digitized by Google

den der Rückenmarksnerven, welche zu den großen, in der mittleren Ebene des Körpers liegenden großen Blutgefäßen herüber gehen, auf ihn treffen und sich mit ihm durchkreuzen sollen.

Am Halse geht der Grenzstrang des sympathischen Nerven hinter der A. carotis vor dem Seitentheile der Körper der Halswirbel herab, in der Brusthöhle geht er von einem Rippenköpfchen zum andern herunter, im Bauche nähert er sich mehr der Mittellinie und dem der andern Seite und liegt vor den Körpern der Lendenwirbel; im kleinen Becken liegt er nach innen neben den vorderen Sacrallöchern, und zuweilen dicht an den daselbst hervortretenden Nervenstämmen. Nach unten nähert er sich dann der andern Seite sehr, und vereinigt sich endlich mit ihm auf dem Kreuz- und Steißbeine.

Die in diesem Strange liegenden Knoten, und die die Knoten unter einander verbindenden Fäden der rechten und der linken Seite hängen nur an dieser letzteren Stelle durch bogenförmige, quer über die Mittellinie des Körpers weggehende Fäden unter einander zusammen. An andern Stellen wird dieser Zusammenhang durch Nerven bewirkt, welche abwärts zu den Organen abgehen und sich in der Mittellinie in Geflechten oder Knoten vereinigen. Auf der vorderen Seite des Schwanzbeins kommen die Knotenstränge beider Seiten in einem sehr kleinen, zuweilen kaum bemerklichen Knoten, dem Steißbeinknoten, Ganglion coccygeum, zusammen. Eine solche Vereinigung der beiden Knotenstränge ist am andern Ende derselben in der Nähe des Gehirns noch nicht nachgewiesen. Man hat von dieser Vereinigung des rechten und des linken Knotenstranges des sympathischen Nerven auf dem Schwanzbeine durch das Ganglion coccygeum häufig eine zu große Wirkung hinsichtlich der Vereinigung beider Seitentheile des sympathischen Nerven erwartet. Beide Knotenstränge vereinigen sich, wie gesagt, schon vorher auf dem Kreuzbeine so innig durch Querfäden, und hängen auch höher oben durch die der mittleren Ebene des Körpers zunächstliegenden Knoten und Geflechte so genau zusammen, daß derselbe Zusammenhang beider Seitentheile des sympathischen Nerven weit vollkommener höher oben als da unten geschieht.

Die Knoten des Knotenstranges entsprechen im Allgemeinen der Größe und Zahl der Gehirn- und Rückenmarksnervenfäden, mit welchen sie in Verbindung stehen. Am Halse, wo auf 8 Halsnerven und mehrere Gehirnnerven nur 2 bis 3 Halsknoten, Ganglia cervicalia kommen, sind 2 Knoten, die mit vielen Nerven in Verbindung stehen, das Ganglion cervicale supremum und bisweilen das Infimum vorzüglich groß. Dasselbe ist auch bei dem Ganglion thoracicum primum der Fall, welches auch meistens von mehreren Halsnerven mit Fäden ver-

Digitized by Google

sehen wird. Die übrigen Knoten des Knotenstranges in der Bru ganglia thoracica, von welchen immer eines auf einen Rückenmarksnerven kommt, sind kleiner. Die Lendennerven, ganglia lumbalia, sind dann sehr groß, wenn nicht ihrer 5, sondern wenigere sind, wenn nämlich hier und da 2 Knoten zu einem vereinigt sind. Die Größe der Nervenknoten des Knotenstrangs stimmt aber nicht mit der Größe der Rückenmarksnerven überein. Mehrere Kreuzknoten, ganglia sacralia, sind ziemlich klein, ungeachtet die Nerven groß sind, von welchen die zu den Knoten gehenden Fäden ausgehen.

Die Größe der Knoten stimmt aber im Allgemeinen ungefähr mit der Größe der Fäden überein, welche von ihnen zu den Organen abgegeben werden, wenn man nämlich auch die Fäden berücksichtigt, welche den Knotenstrang noch ein Stück begleiten.

Die ganze Abtheilung des Nervensystems, welcher man den Namen des sympathischen Nerven oder der organischen, der vegetativen Abtheilung des Nervensystems beilegt, hat unter Andern offenbar den Zweck, viele aus dem Gehirne und Rückenmarke gekommene, zum Theile in die Knoten der Gehirn- und Rückenmarknerven nicht eingetretene, zum Theil aber auch durch diese Knoten getretene Nervenfäden unter einander zu verbinden, und sie in die Knoten der 2ten Klasse (in die Knoten des Knotenstranges des sympathischen Nerven) aufzunehmen, und von diesen Knoten aus, Nervengeflechte abzuleiten, welche sich in der mittleren Ebene, durch welche man sich den Körper in eine rechte und linke Hälfte getheilt denken kann, auf das innigste vereinigen, und gewisse, dem Einflusse der Seele entzogene Organe mit Nervenfäden zu versehen. Alle Nervenknoten, sowohl die an den Stämmen der Gehirn- und Rückenmarknerven befindlichen, als auch die übrigen scheinen durch die Fäden des sympathischen Nerven unter einander zusammen zu hängen, und es scheint kein Ganglion zu existiren, zu welchem nicht auf eine entweder mehr offenbare oder auch mehr verborgene Weise Nervenfäden des sympathischen Nerven gelangten.

Der Nervus sympathicus, und ganz vorzüglich seine Knoten sind bei dem Embryo verhältnißmäßig sehr groß. Schon J. F. Meckel [1]) beobachtete bei einem vom Scheitel bis zum Steißbeine 3½ Zoll langen menschlichen Embryo, daß unter den Nerven der N. vagus und die Ganglien des N. sympathicus vorzüglich durch ihre Größe auffielen. Das erste Ganglion war fast 2 Linien lang, eine breit, und über ¼ Linie dick. In demselben Verhältnisse waren die durch die Verbindung des Intercostalnerven mit den Rückennerven entstehenden Ganglien gleichfalls sehr groß, so daß mehrere einander unmittelbar berührten. Der Zwerchfellnerv und die Nerven der Extremitäten waren dagegen nicht auf-

[1]) *J. F. Meckel*, Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie der Physiologie. Halle 1806.

fallend groß. Dieselbe Bemerkung machte neuerlich Joh. Fr. Lobstein [1]). Auch er fand, daß die Ganglien sehr groß waren und in der Brusthöhle einander sehr nahe standen. Bei einem 3 Zoll langen Embryo war das Ganglion cervicale supremum 2½ Lin. lang. Bei einem 5monatlichen, 6 Zoll langen Embryo war das Ganglion cervicale supremum weniger platt als bei Erwachsenen, und 3 Linien lang und 1 Linie dick. Das Ganglion coeliacum werde von ihm bei einem andern, 3 Pfund schweren Embryo von 7 Monaten, 1 und 1 Linie im Durchmesser gefunden.

Man kann den Knotenstrang des sympathischen Nerven in den am Kopfe (pars cephalica), am Halse (pars cervicalis), in der Brusthöhle (pars thoracica), in der Bauchhöhle (pars lumbalis), und in der Beckenhöhle (pars sacralis) gelegenen Theil eintheilen, und an allen diesen Stellen die die Knoten unter einander verbindenden Verbindungsfäden, die von dem Gehirn und Rückenmark zu ihnen hinzutretenden äußeren Nervenfäden, und endlich die von ihnen zu den dem Einflusse der Seele entzogenen Organen abgegebenen, der mittleren Ebene des Körpers sich nähernden inneren Nervenfäden unterscheiden.

Der am Kopfe gelegene Theil des sympathischen Nerven, Pars cephalica nervi sympathici [2]).

So nennt man diejenige Fortsetzung des Nervus sympathicus, welche sich vom obersten Halsknoten, ganglion cervicale supremum aus, durch den Canalis caroticus, oder auf anderen Wegen in die Schädelhöhle begiebt, und sich daselbst mit noch mehreren Gehirnnerven vereinigt und auch daselbst zu gewissen Organen Fäden schickt. Der zum Kopfe aufsteigende Strang des sympathischen Nerven vereinigt sich nämlich mit mehreren Gehirnnerven auf eine sehr offenbare und sich sehr gleichbleibende Weise.

1) Namentlich vereinigt er sich durch einen von dem oberen Ende des Ganglion cervicale supremum ausgehenden, in dem Canalis caroticus emporsteigenden Strang, welcher sich in 2, theils vor, theils hinter der Carotis gelegene Fäden spaltet, mit dem Ganglion sphenopalatinum des 5ten Nervenpaars, und an der Seite des Türkensattels mit dem 6ten Nervenpaare. (Diese Verbindung betrachtete man ehemals als den Ursprung des Knotenstranges des sympathischen Nerven,

---

[1]) *Joh. Frid. Lobstein*, de nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis, commentatio anatomico-pathologica, Tabulis aen. et lithogr. illustrata. Parisiis 1823. 4. p. 47 cap. III. De nervi sympathetici in foetu evolutione.

[2]) *Hard. Wilh. Taube*, Diss. inaug. de vera nervi intercostalis origine, praes. Hallero. Goettingae 1743, enthält die Geschichte der Entdeckungen über den obersten Theil des sympathischen Nerven bis auf *Haller*.

Leonhard Hirzel, Untersuchungen über die Verbindungen des sympathischen Nerven mit den Hörnerven; in Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie B. I. 1824. p. 197—236. und *F. Arnold*, der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen. Heidelberg 1831. 4. haben die Geschichte dieses Nerven bis auf die neueste Zeit fortgesetzt.

Digitized by Google

und sah den Theil des Vidischen Nerven, Ramus profundus N. Vidiani, welcher hier vom Ganglion cervicale supremum als zum Ganglion sphenopalatinum gehend, beschrieben worden ist, als von diesem letzteren abgehend und zum Ganglion cervicale supremum kommend an). Obgleich diese Verbindung des Ganglion cervicale supremum nicht leicht fehlt, so ist doch die Zahl der Nervenfäden, welche zum 6ten Paare gehen, und die Ordnung, in welcher sie mit dem Vidischen Nerven zusammenstoßen, nicht immer dieselbe.

Nimmt man hypothetisch an, daß der vom Ganglion sphenopalatinum oder in dessen Nähe ausgehende, im Foramen incisivum sich von beiden Seiten her vereinigende N. nasopalatinus Scarpae Fäden enthalte, welche zum Theil eine Fortsetzung jenes Ramus profundus Nervi Vidiani sind, so kann auch dieser Nerv als eine weitere Fortsetzung des Grenzstranges des Nervus sympathicus angesehen werden, und man hat dann den N. nasopalatinus als eine Anstalt zu betrachten, durch welche der Knotenstrang der rechten und der linken Seite sich auch im Kopfe unter einander verbinden; denn bekanntlich vereinigen sich beide Nervi nasopalatini im Foramen incisivum, und also in der Mittellinie des Körpers unter einander. Diese Ansicht, den Ramus profundus N. Vidiani und den N. nasopalatinus als eine Fortsetzung des Knotenstrangs des N. sympathicus anzusehen, hat unter Andern aus dem Grunde viel für sich, weil, wie neuerlich Bock gezeigt hat, die Gehirn- und Rückenmarksnerven (den N. vagus abgerechnet) sich nicht in der mittleren Ebene des Körpers von beiden Seiten her durch deutlich sichtbare Zweige vereinigen, selbst da nicht, wo große Nerven einander an dieser Ebene sehr nachkommen, wie an der Zunge und am Penis. Der N. nasopalatinus würde demnach eine auffallende Ausnahme bilden, wäre er nicht als ein Theil des N. sympathicus anzusehen, dessen Eigenthümlichkeit unter Anderen gerade darin besteht, daß sich seine Aeste an vielen Stellen in der mittleren Ebene auf eine sehr offenbare Weise unter einander vereinigen, woher es denn auch zu rühren scheint, daß bei der halbseitigen Lähmung wohl zuweilen der halbe Mund und die halbe Zunge ihre Bewegung oder Empfindung verliert, nicht aber das halbe Herz oder der halbe Darmcanal. Uebrigens unterscheidet sich auch der Ramus profundus des N. Vidianus vom Ramus superficialis desselben durch die röthliche Farbe, welche an vielen Fäden des sympathischen Nerven so auffallend ist, daher man auch aus diesem Grunde geneigt sein kann, ihn für einen vom N. sympathicus zu dem Ganglion sphenopalatinum hinzukommenden Nerven zu halten.

Mehrere Anatomen [1]), unter ihnen neuerlich auch H. Cloquet [2]), glauben an der Stelle der Vereinigung des rechten und linken N. nasopalatinus einen unpaaren, in der mittleren Ebene des Körpers liegenden Nervenknoten gefunden zu haben. Ein solcher unpaarer Knoten kommt sonst an keinem andern Gehirn- oder Rückenmarksnerven, wohl aber an vielen Stellen des sympathischen Nerven vor. Auch die Existenz eines solchen Knotens würde es wahrscheinlich machen, daß der N. nasopalatinus zum sympathischen Nerven zu rechnen sei, wäre sie nicht neuerlich von Arnold in Zweifel gezogen worden, und noch nicht gehörig erwiesen.

2) Ferner vereinigt sich der oberste Halsknoten durch einen in der Regel zum Ganglion petrosum des Nervus glossopharyngeus aufsteigenden, von da durch die Paukenhöhle zur Anschwellung des knieförmig gebogenen Nervus facialis übergehenden Faden, mit dem 9ten und 7ten Gehirnnervenpaare. Da diese knieförmige Beugung des N. vagus durch den Ramus superficialis des N. Vidianus mit dem Ganglion sphenopalatinum

---

1) Siehe die Ausgabe dieses Handbuchs vom Jahre 1802 bei der Beschreibung des N. nasopalatinus.

2) *Hippol. Cloquet*, Traité d'anat. descr. rédigé d'après l'ordre adopté à la faculté de méd. de Paris; 2me éd. Tome II. à Paris 1822. 8. p. 201 und dess. Diss. sur les odeurs, sur le sens et les organes de l'olfaction etc. Paris 1815. 4.

Digitized by Google

und von da durch den N. nasopalatinus mit dem Ganglion nasopalatinum zusammenhängt, so könnte man vielleicht auch auf den Gedanken kommen, auch diesen 2ten Strang für eine Fortsetzung des Knotenstranges des N. sympathicus zu halten, ungefähr so wie es bei den Fröschen offenbar der Fall ist, wo ein doppelter Strang das obere Ende des Knotenstranges des sympathischen Nerven mit dem 5ten Nervenpaare in Verbindung bringt.

3) Endlich vereinigt sich das Ganglion cervicale supremum durch einen oft zur oberen, oft auch zur unteren Anschwellung des Nervus vagus übergehenden Faden mit dem 10ten Gehirnnervenpaare, welche Verbindung aber zuweilen zu fehlen scheint, und daher von einigen, wie von Wutzer, geläugnet worden ist.

Außer diesen offenbaren Verbindungsfäden, welche das Ganglion cervicale supremum mit Gehirnnerven vereinigen, giebt es noch mehrere weniger offenbare, weniger beständige und gewisse Verbindungen.

Nach Haller, Huber, Iwanoff, H. Cloquet und Arnold verbindet sich oben der sympathische Nerv auch mit dem N. hypoglossus oder mit dem 12ten Paare. Arnold sah diese Verbindung nie fehlen; nach Sömmerring und Hirzel ist sie nur selten vorhanden, nach J. F. Lobstein immer nur scheinbar. Nach Gerold, Laumonier, Munniks, Bock, H. Cloquet, Hirzel, Arnold und Langenbeck verbindet sich der sympathische Nerv auch zuweilen mit dem N. oculi motorius, oder mit dem 3ten Paare.

Mit dem N. accessorius Willisii kann er vielleicht auf eine verborgenere Weise an der Stelle verbunden sein, wo dieser mit der hinteren Wurzel des ersten Rückenmarksnerven oder mit der knotenartigen Anschwellung des N. vagus verbunden ist. Denn durch diese letztere Anschwellung hängt nach Bock auch zuweilen der N. hypoglossus mit dem Ganglion cervicale supremum zusammen.

Man sieht hieraus, daß sich das Ganglion cervicale supremum fast mit der Hälfte aller Gehirnnerven verbinde, und daß zuweilen nur die 3 durch ihre Structur so sehr ausgezeichneten Sinnesnerven, der N. olfactorius, opticus und acusticus, so wie das 4te Paar von dieser Verbindung ausgenommen zu sein scheinen.

Mit mehreren dieser Hirnnerven ist das Ganglion cervicale supremum nicht bloß durch einen einfachen Faden, sondern durch mehrere Fäden verbunden.

Aus dem die Carotis interna umgebenden Geflechte geht zuweilen nur ein einziger Faden, oft aber kommen 2 oder 3 Fäden zum N. abducens an der Stelle, wo er durch den Sinus cavernosus und an der äußeren Seite der A. carotis cerebralis vorbeigeht.

Die an der Carotis cerebralis im Canalis caroticus emporsteigenden Fäden des ersten Halsknotens des sympatischen Nerven bilden daselbst oft ein Geflecht. Von diesem Geflechte gehen nach Schmidel Fädchen zum ersten und zum 3ten Aste des 5ten Nervenpaars, nach Laumonier zu dem in der Schädelhöhle befindlichen Theile des 1sten und 2ten Astes desselben, nach Bock zum ersten Aste und zum Gasserschen Knoten, nach Arnold zum 1sten Aste und zum Gasserschen Knoten, nach Langenbeck zu dem 1sten und 2ten Aste des 5ten Nervenpaars in der Schädelhöhle.

Außerdem sahen Fontana [1]), H. Cloquet, Hirzel und Arnold Fäden von diesem Geflechte zum Hirnanhange, und H. Cloquet, zum Trichter gehen. Bock [2]) hatte sich auch ungefähr wie jene Anatomen ausgedrückt.

---

[1]) Siehe *Girardi* de nervo intercostali. Florentiae 1791; in *Ludwig* script. neurol. min. Tom. III. p. 78.

[2]) *Bock* Beschreibung des fünften Nervenpaares p. 66.

Digitized by Google

Mit Recht bestimmt er aber das, was er gesehen hat, in einer neueren Schrift [1]) genauer, indem er sagt, »ein kleiner Zweig geht an einer Arterie zur Schleimdrüse des Gehirns, und dann verliert er sich früher oder später in den Häuten derselben.« Ich meines Theils habe früher mit möchlichster Sorgfalt Untersuchungen über eine solche Verbindung des N. sympathicus mit der Glandula pituitaria bei Säugethieren und Vögeln angestellt, und mich völlig überzeugt, daß keine solche Verbindung der Substanz der Glandula pituitaria und des N. sympathicus bei diesen Thieren existirt.

Knoten, welche der Pars cephalica des sympathischen Nerven, und Nervenzweige desselben, die den in der Nähe gelegenen Organen angehören.

Der beständigste unter diesen Knoten ist das in der Augenhöhle an der äußeren Seite des Sehnerven gelegene Ganglion ciliare oder ophthalmicum, der Augenknoten, ein 2ter auch häufig, aber doch nicht immer vorhandener Knoten ist der an der 3ten Beugung der A. carotis neben dem Türkensattel hinter dem 6ten Hirnnerven gelegene Knoten, ganglion caroticum, oder cavernosum, der Zellknoten.

Das Ganglion caroticum, welches schon von Petit und von Schmidel [2]) oberflächlich bemerkt und von letzterem auch abgebildet, dann von Laumonier, Bock, H. Cloquet, J. F. Lobstein und Hirzel beschrieben, und von Arnold neuerlich gänzlich geläugnet worden ist, ist wenigstens nicht beständig vorhanden. Es liegt in dem Nervengeflechte, welches die Carotis interna umgiebt an der äußeren Seite der Carotis, ist meistens kleiner als das Ganglion ophthalmicum, und hat also etwa 1 Linie im längeren Durchmesser. Von ihm gehen mehrere dünne Fäden aus, von welchen einige schon erwähnt worden sind, nämlich die zum 3ten Hirnnerven zum 1sten Aste und zum Ganglion des 5ten Paares und zu dem Ciliarknoten, oder zu den Wurzeln desselben. Darüber, ob die Gehirnarterien von Aesten des sympathischen Nerven bis zum Gehirne begleitet werden, ist noch Streit. Lancisi, Reil, Ribes, Bock, Arnold und Langenbeck sind theils dieses anzunehmen geneigt, theils glauben sie dergleichen Zweige wirklich wahrgenommen zu haben.

Das Ganglion ophthalmicum, welches schon oben beschrieben worden ist, steht mit dem Nervus nasociliaris des 1sten Astes des N. trigeminus durch die lange dünne, und mit dem unteren Aste des N. oculorum motorius durch die kurze und dicke Wurzel in Verbindung. Außerdem gehen zu ihm nach Ribes, Bock, H. Cloquet, Hirzel, Arnold und Langenbeck ein oder einige sehr kleine Fäden von dem an der Carotis interna gelegenen Geflechte des sympathischen Nerven hin. Zuweilen gelangen diese Fädchen nicht unmittelbar bis zu dem Knoten, sondern sollen nach Bock, H. Cloquet in den N. oculi motorius, oder in den 1sten Ast des 5ten Nervenpaars eindringen, und sich unter der Scheide dieser Nerven bis zu den Wurzeln des Augenknoten verfolgen lassen. Tiedemann fand einmal, daß ein ziemlich starker Faden vom Ganglion sphenopalatinum abging, durch die untere Augenhöhlenspalte in die Augenhöhle drang und mit der von M. oculi motorius berührenden Wurzel in das Ganglion ophthalmicum eindrang.

---

[1]) Bock, Handbuch der practischen Anatomie. Meißen 1820. 8. B. 1. S. 202.

[2]) *C. G. Schmidel*, epistola anatomica, qua de controversa nervi intercostalis origine quaedam disseruntur ad. *Joh. Wilh. Wernerum*. Erlangae 1747.

[3]) Siehe Arnold a. a. O. B. II. S. 157.

Digitized by Google

Chaussier und Riebes [1]) Kusel [2]) Langenbeck fanden ein dünnes Nervenfädchen, welches aus dem an der Carotis int. gelegenen Geflechte, oder nach Tiedemann, Kusel und Langenbeck aus dem Ganglion ciliare selbst mit der A. centralis retinae in den Sehnerven eindrang. Caussier und Ribes sahen unter Wasser, daß ein Bündel des Nervengeflechts an der Carotis interna zur A. ophthalmica überging, und sich für alle ihre Aeste verzweigte und auch die Netzhautpulsader versah. Arnold verfolgte auch dergleichen Aeste eine Strecke an der A. ophthalmica.

Tiedemann [4]) sah an den Augen größerer Thiere, deren Arterien sehr vollkommen angefüllt worden waren, feine, aus dem Ganglion ophthalmicum entspringene Nervenfäden, die die in den Sehnerven eindringenden Arterienzweige und die Ciliararterien begleiteten, und theils in die fibröse Scheide des Sehnerven, theils in die Häute des Augapfels eindrangen und zur Retina gelangten, und glaubte sie bis an die Zonula ciliaris verfolgen zu können. Diesen Eintritt von Nervenfäden mit der A. centralis und auf anderen kleinen Arterienzweigen in den Sehnerven und mit den AA. ciliaribus in den Augapfel nahm er auch an menschlichen Augen wahr.

Langenbeck bildet den in den Sehnerven eindringenden Nervenfaden so ab, als ob er in der Are desselben bis zur Retina verfolgt worden, und sich auf der Retina in Zweige getheilt habe. Bell und Langenbeck sahen auch, daß die Aeste der A. ophthalmica von kleinen, vom 1sten Aste des 5ten Paars hergegebenen Fäden begleitet werden.

Der am Halse gelegene Theil des sympathischen Nerven.

Der oberste Halsknoten, ganglion cervicale supremum, ist länglich, und läuft nach oben und nach unten schmal zu. Er sieht von vielen Blutgefäßen röthlich aus, übrigens ist er von unbeständiger Gestalt [6]) und Länge [7]), liegt vor den obersten Halswirbeln, und erstreckt sich, je nachdem er kürzer oder länger ist, vom ersten bis zum 3ten Halswirbel hinab.

Er enthält einen Faden oder mehrere Fäden vom Vereinigungsaste des ersten und zweiten Halsnerven [8]); einen Faden oder mehrere

---

[1]) *Tiedemanns* etc. Zeitschr. für Physiol. B. II. p. 167.

[2]) *Tiedemanns* etc. Zeitschr. für Physiol. B. II. p. 227.

Ribes, Mémoires de la societé méd. d'émulation. Paris 1811. Vol. VII. p. 97 sq. und *Meckels* Archiv B. IV. S. 620.

[4]) *Langenbeck*, Icones anatomicae; Neurologia; Fasc. 3. Tab. XVIII und XX.

[5]) Zeitschrift für Physiologie. Heidelberg 1824. 4. B. 1. 254—457.

[6]) Bisweilen ist er in der Mitte einmal oder zweimal schmäler, so daß er ein zweifacher oder dreifacher Knoten ist, bisweilen ist er mehr platt, in andern mehr rund. Langenbeck sah ihn völlig in 2 Knoten getheilt. Icones anat. Neurologia; Fasc. III. Tab. XVIII.

[7]) In einigen ist er nur einige Linien, in andern über 2 Zolle lang. Neubauer fand einen von 3 Zoll 9 Linien lang. (De nerv. intercost. §. 9.) Wenn er aber sehr lang ist, vertritt er oft zugleich die Stelle des Ganglion cervicale medium. Dieser Knoten und der sympathische Nerv überhaupt verhält sich oft auf der einen Seite nicht eben so wie auf der andern. Der obere Halsknoten z. B. kann auf der einen Seite sehr lang, auf der andern sehr kurz sein, auf der einen Seite kann das Ganglion cervicale medium da sein, auf der andern kann es ganz fehlen. (Siehe hierüber *Lobstein* de nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis. Parisiis 1823. 4. p. 5.)

[8]) Diese Verbindungsfäden sind nicht da, wenn der Stamm über dem Knoten einen Faden vom ersten Halsnerven erhält. (Neubauer §. 11.)

Digitized by Google

Fäden von dem des 2ten und 3ten Halsnerven, oder auch vom 2ten und vom 3ten Halsnerven einzeln. Der letztere Faden geht jedoch nicht selten unterhalb des Knotens zum Stamme des Nerven.

Vom untern Ende dieses obersten Halsknotens geht der Stamm des Nervens vor den Halswirbeln, und zwar zunächst vor dem M. rectus anticus major, dann vor dem M. longus colli, hinter der Carotis hinab, an welchem er jedoch so wenig anhängt, daß, wenn man die Carotis, den N. vagus und die V. jugularis in die Höhe hebt, der Stamm des N. sympathicus nicht an ihnen, sondern an jenen Muskeln hängen bleibt.

Auf diesem Wege erhält er, wie schon bemerkt worden, bisweilen Fäden vom Vereinigungsaste des 3ten, 4ten [1]) und 5ten Halsnerven, die bisweilen aber zum untern Knoten gehen.

Häufig, nach J. F. Meckel d. j., im Verhältnisse wie 3:1 befindet sich zwischen dem obern und untern [2]) Halsknoten, noch ein mittlerer Halsknoten, ganglion cervicale medium, in der Gegend des 5ten oder des 6ten und des 7ten Halswirbels, meistens aber über der A. thyreoidea inferior [3]). Dieser ist immer kleiner, als der obere, meist auch kleiner als der untere Knoten, selten größer als er.

Er erhält einen oder mehrere Fäden vom 3ten bis 5ten, seltener vom 6ten Halsnerven [4]).

Endlich endigt sich das Halsstück des Nerven im untern Halsknoten, ganglion cervicale infimum [5]). Dieser liegt gewöhnlich vor der Wurzel des Querfortsatzes des 7ten Halswirbels, hinter, über oder vor der A. thyreoidea inferior. Bisweilen hängt er mit dem obersten Brustknoten zusammen. Meistens liegen der mittlere und der untere Halsknoten nahe bei einander, zuweilen so nahe, daß sie in einen Knoten sich zu vereinigen anfangen.

Der untere Halsknoten ist immer kleiner als der obere, und von verschiedener Gestalt, platt, länglich, rundlich, eckig, oval, ꝛc. bisweilen doppelt.

Er erhält einen oder 2 Fäden vom 4ten, 5ten und 6ten, seltner

---

[1]) Selten, wenn der untere Knoten sehr tief liegt, erhält er noch einen Faden vom 8ten, noch seltner einen vom 6ten Halsnerven.

[2]) Bisweilen spaltet sich der Nerv, so daß ein Ast desselben das Ganglion medium, der andere das infimum bilden hilft. (*Haller* el. phys. IV. p. 158.).

[3]) Selten unter derselben, oder vor ihr (Sömmerring Nervenlehre §. 320. Zweite Ausg. §. 272.).

[4]) Neubauer §. 26. glaubte auch eine Verbindung mit dem N. phrenicus gefunden zu haben.

[5]) Oft spaltet sich der Nerv über dem untern Ganglion, und vereinigt sich wieder, so daß er die A. thyreoidea inferior umschlingt. *Neubauer* tab. n. 31. 32.

Digitized by Google

vom 7ten oder vom 8ten Halsnerven, je nachdem er größer oder kleiner ist. Manche von diesen Fäden gehen nach *Bock* im Canalis vertebralis der Querfortsätze der Halswirbel zu ihm herab [1]).

Aus dem untern Halsknoten geht der Stamm des Nervus sympathicus in den sehr nahe bei ihm gelegenen obersten Brustknoten über. Dies geschieht auf verschiedene Weise, doch meistens so, daß er mit ihm durch einige kurze Fäden verbunden ist, und daß durch längere Fäden eine oder 2 Schlingen, ansae, entstehen, welche die A. subclavia umgeben. Wenn diese Schlingen hier fehlen, so befinden sie sich meistens zwischen dem Ganglion cervicale medium und infimum. Zuweilen theilt sich der Hauptstrang des N. sympathicus da, wo er aus dem Ganglion cervicale medium in das Ganglion cervicale infimum übergeht, so, daß ein Theil desselben unmittelbar vom Ganglion cervicale medium in das Ganglion thoracicum primum tritt [2]).

Zweige der Halsknoten und des Stranges zu benachbarten Organen.

An der vorderen Seite des obersten Halsknotens kommen erst über der Stelle, wo sich die A. carotis communis spaltet, die röthlichen sogenannten weichen Nerven, nervi molles [3]), oder Gefäßnerven [4]) von unbeständiger Anzahl, (2, 3 bis 6) hervor. — Sie schlingen sich um die Carotis cerebralis und facialis, und verbinden sich unter einander, auch mit Fäden von den Ramis pharyngeis des Glossopharyngeus und des Vagus, und machen so ein zartes Geflecht aus. Zuweilen bilden sie auch ein kleines, zwischen der Carotis cerebralis und facialis gelegenes Knötchen. Sie begleiten die Aeste der Carotis facialis, und stoßen am Schlunde, an der Submaxillardrüse und an den Stellen mit den beschriebenen Aesten der Gehirnnerven zusammen.

Einer dieser Aeste des obersten Halsknotens oder 2 verbinden sich mit einem Aste des N. laryngeus superior. Vorzüglich stark sind die

---

[1]) *Bock*, die Rückenmarksnerven nebst Abbildungen auf 7 Kupfertafeln in Fol. Leipz. 1827. S. (Text in 8. 543. *J. F. Lobstein*, (De nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis. Parisiis 1823. 4. p. 10) behauptet, daß dieses Ganglion bei den meisten Leichnamen, welche er untersuchte, keine Gemeinschaft mit den Halsnerven gehabt habe.

[2]) Nach J. F. Lobstein a. a. O. S. 11 hängt das Ganglion cervicale infimum mit dem Ganglion thoracicum primum, das von ihm nur etwa 2 Linien weit entfernt ist, gewöhnlich auf eine dreifache Weise zusammen, durch die Fortsetzung des Stammes, durch 2 dünne Zweige, welche um die A. vertebralis eine Schlinge bilden, und endlich durch einen einfachen oder auch nicht selten doppelten Zweig, welcher um die A. subclavia eine Schlinge bildet.

[3]) Zuerst erwähnt in *Lancisi* de gangliis p. 109. Nachher bestimmt und mit jenem Namen benannt in *Haller* (el. phys. IV. p. 236.) Aeußerst genau und umständlich nach mehreren Präparaten beschrieben in *Neubauer* descr. nerv. card. §. 12—18.

[4]) So nennt sie Sömmerring (Nervenlehre §. 318. 2te Ausg. §. 270.), weil sie vorzüglich den Schlagadern angehören.

Digitized by Google

Nervenfäden, welche sich, wie gesagt, dem Plexus pharyngeus, welcher vom N. vagus, accessorius und glossopharyngeus gebildet wird, beigesellen. Einige Fäden begleiten auch die A. thyreoidea superior zur Schilddrüse. Einige steigen an der Carotis cerebralis empor, und bilden daselbst mit Aesten des N. glossopharyngeus ein Netz, in welchem zuweilen ein kleiner platter Knoten befindlich ist.

Ein langer Faden, nervus cardiacus longus, der bald aus dem unteren Ende des Ganglion cervicale supremum, bald aus dem Strange des N. sympathicus entspringt, zuweilen fehlt, nicht selten aber mit einem Faden vom N. laryngeus superior, oder weiter unten mit einem Aste vom N. vagus in Verbindung steht, geht zum Plexus cardiacus hinab. Er liegt mehr nach innen als der Hauptstrang des N. sympathicus, und ist dünner als er.

Aus dem mittlern Halsknoten, wenn er da ist, oder wenn er fehlt, aus dem Stamme des N. sympathicus in der Gegend desselben, gehen oft einer oder 2 Fäden zu dem an der Aorta liegenden Plexus cardiacus hinab, die sich auch mit dem Nervus cardiacus longus und mit dem Recurrens verbinden, und Fäden zu den Kranzadern des Herzens und zuweilen auch zum Schlunde schicken.

Andere Zweige umgeben die A. thyreoidea inferior, die A. vertebralis und die A. subclavia mit einem Netze. Aus dem Stamme des N. sympathicus über dem untern Halsknoten kommen einer oder 2 Fäden, die sich mit den ebengenannten Fäden, auch mit Fäden des N. cardiacus longus und des N. vagus ꝛc. zum Plexus cardiacus verbinden.

Aus dem untern Halsknoten gehen einer, 2 oder mehrere Fäden hinab, die zum Plexus cardiacus kommen, sich mit Fäden des Stammes des N. vagus und des von ihm entspringenden N. recurrens, ferner mit Fäden des Nervus cardiacus longus, mit den des mittlern Halsknotens oder des Stammes des sympathischen Nerven verbinden. Zuweilen entspringt der dickste von den Fäden, die zu dem Herzgeflechte gehen, von dem untern Halsknoten oder von dem Ganglion thoracicum primum, zuweilen aber auch von dem mittleren Halsknoten.

In dem Plexus cardiacus kommt bisweilen ein kleines Knötchen vor, und unter den Herznerven, die durch die Vereinigung mehrerer Fäden in diesem Geflechte zusammengesetzt werden, zeichnet sich einer durch seine Größe vorzüglich aus. Wrisberg [1]) gab ihm den Namen nervus cardiacus maximus. Er und noch ein 2ter ziemlich dicker

[1]) *Wrisberg*, de nervis arterias venasque comitantibus comment. §. 23. und Sylloge comment. anat. Goetting. 1786. 4. p. 59.

Digitized by Google

Aſt liegen zwiſchen der Luftröhre und der Aorta, und gehen dann zwiſchen der Aorta und der A. pulmonalis zum Herzen, und ſtehen daſelbſt, von der rechten und linken Seite kommend, in wechſelſeitiger Verbindung. Nach den Unterſuchungen von Ribes [1]), ſo wie auch nach denen von Baur [2]) gehen von den Geflechten, welche die A. subclavia umgeben, Fäden auch an der Armarterie hin. Nach Scarpa [3]) begleiten einige Fäden, die aus dieſem Geflechte kommen, die A. mammaria interna und die A. thymica in die Cavitas mediastini antica. G. Coopmann glaubte ſogar Aeſte vom N. vagus und vom N. sympathicus zum Herzbeutel und zur V. cava superior verfolgt zu haben [4]).

Der in der Bruſthöhle gelegene Theil des ſympathiſchen Nerven. Pars thoracica nervi sympathici.

Der Anfang dieſes Theiles des Nervus sympathicus iſt der obere oder große Bruſtknoten, ganglion thoracicum primum s. supremum s. magnum. Dieſer Knoten iſt nächſt dem oberſten Halsknoten der größte des Knotenſtrangs. Immer iſt er größer als die folgenden Bruſtknoten und als der untere Halsknoten. Er liegt vor dem Köpfchen der erſten Rippe, hinter der A. subclavia, und reicht mehr oder weniger hinauf oder hinab, und verſchmilzt bisweilen mit dem 2ten Bruſtknoten oder mit dem unterſten Halsknoten. Seine Geſtalt iſt unbeſtändig, plattrundlich, oval, eckig, cylindriſch ꝛc.

Er empfängt die Fortſetzung des Stammes des Nervus sympathicus, ferner einen anſehnlichen Faden vom 1ſten Rückennerven, auch Fäden vom 8ten, 7ten, 6ten Halsnerven ꝛc. Mehrere aus dem Canalis vertebralis der Querfortſätze der Halswirbel hervortretende Fäden ſtehen mit ihm in Verbindung. Einige von ihnen ſind Aeſte der unteren Halsnerven, die auf dieſem Wege zu ihm gelangen, andere ſcheinen die A. vertebralis als Gefäßnerven zu begleiten. Dieſe letztere verfolgte Bock bis zum 2ten Halswirbel hinauf [5]).

Das Ganglion thoracicum primum giebt Fäden zum Plexus

---

[1]) *Ribes*, Mém. de la soc. d'émulat. VIII. 1817, und in *Meckels* Archiv V. p. 442.

[2]) *Chr. Jac. Baur*, Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani etc. Tubingae 1818. 4. p. 15.

[3]) *A. Scarpa*, Tabulae neurologicae ad illustrandam historiam cardiacorum nervorum. Ticini 1794. p. 28.

[4]) *G. Coopmann*, Neurologia Franeck 1781. p. 106 und 342.

[5]) J. F. Lobſtein ſah vom Ganglion cervicale medium Zweige zwiſchen dem 4ten und 5ten Halswirbel in den Vertebralcanal treten, zur A. vertebralis gehen, und in ihr endigen.

Digitized by Google

cardiacus, von welcher bisweilen einer oder einige den großen Herznerven bilden helfen.

Vom obersten Brustknoten geht der Nervus sympathicus an der vordern Fläche der Köpfchen der Rippen, neben den Rückenwirbeln hinab, und hat noch elf [1]) Brustknoten, ganglia thoracica, welche kleiner als der obere, platt, übrigens von verschiedener Gestalt, meist dreieckig, auch von verschiedener Größe sind. Der Stamm des Nerven geht von jedem dieser Knoten zum nächst untern hinab. Die Dicke des Stamms ist nicht in allen Zwischenräumen gleich, auch ist er bisweilen in einem oder dem andern Zwischenraume doppelt so groß.

In jedem Spatium intercostale liegt ein solcher Knoten. Jeder Knoten empfängt einen, 2 oder 3 Fäden vom Ramus intercostalis des nächsten Rückennervens. Wo nur ein Faden zu ihm kommt, da ist dieser dicker, ꝛc.

Aus den Knoten gehen Aeste zur absteigenden Aorta, auch Aeste zum Plexus oesophageus des N. vagus.

Die Knoten, ungefähr vom 6ten bis zum 11ten geben stärkere Fäden schräg einwärts hinab, welche an den Körpern der Wirbelsäule den Nervus splanchnicus major zusammensetzen und zuweilen, wenn ein vom 9ten oder 10ten und 11ten Ganglion kommender Faden sich nicht mit den großen Eingeweidenerven vereinigt, noch einen 2ten kleineren Eingeweidenerven den Nervus splanchnicus minor bilden [2]). Der N. splanchnicus major läuft hinter der Brusthaut gewöhnlich zwischen dem mittleren und inneren Schenkel des Zwerchfells, selten durch den Hiatus aorticus in die Unterleibshöhle. Der N. splanchnicus minor, wenn er vorhanden ist, durchbohrt meistens die Fasern des Zwerchfells am mittlern Zwerchfellschenkel.

Bisweilen kommt von den letzten Brustnerven ein Nervus renalis posterior superior, der hinter dem Schenkel des Zwerchfelles herab, und über den Nierenadern zur Niere geht.

Diesen Nerven führt Wrisberg unter dem Namen N. splanchnicus minor auf, weil er den Nerven, welchen Walter N. splanchnicus minor nennt, nicht fand.

---

[1]) Von welchem Theile des Knotenstranges die den N. splanchnicus zusammensetzenden Nerven auf eine sichtbare Weise abgehen, ist sehr unbestimmt. In der That kommt auch darauf nicht viel an, ob die von einem Knoten zu ihm gegebenen Fäden sogleich den Knotenstrang verlassen, oder sie noch eine Strecke hindurch mit dem Knotenstrange verbunden bleiben. Je länger keine Fäden von ihm abgehen, desto dicker wird der Knotenstrang. Nach Wrisberg wird der N. splanchnicus major mindestens aus 3, höchstens aber aus 8 Fäden zusammengesetzt.

[2]) Also insgesammt elf oder zwölf Ganglia thoracica.

Digitized by Google

Der an den Lendenwirbeln gelegene Theil des sympathischen Nerven, Pars lumbaris nervi sympathici.

Vom untersten Brustknoten tritt die Fortsetzung des Nervus sympathicus magnus zwischen dem Crus externum und medium, oder durch das Crus externum der Pars lumbaris des Zwerchfells aus der Brust in den Unterleib, geht dann an der Seite der Lendenwirbel (weiter nach der Mitte zu liegend, als in der Brust,) hinab, und bildet die **Lendenknoten** (ganglia lumbaria). Meist sind ihrer fünfe, einer bei jedem Lendennerven, doch bisweilen auf einer Seite oder auf beiden nur 4, seltner nur 3. Bisweilen sind 2 Knoten in einen länglichen Knoten vereinigt. Die 4 oberen liegen wie gesagt weiter von ihren Nerven nach innen entfernt, als die Brustknoten und Kreuzbeinknoten. Sie sind meistens länglich und nehmen im Allgemeinen vom 1sten bis zum 5ten an Größe zu, doch ist bisweilen das 2te größer, als das 3te, ꝛc. Die Dicke des Stamms ist nicht in allen Zwischenräumen gleich; auch ist er bei einigen in einem oder dem andern Zwischenraume doppelt, dreifach ꝛc.

Jeder Knoten empfängt Fäden von dem nächstobern Lendennerven, 2 bis 3, die je mehr, desto dünner sind. Bisweilen geht auch einer oder der andere Faden zum Nerven zwischen 2 Knoten, oder auch, es kommen Fäden, welche von 2 benachbarten Lendennerven abgegeben worden sind, zu einem Knoten.

Aus den Lendenknoten, theils auch aus dem Strange zwischen denselben, kommen Fäden, die zur Aorte, zu den A. A. iliacis lumbaribus ꝛc. gehen.

Einige Fäden vereinigen sich vor den Lendenwirbeln mit einander in **Nebenknötchen**, die weiter nach der Mitte liegen, andere kommen bisweilen vor den Lendenwirbeln mit Fäden der andern Seite zusammen.

Aus dem obersten Theile des Stranges, oder aus dem obersten Ganglion lumbare, oder noch höher, kommt der Nervus renalis posterior inferior, der hinter den Schenkeln des Zwerchfells zur Niere geht.

Pars sacralis.

Von der vorderen Fläche des letzten Lendenwirbels gelangt der Nervus sympathicus auf die vordere Fläche des Kreuzbeins, geht auf derselben, weiter nach der Mitte liegend, als die vorderen Kreuzbeinlöcher, hinab, lenkt sich, wie der Kreuzbeinknochen allmählig schmäler wird, auch allmählig mehr nach der Mitte, so daß er sich dem nämlichen Nerven der anderen Seite nähert, und endlich auf der vorderen Fläche des

Digitized by Google

Steißbeins beide Nervi sympathici mit einander unter einem spitzigen Winkel oder in einer Schlinge [1]), vereiniget werden [2]).

Auf diesem Wege bildet er die **Kreuzbeinknoten**, ganglia sacralia, deren gemeiniglich fünf, selten einer mehr oder weniger sind. Die 4 oberen liegen neben den 4 vorderen Kreuzbeinlöchern, der 5te liegt neben dem Ausgange des 5ten Kreuzbeinnerven zwischen dem Kreuzbeine und dem Steißbeine. Sie sind platt, übrigens von verschiedener Gestalt, meist eckig, und nehmen vom ersten bis zum letzten an Größe ab. Der Stamm ist zwischen diesen Knoten von verschiedener Dicke, und viel dünner, als in der Pars lumbaris; auch ist er bei einigen in einem und dem andern Zwischenraume doppelt, dreifach ꝛc.

Jeder Knoten empfängt einen, 2, 3 Fäden vom nächsten höheren, zuweilen auch von tieferen Kreuzbeinnerven, die, je mehrere ihrer sind, desto dünner gefunden werden. Auch gehen theils Fäden zu dem zwischen den Knoten gelegenen Strange des Nerven. Diese zu den Kreuznerven gehenden Fäden sind an manchen Stellen sehr kurz, so daß die Knoten den Kreuznerven sehr nahe sind.

Aus den Kreuzbeinknoten, theils auch aus den Theilen des Nerven zwischen denselben, gehen Fäden zu dem Beckengeflechte, plexus hypogastricus des N. sympathicus, zum Mastdarme und zu den Arteriis sacralibus, ꝛc.

Einige Vereinigungsfäden kommen an der vorderen Fläche des Kreuzbeins schräg oder auch quer zum Nervus sympathicus der andern Seite hinüber, so daß sie beide Nerven mit einander verbinden.

Indem endlich beide Nervi sympathici vor dem Steißbeine sich vereinigen, entsteht daraus das unpaare von oben nach unten längliche **Steißbeinknötchen**, ganglion coccygeum, aus welchem einige Fädchen in das benachbarte Zellgewebe gehen. Nicht selten fehlt das Knötchen ganz, und es ist dann nur eine Schlinge vorhanden, aus welcher jene kleinen Nervenzweige austreten.

Geflechte des sympathischen Nerven in der Brust- und Unterleibshöhle.

Geflechte in der Brusthöhle, das Geflecht für das Herz, für die Lungen und für die Speiseröhre.

Theils vor dem Aortenbogen, noch mehr aber zwischen der aufsteigenden Aorta und dem rechten Aste der Lungenarterie, und auch endlich

[1]) Diese Endigung und Vereinigung beider großer sympathischer Nerven hat zuerst J. G. Walter entdeckt und abgebildet auf s. Tab. I. Fig. 1. nervor. thoracis et abdominis.

[2]) *Jo. Frid. Lobstein*, de nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis p. 38.

neben ihr, daß heißt vor und hinter dem Stamme der Lungenarterie, liegt das Herzgeflecht, plexus cardiacus, welches meistentheils von den schon erwähnten Zweigen der 3 Halsknoten und des ersten Brustknotens, ferner von einigen kleineren Aesten des N. vagus und seines Astes, des N. recurrens, zusammengesetzt wird. In einigen von den Anatomen aufgezeichneten Fällen soll auch der Ramus descendens des N. hypoglossus damit im Zusammenhange gestanden haben.

Immer kommen in diesem Geflechte die Nerven von beiden Seiten, von der rechten und von der linken Seite her in der mittleren Ebene, die den Körper in 2 Hälften theilt, zusammen.

Die Zahl und die Größe der vom obersten, mittleren und unteren Halsknoten, und vom ersten Brustknoten kommenden in dieses Geflecht tretenden Nerven, ist unbestimmt. Meistentheils ist die Zahl, die Größe und die Anordnung dieser Fäden, nicht einmal auf der rechten Seite eben so beschaffen wie auf der linken.

Die Nervenzweige des N. sympathicus, welche auf der rechten Seite vor der A. anonyma und auf der linken Seite vor dem Aortenbogen herabgehen, nennen manche Anatomen plexus cardiacus superficialis, die viel dickeren und zahlreicheren Nervenzweige dagegen, welche vom sympathischen Nerven und vom N. vagus hinter dem Aortenbogen zwischen ihm und der Luftröhre herabgehen, nennen dieselben plexus cardiacus magnus oder profundus. Beide Geflechte hängen unter einander zusammen, und können nicht einzeln zum Herzen verfolgt werden, auch gehört der N. cardiacus longus, wenn er vorhanden ist, beiden Geflechten an.

Einige von den Nerven, welche hinter der Aorta weggehen und sich durch ihre Dicke vorzüglich auszeichnen, entspringen zwar hauptsächlich aus Fäden des Ganglion cervicale medium, infimum und thoracicum primum. Indessen stehen sie auch mit den Fäden, die der N. vagus, und namentlich auch sein Ast der N. recurrens giebt, und mit dem N. cardiacus longus, wenn er vorhanden ist, in Verbindung. Die von der rechten und von der linken Seite gekommenen Nervenfäden stoßen zwischen der A. aorta und dem rechten Aste der A. pulmonalis zusammen. An dieser Stelle zuweilen aber auch schon höher oben, sind hier und da an den Vereinigungsstellen der Nerven kleine, sich aber nicht bei verschiedenen Menschen gleich bleibende Verdickungen, die man für kleine Nervenknoten halten könnte, sichtbar.

Von der Stelle aus an dem Anfange der hinteren Wand der Aorta, wo sich die von der rechten und linken Seite gekommenen Nervenfäden zum Theil vereinigt haben, gehen Nervenfäden zum Atrium dextrum. Einige laufen nämlich zur A. coronaria dextra und gehen mit derselben

Digitized by Google

zur Querfurche des Herzens und zum rechten Ventrikel, andere gehen unmittelbar zu dem in der Querfurche herumgebogenen Aſte der A. coronaria dextra, und verſtärken das aus jenen Nervenfäden entſtandene Geflecht, das man plexus coronarius dexter nennt. Die Zahl und Größe der dieſen Plexus bildenden Nervenfäden, ſteht mit der viel geringeren Menge der Fleiſchfaſern im Verhältniſſe, welche in der rechten Herzhälfte enthalten ſind; der Plexus coronarius dexter iſt daher kleiner als der Sinister. Uebrigens bekommen ſowohl das rechte Atrium als der rechte Ventrikel von jenem Plexus ſeine Nerven. Andere hinter dem Anfange der Aorta und der Lungenarterie gelegene Nervenzweige begeben ſich zur linken Herzhälfte, indem ſie zum Theil zwiſchen der Aorta und der A. pulmonalis vorn zum Vorſchein kommen und die A. coronaria sinistra begleiten, theils hinter dem Anfange der A. pulmonalis und dem Atrio sinistro hin zu dieſer Herzhälfte gehen.

Zwar begleiten die Herznerven großentheils Aeſte der Herzarterien, indeſſen trifft man auch, wie Scarpa und Lobſtein gezeigt haben, bei einer genauen Verfolgung der Aeſte derſelben Nervenfäden an, welche ihren eigenen von dem Laufe der Arterien verſchiedenen Weg verfolgen.

So ſahe Lobſtein [1]) einige Fäden der Art, die nicht von Arterien begleitet wurden, zu dem Fleiſche des rechten und des linken Atrii gehen. Einen an der Baſis des linken Ventrikels liegenden Nerven ſahe er in die Tiefe dringen und ſich in einem Papillarmuskel und auch einige andere Zweige ſich im Fleiſche des linken Ventrikels endigen.

Was die Frage anlangt, ob die auf der rechten und die auf der linken Seite des Körpers entſprungenen Herznerven ſich gleichmäßig zu allen 4 Abtheilungen des Herzens verbreiten, ſo hat ſchon Scarpa [2]) den Satz ausgeſprochen, daß ſie von beiden Seiten her an der Grundfläche des Herzens ſo zuſammenkommen und ſich ſo durchkreuzen, daß ſowohl die vordere als auch die hintere Seite beider Herzhälften aus den auf der rechten und auf der linken Seite des Körpers entſprungenen Herznerven Fäden erhalten.

Ueberſieht man nun den Urſprung der Herznerven und der mit der Lungenarterie in die Lungen eindringenden Nerven, ſo findet man, wie auch Lobſtein verſichert, daß zwar kein einziger Zweig des N. vagus unmittelbar in die Subſtanz des Herzens eindringe, daß aber wohl mehrere Aeſte deſſelben ſich dem Herzgeflecht beimiſchen. Indeſſen entſtehen immer die meiſten Herznerven aus dem N. sympathicus. Bei den Nerven der Lungen verhält ſich's umgekehrt. Sie ſind ihrem größ-

---

[1]) *Joh. Fr. Lobstein*, De nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis etc. Parisiis 1823. 4. p. 15. 14.

[2]) *Scarpa* a. a. O. §. 7.

ten Theile nach fortgesetzte Aeste des N. vagus. Nach Lobstein stoßen der Plexus pulmonalis und der Plexus cardiacus an der A. pulmonalis unter einander zusammen. Auch am Lungengeflechte befinden sich bisweilen kleine Nervenknoten eingestreuet, welche kürzlich Langenbeck abgebildet hat. Nach Sabathier sollen auch kleine Nervenzweige zu den Lungenvenen gehen, welche aber Behrends und Lobstein nicht finden konnten [1]).

Der Oesophagus erhält seine Nerven fast ganz allein vom N. vagus.

Geflechte in der Bauchhöhle, Plexus coeliacus.

Beide Nervi splanchnici kommen unter dem Zwerchfelle in dem Bauchgeflechte (plexus coeliacus s. semilunaris oder solaris) zusammen, in welchem sich 2 unter einander verbundene, sehr große Knoten, einer auf der rechten der andere auf der linken Seite neben der A. coeliaca befinden. Man nennt diese Knoten ganglia coeliaca, oder ganglia semilunaria, oder ganglia solaria abdominalia, oder splanchnica [2]). Sie sind die größten Nervenknoten des ganzen Körpers. Ihre Gestalt aber bleibt sich nicht gleich. Dieses vor der Aorta liegende und längs den Aesten der von ihm umgebenen A. coeliaca sich hinziehende Geflecht nimmt auch Fäden vom Par vagum auf, und steht mit den Nervis phrenicis in Verbindung. Auch vom untersten Ganglion thoracicum erhält es einen Zweig. Die Gestalt dieses Geflechtes ist in verschiedenen Körpern sehr verschieden. Im Allgemeinen besteht es aus vielen Nervenfäden und Nervenknoten, in welchen diese Fäden mit einander verbunden sind. Diese Knoten sind platt, eckig, röthlich, bisweilen durchlöchert.

Plexus gastrici, hepatici, splenici etc.

So heißen nach den Arterien, welche sie mit Netzen umgeben, die Fortsetzungen des Plexus coeliacus.

Aus diesem Geflechte kommen:

1) Rami phrenici zur unteren Fläche des Zwerchfells.
2) Rami suprarenales zur Nebenniere.

---

[1]) *Lobstein* a. a. O. p. 17.

[2]) Zuerst beschrieb dieses Geflecht mit einer unvollkommenen Abbildung Vieussens (neurograph. p. 188. sqq. Tab. XXIII.) Die erste richtige und schöne Abbildung, auf welcher aber die Nerven zum Theil etwas zu dünn vorgestellt sind, ist die von Walter auf seiner Tab. II. III. nervor. thor. et abd. — Sehr genau beschreibt die Verschiedenheit dieses Geflechtes: Wrisberg in s. obss. de nerv. visc. abd. Sect. IV. Neuerlich ist es von Manec, (Anatomie analytique. Paris 1823. Fol.) und auf vielen Tafeln von Langenbeck abgebildet worden, und Wutzer ist noch jetzt damit beschäftigt, über die Verschiedenheit der Gestalt des Ganglion coeliacum Untersuchungen zu machen.

Digitized by Google

3) Plexus gastricus superior s. coronarius ventriculi, der die A. A. coronarias am concaven Bogen des Magens begleitet, an deſſen Bildung aber die Aeſte des N. vagus den größten Antheil nehmen.

4) Plexus hepaticus sinister s. anterior, der mit der A. hepatica zur Leber geht.

5) Plexus hepaticus dexter s. posterior, der mit der Vena portarum zur Leber geht, dem gemeinen Gallengange, dem Blaſengange, der Gallenblaſe, dem Lebergange, dem Magen, dem Zwölffingerdarme, dem Pankreas und auch dem Netze auf der rechten Seite Aeſte giebt, die am converen Bogen des Magens hingehen und zum Magen und zum großen Netze Zweige geben.

6) Plexus splenicus iſt ein Netz, das etwa aus 2 Fäden entſteht, von welchen der eine nach Lobſtein eine Fortſetzung des N. vagus zu ſein ſcheint. Er geht mit der A. splenica hinter dem Pankreas fort. Die Nerven der Milz ſind ſehr klein. In das Pankreas dringen einzelne Nerven aus dem Ganglion coeliacum und Fäden von dem Milzgeflechte ein.

Die zum großen Netze gehenden Aeſte bleiben in der Subſtanz der Schlagadern deſſelben, ohne ſich in der häutigen Subſtanz des Netzes ſelbſt auf eine ſichtbare Weiſe zu verbreiten [1]).

Plexus mesentericus superior.

Dieſer iſt eine Fortſetzung des Plexus coeliacus, ſo daß aus den Gangliis coeliacis Fäden kommen, die ihn zuſammenſetzen. Er geht an der A. mesenterica superior, dieſelbe umgebend, hin, und zertheilt ſich in eine Menge Aeſte, welche im Mesenterium und Mesocolon zum ganzen dünnen Darme, zum rechten Grimmdarme und zum queren Grimmdarme gehen.

Plexus renales.

Zu den beiden Nieren gehen die beiden Plexus renales, welche vom Plexus coeliacus und mesentericus superior entſpringen, deren jeder die A. renalis begleitet, und Knoten (ganglia renalia) in unbeſtändiger Anzahl hat, zu denen noch der Nervus renalis posterior und posterior inferior kommen.

Plexus spermatici.

Zu den beiden Saamenſträngen kommen die beiden Plexus spermatici, deren jeder von dem Plexus renalis ſeiner Seite entſpringt,

[1]) *Walter* tabb. nerv. thor. et abd. p. 17.

Digitized by Google

aus 3 bis 4 dünne Fäden besteht und an den Vasis spermaticis, im männlichen Körper zum Hoden, im weiblichen zur Mutter und den Eierstöcken hinabgeht.

Unterwegs geben diese Plexus Fäden zum Harngange ab.

Zu ihnen kommen noch Fäden von den Gangliis spermaticis, welche am unteren Theile der Aorte liegen, und vom Plexus mesentericus superior und inferior, sowie auch von den Renalibus, Fäden erhalten.

Plexus mesentericus inferior.

Dieser wird aus Fäden des Plexus mesentericus superior, der Plexuum renalium, die an der Aorte hinabgehen, und von hinzukommenden Fäden der Lendenknoten und des Stranges des Nervus sympathicus selbst ꝛc. zusammengesetzt, und vertheilt sich im Mesocolon zum linken Grimmdarme und zum Mastdarme.

Einige allgemeine Bemerkungen über den Zusammenhang dieser Plexus unter einander und mit dem N. vagus.

Nach Lobsteins Untersuchung der Verbreitung des N. Vagus und des N. sympathicus im Unterleibe, hing die Fortsetzung des rechten N. vagus, welche an die vordere Seite des Magens trat, nicht mit dem Plexus solaris zusammen, sondern schickt eine Anzahl Fäden, die an der kleinen Curvatur des Magens hinlaufend, nach links dünner wurden und bis in das zwischen der Muskelhaut und Schleimhaut liegende Zellgewebe verfolgt werden konnten. Eine solche Verbreitung dieser Nerven in der Muskelhaut, aus welcher geschlossen werden könnte, daß gewisse Fäden den Fleischfasern angehörten, konnte er nicht finden. Nur an der Einsenkungsstelle des Oesophagus schien ein Fädchen sich so zu verhalten.

Die Leber erhält nach ihm sowohl vom Ganglion semilunare dextrum als auch von dem sinistrum Nervenfäden, mit welchem sich die des linken N. vagus verbinden. Die vom linken Ganglion semilunare zu ihr gehenden Nervenfäden laufen auch nach ihm mehr an der vorderen Seite der A. hepatica, die vom rechten mehr an der V. portae hin. Nach Lobstein gehen von jenem Geflechte mehrere Fäden mit der A. gastro-duodenalis zum Duodenum und zum Pancreas ab. Er glaubt ferner einige Nervenzweige verfolgt zu haben, welche sich in den Häuten des Ductus choledochus endigten. Obgleich die von dem Ganglion semilunare dextrum entspringenden, zur Leber gehenden Nervenfäden locker an die V. portae angeheftet sind, so ist es doch schwer, Nervenfäden zu beobachten, die der V. portae selbst angehören und sie fortwährend begleiten. Indessen glaubt Lobstein, daß es ihm doch endlich gelungen sei, einige solche Fäden zu beobachten.

Die Nerven, welche die Milzarterie zur Milz begleiten, bestehen nach Lobstein aus 2 Strängen, von welchen der eine vom rechten N. vagus, der andere vom linken Ganglion semilunare abgeht. Vom rechten Ganglion semilunare erhält die Milz nach Lobstein keine Nervenfäden. Diese Nerven bilden ein die Milzarterie umgebendes Netz. Am Hilus lienalis begleiten immer je 2 Nerven einen Arterienast. Aber schon bei der 2ten Theilung dieser Arterie verlassen sie dieselben nach Lobstein und setzen ihren Weg allein durch das Parenchyma der Milz fort.

Der Kopf des Pancreas erhält nach Lobstein seine Nerven vorzüglich von dem rechten Ganglion semilunare, der linke Theil desselben vorzüglich aus dem linken.

Zu dem Plexus mesentericus superior, der mit beiden Gangliis semilunari-

bus zusammenhängt, setzt sich nach Lobstein ein Zweig des rechten N. vagus fort. Ein kleiner Zweig desselben konnte von demselben Anatomen sogar bis zur A. coliaca media verfolgt werden.

Da nun von dem Plexus mesentericus superior eine unmittelbare Fortsetzung zur A. mesenterica inferior geht, so ist dieser selbst als eine unmittelbare Verlängerung des Plexus coeliacus anzusehen. Die Plexus renales stehen nicht in einer so unmittelbaren Verbindung mit dem Plexus coeliacus.

Plexus hypogastricus superior bei Frauen [1]).

Er ist unpaar, entsteht aus Fäden welche vom Plexus mesentericus inferior, von dem unteren Theile des Lendenstücks des sympathischen Nerven hinter der A. iliaca und von dem Knoten im Nierengeflechte zu ihm übergehen. Er liegt auf der Mitte des Körpers des letzten Lendenwirbels und auf dem Promontorio zwischen den Arteriis iliacis und theilt sich unten in 2 um den Mastdarm seitwärts herumgehende Plexus, welche einigen zum Uterus, zur Harnblase und zum Mastdarme gehenden Aesten der A. hypogastrica folgen. Von ihm entspringen wie W. Hunter, und vorzüglich Tiedemann und Langenbeck gezeigt haben, wichtige Nerven für den Uterus.

Plexus hypogastricus inferior.

Dieser ist nicht unpaar, sondern doppelt, einer gehört der rechten, der andere der linken Seite an. Er liegt theils neben, theils vor dem Mastdarme, vor den Lendenwirbeln und dem heiligen Beine, entsteht aus Fäden des Plexus hypogastricus superior, des Nervus sympathicus und aus Fäden, welche von dem Kreuzknoten desselben kommen. In ihn gehen aber auch vom 3ten und 4ten Kreuznerven sehr bedeutende Zweige über. In ihm liegen einige Knoten, ganglia hypogastrica, eingestreuet. Seine Zweige vertheilen sich zu den Schlagadern des Beckens, zum Mastdarme, zur Harnblase, und zu dem untersten Theile der Harngänge, in Männern zu den Saamenbläschen, in Weibern zu dem unteren Theile der Gebärmutter und zur Scheide.

Ueber die Nerven des Uterus stimmen die Untersuchungen verschiedener Anatomen nicht überein. Darüber sind zwar alle Anatomen derselben Meinung, daß sie bei alten Frauen und unreifen Mädchen sehr dünn sind. Aber nach W. Hunter [2]) sollen sie bei den Frauen während der Schwangerschaft an Dicke zunehmen, und so fand sie auch Tiedemann bei 3 nach der Geburt gestorbenen Frauen und behaup-

---

[1]) Siehe Tiedemanns unten angeführte Schrift.

[2]) *W. Hunter*, anatomische Beschreibung des menschlichen schwangeren Uterus, a. d. Engl. übers. von *Froriep*. Weimar 1802. und *F. Tiedemann*, Tabulae nervorum uteri. Heidelbergae 1822. Fol. 5. 10. *Ehrmann* in *Lobstein* de nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis. Parisiis 1823. 4. p. 18.

tete, sie auch bis in die Substanz des Uterus verfolgt zu haben. Lobstein [1]) dagegen, ob er gleich auch den Uterus kurze Zeit nach der Geburt untersuchte, konnte doch keine deutliche, im Uterus sich verbreitende Nerven finden.

Die Verschiedenheit des Plexus spermaticus und hypogastricus beim männlichen und weiblichen Geschlechte ist noch nicht gehörig auseinandergesetzt worden.

Seb. Götze hat neuerlich den Plexus spermaticus des männlichen Geschlechts (wie es scheint auf der rechten Seite) mit vieler Mühe untersucht. Aus seiner Beschreibung geht hervor, daß die die A. spermatica begleitenden Nervengeflechte viel zahlreicher sind als man glauben sollte. Sie entspringen von Ganglien, welche an der Aorta liegen, vom Plexus mesentericus superior und inferior, vom Plexus renalis und vom hypogastricus. In diesen die Arteria spermatica begleitenden Geflechten befanden sich im Unterleibe vorzüglich 2 sich durch ihre Größe auszeichnende Ganglien, und außer ihnen kamen noch 2 Ganglien in diesem Geflechte vor, nachdem es die Unterleibshöhle verlassen hatte. Das obere lag auf der Vena cava unter der A. spermatica, stand mit den Ganglien an der Aorta, mit dem Plexus renalis und mit dem Plexus spermaticus in Verbindung, und war rundlich und von einem großen Umfange.

Das untere Ganglion, daß sich durch seine Größe so sehr auszeichnete, lag auf der A. iliaca ungefähr 2 Zoll vom Annulus abdominalis entfernt, war dreieckig, und stand nicht nur mit dem Plexus spermaticus, sondern auch mit dem hypogastricus in Verbindung. Am Annulus abdominalis kamen ungefähr 6 größere und viele kleinere Nervenfäden an.

Von den Knoten, welche dem Geflechte eingestreuet waren, nachdem es die Unterleibshöhle verlassen hat, lag einer an der Stelle, wo der Funiculus spermaticus über das Ligamentum Poupartii weggeht. Er war dreieckig, der andere lag tiefer. Uebrigens wurde auch der Ureter von sehr dünnen Nerven begleitet, die ihren Ursprung theils aus dem Plexus renalis, theils aus dem Plexus spermaticus hatten, auch sahe Götz, daß das Vas deferens von einem sehr reichen und eleganten, aus dem Plexus hypogastricus stammenden Nerven nahe umgeben sei [2]).

---

[1]) *Joh. Fr. Lobstein*, De nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis Commentatio 1823. 4. p. 31. »Rarissime in uteri substantiam, tum vacui tum gravidi, sese immittere videntur nervorum surculi. In utero puerperae, duodecim horas post partum mortuae, accurato examine instituto, nullos reperi nervos, neque a plexu spermatico neque ab hypogastrico emissos, quamvis vasa sanguinea et lymphatica admodum fuerint distensa. Hac occasione inquirere volui ope microscopii, an tunicis istorum vasorum aliquis adhaeserit surculus nerveus; sed omni cura adhibita detegere potui nullum.

[2]) *Sebastianus Götz*, Prodromus neurologiae partium genitalium masculinarum. Erlangae 1823. 4.


Digitized by Google